

بررسی ارتباط مؤثرترین عوامل خاکی و مدیریتی با پراکنش گروه گونه‌های اکولوژیک و محاسبه سهم مشترک آنها (مطالعه موردی: مرتع بیلاقی چهارباغ، استان گلستان)

اسماعیل شیدایی کرکج^{۱*}، سیده زهره میردلیمی^۲ و موسی اکبرلو^۳

*- نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای علوم مرتع، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران، پست الکترونیک: esmaeil_sheidayi@yahoo.com

- دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

- دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

تاریخ دریافت: ۹۱/۶/۴ تاریخ پذیرش: ۹۲/۴/۲۲

چکیده

در این تحقیق برای تدبیر صحیح مدیریتی منطبق بر اصول اکولوژیک، رابطه پراکنش گروه گونه‌های اکولوژیک مرتع بیلاقی چهارباغ با عوامل خاکی و مدیریت‌های مختلف چرای دام بررسی شده است. بر اساس نوع مدیریت و بهره‌برداری از مرتع، پنج واحد پوشش گیاهی غالب مرتع شامل مرجع (قرق)، کلید و بحرانی (آغل نیمزروزی، مرتع حریم روستا و اطراف آبخیز) در منطقه شناسایی شد. اندازه‌گیری اطلاعات پوشش گیاهی و عوامل خاکی در نقاط معرف بهره‌برداری‌های مختلف مرتع انجام گردید. به طوری‌که در نقاط معرف هر واحد بهره‌برداری، نمونه‌برداری از تراکم و درصد تاج پوشش گونه‌های گیاهی و خاک دو عمق به صورت تصادفی - سیستماتیک انجام شد. برای تعیین گروه گونه‌های اکولوژیک منطقه از آنالیز خوشه‌بندی و برای تجزیه و تحلیل اثرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و مدیریتی مورد مطالعه بر پراکنش گروه گونه‌های اکولوژیک از روش‌های تجزیه مؤلفه‌های اصلی و تقسیم‌بندی واریانس با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای PC-ORD ۵ و Canoco 4.0 استفاده شد. نتایج منجر به تفکیک هر پنج گروه گونه‌های اکولوژیک از هم گردید. درصد از پراکنش گروه گونه‌های اکولوژیک در منطقه توسط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، ۰/۴۸ درصد تحت تأثیر اثر مشترک این دو عامل بوده است. از میان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، به ترتیب پارامترهای درصد رس در عمق اول (۰/۹۹۹)، فسفر در عمق دوم (۰/۹۹۱)، وزن مخصوص (۰/۹۸۹)، تخلخل (۰/۹۸۵) و درصد رطوبت اشباع (۰/۹۸۲) در عمق اول و پتانسیم در عمق دوم (۰/۹۶۶) از بیشترین تأثیر در پراکنش گروه گونه‌های اکولوژیک منطقه برخوردار بودند.

واژه‌های کلیدی: گروه گونه‌های اکولوژیک، عامل خاک، عامل مدیریتی، پراکنش.

مقدمه

گیاهان خواص فیزیکی و شیمیایی خاک می‌باشد. این خصوصیات به عنوان ظرفیت و توانایی خاک برای حفظ تولید زیستی، سلامت محیط‌زیست، گیاهان و جانوران در محدوده اکوسیستم شناخته شده است (Doran & Parkin, 1994 و Alvarez *et al.*, 2007). علاوه بر عوامل محیطی،

خاک مؤلفه اصلی اکوسیستم‌های مرتعی است که با تأمین نیازهای غذایی و حمایت مکانیکی گیاهان زمینه را برای رشد آنها فراهم می‌سازد و بر ساختمان و عملکرد آن تأثیر می‌گذارد. از جمله اساسی‌ترین عوامل برای رشد

پراکنش گیاهان اثرگذار می‌باشند. اخیراً توجه زیادی به اثر دام و انسان بر سلامت و کیفیت خاک شده است، بنحوی که Manley و همکاران (۱۹۹۵) چرای دام را به عنوان عاملی در افزایش میزان کربن و نیتروژن خاک معرفی نمودند.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک باعث پراکنش جغرافیایی گیاهان در مقیاس خرد و کلان می‌شود. به طوری که پراکنش پوشش گیاهی در مناطق دشتی اغلب تحت تأثیر این خصوصیات خاک و عوامل انسانی قرار دارد (Zare Chahouki *et al.*, 2010). البته پارامترهای مختلف خاکی تأثیر یکسانی روی گونه‌های گیاهی ندارند. از میان ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاکی مختلف مؤثر بر پراکنش تیپ‌های مختلف رویشی در مراتع بیلاقی، میزان آهک، پتسیسم، گچ، هدایت الکتریکی، بافت و درصد اشباع بازی خاک در پراکنش تیپ‌های گیاهی از اثرگذاری حائز اهمیتی برخوردار می‌باشند، به طوری که گونه‌هایی از جنس *Astragalus* درمنه نظیر درمنه دشتی و گون زرد (*microcephalus* Willd) بیشترین همبستگی را با میزان هدایت الکتریکی، درصد شن، ماده آلی و گچ داشته است (Tamartash *et al.*, 2003; Jafari *et al.*, 2002).

البته در حالی که گونه درمنه دشتی در مراتع پشتکوه بیزد با میزان هدایت الکتریکی ارتباط معکوس دارد (Zare Chahouki *et al.*, 2007). در منابع دیگر برخی گونه‌های گیاهی با فاکتورهای درصد سدیم، هدایت الکتریکی، لوم و شن رابطه مستقیم و با فاکتورهای اسیدیته، درصد رطوبت و رس خاک رابطه معکوس برقرار کرده‌اند (Zare Chahouki, 2001 و Moradi *et al.*, 2008).

Ahmadipour (2006) مؤثرترین عوامل خاکی بر پارامترهای گونه‌های گیاهی را هدایت الکتریکی، اسیدیته، نیتروژن و رس معروفی نمودند. پارامترهای شیمیایی خاک نظیر رطوبت، هدایت الکتریکی، مواد آلی، هوموس، تجمع یونی و درصد املاح محلول به عنوان مهمترین و مؤثرترین پارامترها معرفی شدند (Zhao *et al.*, 2007؛ Lepping & Daniels, 2007؛ Zare Arshad *et al.*, 2008 و et al., 2008).

انسان نیز از آنجا که بدنبال کسب سود حداکثر در کوتاه‌مدت است، اغلب با بهره‌برداری و چرای دام بیش از حد یا تغییر کاربری اراضی باعث تخریب این منبع می‌شود. در حالی که برای تشکیل هر سانتی‌متر از آن به چند صد سال زمان نیاز است. از این‌رو برای گرفتن هر تصمیم مدیریتی در مرتع باید بررسی‌های دقیق علمی و عملی پیرامون اثر آن انجام شود (Azarnivand & Zare Chahouki, 2010). بر همین مبنای پوشش گیاهی و خاک قسمت‌های وسیعی از مراتع ایران، بر اثر مدیریت نامناسب دام در مرتع، چرای بیش از حد و خارج از ظرفیت، عدم پراکنش صحیح دام و چرای زودرس دچار تغییراتی شده است که می‌تواند باعث رخداد عواقب ناگوار تخریبی گردد (Chaichi *et al.*, 2005). در نهایت اثرگذاری این عوامل سبب شده است که مراتع فقیر تا خیلی فقیر در حدود ۴۸/۲ درصد، مراتع متوسط تا فقیر ۴۱/۴ درصد و مراتع خوب ۱۰/۴ درصد از کل سطح مراتع کشور را به خود اختصاص دهند (Eskandari *et al.*, 2008).

بنابراین آگاهی و شناخت از تغییر پراکنش گروه‌های گیاهی ناشی از مدیریت نادرست و چرای شدید و عوامل محیطی مثل خصوصیات خاک برای اتخاذ مدیریت صحیح مرتع ضروریست.

بطور کلی عوامل مؤثر در پراکنش گیاهان ممکن است ناشی از ویژگی‌های گیاه، عوامل محیطی و مدیریتی و یا ناشی از هر سه باشد. به عبارتی در این اکوسیستم‌ها تفاوت در نوع استفاده دام از مرتع و حضور آن یکی از دلایل تغییر پوشش گیاهی ذکر شده است (Warren *et al.*, 2001).

مطالعات زیادی پیرامون عوامل محیطی، مدیریتی و پوشش گیاهی در مراتع نقاط مختلف جهان انجام شده است که حکایت از وجود ارتباط ویژه و متقابل بین آنها دارد. عوامل محیطی (Aragon *et al.*, 2007) و مدیریتی از جمله شدت‌های چرایی (Zhao *et al.*, 2007)، نحوه بهره‌برداری (Kohandel *et al.*, 2010)، آتش‌سوزی و زراعت (Houghton & Goodale, 2004) شیمیایی (Farazmand *et al.*, 2009) و فیزیکی (et al., 2008) خاک، ساختار مورفولوژیکی و الگوی

آنها در توجیه تغییرات انجام شد، زیرا در این مناطق پنج گانه پوشش گیاهی تغییر یافته و باهم قابل تفکیک است، از این‌رو هدف این تحقیق مشخص کردن میزان اثر تغییرات خاک و نوع مدیریت بر این تغییرات و تعیین همبستگی مهمترین پارامترهای محیطی یعنی خاک، با نوع تیپ‌های پوشش گیاهی تشکیل دهنده منطقه است. بنابراین نتایج کمک خواهد کرد با شناخت و مراقبت درست از اکوسیستم‌های مناطق کوهستانی مرتع بهتر بتوان زیستگاه‌های طبیعی، تنوع زیستی، آب و خاک و مناطق آسیب‌پذیر را حفاظت کرد.

مرور منابع نشان می‌دهد در مطالعات پیرامون پوشش گیاهی و عوامل مدیریتی بندرت از روش‌های تجزیه آماری چند متغیره استفاده شده است. البته در اغلب مطالعات پیرامون اثر شدت چرا و مدیریت مرتع بر پوشش گیاهی، تنها از روش‌های آنالیز آماری ساده یک متغیره استفاده شده است. در منطقه مورد مطالعه آنچه بیش از پیش نمایان است، اثرگذاری انواع مختلف بهره‌برداری بر پوشش گیاهیست. از این‌رو مطالعه حاضر بهمنظور بررسی میزان اثرگذاری عامل مدیریتی توان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر توزیع پوشش گیاهی و مطالعه اثر مشترک آنها با استفاده از روش‌های تجزیه آماری چند متغیره در منطقه چهار باغ انجام شده است.

مواد و روش‌ها


تشریح منطقه

در این پژوهش مرتع کوهستانی منطقه چهارباغ که با موقعیت جغرافیایی "٣٥°٤٤' تا ٣٦°٣٩' عرض شمالی و ٢٨°٣٩' تا ٥٤°٣٣' طول شرقی در ۲۰ کیلومتری جنوب گرگان و ۴۵ کیلومتری شمال غرب شهرود و در محدوده ارتفاعی ۲۱۲۰ تا ۲۲۲۰ از سطح دریا واقع شده است (شکل ۱)، به عنوان عرصه مطالعاتی و معرف اقلیم رویشی شمال خراسانی در ناحیه ایران و تورانی انتخاب شد. اقلیم منطقه بر اساس طبقه‌بندی اقلیمی آمبرژه، اقلیم ارتفاعات سرد و متوسط بارندگی سالانه آن ۳۰۵ میلی‌متر است که بیشترین نزولات در فصل زمستان و به شکل برف

(Chahouki *et al.*, 2008) از میان پارامترهای فیزیکی خاک، بافت (Fahimipour & Davies *et al.*, 2007) و عمق (Kosmas *et al.*, Zare Chahouki, 2010 Mohtashamnia, Piry Sahragard *et al.*, 2011) خاک ارتباط چشمگیری با ترکیب گونه‌ای و پراکنش گیاهان داردند. در این زمینه، نتایج حاصل از آنالیز چندمتغیره توسط Gorgin Karajji و همکاران (۲۰۰۶) نشان داد که گونه‌های زولنگ (*Eryngium* sp.)، بومادران کوهستانی (*Bromus* Boiss) و جارو علفی (*Achillea vermicularis*) (tomentellus) خواستار شن بیشتر و سیلت و رس کمتر هستند، در حالی که گونه کلاه میرحسین (*Acantolimon* sp.) خواستار اسیدیته کمتری است اما با میزان سیلت و درصد اشیاع رابطه مثبت دارد. Shokrollahi و همکاران (۲۰۱۲)، در بررسی رابطه برخی عوامل محیطی با پراکنش گونه *Agropyron cristatum* دریافتند که مهمترین عوامل محیطی مؤثر در تفیکیک رویشگاه‌های این گونه ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، ماده آلی، بافت خاک، ازت، فسفر و لاشیرگ می‌باشد. با توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیستم و استفاده‌های مختلفی که بشر به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن می‌نماید، ضرورت شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی و عوامل مدیریتی برای ثبات و پایداری آنها امری اجتناب‌ناپذیر است. با شناخت روابط موجود، علل پراکنش و تغییرات پوشش گیاهی، توان رویشگاه‌ها (Ludwig & Reynolds, 1988)، شرایط زیستگاه و محل رشد گیاهان به عنوان تیپ‌های گیاهی و یا گروه گونه‌های اکولوژیکی مشخص می‌شود که به عنوان مهمترین ابزار برای اتخاذ تدابیر صحیح مدیریتی منطبق بر اصول اکولوژیک در بازسازی و مدیریت اکوسیستم مرتعی بشمار می‌آید (Legendre & Yimer *et al.*, 2002; Fortin, 1989). از این‌رو تحقیق حاضر با هدف تعیین مؤثرترین عوامل از میان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل مدیریتی در پراکنش گروه گونه‌های اکولوژیک و تغییر پوشش گیاهی در مدیریت‌های مختلف در مراعع بیلاقی چهارباغ و همچنین تعیین سهم جزئی و مشترک هر یک از

است. اساس انتخاب منطقه کلید بر مبنای فاصله از مناطق بحرانی بود، به این ترتیب منطقه‌ای به عنوان منطقه کلید در نظر گرفته شد که از مناطق بحرانی مرتع فاصله متوسط داشته و از شدت چرای متوسطی برخوردار باشد (Kohandel et al., 2010). شایان ذکر است که مکان قرق شده با مساحتی معادل ۱۲ هکتار، در حدود دوازده سال قدمت دارد. طبیعی است مکان‌های مذکور به گونه‌ای انتخاب شد که از نظر خصوصیات مرتع فیزیکی و اقلیمی، شبیه به هم بوده ولی شدت چرا و تراکم لگدکوبی (نوع بهره‌برداری) و خصوصیات خاک در آنها متفاوت باشد. لازم به ذکر است که بعلت کوچک بودن سطح منطقه (۲۴۰۰ هکتار) تغییرات پارامترهای پستی و بلندی و پارامترهای اقلیمی شامل بارندگی، دما، رطوبت نسبی و تبخیر و تعرق در بین پنج سایت انتخابی ناجیز بوده، بدین جهت در محاسبات وارد نشده‌اند. همچنین این سایتها به طور عمده در عامل میزان چرا و لگدکوبی و خاک با هم تفاوت داشتند و بعلت مهمتر بودن عوامل مدیریتی و تحت تأثیر قرار دادن سایر پارامترها از بررسی عوامل توپوگرافی و اقلیمی صرف نظر شد. موقعیت عمومی منطقه و محل قرارگیری سایتها پنج گانه در شکل ۱ نشان داده شده است.

می‌بارد (Behmanesh et al., 2008). تیپ گیاهی غالب مراعع منطقه (علف بره- چمن گندمی) *Agropyrum* (علف بره- چمن گندمی) و *Festuca ovina* L.- *trichophorum* (Link) و کلاه میرحسن (Acanthophyllum sp.) است که پوشش گیاهی و خاک آن تخریب شده و گونه‌های هزارخار لاری (Cousinia commutata Bunge.)، کنگر صحراوی (Galium verum L.) و شیرپنیر (Cirsium arvense L.) در ترکیب گیاهی مراعع منطقه به فراوانی مشاهده می‌شوند. دام غالب چرا کننده در مراعع منطقه، گوسفند نژاد زل و به مقدار کمی بز نژاد بومی و پاکستانی می‌باشد که از اوایل تابستان تا اواسط پاییز در مراعع منطقه حضور دارند. برای نمونه‌برداری از خاک، در گام اول؛ پنج مکان مرتعی شامل: قرق (منطقه مرجع)، منطقه کلید و مناطق بحرانی (اطراف آبشخور دامها، حریم روستا و اطراف آغل دامها) در منطقه مورد بررسی انتخاب گردید. در اکوسیستم‌های مرتعی، حریم روستاها، آغل‌ها (نقاط استراحت نیمروزی دام در مرتع) و آبشخورها به عنوان کانون‌های بحران شناخته شده‌اند و شدت چرا در اطراف آنها زیاد بوده و با دور شدن از آنها، شدت چرا کمتر می‌شود (Badripour, 1997). پراکنش نقاط نمونه‌برداری مربوط به سایتها آغل، آبشخور و حریم روستا در محدوده ۴۰ تا ۳۰۰ متری اطراف آنها متغیر بوده



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی مراعع منطقه چهارباغ و نقاط معرف سایتها مدیریتی و بهره‌برداری مورد بررسی

آوردن درصد ذرات رس، سیلت و شن (ذارت بافت خاک) از روش هیدرومتری بایکاس، اسیدیته خاک در حالت گل اشباع از دستگاه pH متر و هدایت الکتریکی (EC) عصاره Jafari گل اشباع از دستگاه هدایتسنج استفاده شد (haghghi, 2003). نمونه برداری پوشش گیاهی به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. تعداد پلات مورد نیاز در هر واحد مدیریتی با تعداد نمونه اولیه ۲۰ پلات، با استفاده از فرمول آماری (رابطه ۱) تعیین گردید (Barani *et al.*, 2009).

$$N = \left(\frac{v}{E} \right)^2 \quad \text{رابطه ۱}$$

که در آن (N) تعداد پلات مورد نیاز، (CV) ضریب تغییرات و (E) میزان خطای پنج درصد، در مجموع ۱۰۰ پلات برای نمونه برداری برداشت گردید. پس از استقرار هر پلات تعداد پایه و درصد تاج پوشش هر گونه ثبت شد. اندازه پلات ها نیز با توجه به پوشش غالب گیاهان منطقه یک مترمربعی انتخاب شد.

تجزیه و تحلیل آماری

بعد از جمع آوری اطلاعات، با توجه به دارابودن واحدهای مختلف عوامل محیطی و همچنین برای از بین بردن اریبی به سمت داده های با واریانس بالا، اقدام به نرمال سازی داده ها با استفاده از تبدیل لگاریتمی شد. سپس ماتریس مربوط به گونه های گیاهی و عوامل محیطی به صورت جداگانه تشکیل داده شد. پس از ورود داده های پوشش گیاهی در نرم افزار PC-ORD5 (McCune & Mefford, 1999) و بکارگیری روش تجزیه خوش ای (CA: Clustering Analysis) (با توجه به همخوانی نتایج این روش نسبت به سایر روش های خوش بندی با شرایط منطقه)، گروه گونه های اکولوژیک بر اساس حضور و عدم حضور گونه های گیاهی داخل پلات های نمونه برداری در منطقه شناسایی شدند. برای تفکیک گروه گونه های اکولوژیکی از روش Ward (1993) و سطح عدم تشابه ۷۱ درصد استفاده شد. با استفاده از مقادیر اهمیت نسبی و

روش نمونه برداری گروه گونه های اکولوژیک بر مبنای میزان اثر چرا و مدیریت ها و نوع بهره برداری و شدت چرا از مرتع انتخاب شدند. در این بررسی تیپ های گیاهی بر اساس تعیین گونه های غالب از سیمای ظاهری (Physiognomy) یکدیگر جدا شدند که ۵ تیپ پوشش گیاهی در منطقه شناسایی و بر روی هر تیپ گیاهی و در منطقه معرف پروفیل خاک حفر گردید. در گام بعد؛ در داخل هر یک از مکان های انتخابی، نمونه های خاک به روش سیستماتیک- تصادفی و با توجه به عمق ریشه دوانی گیاهان مرتعی (کوهستانی بودن منطقه و عمق کم خاک)، از عمق های ۰ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر در اواخر فصل چرا برداشت گردید که تعداد تکرار برای هر مکان و هر عمق مشخص، پنج نمونه مرکب می باشد. این مرحله به این ترتیب بود که ابتدا با استقرار پنج ترانسکت ۵۰ متری (طول ترانسکت متناسب با وسعت محدوده نمونه برداری است) و انتخاب سه نقطه تصادفی بر روی هر ترانسکت اقدام به حفر پروفیل در این نقاط شد و از دو عمق مذکور نمونه های خاک برداشت گردید. سپس از مخلوط کردن هر سه نمونه برداشت شده مربوط به هر ترانسکت با هم یک نمونه مرکب خاک برای هر یک از عمق ها تهیه گردید، به طوری که در مجموع تعداد نمونه مرکب برای هر عمق و هر مکان مرتعی به تعداد ترانسکت ها یعنی تعداد پنج نمونه مرکب می باشد. در این مطالعه در هر مکان مرتعی ۱۵ بروفل حفر شد که در مجموع ۵۰ نمونه مرکب خاک آماده شد. نمونه ها پس از برداشت، در سایه و در معرض هوای آزاد خشک گردید و پس از الک کردن با الک نیم میلی متری، خصوصیات شیمیایی آنها در آزمایشگاه اندازه گیری شد. برای این منظور، درصد ماده آلی به روش والکلی و بلاک، درصد ازت به روش کجلال، مقدار فسفر قابل جذب به روش السون، مقدار پتاسیم قابل جذب و سدیم با استفاده از دستگاه شعله سنج و مقدار کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون، تعیین گردید. وزن مخصوص ظاهری خاک و میزان رطوبت خاک توسط سیلندر های با حجم مشخص تعیین شد. برای بدست

نتایج


ارزیابی پوشش گیاهی منطقه نشان داد در مجموع ۲۶ گونه گیاهی در کل مرتع شناخته شد که ۳۰ درصد گونه‌ها مربوط به تیره گندمیان (*Poaceae*) بوده و کمترین گونه (هشت درصد) مربوط به خانواده نعنائیان (*Labiateae*) بوده است. فرم رویشی غالب منطقه گراس و بوته بوده و دوره زیستی علف چند ساله بوده است. گونه‌های مهاجمی نظری استیو ریش‌دار (*Stipa barbata* Desf.), هزارخار، گل قاصد (*Acanthophyllum* sp.) و چوبک (*Taraxacum* sp.) در منطقه اطراف آبشحوار رosta و آغل تراکم یافته است. از گونه‌های دیگر می‌توان به درمنه کوهی (*Artemisia*), (*Peganum harmala* L.), اسپند (*aucherii* Boiss.), فریون جاروعلفی، سوسن چلچراغ (*Lilium* sp.), فریون *Astragalus gossypinus* (Euphorbia sp.), گون پنبه‌ای (*Thymus* sp.), آویشن کرک‌آسود (*Malva* sp.), پنیرک (*Poa bulbosa* Boiss.), چمن پیازک‌دار (*kotschyanus* Boiss.), (*Melica* sp.) و ملیکا (L.), چمن گندمی (*Agropyrum* sp.) اشاره کرد. بافت خاک منطقه سیلتی - لومی است. اسیدیته خاک منطقه مابین ۷/۸-۷/۴۱ و میانگین ماده آلی دو درصد متغیر است. شوری خاک در حدود ۱۵۷۴ - ۵۲۴ میکرومیلی بر سانتی‌متر و وزن مخصوص ظاهری خاک منطقه بین ۱/۰۸ تا ۱/۸۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. نتایج حاصل از روش تقسیم‌بندی واریانس نشان داد که در مجموع ۹۸/۴۳ درصد از تغییرات گونه‌های گیاهی توسط عوامل انسانی و خاک ایجاد شده است (جدول ۱). از مجموع این تغییرات بیشترین درصد آن (۹۰/۴۸ درصد) توسط عامل خاک بوده است. عامل انسانی به صورت مجزا تقریباً بی‌تأثیر بوده است (۰/۰۰۸ درصد). در حالی که بصورت مشترک دارای تأثیر اندک (۹/۵۱ درصد) بر تغییرات می‌باشد (شکل ۲).

انتخاب دو یا سه گونه غالب، تیپ‌های رویشی در هر گروه گونه اکولوژیکی (نوع مدیریت) شناسایی و ماتریس مربوط به عوامل محیطی در هر گروه بصورت جداگانه تشکیل داده شد. برای انتخاب نوع روش‌های آنالیز چندمتغیره، ابتدا از آنالیز تطبیقی قوس‌گیری شده (DCA) برای دستیابی به طول گرادیان بهره‌گیری شد. بر مبنای طول گرادیان که بزرگترین طول گرادیان حدود ۳/۲۴ بود، به‌منظور تعیین مؤثرترین عوامل خاکی رج‌بندی گروه گونه‌های اکولوژیک در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل مدیریتی به روش تجزیه مؤلفه‌های اصلی (PCA) به عنوان مؤثرترین و مهمترین روش نسبت به سایر روش‌ها در خلاصه‌کردن داده‌های محیطی از طریق جستجوی ابعادی از داده‌ها که واریانس کل را توضیح دهد، انجام شد (Farshadfar, 2005). علاوه بر این یک روش آماری برای تعریف متغیرهای جدید بر حسب ترکیب خطی از متغیرهای اولیه است و هدف از آن، استخراج مؤلفه‌های اصلی یک مجموعه از متغیرهای اولیه بوده که مؤلفه‌های جدید نسبت به هم مستقل بوده و واریانس آنها دارای روند نزولی است. در این آنالیز نمودار رسته‌بندی سایت‌ها نشان خواهد داد که تفکیک سایت از لحاظ واریانس حداقل با کدام مؤلفه صورت می‌گیرد. سپس دیاگرام دو بعدی گونه-عوامل محیطی ترسیم و تشریح گردید. همچنین برای مشخص نمودن سهم هر یک از پارامترهای مورد بررسی در نرم‌افزار Canoco 4.0 از روش تقسیم‌بندی واریانس استفاده گردید. در اینجا برای محاسبه درصد سهم هر یک از عوامل محیطی آنالیز تحلیل تطبیقی متعارف جزئی (Partial CCA) انجام شد و دو کمیت مهم، یعنی مقدار واریانس و مقدار واریانس کل برای عوامل مختلف محاسبه شده و بر اساس این دو کمیت درصد سهم هر یک از عوامل و اثر مشترک آنها محاسبه گردید.

جدول ۱- محاسبه سهم عوامل محیطی در تشریح تغییرات پوشش گیاهی در آنالیز CCA جزئی

منبع تغییرات	مجموع خاک و مدیریتی	مقدار واریانس ^۱	واریانس کل ^۲	درصد تغییرات قابل توضیح ^۳
اثر مشترک		۰/۰۱۲	۰/۱۲۸	۹/۳۶
مدیریتی		۰/۰۰۰	۰/۱۲۸	۰/۰۰۸
خاک		۰/۱۱۴	۰/۱۲۸	۸۹/۰۶
	مجموع خاک و مدیریتی (Trace/ Total inertia)*100	۰/۱۲۶	۰/۱۲۸	۹۸/۴۳


:۲ -Total inertia :۳ -Trace :۱ : (Trace/ Total inertia)*100



شکل ۲- درصد سهم هر یک از عوامل خاکی و مدیریتی در تشریح تغییرات پوشش گیاهی

گونه‌های شیر پنبه، علف بام (*Bromus tectorum* L.) و هزارخار در رده‌های بعدی بیشترین حضور را داشته‌اند. البته گروه گونه اکولوژیکی سه (*Po-bu. Br-to. Ac-sp*) در منطقه آبخسخوار و آغل با غالیت گونه‌های چمن پیازک دار، جارو علفی و چوبک و گونه همراه فربیون نمود بیشتری داشته است. به طوری که گروه گونه اکولوژیکی چهار (*Po-(bu. As-ef. Ta-sp*) با غالیت گونه‌های چمن پیازک دار، گون علوفه‌ای (*Astragalus effusus* Bunge.) و گل قاصد (*St-ba. Ar-au.*) نیز در منطقه آغل و گروه گونه اکولوژیکی پنج (*St-sp*) ریش دار، درمنه کوهی و سنبله‌ای (*Stachys sp.*) رشد دارند.

با توجه به خروجی آنالیز خوشبندی، پنج گروه گونه اکولوژیک مجزا بوجود آمد که گروه گونه‌های اکولوژیک دو و چهار به ترتیب با ۱۴ و ۶ پلات بزرگترین و کوچکترین گروه می‌باشند (شکل ۲). طبق جدول ۲، گروه گونه اکولوژیکی یک (*Po-bu. Br-to.*) دارای گونه‌های گیاهی غالب از جمله چمن پیازک دار و جارو علفی هستند که مختص منطقه قرق و کلید می‌باشند. همچنین گونه‌های گل قاصد و فربیون در رده‌های بعدی بیشترین حضور را داشتند. گروه گونه اکولوژیکی دو (*Br-to. Po-bu. Ce-sp*) در نقاط قرق و آبخسخوار با غالیت گونه‌های جارو علفی، چمن پیازک دار و گل گندم (*Centaurea sp.*) قرار دارند. همچنین



شکل ۳- نمودار درختی (دندروگرام) حاصل از طبقه‌بندی پوشش گیاهی

جدول ۲- میزان اهمیت نسبی گونه‌های گیاهی در گروه‌های اکولوژیکی منطقه

گروه ۵	گروه ۴	گروه ۳	گروه ۲	گروه ۱	مخف	گونه گیاهی	گروه اکولوژیک
۷/۰۲	۳/۲۸	۵۰/۵۸	۷۲/۰۱	۸۲/۱۰	Br-to	<i>Bromus tomentellus</i> Boiss.	
-	۵۹/۶۸	۵۲/۷۴	۶۴/۲۵	۹۰/۳۵	Po-bu	<i>Poa bulbosa</i> L.	
-	-	۹/۷۵	۶۳/۰۱	۴/۶۸	Ce-sp	<i>Centaurea</i> sp.	
۱۲/۱۵	-	-	۱۹/۸۷	-	Br-te	<i>Bromus tectorum</i> L	
-	-	۴۸/۴۵	۴/۲۵	-	Ac-sp	<i>Acanthophyllum</i> sp.	
۱۴/۵۶	۵۴/۴۲	-	-	-	As-ef.	<i>Astragalus effusus</i> Bunge.	
-	۵۰/۴۹	۸/۸۶	-	۲۹/۶۰	Ta-sp	<i>Taraxacum</i> sp.	
۶۸/۴۹	۵/۸۴	۱۰/۰۷	-	-	St-ba	<i>Stipa barbata</i> Desf.	
۵۶/۰۴	-	-	-	-	Ar-au	<i>Artemisia aucheri</i> Boiss.	
۵۰/۶۸	۲/۲۵	-	-	۲/۲۰	St-sp	<i>Stachys</i> sp	
۶/۶۸	۴/۲۸	-	-	-	No-mu	<i>Noea mucronata</i> Forsk.	
	۹/۸۳	۹/۴۹	۱۸/۱۴	۴/۹۸	Ma-sp	<i>Malva</i> sp.	
۱۱/۳۸	۴/۵۶	-	۱۵/۲۷	۹/۰۴	Co-sp	<i>Cosinia</i> sp.	
	-	۴۴/۷۳	-	۲۴/۵۸	Eu-sp	<i>Euphorbia</i> sp.	
-	-	-	۲/۰۱	-	Ga-ve	<i>Galioum verum</i> L.	
-	-	۶/۲۹	-	-	Ch-bo	<i>Chenopodium botrys</i> L.	
-	۴/۲	-	۲/۵	۵/۵	Ach-sp	<i>Achillea</i> sp.	
۴/۹۸	-	۱/۰۱	-	-	Pe-ha	<i>Peganum harmala</i> L.	
-	-	-	۶/۵۸	۲/۰۱	Th-ko	<i>Thymus koteschianus</i>	
۳/۲۸	۱۴/۵۲	-	۴/۲۵	-	On-co	<i>Onobrychis cornuta</i> L.	

با مشاهده سهم هر یک از مؤلفه‌ها در توجیه تغییرات (جدول ۳ و جدول ۴) می‌توان اینطور بیان کرد که عوامل

عمق اول است. از طرفی گروه گونه اکولوژیکی *Br-to. Po-bu. Ce-sp* واقع در ربع چهارم متأثر از عوامل گروه گونه اکولوژیکی قبلی به همراه میزان پتاسیم در عمق دوم خاک است. گروه گونه های اکولوژیک *Po-bu. Br-to. Ac-sp* و *Po-bu. As-ef. Ta-sp* واقع در ربع دوم نمودار، اغلب تحت تأثیر میزان فسفر در عمق دوم و وزن مخصوص در عمق *St-ba. Ar-au.* *St-sp* واقع در ربع سوم نمودار به نسبت تحت تأثیر پارامترهای واقع بر روی هر دو محور به صورت یکسان است. این گروه اغلب تحت تأثیر عوامل وزن مخصوص در عمق اول و پتاسیم در عمق دوم قرار دارد.

خاکی از قبیل درصد رس در عمق اول، فسفر در عمق دوم، وزن مخصوص، تخلخل و درصد رطوبت اشباع در عمق اول و پتاسیم در عمق دوم خاک از بیشترین نقش در پراکنش گروه گونه های اکولوژیک منطقه برخوردار هستند. نتایج آنالیز مؤلفه های اصلی نشان می دهد که ۹۰/۳ درصد تغییرات گروه گونه های اکولوژیک توسط ویژگی های معرف محورهای اول (شامل درصد رس، وزن مخصوص، تخلخل و درصد رطوبت اشباع در عمق اول خاک) و دوم (شامل میزان فسفر و پتاسیم در عمق دوم خاک) توجیه می شود. با توجه به شکل ۳، گروه گونه های اکولوژیک *Po-bu. Br-to* در ربع چهارم نمودار قرار گرفته است و مهمترین عوامل مؤثر بر آنها میزان رس، تخلخل و رطوبت اشباع در

جدول ۳- مقادیر ویژه و درصد واریانس توجیه شده توسط متغیرهای محیطی با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی


BSE (Broken-stick) Eigenvalue	درصد تجمعی واریانس	درصد واریانس	مقادیر ویژه	مؤلفه ها
۴/۲۵۴	۵۹/۱۳۳	۵۹/۱۲۳	۲۲/۰۶۲	۱
۳/۲۵۴	۹۰/۳۰۰	۳۱/۱۶۷	۱۲/۱۵۵	۲
۲/۷۵۴	۹۶/۹۵۸	۶/۶۵۷	۲/۵۹۶	۳
۲/۴۲۰	۱۰۰	۳/۰۴۲	۱/۱۸۶	۴
۲/۱۷۰	۱۰۰	۰	۰	۵
۱/۹۷۰	۱۰۰	۰	۰	۶
۱/۸۰۴	۱۰۰	۰	۰	۷
۱/۶۶۱	۱۰۰	۰	۰	۸
۱/۵۳۶	۱۰۰	۰	۰	۹
۱/۴۲۵	۱۰۰	۰	۰	۱۰

جدول ۴- همبستگی بین گروه گونه های اکولوژیک منطقه و ویژگی های محیطی با استفاده از تجزیه مؤلفه های اصلی

مؤلفه اصلی ششم	مؤلفه اصلی پنجم	مؤلفه اصلی چهارم	مؤلفه اصلی سوم	مؤلفه اصلی دوم	مؤلفه اصلی اول	مؤلفه خصوصیات خاکی و مدیریتی	
						مؤلفه اصلی اول	مؤلفه اصلی خاکی و مدیریتی
۰	۰	۰/۱۹۸۶	۰/۰۵۸۵	۰/۴۵۵۰	-۰/۸۶۶۱	اسیدیته ۱	
۰	۰	-۰/۲۹۹۴	-۰/۰۱۳۶	-۰/۹۱۱۴	-۰/۲۸۲۲	هدايت الکتریکی ۱	
۰	۰	-۰/۱۰۱۳	۰/۰۱۲۶	۰/۱۵۶۷	۰/۹۸۲۴	رطوبت اشباع ۱	
۰	۰	۰/۲۲۸۰	-۰/۱۶۰۳	۰/۱۵۴۱	۰/۹۴۷۹	رطوبت ۱	
۰	۰	-۰/۰۷۵۷	۰/۰۵۶۱	-۰/۱۰۷۵	-۰/۹۸۹۷	وزن مخصوص ۱	
۰	۰	-۰/۱۲۲۱	-۰/۱۷۲۹	۰/۱۷۹۲	-۰/۹۶۰۸	آهک ۱	
۰	۰	-۰/۱۶۰۹	۰/۰۱۷۸	-۰/۷۴۹۲	۰/۶۴۲۲	سنگریزه ۱	

مؤلفه اصلی ششم	مؤلفه اصلی پنجم	مؤلفه اصلی چهارم	مؤلفه اصلی سوم	مؤلفه اصلی دوم	مؤلفه اصلی اول	خصوصیات خاکی و مدیریتی	مؤلفه
.	.	./۲۶۶۳	./۲۳۹۴	-./۶۶۵۸	-./۶۵۴۶	شن ۱	
.	.	-./۰۲۴۱	./۰۲۰۵	-./۰۳۲۲	./۹۹۹۰	رس ۱	
.	.	-./۱۹۷۳	-./۲۹۶۴	./۷۵۶۱	-./۵۴۹۱	سیلت ۱	
.	.	./۰۸۱۵	-./۰۶۰۷	./۱۳۶۶	./۹۸۵۴	تخلخل ۱	
.	.	./۱۲۹۶	-./۰۸۹۰	./۲۱۱۱	./۹۶۴۷	ماده آلی ۱	
.	.	-./۱۳۱۲	./۰۵۰۲	./۶۰۰۵	./۰۵۶۵۲	سدیم ۱	
.	.	./۲۹۹۳	./۱۱۳۴	-./۲۲۸۲	./۹۱۹۵	پتانسیم ۱	
.	.	-./۲۱۲۰	-./۴۵۸۴	./۶۹۲۳	-./۵۱۵۴	کلسیم ۱	
.	.	./۰۰۰۵	-./۱۱۴۸	./۹۵۸۹	./۲۵۹۷	منیزیم ۱	
.	.	./۱۰۴۲	-./۲۴۱۳	-./۲۶۷۴	./۹۲۷۰	فسفر ۱	
.	.	-./۰۷۶۱	./۶۵۳۵	-./۰۱۶۴	./۷۵۳۰	نسبت سدیم اشباع ۱	
.	.	-./۰۴۴۳	./۰۵۲۰	-./۴۴۱۰	./۷۲۶۶	سدیم قابل تبادل ۱	
.	.	./۳۰۰۶	-./۱۱۵۷	-./۷۰۵۷	-./۶۳۱۱	اسیدیته ۲	
.	.	-./۲۲۶۸	-./۰۶۲۰	./۸۸۸۴	./۳۸۸۴	هدایت الکتریکی ۲	
.	.	-./۱۱۷۷	./۱۴۲۱	./۴۲۲۵	./۸۸۲۵	رطوبت اشباع ۲	
.	.	./۰۴۳۵	-./۰۲۶۰	./۷۳۱۱	./۶۸۰۴	رطوبت ۲	
.	.	./۰۹۴۲	-./۰۵۱۹	-./۳۴۵۲	-./۹۲۲۳	وزن مخصوص ۲	
.	.	./۱۳۴۲	-./۱۹۱۸	-./۳۵۲۸	./۹۰۵۹	آهک ۲	
.	.	./۱۰۸۲	-./۲۶۸۱	-./۵۲۴۲	./۷۹۴۳	سنگریزه ۲	
.	.	-./۱۲۲۸	-./۶۶۷۲	-./۵۹۹۱	./۴۲۵۲	شن ۲	
.	.	-./۰۹۹۱	./۲۹۶۸	-./۱۰۰۶	./۹۴۴۵	رس ۲	
.	.	./۱۳۷۶	./۵۱۴۸	./۵۰۲۷	-./۶۸۰۷	سیلت ۲	
.	.	-./۰۷۷۴	./۰۳۴۲	./۳۹۰۸	./۹۱۶۶	تخلخل ۲	
.	.	-./۱۷۵۴	-./۰۳۲۸	./۵۹۷۸	./۷۸۱۵	ماده آلی ۲	
.	.	./۰۱۱۳	-./۰۰۱۱	./۹۶۶۵	-./۲۵۶۵	پتانسیم ۲	
.	.	-./۲۷۸۵	./۰۹۱۳	-./۸۷۷۱	./۳۸۰۵	سدیم ۲	
.	.	./۰۹۶۵	-./۰۸۸۵	./۸۷۷۱	./۹۴۴۹	کلسیم ۲	
.	.	-./۲۰۶۰	-./۲۲۹۰	-./۰۳۷۸	./۹۵۰۶	منیزیم ۲	
.	.	./۰۴۸۵	-./۰۲۲۵	./۹۹۱۳	./۱۲۱۲	فسفر ۲	
.	.	-./۳۱۸۳	./۱۷۸۴	-./۴۷۷۷	-./۸۰۲۱	نسبت سدیم اشباع ۲	
.	.	-./۲۴۲۳	./۱۶۰۰	-./۰۷۳۸	-./۹۵۴۱	سدیم قابل تبادل ۲	
.	.	-./۲۶۷۳	./۰۱۲۴	-./۷۹۴۳	./۵۴۵۴	شدت چرای دام	

کد ۱ معرف عمق اول (۰-۲۰ سانتی متر)، کد ۲ بیانگر عمق دوم (۴۰-۲۰ سانتی متر) است.



شکل ۳- نمودار پراکنش گروه گونه‌های اکولوژیک در ارتباط با عوامل خاکی و مدیریتی با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی

و در عمق دوم خاک میزان فسفر می‌باشد. نتایج فوق با نتایج تحقیقات سایر محققان مطابقت دارد (Moradi & Ahmadipour, 2006 و Tamartash *et al.*, 2009). از بین خصوصیات فیزیکی، بافت (میزان رس) در عمق اول و از خصوصیات شیمیایی، فسفر در عمق دوم به عنوان مؤثرترین عوامل بر تفکیک گروه‌ها و به دنبال آن گونه‌های گیاهی از یکدیگر شناخته شدند. همانطور که مطابق با نتایج مطالعات Gorgin Karajji و همکاران (۲۰۰۶) گونه‌های از یکدیگر شناخته شدند. همانطور که مطابق با نتایج مطالعات Acantolimon sp. خواستار خاک‌های با میزان رس اندک است. همچنین گونه‌های *Bromus* و *Poa bulbosa* L. در خاک‌های رسی، خلل و فرج دار و مرطوب در عمق اول و پتابسیم‌دار در عمق دوم از تراکم بسیار بالایی برخوردار می‌باشند. در این نقاط، رسی بودن خاک باعث افزایش رطوبت، طرفیت نگهداری آب در خاک و به دنبال آن چرخه مواد غذایی، تهويه و عمق ریشه‌دانی می‌شود که برآیند این عوامل بر پراکنش پوشش گیاهی از جمله گونه‌های فوق الذکر نقش دارد که همسو با یافته‌های Piry و Zare Chahouki و Fahimipour (۲۰۱۰) و Sahragard (۲۰۱۱) می‌باشد. از طرفی از آنجا

بحث

در این تحقیق از آنالیز خوشای برای تشخیص گروه گونه‌های اکولوژیک منطقه استفاده گردید. بر این اساس چهار گروه گونه اکولوژیکی تفکیک شد که هر کدام دارای گونه‌های غالب و همراه مختص به خود بودند. گونه‌های *Poa bulbosa* L., *Bromus tomentellus* Boiss. از جمله گونه‌های غالب در گروه گونه‌های *Centaurea* sp. اکولوژیکی یک و دو و گونه‌های *Bromus* *Poa bulbosa* L. از جمله *Acanthophyllum* sp. و *tomentellus* Boiss. گونه‌های غالب در گروه گونه اکولوژیکی سه می‌باشند. گروه گونه‌های اکولوژیکی چهار با غالبیت گونه‌های *Poa bulbosa* L. و *Taraxacum* sp. *Astragalus effusus* Bunge, *Stipa barbata* و گروه گونه اکولوژیکی پنج با غالبیت گونه‌های *Stachys* sp. و *Artemisia aucheri* Boiss. Desf. است. از طرفی نتایج تجزیه مؤلفه‌های اصلی نشان داد که مؤثرترین عوامل در تفکیک گروه گونه‌های اکولوژیک شناسایی شده، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بخصوص پارامترهای موجود در عمق اول خاک از جمله درصد رس، وزن مخصوص، تخلخل و درصد رطوبت اشباع

چنین ویژگی‌هایی از تراکم بیشتری برخوردارند. نتایج تحقیقات Jafari و همکاران (۲۰۰۲) نیز در این مورد، رویشگاه گونه‌های گیاهی *Stipa barbata* Desf. و *Artemisia sp.* را تحت تأثیر عوامل شوری و بافت خاک معرفی کردند.

با توجه به نتایج ارائه شده به سادگی می‌توان بیان کرد که در مناطق مختلف تحت بهره‌برداری عوامل فسفر در عمق دوم و رس و وزن مخصوص در عمق اول از جمله مهمترین و مؤثرترین عوامل متمایز کننده مناطق آغل، آبخسخوار و روستا از مناطق قرق و کلید می‌باشند. مطابق با نتایج Kohandel و همکاران (۲۰۱۰) این نتیجه حکایت از اثر غیرمستقیم عامل مدیریتی (نواع مختلف بهره‌برداری) چرای دام بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و درنتیجه پوشش گیاهی دارد. همانطور که نتایج حاصل از آنالیز تجزیه واریانس نشان داد در مجموع ۹۸/۴۳ درصد از تغییرات گونه‌های گیاهی تحت تأثیر عوامل خاکی و مدیریتی مورد مطالعه بوده‌اند. از بین دو عامل مورد مطالعه، حدود ۹۰/۴۸ و ۰/۰۰۸ درصد از تغییرات گونه‌های گیاهی به ترتیب توسط پارامترهای خاکی و مدیریتی بوده است. لازم به ذکر است که در منطقه مورد مطالعه سایر عوامل محیطی (زنده و غیرزنده) بر پراکنش آنها دارای اثرگذاری بسیار اندک می‌باشند. در این میان تقریباً ۱۰ درصد از تغییرات گونه‌های گیاهی در نتیجه اثرگذاری مشترک هر دو پارامترهای خاکی و مدیریتی می‌باشد. پائین‌بودن این مقدار می‌تواند بعلت کیفی بودن عامل مدیریتی مورد بررسی در آنالیز باشد. درحالی‌که با ادامه روند تجزیه و تحلیل چندمتغیره به وضوح می‌توان بی برد که در حقیقت این عامل مدیریتی می‌باشد که بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیرگذار است و تأییدکننده نتایج Yimer et al., (2006) می‌باشد. آنان بیان داشتند که عوامل مختلف محیطی بر هم تأثیرگذاری قابل توجهی دارند (Moradi et al., 2008).

در بخش مدیریتی نیز بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تغییرات پارامترهای خاک در دو عمق خاک بر اثر چرای دام، نوع استفاده و حضور دام نشان می‌دهد که چرای

که گونه‌های گیاهی در مناطق کلید و قرق پراکنده هستند، بنظر می‌رسد عامل قرق و ممنوعیت ورود دام به مرتع باعث بهبود خاک و شرایط مساعد برای رشد و توسعه گونه‌های گیاهی در این گروه شده است.

در بین خصوصیات شیمیایی خاک، فسفر عنصر پرمصرفی برای گیاهان است (Azarnivand & Zare, Chahouki, 2010). که در این تحقیق، میزان عامل فوق در عمق دوم خاک از مهمترین پارامترها در تفکیک گروه گونه‌های اکولوژیکی *Po-bu. As- Po-bu. Br-to. Ac-sp ef. Ta-sp* (مناطق آبخسخوار و آغل) از سایر گروه گونه‌های اکولوژیک شناسایی گردید. به طوری که گروه گونه‌های اکولوژیک فوق با این پارامتر خاکی ارتباط قوی در جهت مثبت برقرار نموده‌اند. بر این اساس رویشگاه گونه‌های *Astragalus effuses* Bunge, *Ephorbia sp*, *Acanthophyllum sp*, *Bromus tomentellus* Boiss, *Taraxacum sp* و *Poa bulbosa* L و آغل واقع شدند بشدت تحت تأثیر عامل فوق می‌باشند که با نتایج تحقیقات Fahimipour و Zare Chahouki (۲۰۱۰) در تأیید اثر عناصر پرمصرف بر پراکنش پوشش گیاهی همخوانی دارد. در تحقیقی دیگر (Heshmati, 2003) به ارتباط قوی بین میزان فسفر خاک با گونه‌های گیاهی *Astragalus effusus* Bunge و *Poa bulbosa* L. شد که نتایج تحقیق حاضر نیز تأییدکننده آن می‌باشد. در این مناطق به نظر می‌رسد حضور بیش از حد دام و بالطبع فضولات آن با تسريع در تجزیه لاشبرگ باعث به هم خوردن تعادل پوشش گیاهی در منطقه و حضور گونه‌های گیاهی خاردار، سمی و غیر خوشخوارک مانند *Euphorbia* sp, *Cosinia* sp, *Taraxacum* sp, *Acanthophyllum* sp Kohandel et al., Zhao et al., 2007) شده است (2007). از دیگر خصوصیات شیمیایی خاک مؤثر بر پوشش گیاهی عامل شوری و وزن مخصوص در عمق اول و پیاسیم در عمق دوم می‌باشد. به طوری که گونه‌های *Artemisia aucheri* Boiss, *Stipa barbata* Desf و *Stachys* sp. واقع در منطقه روستا با خاک‌های دارای

پوشش گیاهی می‌شود. به‌طوری‌که مدیریت چرای دام به‌طور مستقیم بر پوشش گیاهی اثر نکرده بلکه تغییر در خصوصیات خاک بوده است که سبب تعیین پوشش و ترکیب گیاهی شده است.

منابع مورد استفاده

- Alvarez, R. J., Carrascob, L., Marin, C. M. and Martinez, J. J. 2007. Soils of a dune coastal salt marsh system in relation to groundwater level, micro-topography and vegetation under a semi-arid Mediterranean climate in SE Spain. *Catena*, 69: 111-121.
 - Aragon, C. F., Albert, M. J., Nez-benavides, L.G., Luzuriaga, A. L. and Escudero, A. N., 2007. Environmental scales on the reproduction of a gypsophyte: a hierarchical approach. *Journal Annals of Botany*, 99: 519-527.
 - Arshad, M., Hussan, A., Ashraf, M., Noureen, S. and Moazzan, M., 2008. Edaphic factors and distribution in the Cholistan desert, Pakistan. *Journal of Botany*, 40(5): 1923-1931.
 - Azarnivand, H. and Zare Chahouki, M. A., 2010. Rangeland ecology. Tehran University, Iran, 346p.
 - Badripour, H., 1997. Effect of distances from watering point on rangeland condition and vegetation characteristics. M.S.c. thesis, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, 73p.
 - Barani, H., Rastgar, Sh., and Mohseni, A., 2009. Comparing of statistical different models for suitable estimation of sample number in vegetation studies (Case study: steppic rangelands of north-east Golestan Province). Report of Research Gorgan University Agricultural Sciences and Natural Resources, 31p.
 - Behmanesh B., Heshmati, G. A. and Baghani, M., 2008. Defining the medicinal plants diversity in Chaharbagh mountainous rangelands, Golestan province. *Journal of Rangeland*, 2(2): 141-150.
 - Chaichi, M. R., Mohseni Saravi, M. and Malekian, A., 2005. Effects of livestock trampling on soil physical properties and vegetation cover (Case study: Lar rangelands, Iran). *International Journal of Agriculture and Biology*, 7(6): 909-914.
 - Davies, K. W., Bates, J. D. and Miller, R. F., 2007. Environmental and vegetation relationships of the *Artemisia tridentata* spp. *Wyomingensis* alliance. *Journal of Arid Environments*, 70: 478-494.
 - Doran, J. W. and Parkin, T. B., 1994. Defining and assessing soil quality. 3-21. In Doran, J. W., Coleman, D. C., Bezdicke, F. C. and Stewart, B. A., (Eds.) Defining soil quality for a sustainable environment. Soil Science Society of America Press,
- دام و لگدکوبی آن در مرتع سبب ایجاد تغییراتی در خصوصیات خاک و پوشش گیاهی شده است. بدین صورت که چرای سبک و متعادل در منطقه کلید نه تنها اثر سوئی بر ویژگی‌های شیمیایی مورد مطالعه خاک نداشته، بلکه حاصلخیزی خاک و عناصر مغذی از جمله فسفر و پتاسیم را نیز در مقایسه با مناطق بحرانی (اطراف آبشخور دام‌ها، حریم روستا و اطراف آغل دام‌ها) افزایش داده است و به تبع آن سبب اثرگذاری مثبت بر پوشش گیاهی شده است. بنابراین برای مدیریت پایدار مرتع منطقه مورد مطالعه، توجه به اصول مرتعداری و حفظ شدت چرای متعادل ضروریست. همچنین پس از یک مدت خاص با تغییر محل استقرار منطقه بحرانی آغل در نقاط مختلف مرتع به دلیل آنکه این منطقه غنی از مواد آلی و غذایی هست می‌توان دو مقصود را دنبال کرد؛ اول آنکه با توزیع این مکان می‌توان از بوجود آمدن مناطق بحرانی در منطقه جلوگیری کرد؛ دوم اینکه با این عمل می‌توان از این مناطق به عنوان مناطق حاصلخیز مرتع برای بهبود پوشش گیاهی استفاده کرد، زیرا به دلیل بالابودن مواد غذایی استقرار سریع پوشش گیاهی محتمل‌تر است. از این‌رو توصیه می‌شود به دلیل نقش مؤثر اثبات شده قرق در منطقه از این روش برای احیای سایت‌های با شدت چرای بالا مخصوصاً حریم روستا استفاده گردد. البته کاهش تراکم دام در نقاط بحرانی از طریق افزایش تعداد آبشخورها و محل‌های استراحت دام در عرصه نیز از دیگر روش‌های کاهش شدت تخریب سایت‌های بحرانی خواهد بود. به‌طوری‌که میزان این اثرات منفی و افزایش گونه‌های نامطلوب در منطقه حریم روستا به مرتب و خیم‌تر و زیادتر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود حتی‌الامکان سعی گردد برای تخفیف میزان تخریب، دام‌ها هر ساله از یک طرف حریم روستا را برای رفت و آمد استفاده نمایند.
- به عنوان جمع‌بندی کلی می‌توان بیان کرد، در صورتی که مکان‌های مرتعی از لحاظ خصوصیات اقلیمی و توپوگرافی یکسان باشد و تنها در شدت چرای دام متفاوت باشند ابتدا خاک تغییر کرده، بعد این تغییرات سبب ایجاد تغییر در

- ecology a primer on methods and computing. A Wiley Inter science Publication, USA, 337p.
- Manley, J. T., Schuman, G. E., Reeder, J. D. and Hart, R. H., 1995. Rangeland soil carbon and nitrogen responses to grazing. *Journal of Soil and Water Conservation*, 50(3): 294-298.
- McCune, B. J. and Mefford, M. J., 1999. PC-ORD multivariate analysis of ecological data, Version 5, MjM Software Design, Glenden Beach, Oregon, USA.
- Mohtashamnia, S., 2011. Investigating the most important environmental factors on *Artemisia* genus distribution in Fars province (Case study: Fars stepic rangelands). *Natural Ecosystems of Iran*, 1(3): 75-86.
- Mokhtari Asl, A., Mesdaghi, M., Akbarloo, M. and Zangavarani, R., 2008. Effective interaction between soil characteristics and indicator species in meadows of grassland Qrkhlamar and East Azerbaijan province. *Journal of Agriculture and Natural Resources*, 15(1): 135-152.
- Moradi, H. R. and Ahmadipour, S. H., 2006. Investigation of morphology and soil on vegetation cover using GIS (Case study in part of rangelands Vaz watershed), *The Journal of Geographic Researches*, 38(58): 17-32.
- Moradi, H. R., Mirnia, S. K. and Faragzadeh, M., 2008. Effect of grazing intensities on the soil physical properties and vegetation cover of Charandoo summer rangelands in Kurdistan province. *Iranian Journal of Range and Desert Research*, 15(3): 369-378.
- Piry Sahragard, H., Azarnivand, H., Zare Chahouki, M. A., Arzani, H. and Qumi, S., 2011. Study of effective environmental factors on distribution of plant communities in middle Taleghan basin. *Journal of Range and Watershed Management*, 64(1): 1-11.
- Pyke, D. A., Herrick, J. E., Shaver, P. and Pellatt, M., 2002. Rangeland health attributes and indicators for qualitative assessment. *Journal of Range Management*, 55: 584-597.
- Shokrollahi, Sh., MoradiAssistant, H. R. and Dianati Tilaki, Gh. A., 2012. A survey of some environmental factors affecting on distribution of *Agropyron cristatum* (Case study: Polur summer rangelands, mazandaran province). *Journal of Watershed Management Research*, 97: 111-119.
- Tamtash, R., Tatian, M. R., Reihani, B. and Shokrian, F., 2009. Investigation on relation between physicochemical characteristics of marl soils and plant communities (Case study: Birjand plain). *Iranian Journal of Range and Desert Research*, 16(4): 481-492.
- Ward, J. H., 1963. Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of American Statistical Association*, 58: 236-244.
- Madison, WI.
- Eskandari, N., Alizadeh, A. and Mahdavi, F., 2008. Rangeland management policies in Iran. Institute of Forests and Rangelands, Iran, 190p.
- Fahimipour, E. and Zare Chahouki, M. A., 2010. Investigation of plant diversity changes with environmental factors in middle rangelands of Taleghan. *Pajouhesh & Sazandegi*, 87: 44-51.
- Farazmand, S., Heidarpoor Kiasara, H. and Ziatabar Ahmadi, M., 2009. Investigation of grazing effects on some soil chemical characteristics (The case study in the Kojur of Noushahr region). *Pajouhesh & Sazandegi*, 82: 32-37.
- Farshadfar, E., 2005. Multivariate principles and procedures of statistics. Publications of Taghbostan, Iran, 734p.
- Gorgin Karaji, M., Karami, P., Shokri M. and Safaeian, N., 2006. Investigation of relation some dominanat plants species with soil physical and chemical properties (Case study: Farhadabad sub-basin in Saral region of Kordestan). *Pajouhesh & Sazandgi*, 73: 126-132.
- Heshmati, Gh.A. 2003 Multivariate analysis of environmental factor effects on establishment and expansion of rangeland plants. *Iranian Journal of Natural Resources*, 56(3): 309-320.
- Houghton, R. A. and Goodale, C. L., 2004. Effects of land-use change on the carbon balance of terrestrial ecosystems. *Geophysical Monograph Series, Ecosystems and Land Use Change*, 153: 85-98.
- Jafari haghghi, M., 2003. Methods of soil analysis and samples and physical and chemical analysis with emphasis on theory and application principles. Publications of Neday Zohi, Iran, 236p.
- Jafari, M., Zare Chahouki, M. A., Azarnivand, H., Baghestani, N. and Zahedi Amiri, Gh., 2002. Relationships between Poshtkouh rangelands vegetation of Yazd province and soil properties using multivariate analysis methods. *Iranian Journal of Natural Resources*, 55(3): 433-450.
- Kohandel, A., Arzani, H. and Hosseini Tavassol, M., 2010. Effect of grazing intensity on soil and vegetation characteristics using principal components analysis. *Iranian Journal of Range and Desert Research*, 17(4): 518-526.
- Kosmas, C., Gerontidis, S and Marathianou, M., 2000. The effect of land use change on soil and vegetation over various lithological formation on Lesvos (Greece). *Catena*, 40: 51-68.
- Legendre, P. and Fortin, M. J., 1989. Spatial pattern and ecological analysis. *Vegetation*, 80: 107-138.
- Lepping, O. and Daniels, F. J. A., 2007. Phytosociology of beach and salt marsh vegetation in northern west Greenland. *Polar frosting*, 76(3): 95-108.
- Ludwig, J. A. and Reynolds, J. F., 1988. Statistical

- regression to study the relationship between presence of plant species and environmental factors. *Pajouhesh & Sazandegi*, 76: 136-143.
- Zare Chahouki, M. A., Jafari, M. and Azarnivand, H., 2008. Relationship between vegetation diversity and environmental factors. *Pajouhesh & Sazandegi*, 21(1): 192-199.
- Zare Chahouki, M. A., Zare Chahouki, A. and Zare Ernani, M., 2010. Effects of topographic and edaphic characteristics on distribution of plant species in Eshtehard rangelands. *Iranian Journal of Range and Watershed Management*, 63(3): 331-340.
- Zhao, R., Zhou, H., Qian, Y. and Zhang, J., 2007. Interrelations between plant communities and environmental factors of wetlands and surrounding lands in mid and lower reaches of Tarim River. *Journal of Applied Ecology*, 17(6): 955-60.
- Warren, A., Batterbury, S. and Osbahr, H., 2001. Soil erosion in the west African Sahel: a review and an application of a ‘local political ecology’ “approach in southwest Niger. *Journal of Global Environmental Change*, 11(1): 79-95.
- Yimer, F., Ledin, S. and Abdelkadir, A., 2006. Soil property variations in relation to topographic aspect and vegetation community in the south-eastern highlands of Ethiopia. *Forest Ecology and Management*, 232: 90-99.
- Zare Chahouki, M. A., 2001. Investigation of relation between some plant species and soil properties in Poshtkouh rangelands, Yazd Province. M.Sc. thesis, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, 110p.
- Zare Chahouki, M. A., Jafari, M., Azarnivand, H., Moghaddam, M. R., Farahpour, M. and Shafizadeh NasrAbadi, M., 2007. Application of logistic

Relationship of the most effective soil and management factors with distribution of ecological species groups and calculating their common effect (Case study: Chahar Bagh summer rangelands, Golestan province)

E. Sheidai Karkaj^{1*}, S. Z. Mirdeyhami² and M. Akbarlou³

1*- Corresponding author, Ph.D. Student in Rangeland Science, Department of Range Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran, Email: esmaeil_sheidai@yahoo.com

2-Ph.D. Student in Rangeland Science, Department of Range Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

3-Associate Professor, Department of Range Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

Received:8/25/2012

Accepted:7/13/2013

Abstract

In this study, in order to take appropriate measures in accordance with the principles of ecological management, the relationship between distribution of ecological species groups of Chahar Bagh summer rangelands with soil factors and various grazing management practices was investigated. Five dominant vegetation units including reference area (closure), key and critical areas (pen, vicinity of village and watering point) were identified in the region, upon the range management and utilization types. Vegetation parameters including density and canopy cover percentage as well as soil properties of two depths were investigated by a random-systematic method. Clustering analysis and principle component analysis were applied to determine the ecological groups of the region as well as the effects of soil physicochemical properties on the distribution of ecological species groups using PC-ORD5 and Canoco 4.0 software. The results led to the separation of five ecological species groups from each other. In this region, the distribution of ecological species groups was affected by soil physicochemical properties (90.48%), management parameters (0.008%), and the interaction effects of these factors (10%). Among the soil physicochemical properties, clay percentage in the first depth (0.999), P content in the second depth (0.991), bulk density (-0.989), porosity (0.985), saturation percentage in the first depth (0.982), and K content in the second depth (0.996) had the highest impact on the distribution of ecological species groups, respectively.

Keywords: Ecological species groups, soil properties, management factors, distribution.