

## مقایسه کاج الدار با دو شکل طبیعی بوجود آمده از آن با استفاده از صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک

فاطمه شایان‌مهر<sup>۱\*</sup>، سید غلامعلی جلالی<sup>۲</sup> و فائزه قناتی<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup>- نویسنده مسئول، کارشناس ارشد جنگل‌داری، پست الکترونیک: fshayanmehr@yahoo.com

- دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشگاه تربیت مدرس.

- استادیار، گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس.

تاریخ پذیرش: ۸۷/۱۰/۲۹

### چکیده

به‌منظور تفکیک گونه کاج الدار (*Pinus eldarica* Medw.) از دو نوع کاج بوجود آمده از آن یعنی کاج توپی و کله‌قندی، تغییرات کیفی آنژیم پراکسیداز به‌روش الکتروفورز ژل پلی‌اکریل آمید در سیستم PAGE و نیز سنجش فعالیت این آنژیم مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین محتوای لیگنین نمونه‌های سوزن و ساقه به‌همراه ۱۳ صفت ماکرو‌مورفولوژیک پایه‌ها با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج، الگوهای ایزوآنژیمی سه نوع کاج مورد مطالعه، میزان فعالیت این آنژیم و محتوای لیگنین کلیه نمونه‌ها را مشابه نشان داد، درحالی‌که نتایج مقایسه صفات مورفولوژیک بیانگر وجود تفاوت‌های بارز در این کاج‌هاست. این نتایج حکایت از آن دارد که با وجود بروز تفاوت‌های ریختاری واضح و به رغم این که آنژیم پراکسیداز به‌عنوان آنژیم غالب و مهم در تغییرات فیزیولوژیکی و مطالعات تکامل گیاهان و بررسیهای تنوع ژنتیکی و شناسایی جنس، گونه و زیرگونه کاربرد فراوان دارد، ولی بخش محلول (نوع سیتوزولی آن) برای تمایز این کاج‌ها نشانگر مناسبی نمی‌باشد. همچنین استفاده از نشانگرهای مولکولی و مطالعات سیتوژنتیکی برای مشخص کردن علت این امر پیشنهاد می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: کاج الدار، پراکسیداز، الکتروفورز، مورفولوژی، کاج توپی، کاج کله‌قندی.

### مقدمه

محیطی سازگار شده است. در این منطقه برخی از پایه‌های این کاج از حالت و شکل طبیعی پایه‌های مادری خود فاصله گرفته و دچار تغییراتی از نظر قامت درخت، شکل و تراکم تاج، اندازه مخروط و بذر شده‌اند. پایه‌های بوجود آمده تحت عنوانهای کاج توپی و کله‌قندی مشهورند که به‌دلیل شکل تاج این کاج‌ها و شباهت آنها به این موارد، تحت این نام خوانده می‌شوند. امروزه قامت کوتاه و تاج کروی یا مخروطی آنان سبب شده تا در بسیاری از مناطق به‌عنوان گونه‌ای منحصر به‌فرد در ایجاد فضای سبز، کاشته شوند.

رویشگاه طبیعی کاج تهران یا کاج الدار (*Pinus eldarica* Medw.) امروزه محدود به کوه منفرد و کم ارتفاعی به‌نام Eller Oukhi در جنوب‌شرقی تفلیس گرجستان در ارتفاع ۲۰۰ تا ۶۰۰ متر از سطح دریا و به‌وسعت ۵۵۰ هکتار می‌باشد (Eller, 1967). تاریخ ورود احتمالی این درخت به ایران به بیش از ۸۰۰ سال پیش تخمین زده می‌شود (سردادی، ۱۳۶۸؛ جزیره‌ای، ۱۳۸۰؛ میربادین و همکاران، ۱۳۷۳). منطقه نشتیفان، در جنوب شهرستان خوف از جمله مناطقی است که کاج الدار از قدیم در آنجا کاشته شده و به‌خوبی با شرایط

*Pinus* (al., 2004; Ponton *et al.*, 2004) در جنس *Pinus* ۲۰۰۴ صفاتی نظیر اندازه مخروط، طول و وزن بذر، شکل برجستگی خارجی فلس مخروط، در رده‌بندی، شناسایی و تشخیص آنها بسیار مفید و رایج می‌باشد (Aguinagalde *et al.*, 1999; Gil *et al.*, 1996; Mirov, 1967; Gil *et al.*, 2002; Mirov, 1967). امروزه روش‌های تاکزوئومی براساس صفات مورفولوژی بر پایه علم آمار، به دلیل سهولت در اندازه‌گیری و ارزیابی در کنار تجزیه و تحلیل DNA می‌تواند مکملی بر تشخیص روابط فیلوزنی میان گونه‌ها و زیرگونه‌ها باشد (Apavatjrut *et al.*, 1999; Gil *et al.*, 2002).

در این تحقیق، با توجه به نقش اساسی آنزیم پراکسیداز در تشکیل دیواره سلولی، تنظیم رشد و نمو، متابولیسم تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و نیز اهمیت و سهولت استفاده از صفات مورفولوژیک در بررسی تنوع ژنتیکی، از مقایسه الگوی ایزوآنزیمی پراکسیداز و فعالیت آن و نیز ویژگیهای مورفولوژیک بهمراه محتواهای لیگنین سوزن و ساقه در جهت بررسی امکان تفکیک گونه الدار و دو شکل مورفولوژیک بوجود آمده (spec. nova) از آن استفاده شده است.

### مواد و روشها

در این پژوهش برای مقایسه دو کاج توبی و کله‌قندی با شکل اصلی آن (کاج الدار)، نمونه‌های نهال سه ساله از هر یک از منطقه نشتیفان تهیه و به مدت ۵ ماه در شرایط گلخانه نگهداری شدند. پس از ثبت در شرایط گلخانه از نهالها در دو فصل بهار و تابستان (سال ۱۳۸۵) نمونه‌گیری شده و مورد مقایسه آنزیمی قرار گرفتند. برای مطالعه کیفی آنزیم، نمونه‌های سوزن (۱ گرم) با بافر استخراج (تریس- اسید کلریدریک pH=۸، کلرید سدیم، DTT، EDTA) عصاره‌گیری و به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفیوژ شد و به روش الکتروفورز ژل پلی‌آکریل آمید (PAGE) با ترکیب ۲/۵ درصد اکریل آمید و ۰/۶۳ درصد بیس، تریس- اسید کلریدریک pH=۸/۸ مولار ۱/۵ مولار برای ژل جدا کننده

امروزه استفاده از فناوریهای مولکولی (ایزوآنزیم‌ها و PCR) در مطالعه ویژگیهای بیوشیمیایی برای تمایز ژرم‌پلاسم گیاهی بسیار گسترش یافته که تخمین بهتری از تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتها فراهم کرده است (Andres *et al.*, 1999). ایزوآنزیم‌ها رابطه نزدیکی با محصول ژن دارند. تحرک الکتروفورزی آنها، نتیجه اندازه و شکلهای مختلف مولکول‌های آنزیم می‌باشد که اختلافشان شاخص خوبی از تنوع ژنتیکی است (Rahman *et al.*, 2000). مطالعه الکتروفورزی آنزیم‌ها به طور گسترده برای ارزیابی‌های ژنتیکی جمعیتهای گیاهی استفاده می‌شود و تاکنون گونه‌های درختی زیادی (از جمله آلو، پسته، ملح و صنوبر) با استفاده از تنوع ایزوآنزیمی مقایسه شده‌اند. تحقیقات گوناگون نشان داده است که الگوهای ایزوآنزیمی یک ابزار کارآمد و مفید در تمایز گونه‌های گیاهیست (Apavatjrut *et al.*, 1999; Ellstarnd & Lee, 1987; Reimers *et al.*, 1992).

با کمک الگوی ایزوآزمی پراکسیداز، کولتیوارهای آلو از یکدیگر تمایز شدند (Pashkoulov *et al.*, 1995). با استفاده از تجزیه و تحلیل آنزیم پراکسیداز در جوامع مختلف پده در چین، ۴ کلون تمایز با اختلافهای اساسی تشخیص داده شد (Xuexin, 1991). همچنین بسیاری از داده‌های ایزوآزمی مربوط به ملح و هیبریدهای بوجود آمده از آن در اروپا تنها با استفاده از پراکسیداز گزارش شده است (Agustin *et al.*, 2000).

صفات مورفولوژیک نیز از اولین و قدیمی‌ترین ابزارهای طبقه‌بندی گیاهی بوده است. ویژگیهای برگ و میوه در پهنه‌برگان و سوزن و مخروط در سوزنی‌برگان به طور گسترده در این گونه مطالعات بررسی شده‌اند (Brushi *et al.*, 2003; Gil *et al.*, 2002; Nakatani *et al.*, 2003).


سود ۲ مولار اضافه و با اسید استیک گلاسیال به حجم رسید. محتوای لیگنین با اندازه‌گیری جذب در طول موج ۲۸۰ نانومتر و با استفاده از ضربی جذب ویژه محاسبه گردید (Iiyama & Wallis, 1990). برای اندازه‌گیری مشخصه‌های مورفولوژیک از نهالهای سه‌ساله، قطر تاج، قطر یقه و ارتفاع نهالها و نیز طول سوزن، طول غلاف و قطر سوزنها بهمراه غلاف و از پایه‌های مادری موجود در منطقه، مخروط جمع‌آوری و صفات طول مخروط ماده، قطر مخروط، قطر پایک، وزن مخروط، تعداد بذر در هر مخروط، وزن بذر و طول بذر اندازه‌گیری و سپس با استفاده از آزمونهای تک متغیره و چند متغیره مورد مقایسه قرار گرفتند. برای انجام کلیه تجزیه و تحلیل‌های آماری، از نرم‌افزارهای SPSS و PC-ORD استفاده گردید.

### نتایج


شکل ۱ مقایسه الگوهای ایزوآنزیمی پراکسیداز را در سوزنهای کاج الدار با دو شکل جدید آن نشان می‌دهد. همان‌طورکه مشاهده می‌شود همه نمونه‌ها الگوی ایزوآنزیم‌های ثابتی را از نظر کیفی نشان می‌دهند و یا به عبارتی در الگوهای ایزوآنزیمی هر سه نوع کاج، تفاوت خاصی که معرف تفکیک آنها باشد مشاهده نمی‌شود. شکلهای ۲، ۳ و ۴ فعالیت آنزیم پراکسیداز را در سه بخش محلول، یونی و کوالانی نشان می‌دهند (تجزیه واریانس). ملاحظه می‌گردد که این اختلاف‌ها به لحاظ آماری در سطح احتمال ۹۵٪ معنی‌دار نبوده است.

با غلظت ۱۲/۵٪ و ۱۵٪ درصد اکریل آمید و ۰/۰۱ درصد بیس، تریس-اسید کلریدریک ۰/۵ مولار pH=۶/۸ بازگشته با غلظت ۵٪ استفاده گردید (مصطفایی، ۱۳۸۲؛ Reimers *et al.*, 1992). رنگ‌آمیزی اختصاصی آن با محلول ۳-آمینو-۹-اتیل کاربازول، این‌ان دی متیل شکلامید، استات سدیم با غلظت ۵۰ میلی‌مولار و pH=۴/۵، پراکسید هیدروژن انجام شد (Tanksley & Orton, 1986).


برای سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز در سه بخش محلول، یونی و کوالانی از اسپکتروفتومتر استفاده شد. نمونه‌های سوزن با بافر تریس-مالئیک اسید ۴۰ میلی‌مولار عصاره‌گیری شدند. ترکیب واکنش برای سنجش فعالیت بخش محلول شامل: بافر تریس-مالئیک اسید ۴۰ میلی‌مولار، گایاکول ۲۸ میلی‌مولار، پراکسید هیدروژن ۵ میلی‌مولار و عصاره آنزیمی و برای سنجش ۴۱/۶ Syringaldazin میکرومولار استفاده شد و فعالیت آنزیمی به صورت افزایش جذب در طول موج معین در دقیقه بهازای هر میلی‌گرم پروتئین نمونه محاسبه گردید (Morita *et al.*, 2006). برای مقایسه مقدار لیگنین، دیواره‌های سلولی نمونه‌های گیاهی (سوزن و ساقه) استخراج گردید (Morita *et al.*, 2006). میزان ۶ گرم از نمونه‌ها با ۲/۵ میلی‌لیتر استیل بروماید (AcBr) ۲۵ درصد (v/w) و ۰/۱ میلی‌لیتر پرکلریک اسید ۷۰ درصد در بن ماری (۷۰°C) به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفته و بعد از سرد کردن به آن



شکل ۱- باندهای ایزوآنزیمی پراکسیداز حاصل از الکتروفورز ژل پلی‌اکریل آمید (PAGE) با غلظت ۱۲/۵ درصد




شکل‌های ۲ و ۳- مقایسه فعالیت بخش محلول و بخش آنزیم پراکسیداز در کاج الدار، کله‌قندی و توپی



شکل ۴- مقایسه فعالیت بخش کووالان آنزیم پراکسیداز در کاج الدار، کله‌قندی و توپی

شکل ۵ مقایسه میزان لیگین نمونه‌های سوزن و ساقه نهالهای موردنظر را نشان می‌دهد که نتایج با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه تفاوت معنی‌داری را میان آنها نشان نداده است.



شکل ۵- مقایسه میزان لیگین موجود در نمونه سوزن و ساقه نهالهای هر سه نوع کاج

قطر سوزن با غلاف و ارتفاع نهال بسیار معنی دار (در سطح احتمال ۹۹ درصد) بوده و بیشترین مقدار میانگین هر یک از این صفات، مربوط به کاج الدار و کمترین آن مربوط به کاج توپی بوده است. کاج کله‌قندی نیز در حد واسطه میان این دو قرار گرفته است. صفات طول غلاف و قطر تاج نهال نیز در کاج الدار بیشتر از دو کاج دیگر بوده، اما کاج کله‌قندی و توپی تفاوتی به لحاظ آماری نشان ندادند. قطر ساقه نهال نیز تفاوت معنی داری در هیچ یک نشان نداده است.

نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای مورفولوژیک نیز در جدول ۱ آورده شده است. چنانچه مشاهده می‌شود کلیه صفات به غیر از قطر ساقه نهال در سطح ۹۹٪ معنی دار بوده است. نتایج مقایسه میانگین هر یک از ۱۳ صفت مورفولوژیک ذکر شده در هر سه نوع کاج، با استفاده از آزمونهای Dunnett T3 و Tukey HSD نیز در جدول ۲ نشان داده شده است (میانگین  $\pm$  اشتباه معیار). صفاتی نظیر طول مخروط، وزن مخروط، قطر مخروط، قطر پایک مخروط، تعداد بذر در هر مخروط، طول بذر، وزن بذر،

جدول ۱- نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک (One Way ANOVA)

صفات مورفولوژیک	سطح معنی داری	F	مربعات	میانگین	درجه آزادی
طول مخروط (میلی‌متر)	۰/۰۰۰	۶۶/۶۶**	۹۱۴/۷	۲	۲
وزن مخروط (گرم)	۰/۰۰۰	۵۳/۴۴**	۶/۵	۲	۲
قطر حداقل مخروط (میلی‌متر)	۰/۰۰۰	۶۰/۶۶**	۰/۵۲	۲	۲
قطر پایک مخروط (میلی‌متر)	۰/۰۰۰	۴۳/۸۸**	۰/۶۸	۲	۲
تعداد بذر در هر مخروط	۰/۰۰۰	۲۴/۸۸**	۶/۶	۲	۲
طول بذر (میلی‌متر)	۰/۰۰۰	۹۲/۵۵**	۱۹/۸	۲	۲
وزن بذر (گرم)	۰/۰۰۰	۱۴۱/۵۵**	۰/۰۱	۲	۲
طول سوزن (سانتی‌متر)	۰/۰۰۰	۷/۹۹**	۰/۰۱۶	۲	۲
قطر سوزن با غلاف (میلی‌متر)	۰/۰۰۰	۴۱/۸۸**	۰/۰۵۷	۲	۲
طول غلاف (میلی‌متر)	۰/۰۰۰	۲۳/۹۹**	۰/۰۴۶	۲	۲
ارتفاع نهال (سانتی‌متر)	۰/۰۰۰	۱۶۹/۲۲**	۲۱۵۶۲/۸	۰/۰۰	۲
قطر تاج نهال (سانتی‌متر)	۰/۰۰۰	۴۲/۲۲**	۰/۰۲۰	۰/۰۰	۲
قطر ساقه نهال (میلی‌متر)	۰/۰۸۳۴	۰/۱۸ ns	۴/۰۴		

\* و ns به ترتیب به معنی وجود اختلاف آماری معنی دار در سطح احتمال ۹۹٪ و عدم وجود اختلاف معنی دار آماریست.


جدول ۲- نتایج مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک در سه کاج مورد مطالعه با استفاده از آزمون توکی و دانت تی ۳

صفات مورفولوژیک	کاج توکی	کاج کله‌قندی	کاج الدار	کاج توکی
طول مخروط (میلی‌متر)	$35/41 \pm 1/75$ c	$46/13 \pm 0/72$ b	$59/21 \pm 1/66$ a	
وزن مخروط (گرم)	$4/91 \pm 0/75$ c	$17/18 \pm 0/69$ b	$33/19 \pm 5/14$ a	
قطر حداکثر مخروط (میلی‌متر)	$23/01 \pm 1/24$ c	$30/56 \pm 0/40$ b	$40/27 \pm 1/10$ a	
قطر پاییک مخروط (میلی‌متر)	$4/61 \pm 0/23$ c	$6/99 \pm 0/38$ b	$8/62 \pm 0/30$ a	
تعداد بذر در هر مخروط	$11/00 \pm 3/60$ c	$23/71 \pm 1/66$ b	$60/83 \pm 2/61$ a	
طول بذر (میلی‌متر)	$6/40 \pm 0/08$ c	$7/17 \pm 0/05$ b	$7/67 \pm 0/05$ a	
وزن بذر (گرم)	$0/04 \pm 0/001$ c	$0/06 \pm 0/001$ b	$0/07 \pm 0/001$ a	
طول سوزن (سانتی‌متر)	$10/95 \pm 0/17$ b	$11/90 \pm 0/17$ a	$11/08 \pm 0/19$ b	
قطر سوزن با غلاف (میلی‌متر)	$1/05 \pm 0/01$ c	$1/16 \pm 0/01$ b	$1/25 \pm 0/02$ a	
طول غلاف (میلی‌متر)	$6/62 \pm 0/10$ b	$6/83 \pm 0/08$ b	$7/67 \pm 0/13$ a	
ارتفاع نهال (سانتی‌متر)	$42/00 \pm 0/89$ c	$71/13 \pm 4/23$ b	$142/88 \pm 5/40$ a	
قطر تاج نهال (سانتی‌متر)	$42/13 \pm 1/03$ b	$42/13 \pm 0/85$ b	$55/50 \pm 1/51$ a	
قطر ساقه نهال (میلی‌متر)	$29/19 \pm 2/27$ a	$27/81 \pm 0/80$ a	$28/81 \pm 1/59$ a	

وجود علامت‌های مشابه در هر ردیف، بیانگر عدم وجود اختلاف معنی‌دار آماری در سطح احتمال ۹۵٪ است.

بیشتری به کاج کله‌قندی دارد و این دو با کاج الدار یعنی پایه‌های مادری بوجود آمده از آن تفاوت معنی‌داری دارند؛ چنان‌چه در این تحلیل، دو کاج یادشده در خوشهای مجزا از کاج الدار قرار گرفته‌اند (شکل ۶).

صفات موردنظر همچنین با استفاده از تجزیه خوشهای دو مرحله‌ای (Two Step Cluster) ارزیابی شدند و میزان قربت این کاج‌ها با یکدیگر با استفاده از کلیه صفات یاد شده مشخص گردید. نتایج این آزمون نشان داد که کاج توکی از نظر صفات مورفولوژیک اندازه‌گیری شده شباهت



شکل ۶- نتایج تجزیه خوشهای دو مرحله‌ای با استفاده از مجموع صفات مورفولوژیک اندازه‌گیری شده

کاج کله‌قندی و توپی است. علاوه بر این پس از انجام چند تحلیل عاملی و حذف ۲ متغیر نامناسب براساس مالک کفايت نمونه‌گیری پایین آنها (یعنی قطر یقه نهال و طول غلاف سوزن) از ۱۱ متغیر باقی‌مانده در این تحلیل استفاده گردید.

جدول ۳ مقایسه میانگین ۱۳ صفت مورد مطالعه در هر یک از خوشه‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای دو مرحله‌ای مرحله‌ای را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌گردد که در کلیه صفات به غیر از قطر یقه نهال و طول سوزن، مقادیر میانگین مربوط به کاج الدار در سطح احتمال ۹۹٪ بیش از

جدول ۳- مقایسه میانگین ۱۳ صفت مورد مطالعه در هر یک از خوشه‌های بدست آمده از تجزیه خوشه‌ای دو مرحله‌ای

صفات مورفولوژیک	خوشه ۱	خوشه ۲	معنی‌داری	آماره t
طول سوزنها (سانتی‌متر)	$11/44 \pm 0/13^a$	$11/09 \pm 0/19^a$	۰/۱۰۶	۱/۶۲۱
قطر سوزنها با غلاف (میلی‌متر)	$1/11 \pm 0/010^b$	$1/25 \pm 0/020^a$	۰/۰۰۰	-۶/۴۴۵
طول غلاف (میلی‌متر)	$6/73 \pm 0/07^b$	$7/67 \pm 0/13^a$	۰/۰۰۰	-۶/۴۱۴
طول مخروط (سانتی‌متر)	$40/77 \pm 1/74^b$	$59/21 \pm 1/66^a$	۰/۰۰۰	-۶/۳۶۲
وزن مخروط (گرم)	$11/04 \pm 1/77^b$	$33/19 \pm 5/14^a$	۰/۰۰۶	-۴/۰۷۴
قطر حداقل مخروط (میلی‌متر)	$26/78 \pm 1/22^b$	$40/27 \pm 1/10^a$	۰/۰۰۰	-۶/۶۹۴
قطر پایک مخروط (میلی‌متر)	$5/80 \pm 0/39^b$	$8/62 \pm 0/30^a$	۰/۰۰۰	-۴/۴۱۵
تعداد بذر در هر مخروط	$17/36 \pm 2/59^b$	$90/83 \pm 2/61^a$	۰/۰۰۰	-۹/۹۹۶
طول بذر بدون باله (میلی‌متر)	$6/97 \pm 0/05^b$	$7/67 \pm 0/05^a$	۰/۰۰۰	-۱۰/۰۱۲
وزن بذرها (گرم)	$0/057 \pm 0/001^b$	$0/073 \pm 0/001^a$	۰/۰۰۰	-۱۰/۸۵۲
ارتفاع نهالها (سانتی‌متر)	$56/56 \pm 4/30^b$	$142/88 \pm 5/40^a$	۰/۰۰۰	-۱۲/۰۰۱
قطر تاج نهالها (سانتی‌متر)	$42/13 \pm 0/65^b$	$55/50 \pm 1/51^a$	۰/۰۰۰	-۹/۶۰۰
قطر یقه نهال (میلی‌متر)	$28/50 \pm 0/17^a$	$28/81 \pm 1/59^a$	۰/۰۷۸	-۰/۱۵۶

\* و ns بهترتبی به معنی وجود اختلاف آماری معنی‌دار در سطح احتمال ۹۹٪ و عدم وجود اختلاف معنی‌دار آماریست.

علامت‌های a و b در هر ردیف نیز به معنی وجود اختلاف معنی‌دار آماری در هر یک از دو خوشه و علامت‌های مشابه در هر ردیف بیانگر خلاف آن است.

در ادامه تحلیل، دو مؤلفه یا عامل اول انتخاب گردیدند. جدول ۵ بارهای عاملی مربوط به دو عامل پس از دوران را نشان می‌دهد که این بارها میزان همبستگی هر متغیر را با مؤلفه‌ها نشان می‌دهند.

در جدول ۴ میزان واریانس بیان شده توسط مؤلفه‌ها و نیز مقادیر ویژه آنها ارائه شده است. از آنجا که دو مؤلفه اول بیش از ۷۰ درصد از واریانس را تبیین می‌نمایند و نیز مقادیر ویژه (Eigen values) بیش از یک دارند، بنابراین

جدول ۴- میزان واریانس بیان شده توسط مؤلفه ها و مقادیر ویژه آنها در تحلیل عاملی


مجموع مربعات بارهای استخراج شده			مقادیر ویژه ابتدایی		
درصد واریانس جمعی	درصد واریانس	مجموع	درصد واریانس جمعی	درصد واریانس	مجموع
۵۵/۱۴۰	۵۵/۱۴۰	۶/۰۶۵	۵۷/۱۰۹	۵۷/۱۰۹	۶/۲۸۲
۷۰/۹۹۵	۱۵/۸۵۴	۱/۷۴۴	۷۰/۹۹۵	۱۳/۸۸۶	۱/۵۲۷
					۷۰/۹۹۵
					۱۳/۸۸۶
					۸/۷۰۵
					۰/۹۸۵
					۰/۸۳۷
					۰/۵۸۰
					۰/۴۶۲
					۰/۱۵۵
					۰/۱۰۵
					۰/۰۵۹
					۰/۰۳۰
					۰/۰۰۶
					۱۱
					۶/۲۸۲
					۱
					۲
					۳
					۴
					۵
					۶
					۷
					۸
					۹
					۱۰
					۱۱

جدول ۵- بارهای عاملی مربوط به دو عامل پس از دوران یا ماتریس مؤلفه های دوران یافته

صفات مورفولوژیک	مؤلفه ها
دوم	اول
قطر حداکثر مخروط (میلی متر)	۰/۹۷۵
تعداد بذر در هر مخروط	۰/۹۶۸
طول مخروط (سانتی متر)	۰/۹۶۷
وزن مخروط (گرم)	۰/۹۳۲
قطر پایک مخروط (میلی متر)	۰/۸۹۷
ارتفاع نهالها (سانتی متر)	۰/۸۸۸
قطر تاج نهالها (سانتی متر)	۰/۸۰۱
وزن بذرها (گرم)	۰/۷۸۹
طول بذر (میلی متر)	۰/۷۸۶
قطر سوزنها با غلاف (میلی متر)	۰/۵۷۵
طول سوزنها (میلی متر)	-

کاج الدار (نقاط مشخص شده با حرف E)، دومی، کاج کله قندی (نقاط دارای حرف K) و خوش سوم گویای پایه های کاج توپی (نقاط دارای حرف T) است.

نمودار حاصل از پراکنش پایه های سه کاج مورد بررسی در فضای محورهای مختصات، براساس دو مؤلفه اول حاصل از تحلیل عاملی بیانگر تفکیک آنها به صورت کاملاً مشخص می باشد (شکل ۷). خوش اول نشان دهنده



شکل ۷-نمودار پراکنش کاج های مورد مطالعه در فضای مختصات براساس دو مؤلفه اول تحلیل عاملی (خوشه اول که دارای حرف E است مربوط به کاج الدار بوده و خوشه دوم و سوم که به ترتیب با حروف K و T در شکل نشان داده شده اند به کاج کله قندی و توپی تعلق دارند).

چنان‌چه واضح است کاج توپی و کله‌قندی حداقل فاصله یا اختلاف را داشته و کاج توپی و الدار نیز حداقل فاصله یا اختلاف را از نظر صفات مورفولوژیک مورد مطالعه دارا می‌باشند.

در نهایت با استفاده از تجزیه و تحلیل Quick Cluster فواصل میان مراکز خوشه‌ها (در اینجا منظور هر یک از سه کاج یادشده است) مشخص گردید که نتایج آن در ماتریس کوچکی در جدول ۶ نشان داده شده است.

جدول ۶- فواصل نهایی میان مراکز خوشه‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل Quick Cluster

	کاج توپی	کاج کله قندی	کاج الدار	خوشه
۱۲۱/۸۵۳	۸۸/۹۵۷	-	کاج الدار	
۳۴/۵۴۱	-	۸۸/۹۵۷	کاج کله قندی	
-	۳۴/۵۴۱	۱۲۱/۸۵۳	کاج توپی	

## بحث

مشابه بوده و هیچ‌گونه تفاوتی مشاهده نشد. در مطالعات انجام شده نیز با وجود معرفی چهار ایزوآنزیم اسیدی و دو ایزوآنزیم بازی از پراکسیداز، در سوزنهای پنج لاین مختلف از نوئل (*Picea omorika*), تفاوتی میان الگوی Bogdanovici *et al.*, (2005). همچنین عدم وجود اختلاف معنی‌دار در میزان فعالیت این آنزیم و محتواهای لیگنین پایه‌های مورد مطالعه نیز حکایت از آن دارد که به رغم این که آنزیم پراکسیداز به عنوان آنزیم غالب و مهم در تغییرات فیزیولوژیکی، در مطالعات تکامل گیاهان و بررسیهای تنوع ژنتیکی و شناسایی جنس، گونه و زیرگونه کاربرد فراوانی دارد Agustin *et al.*, 2000; Pashkoulov *et al.*, 1995; Xuexin, 1991)، اما در عین حال برای تمایز این کاج‌ها، نشانگر مناسبی نمی‌باشد. ذکر این نکته ضروریست که پراکسیدازها دارای انواع مختلف با خواص آنیونی، کاتیونی و خشی هستند که آنیون پراکسیدازها عمدتاً در آپوپلاسم حضور داشته و در بیوستتر لیگنین و سوبرین نقش دارند (Morita *et al.*, 2006; Vatulescu *et al.*, 2004). بنابراین می‌توان پیشنهاد نمود که استفاده از آنزیم‌های دخیل در ستر اسیدهای چرب (نظری استراز)، برای مشاهده الگوی باندی و احتمالاً تمایز موجود در بین آنان، ممکن است مفید واقع شده و تا حد زیادی راه‌گشای باشد.

کاتیون پراکسیدازها معمولاً محلول (موجود در سیتوزول) می‌باشند. البته برخی از پراکسیدازهای کاتیونی در آپوپلاسم نیز حضور دارند که نمونه آنها آسکوربات پراکسیداز ویژه‌ایست که با استفاده از آسکوربات (و نه گایاگول) به جمع‌آوری پراکسید هیدروژن در آپوپلاسم می‌پردازد و نمونه دیگر آنها اکسین اکسیدازی است که با تنظیم میزان اکسین در ریختزاری و تعیین الگوهای نمو دخالت دارد (Sanchez *et al.*, 1995). بنابراین ممکن است تفاوت‌های ریختی بارز میان شکلهای جدید کاج الدار با پایه‌های مادری، حاصل تفاوت در الگوی ایزوآنزیم‌های

کاج الدار یکی از ۱۰۵ گونه (و زیرگونه) جنس *Pinus* است که برخی از گیاهشناسان آن را یک گونه مستقل شناخته و عده‌ای دیگر آن را یکی از شکلهای جغرافیایی کاج بروسیا (*Pinus brutia*) یا واریته‌ای از کاج حلب (*Pinus halepensis* var. *eldarica*) دانسته‌اند. طی مطالعه‌ای که در ایران در مورد رده‌بندی علمی و پراکنش جغرافیایی آن انجام گردید، نتیجه‌گیری شد که گونه کاج موجود در ایران مجزا از *P. halepensis* بوده و از شکلهای جغرافیایی *P. brutia* می‌باشد که از گذشته‌های دور به ایران وارد شده ولی چگونگی ورود آن به ایران هنوز به طور دقیق مشخص نشده است (سردانی، ۱۳۶۸؛ جزیره‌ای، ۱۳۸۰؛ میربادین و همکاران، ۱۳۷۳) ویژگیهای مشترک کاج بروسیا و الدار وجود یک ترپن دو حلقوی (Terpen-3-Carene) بوده که در رزین‌ها و روغنها فرار آنها یافت می‌شود. بر پایه همین تشابهات، Mirov (1967) این نظریه را عنوان نموده که کاج بروسیا در دوره سوم احتمالاً در اثر هیبرید بین اجداد کاج و کاج جنگلی بوجود آمده، چرا که این ترپن در کاج جنگلی وجود داشته اما در کاج حلب که از جهاتی شبیه کاج بروسیا است به چشم نمی‌خورد. به عقیده برخی از محققان، تعدادی از پایه‌های آن از آسیای صغیر در جهت شمال به سمت قفقاز، انتقال یافته و در حدود ۵۰ میلیون سال قبل به گونه کاج الدار متوجه شده‌اند (سردانی، ۱۳۶۸؛ جزیره‌ای، ۱۳۸۰؛ میربادین و همکاران، ۱۳۷۳).

مطالعه ایزوآنزیمی مربوط به گونه‌های کاج در اروپا بر روی تجزیه و تحلیل ساختار ژنتیکی جمعیتهای کاج سیلوستر و کمپلکس کاج حلب-بروسیا انجام شده است (Andres *et al.*, 1999). در تحقیق حاضر برای بررسی روند تکاملی و جایگاه سیستماتیک دو شکل جدید از گونه کاج الدار از نشانگر آنزیمی پراکسیداز و برخی ویژگیهای بیوشیمیایی متأثر از آن استفاده گردید که الگوهای ایزوزایمی پراکسیداز در مورد هر سه نوع کاج

دچار تردید می‌نماید. بهمین دلیل توصیه می‌شود که علت کاهش رویش کاج توپی و کله‌قندی، تغییر فاحش شکل تاج (کپه‌ای و پرپشت شدن تاج) و حتی مینیاتوری شدن مخروط‌ها و بذرها در این کاج‌ها به طور دقیق و با بکارگیری روش‌های مولکولی و بررسی DNA و یا حتی روش‌های سیتوژنتیک بررسی گردد.

### منابع مورد استفاده

- سردادی، ح.، ۱۳۶۸. مونوگرافی کاج الدار. مجموعه مقالات تحقیقات منابع طبیعی، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراعت، چاپ اول، شماره ۵۵: ۱۰۰-۶۸.
- جزیره‌ای، م.ح.، ۱۳۸۰. جنگلکاری در خشکبوم. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۴۵۰ صفحه.
- مصطفایی، ع.، ۱۳۸۲. راهنمای نظری و عملی الکتروفسورز پروتئین در ذل. انتشارات یادآوران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، چاپ دوم، ۱۷۳ صفحه.
- میربادین، ع.ر.، شیبانی، ح.ع.، محمدی، م. و میرکاظمی س.ز.، ۱۳۷۳. علل ضعف فیزیولوژیک کاج الدار پارک چینگر. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراعت، چاپ اول، ۶۱ صفحه.
- Aguinagalde, I., Llorente, F. and Benito, C., 1996. Relationship among five population Black Pine (*Pinus nigra* Arn.) using morphometric and isozyme markers. *Silvae Genetica*, 46(1): 1-9.
- Agustin, C.M.A., AgUndez, D. and Gil, L., 2000. Identification of native and hybrid elms in Spain using isozyme gene markers. *The Genetic Society of Great Britain, Heredity*, 85: 157-166.
- Andres, F.G., Pita, J.M. and Ortiz, J.M., 1999. Identification of Iberian and Canarian species of the genus *Pinus* with four isoenzyme systems. *Biochemical, Systematics and Ecology*, 27: 235-242.
- Apavatjrut, P., Anunthalabhochai, S., Sirirugsa, P. and Alisi, C., 1999. Molecular markers in the identification of some early flowering *Curcuma L.* (*Zingiberaceae*) species. *Annals of Botany*, 84: 529-534.
- Bogdanovici, J., Ducici, T., Milosavic, N., Vujcic, Z., Sijacic, M., Isaje, V. and Radotic, K., 2005. Antioxidant enzymes in the needles of different omorika lines *Arch. Biol. Sci. Belgrade*, 57 (4): 277-282.
- Brushi, P., Grossoni, P. and Bussotti, F., 2003. Within and among tree variation in leaf morphology of

پراکسیدازهای کاتیونی آپوپلاسمی به‌ویژه در مریستم‌های رأسی باشد.

به‌هرحال صفات مورفولوژیک، اختلافهای بسیار بازتری را در مقایسه با ویژگیهای کمی و کیفی آنزیم مورد مطالعه در این کاج‌ها نشان دادند. صفات وابسته به مخروط و بذر به‌همراه ارتفاع نهال و قطر سوزن با غلاف، بهترین صفات در جهت نشان دادن تمایز مورفولوژیک ایجاد شده تشخیص داده شدند؛ چرا که بیشترین میانگین هر یک از این ویژگیها به‌ترتیب مربوط به کاج الدار، کله‌قندی و توپی بوده است. صفت طول سوزن تنها مورد نقض روند نزولی از کاج الدار به توپی بوده است. به‌طوری‌که بیشترین میانگین را کاج کله‌قندی به‌خود اختصاص داده است. بنابراین صفت اخیر به تهایی نمی‌تواند در تحلیل تمایز مورد استناد قرار گیرد. همچنین با استفاده از نتایج تحلیل عاملی مشخص گردید که قطر یقه نهال، طول غلاف سوزن و طول سوزن به هیچ وجه متغیرهای مناسبی در بیان تغییرات بدست آمده در کاج‌های جدید نمی‌باشند و سایر صفات از جمله صفات مربوط به نهال و مخروط و بذر در ایجاد واریانس‌ها نقش بسزایی داشته که نتایج این تحلیل نیز مشابهت زیادی با نتایج مقایسه تک‌متغیره صفات داشته است. براساس نتایج تجزیه خوش‌های دومرحله‌ای می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که دو کاج توپی و کله‌قندی قرابت فنوتیپی بیشتری با یکدیگر داشته و از نظر مورفولوژیک کاملاً مجزا از کاج الدار هستند. اگرچه این تجزیه و تحلیل، کاج توپی و کله‌قندی را در یک خوش‌های قرار داده است، اما براساس نمودار پراکنش پایه‌های درختی (شکل ۷) می‌توان اظهار نمود که این دو کاج نیز دارای ویژگیهای مختص به‌خود و مجزا از یکدیگر بوده و می‌توانند به‌نوعی واریته‌هایی از کاج الدار محسوب شوند. البته اظهار قطعی مورد اخیر تنها از طریق مطالعه دقیق مولکولی قابل استناد است. به‌هرحال وجود اختلافهای فاحش ظاهری در این کاج‌های نوظهور با پایه‌های مادری، اطلاق نام الدار را به شکلهای جدید

- Ponton, S., Dupouey, J.L. and Dreyer, E., 2004. Leaf morphology as species indicator in seedlings of *Quercus robur* L. and *Q. petraea* (Matt.) Liebl.: modulation by irradiance and growth flush. Ann. For. Sci. 61: 73–80.
- Rahman, M.M., Nito, N. and Isshiki, S., 2000. Cultivar identification of yuzu (*Citrus junos* Sieb. Ex Tanaka) and related acid citrus by leaf isozymes. Scientia Horticulturae, 87: 191-198.
- Reimers, P., Guo, A. and Leach J.A., 1992. Increased activity of a cationic peroxidase associated with an incompatible interaction between *Xanthomonas oryzae* pv oryzae and Rice (*Oryza sativa*). Plant Physiology, 99: 1044-1050.
- Sanchez, M., Revilla, G. and Zarra, I., 1995. Changes in peroxidase activity associated with cell walls during pine hypocotyl growth. Annals of Botany, 75: 415-419.
- Tanksley, S.D. and Orton, T.J., 1986. Developments in plant genetics and breeding isozymes, in plant genetics and breeding. Second impression, Elsevier Science Publishrs B.V., 516 p.
- Vatulescu, A.D., Fortunato, A.S., Maria Claudia, S., Amancio, S., Candido, P. Ricardo, P. and Jackson, P.A., 2004. Cloning and characterization of a basic IAA oxidase associated with root induction in *Vitis vinifera*. Plant Physiology and Biochemistry, 42: 609–615.
- Xuexin, S., 1991. An approach on genetics and variation of peroxidase of natural *Populus euphratica* population. Journal of Desert Research, 11:1-8.
- *Quercus petraea* (Matt) Liebl. Natural Population Trees, 17: 164-172.
- Ellstardn, N.C. and Lee, J.M., 1987. Cultivar identification of cherimoya (*Annona cherimola* Mill.) using isozyme markers. Scientia Horticulturae, 32: 25-31.
- Gil, L., Climent, J., Nanos, N., Mutke, S., Ortiz, I. and Schiller, G., 2002. Cone morphology variation in *Pinus canariensis* Sm. Plant Systematic and Evolution, 235: 35–51.
- Iiyama, K. and Wallis, A.F.A., 1990. Determination of lignin in herbaceous plants by an improved acetyl bromide procedure. J. Sci. Food. Agric., 51: 145-161.
- Mirov N.T., 1967. The genus *Pinus*. University of California, Berkley, The Roland Press Company, Newyork, 602 p.
- Morita, A., Yokota, H., Rahmati Ishka, M. and Ghanati, F., 2006. Changes in peroxidase activity and lignin content of cultures tea cells in response to excess manganese. Soil Science and Plant Nutrition, 52: 26-31.
- Nakatani N., Kume A., Kobayashi T., Hirakawa T. and Sakugawa H., 2004. Needle morphology related to chemical contents in the needles of Japanese fir (*Abies firma*) trees subjected to acidic depositions at MT. Oyama, Eastern Japan. Water, Air and Soil Pollution, 152: 97–110.
- Pashkoulov, D., Givondov, A. and Yliev, P., 1995. Isozyme variability in plum (*Prunus domestica*) and its use for cultivar and interspecific hybrid identification. Plum Experimental station, Drianovo, Bulgaria. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 9 (1): 33-35.

## Comparison of *Pinus eldarica* Medw. with its two natural generated forms using some biochemical and morphological traits

F. Shayanmehr<sup>1\*</sup>, Gh.A. Jalali<sup>2</sup> and F. Ghanati<sup>3</sup>

1<sup>\*</sup> - Corresponding author, M.Sc. in forestry. E-mail: fshayanmehr@yahoo.com

2- Associate Prof., Department of Forestry, Tarbiat Modares University, Iran.

3- Assistant Prof., Department of Plant Science, Tarbiat Modares University, Iran.

### Abstract

In order to distinguish the Mondell pine species (*Pinus eldarica*) from its two natural generated morphotypes (i.e. Ball-shaped and Conical-shaped pines), qualitative alteration of peroxidase enzyme and the assessment of the enzyme activity were compared by use of polyacrylamide electrophoretic method on PAGE system. Furthermore, lignin contents of the needle and stem samples along with 13 macro morphological characteristics of individuals were compared with each other. Results showed that the isozyme pattern of three types of the studied pines, the activity of this enzyme and lignin contents were similar. Whereas, the morphological traits comparison, indicate clear differences in the pines. These, state that despite of obvious morphological differences and application of peroxidase enzyme in physiological changes, plant evolution studies, genetic consideration and identifying genus, species and subspecies but at least soluble portion is not suitable marker for distinction of these pines. The results of this study also, propose to use of molecular markers and cytogenetically studies in order to specify the cause of this occurrence.

**Key words:** Mondell pine, peroxidase, electrophoresis, morphotype, ball-shaped and conical-shaped pine.