

مقایسه دو متن فارسی در اندازه‌گیری آزمایشگاهی میانگین و دامنه تغییرات فرکانس پایه

مهشید آقا جانزاده^۱، علی قربانی^۱، فرهاد ترابی نژاد^۱، محمدرضا کیهانی^۲

^۱- گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

^۲- گروه آمار زیستی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی صوت بهروش‌های درکی و آزمایشگاهی انجام می‌شود. نمونه‌های صوت بیان واکه‌ها، خواندن متن یا گفتار محاوره است. در ایران، برای ارزیابی صوت دو متن رنگین‌کمان و پدربرزگ تهیه شده بودند. این پژوهش با هدف مقایسه دو متن در اندازه‌گیری میانگین و دامنه تغییرات فرکانس پایه صوت انجام شده است.

روش بررسی: در این پژوهش مقطعی میانگین و دامنه تغییرات فرکانس پایه در ۱۲۰ فرد عادی ۶۰ نفر مرد و ۶۰ نفر زن ۲۰ تا ۵۹ ساله مورد بررسی قرار گرفت. نمونه صدای آزمودنی‌ها در خواندن هر دو متن جمع‌آوری و مقایسه شد.

یافته‌ها: میانگین فرکانس پایه در مردان برای متن پدربرزگ ۱۳۷/۹۳ با انحراف معیار ۱/۲ و در زنان به ترتیب ۰/۷ با انحراف معیار ۰/۹ و ۰/۲۳ با انحراف معیار ۲/۱ بود($p < 0.05$). دامنه تغییرات فرکانس پایه در متن پدربرزگ در مردان ۸۸/۱۰ با انحراف معیار ۰/۸ و در زنان ۱۱۶/۷۷ با انحراف معیار ۱/۳ و در متن رنگین‌کمان در مردان ۹۰/۹۲ با انحراف معیار ۱/۱ و در زنان ۹۰/۸ با انحراف معیار ۱/۲ بود($p < 0.05$). بین میانگین فرکانس پایه به دست آمده از مردان در هر متن در گروه‌های سنی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد و در زنان تنها در گروه سنی ۵۰-۵۹ ساله با سایر گروه‌های سنی تفاوت معنی‌دار بود($p < 0.05$). در دامنه تغییرات فرکانس پایه در هیچ‌یک از دو جنس تفاوت معنی‌داری در دو متن مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: این دو متن در اندازه‌گیری میانگین و دامنه تغییرات فرکانس پایه در بزرگسالان یکسان هستند. فرکانس پایه زنان ۵۰-۵۹ ساله با سایر گروه‌ها تفاوت معنی‌دار دارد.

واژگان کلیدی: فرکانس پایه، دامنه تغییرات فرکانس پایه، صوت، ارزیابی آزمایشگاهی، متن پدربرزگ، متن رنگین‌کمان

(دریافت مقاله: ۹۰/۳/۲۳، پذیرش: ۹۰/۸/۱۱)

مقدمه

تکامل پژوهش‌ها، تا سال ۲۰۰۰ تعدادی متن تهیه شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این متن‌ها برای ارزیابی افراد مبتلا به اختلالات ارتباطی و از جمله اختلالات صوت تهیه شده‌اند. متن موسوم به Rainbow (Fairbanks ۱۹۶۰) بیش از سایر متنون مورد استفاده قرار گرفته است^(۱). در کشورهای غیرانگلیسی زبان نیز متن‌های مشابهی تهیه شده است که برای اهداف پژوهشی و بالی‌نی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما از آنجا که ویژگی‌های

در اندازه‌گیری آزمایشگاهی صوت، از تکالیف مختلفی چون تولید واکه‌ها، شمارش اعداد، خواندن متن و گفتار محاوره استفاده می‌شود^(۲). نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که داده‌های به دست آمده از خواندن متن به داده‌های مربوط به گفتار محاوره نزدیک‌تر است^(۳).

سابقه تهیه متن استاندارد برای بررسی جنبه‌های مختلف گفتار در کشورهای دیگر به سال ۱۹۴۰ باز می‌گردد. در طی روند

نویسنده مسئول: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه نظام، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه گفتار درمانی،
کد پستی: ۱۳۴۸۷-۱۵۴۵۹، تلفن: ۰۲۲۲۸۰۵۱-۲، E-mail: ghorbani@slp.ir

شده‌اند که قابل مقایسه با پژوهش‌های گذشته باشد. جامعه مورد مطالعه افراد عادی باسوساد و فارسی‌زبان در چهار گروه سنی ۲۹-۳۰، ۳۰-۳۹، ۴۰-۴۹ و ۵۰-۵۹ ساله بودند. نمونه‌های مورد بررسی در هر گروه سنی شامل ۱۵ زن و ۱۵ مرد و در مجموع ۱۲۰ نفر بوده‌اند. آزمودنی‌ها از میان نمونه‌های در دسترس به صورت غیراحتمالی از دانشجویان و کارمندان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شدند. گفتار هر یک از نمونه‌ها با ارزیابی درکی مورد بررسی قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود که از نظر تولید، تشید و روانی گفتار مشکلی نداشته باشد. دو گفتار درمانگر به صدای آزمودنی‌ها گوش دادند تا با استفاده از قضاوت آنها مشخص شود که صدای آزمودنی‌ها هنجار است یا خیر؟ ملاک تعیین عادی بودن صوت، تشخیص هر دو گفتار درمانگر بود. برای تعیین عادی بودن آزمایشگاهی صوت، از برنامه Vocal Assessment نرم‌افزار Dr. Speech ساخت شرکت Tiger DRS (آمریکا) استفاده شد. برنامه هر یک از علائم گرفتگی، خشن بودن و نفس آلود بودن صدا را از صفر تا سه درجه‌بندی می‌کند. نمونه‌هایی که از مجموع سه علامت، نمره دو یا کمتر از آن داشتند، از نظر صوتی سالم فرض می‌شدند. علاوه بر موارد یاد شده در هنگام نمونه‌گیری، ابتلا آزمودنی‌ها به بیماری‌های مؤثر بر صوت مورد بررسی قرار می‌گرفت و چنانچه آزمودنی‌ها به بیماری‌هایی چون سرماخوردگی مبتلا بودند، نمونه‌گیری به وقت دیگری موکول می‌شد و یا برحسب مورد، نمونه‌دیگری جایگزین می‌شد.

روش‌های اندازه‌گیری متغیرها غیرتهاجمی بود و هیچ گونه آسیبی به آزمودنی‌ها وارد نمی‌شد، از تمام آزمودنی‌ها رضایت‌نامه کتبی شرکت در پژوهش دریافت شد. سن و جنس آزمودنی‌ها در پرسش‌نامه ثبت می‌شد و متن‌های رنگین‌کمان و پدربرزگ در اختیار آنها قرار می‌گرفت. متن رنگین‌کمان دارای ۷ جمله خبری است و مشابه با الگوی متن Rainbow دارای توازن واجی متناسب با زبان فارسی است. این متن ۹۲ کلمه و ۲۰۷ هجا دارد و میانگین تعداد هجا در هر کلمه $2/25$ است و فاقد جمله‌پرسشی و تعجبی است. موضوع متن به نحوی انتخاب شده که موضع

آکوستیکی صوت تحت تأثیر عوامل فرهنگی-زبان‌شناختی^(۳) و نژادی^(۵) هستند نمی‌توان از داده‌های سایر کشورها در تصمیم‌گیری بالینی استفاده کرد.

در گذشته قربانی و همکاران (۱۳۸۴) و سایر پژوهشگران بهدلیل در اختیار نداشتن متن اختصاصی برای اندازه‌گیری ویژگی‌های آکوستیکی صوت، از متن آزمون لبخوانی سارا استفاده نمودند^(۶). متن این آزمون همانند متن Rainbow از توازن واجی برخوردار است و به همین دلیل تصور شده است که برای ارزیابی صوت مناسب خواهد بود. اما آنها این آزمون را برای ارزیابی صوت کاملاً مناسب ندانستند و در بیان نتایج پژوهشی خود به ضرورت تهیه متن اختصاصی برای اندازه‌گیری صوت تأکید کرده‌اند. معماریان و همکاران (۱۳۸۷) به منظور ساخت متن فارسی مناسب برای ارزیابی صوت، متن رنگین‌کمان را ساختند^(۷). پیش از آن، ترابی‌نژاد (۱۳۸۲) در آزمایشگاه گفتار و زبان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ارزیابی نمونه صوت مراجعت مبتلا به اختلالات صوت، متن پدر بزرگ را تهیه کرده بود. تهیه این متن بنابر نیاز بالینی و براساس تشخیص کارشناسی فردی بوده است.

این دو متن برای اندازه‌گیری ویژگی‌های صوت تهیه شده‌اند ولی کارایی آنها در بررسی‌های جمعیت‌شناسی و بالینی مورد مقایسه قرار نگرفته‌است و مشخص نیست که آیا استفاده از این دو متن در اندازه‌گیری پارامترهای صوت به نتیجه یکسان می‌انجامد یا متفاوت خواهد بود. از این رو، این پژوهش، برای تعیین تفاوت‌های احتمالی این دو متن در اندازه‌گیری فرکانس پایه (fundamental frequency: f_0) و دامنه تغییرات^(۸)، طراحی و اجرا شده است.

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع مقطعی است. متغیرهای مورد بررسی با دو متن فارسی رنگین‌کمان و پدربرزگ شامل میانگین f_0 و دامنه تغییرات f_0 در افراد عادی ۲۰ تا ۵۹ ساله در هر دو جنس بوده‌اند. در این پژوهش گروه‌های سنی طوری در نظر گرفته

جدول ۱- میانگین f_0 گفتار بر حسب سن و جنس در دو متن پدربرزگ و رنگین کمان

میانگین (انحراف معیار) f_0 در زنان (هرتز)				میانگین (انحراف معیار) f_0 در مردان (هرتز)				تعداد	گروه سنی
p	پدربرزگ	رنگین کمان	p	پدربرزگ	رنگین کمان	تعداد			
.۰/۶۸	۲۱۴/۹۰ (۰/۷)	۲۰۲/۷ (۱/۹)	.۰/۰۵۶	۱۴۵/۳۳ (۱/۱)	۱۴۲/۷۴ (۱/۳)	۳۰	۲۰-۲۹		
.۰/۶۶	۲۱۴/۶۲ (۱)	۲۱۵/۴۸ (۱/۸)	.۰/۰۸۴	۱۳۰/۵۱ (۱)	۱۳۰/۲۶ (۰/۹)	۳۰	۳۰-۳۹		
.۰/۰۵۲	۲۰۷/۵۳ (۱/۱)	۲۰۳/۴۶ (۲/۲)	.۰/۰۲۴	۱۳۳/۴۰ (۱/۲)	۱۲۸/۴۰ (۱)	۳۰	۴۰-۴۹		
.۰/۰۳	۱۸۷/۲۴ (۰/۹)	۱۹۵/۳۰ (۲/۳)	.۰/۰۱۲	۱۴۲/۴۹ (۱/۲)	۱۳۸/۹۶ (۱/۲)	۳۰	۵۰-۵۹		
.۰/۳۵	۲۰۶/۰۷ (۰/۹)	۲۰۴/۲۳ (۲/۱)	.۰/۰۳۱	۱۳۷/۹۳ (۱/۲)	۱۳۵/۰۹ (۱/۱)	۱۲۰	کل		

دقیقه متن پدربرزگ را می‌خوانند. بهدلیل این که گوینده طبیعی در الگوهای معین زبان‌شناختی و یا در اثر حالات عاطفی و هیجانی، ویژگی‌های زبرزنگیری را مورد استفاده قرار می‌دهد و هنگام استفاده از این موارد دامنه متغیری از f_0 را به کار می‌برد و روش معمول برای تعیین دامنه تغییرات فرکانس، محاسبه اختلاف بین بیشترین و کمترین مقدار f_0 موجود در نمونه گفتار است. در این نوع محاسبه، دامنه ممکن است به خاطر یک مورد استثنایی و خاص بزرگ شده باشد که آن فرکانس جزء صدای فرد نباشد و به علت لغزش لحظه‌ای حنجره یا بهدلیل مشکل گذرا در نرمافزار تجزیه و تحلیل‌کننده باشد، بنابراین در هنگام بررسی صوت با مشاهده هیستوگرام، مقادیر دور از تجمع پیوستار f_0 حذف شدن و با برنامه‌های real analysis نرمافزار Dr. Speech، میانگین و دامنه تغییرات f_0 بر حسب هرتز اندازه‌گیری شدند. میانگین f_0 متن‌های پدربرزگ و رنگین‌کمان با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه با آلفای .۰/۰۵ و آزمون تعقیبی-Student-Newman-Keuls مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین این که متغیرهای مورد بررسی در هر گروه سنی بین دو متن اختلاف معنی‌دار وجود دارد یا خیر از آزمون t استفاده شد.

یافته‌ها

در متن پدربرزگ کمترین میانگین f_0 صوت در زنان ۱۸۷

فرهنگی یا اجتماعی خاصی نداشته باشد و نحوه خواندن آن تا اندازه ممکن در افراد مختلف یکسان باشد. برای این متن، میانگین f_0 ، دامنه تغییرات f_0 و شدت صوت در مردان و زنان ۲۰ تا ۵۹ ساله مورد بررسی قرار گرفته و پایابی و روایی آن تعیین شده است(۷). متن پدربرزگ دارای ۱۵ جمله است (۱۳ جمله خبری، یک جمله پرسشی و یک جمله تعجبی). ۸۳ واژه و ۱۶۰ هجا دارد و میانگین تعداد هجا در هر کلمه ۱/۹۳ است. این متن به نحوی تهیه شده است که خواندن آن برای افراد کم‌سواد راحت باشد.

برای ضبط و تجزیه و تحلیل نمونه صدای آزمودنی‌ها از ابزار در دسترس در آزمایشگاه گفتار و زبان که نرمافزار Dr. Speech است، استفاده شد. دامنه اولیه دستگاه بین ۷۰-۸۰۰ هرتز تنظیم شد تا تمام مقادیر f_0 را دریافت و ثبت کند. برای جمع‌آوری نمونه صوت، هر آزمودنی به‌تهیایی مورد بررسی قرار می‌گرفت. هنگام ضبط صدا پس از فعال شدن دستگاه، سه ثانیه اول سکوت بود تا سر و صدای زمینه در محیط توسط رایانه آزمایشگاه ضبط شود و در هنگام تجزیه و تحلیل توسط نرمافزار Dr. Speech در نظر گرفته شود. پیش از ضبط صدا از آزمودنی‌ها خواسته می‌شد که متن‌ها را بخوانند تا با آنها آشنا شوند و تمرین می‌شد که به‌طور عادی و بدون اغراق بخوانند. پس از اتمام یک متن، ضبط صدا متوقف می‌شود و اطلاعات ذخیره می‌شود و دوباره خواندن متن دیگر شروع می‌شود. ترتیب خواندن متن‌ها ثابت بود و تمام آزمودنی‌ها ابتدا، متن رنگین‌کمان را می‌خوانند و پس از چند

جدول ۲- دامنه تغییرات f_0 گفتار بر حسب سن و جنس در دو متن پدربزرگ و رنگین‌کمان

میانگین (انحراف معیار) دامنه تغییرات f_0				میانگین (انحراف معیار) دامنه تغییرات f_0				تعداد	گروه سنی						
در زنان (هرتز)		در مردان (هرتز)													
p	پدربزرگ	p	پدربزرگ												
.0/۵۴	۱۲۶/۶۱ (۱/۳)	۱۲۰/۳۱ (۱/۲)	.0/۸۹	۱۲۷/۰۴ (-۰/۹)	۱۲۵/۷۸ (۰/۷)	۳۰	۲۰-۲۹								
.0/۸۳	۱۴۷/۲۲ (۰/۶)	۱۴۳/۹۷ (۱/۱)	.0/۳۵	۱۰۶/۹۵ (۱/۱)	۹۸/۹۷ (۰/۹)	۳۰	۳۰-۳۹								
.0/۳۸	۱۴۰/۷۲ (۱/۱)	۱۳۰/۲۰ (۰/۸)	.0/۳۰	۱۲۰/۹۶ (۱)	۹۴/۵۴ (۱)	۳۰	۴۰-۴۹								
.0/۶۶	۱۸۶/۱۹ (۱)	۱۹۴/۰۴ (۱)	.0/۸۰	۱۳۲/۸۸ (۰/۸)	۱۳۴/۹۰ (۱/۱)	۳۰	۵۰-۵۹								
.0/۶۰	۱۵۰/۱۸ (۰/۹)	۱۴۷/۱۳ (۱/۱)	.0/۵۸	۱۲۱/۹۵ (۱/۲)	۱۱۳/۵۴ (۰/۹)	۱۲۰	کل								

۴۰-۴۹ ساله و بیشترین دامنه تغییرات f_0 ۱۳۴ هرتز مربوط به گروه ۵۰-۵۹ ساله بود. داده‌های مربوط به دامنه تغییرات f_0 در دو متن در جدول ۲ و میانگین‌های بیشینه و کمینه در جدول ۳ آورده شده است.

نتایج آنالیز واریانس در بررسی تفاوت میانگین f_0 صوت در مجموع نمونه‌ها معنی‌دار بود ($p=0/۰۴۳$). برای یافتن محل تفاوت، آنالیز واریانس در زنان و مردان تکرار شد. در مردان تفاوت معنی‌داری بین میانگین f_0 در متن پدربزرگ و متن رنگین‌کمان در گروه‌های سنی مشاهده نشد ($p=0/۵۹$). در زنان تفاوت میانگین f_0 در متن پدربزرگ و متن رنگین‌کمان در گروه‌های سنی مختلف معنی‌دار بود ($p=0/۰۰۷$). بنابراین آزمون تعقیبی-Student معنی‌دار بود ($p=0/۰۰۷$). نتایج آزمون تعقیبی-Newman-Keuls میانگین f_0 زنان ۵۰-۵۹ ساله با سایر گروه‌های سنی مربوط تفاوت معنی‌داری داشت. توان آزمون آنالیز واریانس در این قسمت ۸۸ درصد و آزمون تعقیبی ۸۶ درصد به دست آمد. به علاوه تفاوت دامنه تغییرات f_0 در متن رنگین‌کمان و متن پدربزرگ در گروه‌های سنی مختلف در زنان و مردان معنی‌دار نبود ($p=0/۴۳$). توان آزمون آنالیز واریانس ۸۸ درصد به دست آمد.

تفاوت بین میانگین f_0 برای دو متن فقط در زنان ۵۰-۵۹ ساله معنی‌دار بود ($p=0/۰۳$) و در دامنه تغییرات f_0 نیز در هیچ‌یک

هرتز مربوط به گروه ۵۰-۵۹ ساله و بیشترین میانگین f_0 ۲۱۴ هرتز مربوط به گروه ۲۰-۲۹ ساله بود، کمترین میانگین f_0 صوت در مردان ۱۳۰ هرتز مربوط به گروه ۳۰-۳۹ ساله و بیشترین میانگین f_0 صوت ۱۴۵ هرتز مربوط به گروه ۲۰-۲۹ ساله بود. در متن رنگین‌کمان کمترین میانگین f_0 صوت در زنان ۱۹۵ هرتز مربوط به گروه ۵۰-۵۹ ساله و بیشترین میانگین f_0 ۲۱۵ هرتز مربوط به گروه ۳۰-۳۹ ساله بود، کمترین میانگین f_0 صوت در مردان ۱۲۸ هرتز مربوط به گروه ۴۰-۴۹ ساله و بیشترین میانگین f_0 صوت ۱۴۲ هرتز مربوط به گروه ۲۰-۲۹ ساله بود. داده‌های مربوط به میانگین f_0 در متن پدربزرگ و رنگین‌کمان در جدول ۱ آورده شده است.

در متن پدربزرگ کمترین دامنه تغییرات f_0 صوت در زنان ۱۲۶ هرتز مربوط به گروه ۲۰-۲۹ ساله و بیشترین دامنه تغییرات f_0 ۱۸۶ هرتز مربوط به گروه ۵۰-۵۹ ساله بود. کمترین دامنه تغییرات f_0 صوت در مردان ۱۰۶ هرتز مربوط به گروه ۳۰-۳۹ ساله و بیشترین دامنه تغییرات f_0 صوت ۱۳۲ هرتز مربوط به گروه ۵۰-۵۹ ساله بود. در متن رنگین‌کمان کمترین دامنه تغییرات f_0 صوت در زنان ۱۲۰ هرتز مربوط به گروه ۲۰-۲۹ ساله و بیشترین دامنه تغییرات f_0 ۱۹۴ هرتز مربوط به گروه ۵۰-۵۹ ساله بود. کمترین دامنه تغییرات f_0 صوت در مردان ۹۴ هرتز مربوط به گروه ۶۰-۶۹ ساله بود.

جدول ۳- میانگین‌های بیشینه و کمینه تغییرات دامنه f_0 با حدود اطمینان ۹۵ درصد در دو متن پدربرزگ و رنگین‌کمان

میانگین کمینه در مردان		میانگین بیشینه در مردان		میانگین کمینه در زنان		میانگین بیشینه در زنان		گروه سنی	تعداد
رنگین‌کمان	پدربرزگ	رنگین‌کمان	پدربرزگ	رنگین‌کمان	پدربرزگ	رنگین‌کمان	پدربرزگ		
۹۷/۲۳	۱۰۲/۳۴	۱۵۶/۸۵	۱۴۹/۲۲	۱۰۹/۷۶	۱۰۲/۲۷	۱۴۳/۴۶	۱۳۸/۳۵	۳۰	۲۰-۲۹
۸۱/۸۲	۷۸/۷۵	۱۳۲/۰۸	۱۱۹/۱۸	۱۰۷/۴۶	۱۱۷/۷۲	۱۸۶/۹۸	۱۷۰/۲۲	۳۰	۳۰-۳۹
۶۷/۴۳	۷۷/۱۸	۱۷۴/۵۰	۱۱۱/۹۰	۱۱۲/۸۶	۱۰۵/۹۲	۱۶۸/۵۹	۱۵۴/۴۷	۳۰	۴۰-۴۹
۱۰۵/۹۵	۱۰۵/۴۲	۱۵۹/۸۱	۱۶۴/۳۷	۱۳۷/۰۳	۱۲۸/۴۴	۲۳۵/۳۶	۲۴۹/۶۵	۳۰	۵۰-۵۹
۸۸/۱۰	۹۰/۹۲	۱۵۵/۸۱	۱۳۶/۱۶	۱۱۶/۷۷	۱۱۶/۰۸	۱۸۳/۵۹	۱۷۸/۱۷	۱۲۰	کل

است. در بررسی توزیع سنی نمونه‌ها، اغلب نمونه‌ها در هر دو پژوهش به حدود ۵۰ سالگی نزدیک‌تر بودند.

در کل میانگین f_0 چه در زنان و چه در مردان در متن پدربرزگ بیشتر از متن رنگین‌کمان بود. اگرچه این تفاوت از نظر آماری در این تعداد نمونه معنی‌دار نبود اما این تفاوت به این دلیل است که در متن رنگین‌کمان تمام جملات خبری است، اما در متن پدربرزگ یک جمله پرسشی و یک جمله تعجبی هم وجود دارد و جملات کوتاه‌تر هستند.

بنابراین نتایج آزمون‌های آماری دامنه تغییرات f_0 در زنان و مردان در گروه‌های سنی مختلف معنی‌دار نبود (جدول ۲). در پژوهش معماریان و همکاران نیز تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نشان داد که در دامنه تغییرات f_0 در گروه‌های سنی مختلف در زنان و مردان بهطور جداگانه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد(۷). این دو متن در اندازه‌گیری میانگین f_0 در افراد عادی ۲۰-۵۹ ساله یکسان هستند. فقط در استفاده از این دو متن از نظر میانگین f_0 در زنان در گروه سنی ۵۰-۵۹ ساله‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد و در سایر گروه‌ها با یکدیگر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری

در اندازه‌گیری دامنه تغییرات f_0 این دو متن یکسان هستند و به‌جز زنان ۵۰-۵۹ ساله، تفاوتی بین دو متن در بررسی

از گروه‌های سنی تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد.

بحث

در داده‌های به‌دست آمده از اندازه‌گیری میانگین و دامنه تغییرات f_0 در مردان، تفاوت معنی‌داری بین میانگین f_0 به‌دست آمده از متن پدربرزگ و متن رنگین‌کمان در گروه‌های سنی مشاهده نشد (جدول ۱). در پژوهش معماریان و همکاران (۱۳۸۷) نیز نتایج آزمون‌های آماری نشان داد که در مردان در گروه‌های سنی مورد مطالعه در اندازه‌گیری میانگین f_0 گفتار در متن رنگین‌کمان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(۷). چون بیشتر جملات دو متن خبری است و هر دو با ویژگی‌های زبرزنگیری یکسان توسط آزمودنی‌ها خوانده شدند.

در زنان نتایج حاکی از آن است که تفاوت میانگین f_0 در گروه‌های سنی مختلف در هر دو متن پدربرزگ و رنگین‌کمان معنی‌دار است و با آزمون تعقیبی مشخص شد که این تفاوت معنی‌دار در هر دو متن مربوط به گروه سنی ۵۰-۵۹ ساله با سایر گروه‌های سنی بود. اما در پژوهش معماریان و همکاران (۱۳۸۷) در متن رنگین‌کمان در زنان میانگین f_0 گفتار در گروه سنی ۴۹-۴۰ ساله‌ها با سایر گروه‌های سنی تفاوت معنی‌دار داشت ولی در سایر گروه‌ها با یکدیگر، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(۷). این نتیجه به‌دلیل تفاوت در توزیع سنی آزمودنی‌ها در این گروه سنی

با سپاس و تشکر فراوان از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر یحیی مدرسی که نویسندها را در انجام این پژوهش یاری نمودند.

f_0 وجود ندارد بنابراین در بررسی‌های آزمایشگاهی می‌توان این دو متن را به جای یکدیگر به کار برد و هر دو یک چیز را می‌سنجند.

سپاسگزاری

REFERENCES

- Vogel AP, Maruff P, Snyder PJ, Mundt JC. Standardization of pitch-range settings in voice acoustic analysis. *Behav Res Methods*. 2009;41(2):318-24.
- Hollien H, Hollien PA, de Jong G. Effects of three parameters on speaking fundamental frequency. *J Acoust Soc Am*. 1997;102(5pt1):2984-92.
- Powell TW. A comparison of English reading passages for elicitation of speech samples from clinical populations. *Clin Linguist Phon*. 2006;20(2-3):91-7.
- Andrianopoulos MV, Darrow K, Chen J. Multimodal standardization of voice among four multicultural populations formant structures. *J Voice*. 2001;15(1):61-77.
- Morris R. Speaking fundamental frequency characteristics of 8- through 10-year-old white- and African-American boys. *J Commun Disord*. 1997;30(2):101-14.
- Ghorbani A, Torabinejad F, Armandi L. Fundamental frequency in males and females from Iranian, Turk, and Kurd race. *Audiol*. 2006;14(2):45-50. Persian.
- Memarian A, Ghorbani A, Torabinejad F, Keyhani MR. Designing a Farsi text for the assessment of adult voice features and determining its validity and reliability in measuring the fundamental frequency and intensity of speech. *JRRS*. 2008;4(2):117-24.