

فتودینامیک تراپی در درماتولوژی: مقاله مروری

خلاصه

مقاله‌ای که در پیش رو دارد، ترجمه مقاله‌ای از Choudhary و همکاران با عنوان Photodynamic therapy in dermatology: a review Lasers in medical sciences ۲۰۰۹ منتشر شده است. فتودینامیک تراپی (PDT) برای پیشگیری و درمان سرطان‌های پوستی غیر ملانومی بکار می‌رود. تا این اواخر، موارد کاربرد پذیرفته شده برای این روش درمانی محدود به آکتینیک کراتوزیس، کارسینومای سلول بازال ندولر و سطحی و از سال ۲۰۰۶ در بیماری Bowen بوده است. در هر حال دامنه استفاده از PDT در درمان ضایعات غیر بدخیم نظیر آکنه و لگاریس و لیشمانیازیس و به همان میزان در درمان پیری زودرس پوست ناشی از قرار گرفتن در معرض خورشید در حال افزایش است. تولید واسطه‌های فعل اکسیژن نظیر اکسیژن منفرد به دوز نور بکار گرفته شده و همچنین غلظت و تجمع موضعی ترکیب حساسگر نوری در بافت مبتلا بستگی دارد. اثرات ناشی از سمیت سلولی می‌تواند باعث تخریب بافت تومورال شده یا اثرات سیستم ایمنی باعث بهبود اختلالات التهابی پوست می‌گردد. درمان سرطان پوست غیر ملانومی سطحی با استفاده از PDT علیرغم کم بودن تهاجم به بافت اثربخشی زیادی را از خود نشان داده است. همچنین این روش برای دستیابی به نتایج ظاهری عالی، مفید به نظر می‌رسد.

واژه‌های کلیدی: فتودینامیک تراپی (PDT)، پورفیرین‌ها، آکتینیک کراتوزیس (AK)، دیود نوری (LED)

محسن فاتح^۱

داریوش همراهی^۱

۱ گروه لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی
تهران

نویسنده مسئول: دکتر محسن فاتح، پژوهشگر گروه پژوهشی لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، تلفکس: ۰۲۰۴۵۶۶، پست الکترونیک: mfateh@razi.tums.ac.ir

مقدمه

اعتقاد بر این است فتودینامیک تراپی (PDT) روشی است که به صورت فرازینده ای برای درمان بیماری‌ها و اختلالاتی که سیستم‌های مختلف بدن را درگیر می‌کنند بکار می‌رود، سابقه استفاده از این روش را می‌توان در حدود ۴۰۰۰ سال قبل در تمدن مصر باستان یافت که از ترکیب تجویز خوراکی گیاه Amni majus و تابش پرتو خورشید برای درمان ویتیلیگو استفاده می‌شد [۱-۴]. یونانی‌ها و هندی‌ها نیز کاربرد این دانش را می‌شناختند به ترتیبی که از دانه‌های پسورالیا کوریلیفولیا، دردرمان پسوریازیس و ویتیلیگو استفاده می‌کردند، اما به دلایل نامشخصی برای قرن‌ها بعد از آن بکار نرفت، تا اینکه مجدداً در قرن بیستم در اروپای غربی توسط Niels Finsen دانمارکی و Herman von Tappeiner و Oscar Raab قرار گرفت. دو نفر اخیر افرادی بودند که خصوصیات حساسیت به نور آکریدین بر پروتوزوا را مورد مطالعه قرار داده و کشف کردند [۵]. Finsen در سال ۱۹۰۳ برنده جایزه نوبل این کار در فتوتراپی شد. تووانایی تجمع موضعی در بافت تومورال، به همراه اثر فتوتوکسیک روی سلول‌های تومورال، منجر به توسعه فتودینامیک تراپی به عنوان یک ابزار مدرن در درمان سرطان شده است. ۵-آمینولولونیک اسید در سال ۱۹۹۰ توسط Kennedy و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت و منجر به یک پیشرفت شگفت‌انگیز در فتودینامیک تراپی شد.

PDT تعریف

فتودینامیک تراپی عبارت است از فعل‌سازی یک ترکیب حساسگر نوری به وسیله یک نور مرئی برای ایجاد نمونه‌هایی از اکسیژن سیتوتوکسیک و رادیکال‌های آزاد که بطور انتخابی سلول‌های در حال رشد سریع را تخریب می‌کند [۶ و ۷]. PDT ممکن است بسته به اندازه، محل یا تعداد ضایعاتی که منجر به محدودیت کارآیی یا پذیرش روش‌های درمانی رایج می‌شوند، مزیت داشته باشد.

مکانیسم عمل

اساس درمان فتودینامیکی بر یک روند چند مرحله‌ای استوار است. در مرحله اول یک ترکیب حساسگر نوری که در محیط تاریک فاقد سمیت می‌باشد، به صورت سیستمیک یا موضعی و در شرایط دور از نور تجویز می‌شود. بعد از اینکه نسبت ترکیب حساسگر نوری در بافت هدف مورد درمان به مقدار مناسب رسید، دوز مشخصی از نور که با دقت تنظیم شده است برای مدت زمان خاصی که بستگی به مقدار انرژی لازم برای فعل کردن ترکیب حساسگر نوری دارد، مستقیماً روی بافت مبتلا تابانیده می‌شود. مراقبت لازم برای حفظ انرژی در یک سطح ایمن برای بافت‌های سالم اطراف صورت می‌گیرد. فعل‌سازی ترکیب حساسگر نوری ناشی از واکنش‌های فتوشیمیایی است که عوامل سمی کشنده‌ای را تولید می‌کنند نظیر نمونه‌هایی از

منابع نوری غیر همدوس

مزایا

- به علت سطح تابش وسیع در درمان ضایعات پوستی بزرگ کاربرد داردند.
- هزینه پایین و سهولت دسترسی
- ترکیبات حساسگر نوری مختلف با جذب مختلف می تواند بکار رود.

لیزرها در PDT

ترکیبات نور و مواد شیمیایی بطور گسترهای در درمان بیماری‌های پوستی بکار می‌روند. این کاربرد وسیع باعث ظهور تفکر PDT گردید. PDT روشی برای درمان بیماری‌های بدخیم و غیر بدخیم پوستی است. این روش بر پایه تجویز یک ترکیب حساسگر نوری است که بطور انتخابی در بافت هدف تجمع می‌یابد. قرار گرفتن ضایعه در معرض نور مسئی در حضور اکسیژن منجر به آسیب نوری و تخریب بافتی متعاقب آن می‌شود [۱۰].

مدت کوتاهی بعد از اختراق لیزر در سال ۱۹۶۰، بکارگیری آن در پژوهشکی شروع شد. ویژگی‌های بنیادین نور لیزر، مانند همدوسی و تک رنگی آنها، لیزر را تبدیل به ابزاری عالی برای یک سری از کاربردها در پژوهشکی نموده است که از آن جمله می‌توان جراحی، درمان همانژیوما، جوان سازی پوست، از بین بردن موهای زائد و غیره را نام برد [۱۱]. از آنجائی که همدوسی پس از چند دهم میلی متر نفوذ در بافت انسان از بین خواهد رفت، لذا از این خاصیت در PDT استفاده نمی‌شود. نور غیر همدوس به طور وسیعی برای تابش به نوپلاسم استفاده می‌شود. تفاوت‌های اساسی میان منابع نور غیر همدوس و لیزرهای وجود دارد. منابع تابش لیزری و نور غیر همدوس برای PDT استفاده شده‌اند و معمولاً اثرات مشابهی را از خود نشان داده‌اند [۱۲]. منابع نوری غیر همدوس نسبتاً ارزان، مناسب از نظر دسترسی و با عملکرد آسان بوده و شرایط نگهداری آسانی نیز دارند. منابع نوری غیر همدوس فیلتر شده اغلب نوری را با پهنهای باند بیشتری نسبت به لیزرهای LED ها تابش می‌کنند. مقایسه این دو نوع منبع نوری چندان آسان نیست. در این مورد ملاحظات دوزیمتری دقیقی مورد نیاز است [۱۳].

فتودینامیک تراپی با استفاده از لیزرهای پالسی در حال حاضر عمومیت پیدا کرده است اما آثار سوء آن هنوز مشخص نشده است. در مورد استفاده از نور با موج پیوسته در PDT، میزان مصرف اکسیژن می‌تواند فاکتوری کلیدی در تعیین اثرات PDT به شمار آید. محققان بسیاری نشان داده‌اند که کاهش اکسیژن در زمان بکارگیری PDT با یک پرتو موج پیوسته نوری به میزان قابل ملاحظه‌ای با تعییر در میزان فلوئنس جایگزین خواهد شد. نور دارای موج پیوسته با میزان فلوئنس بالا باعث کاهش معنی دار اکسیژن و در نتیجه کاهش اثرات PDT خواهد شد [۱۴]. به عبارت دیگر، افزایش اثرات PDT زمانی

اکسیژن واکنش دهنده با سلول‌های بافت. این رادیکال‌های سمی باعث مرگ سلولی و تخریب بافتی می‌شوند. کاربرد موفق PDT مبتنی بر تجمع طولانی ترکیب حساسگر نوری در سلول‌های بیمار و خروج سریع از سلول‌های بافت طبیعی می‌باشد.

- ترکیبات حساسگر نوری: اولین ترکیب حساسگر نوری که برای استفاده بالینی در PDT پذیرفته شد، فتوفرین بود اما به علت معايب متعدد به خصوص حساسیت طولانی مدت نسبت به نور، نسل‌های دوم و سوم ترکیبات حساسگر نوری مورد تحقیق قرار گرفتند. نسل دوم ترکیبات حساسگرنوری عموماً مواد مستقلی هستند و الزاماً از نوع پورفیرین‌ها نمی‌باشند و انتخابی بودن و فعال بودن آنها پذیرفته شده است. نسل سوم ترکیبات حساسگر نوری مکانیسم هدف زایی اضافی دارند برای مثال قابلیت اتصال به آنتی بادی‌های منوکلونال را دارند.

در حال حاضر در آمریکا، یک محلول محتوى الكل ۵-آمینولولولینیک اسید(ALA) فقط به عنوان یک ترکیب حساسگر نوری پذیرفته شده و در لوله‌های پلاستیکی بسته بندی شده است که در هر یک دو آمپول شیشه‌ای وجود دارد که یکی حاوی یک پودر نگهدارنده ALA و دیگری حاوی محلول الكل در آب (Levulan) می‌باشد. آمپول حاوی یک محلول محتوى اثانول، آب، لارت-۴، ایزوپروپیل الكل و پلی اتیلن گلایکول است. استر متیله ALA فقط برای استفاده در اروپا در ترکیب با نور قرمز، به صورت کرم محتوى ۱۶۸ میلی گرم در گرم MAL، متواستئرات گلیسریل، الكل ستواتریل، پلی اکسیل استئرات، متیل پارابن، بروپیل پارابن، دی‌سدیم اداتات، گلیسیرین، نفت سفید، کلستروول، ایزوپروپیل میریستات، روغن بادام تصفیه شده، الكل اوئلیل و آب خالص است.

کرستینسن و همکارانش [۸] در سال ۲۰۰۷ با انجام مطالعه‌ای مطرح کردند که مقدار مناسب یک رژیم درمانی بر معیارهای فلورسانس پوست طبیعی استوار است. در شرایطی که در زمان انتقال از طریق یک حامل لیپوزومی، حداکثر فلورسانس خود را در غلظت‌های ۰/۵ و ۱ درصد در فاصله ۲ ساعت ایجاد می‌کند در حالی که در شرایط انتقال از طریق کرم تقریباً در مدت ۸ ساعت به همان میزان غلظت می‌رسد و در غلظت بیش از ۲۰٪ نشان دهنده ناقل لیپوزومی ارجحیت دارد.

- منابع نوری: هم منابع نوری لیزری و هم منابع نور غیر لیزری برای PDT در دسترس هستند [۹]. لیزرهای قدیمی تر، نظیر لیزر آرگون، لیزر Nd:YAG و لیزر بخار طلا در حال حاضر با لیزرهای دیود جامدی که کوچکتر و ارزان قیمت‌تر هستند جایگزین شده‌اند. نورهای غیر لیزری، شامل لامپ‌های قوس گزnon یا هالوژن فیلتر شده، لوله‌های فلورسانس نور آبی و ردیفهای دیودی منتشر کننده نور (LED) برای درمان نواحی بزرگی از پوست کاربرد دارند.

وسیله لیزر LPDL با طول موج‌های ۵۸۵، ۵۹۵ و ۶۰۰ نانومتر و نیز منبع نور غیرهمدوس (طول موج ۵۸۰-۵۸۰ نانومتر) مورد تابش قرار داده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شد. همچنین ۲۴ بیمار که با امولسیون موضعی ۲۰٪ ALA تحت درمان PDT قرار گرفته بودند نیز با همان ترتیب تحت تابش یک منبع نوری غیرهمدوس یا LPDL in vitro ۵۸۵ نانومتر قرار گرفتند. بیشترین اثر سمیت در شرایط LPDL با طول موج ۵۸۵ نانومتر یا پرتو یک لامپ غیرهمدوس باشد. ۵۰٪ ژول بر سانتیمتر مربع دیده شد. بهبودی کامل در ۷۹٪ از ۱۰۰ بیمار مبتلا به آکتینیک کراتوزیس (AK) درمان شده به وسیله ALA و نیز ۸۴٪ از ۱۰۰ بیماران مبتلا به AK که به وسیله ALA و یک نور لامپ ناهمدوس درمان شده بودند، مشاهده شده است. درد حین درمان به طور معنی‌داری به وسیله LPDL کاهش یافت. ضایعات گروه کنترل (تابش LPDL بدون استفاده از ALA) از بین نرفتند.

فواید استفاده از لیزرهای به عنوان منابع نوری برای PDT عبارتند از:

- بیشترین اثرگذاری زمانی می‌تواند دیده شود که طول موج لیزر مورد استفاده بر قله جذب نوری ماده حساسگر نوری منطبق باشد، که این خاصیت مربوط به ویژگی تک فامی لیزر است.
- شدت تابش بالای تولید شده به وسیله لیزرهای به کم شدن مدت زمان تابش کمک کرده است.
- لیزرهای را در صورت استفاده از فیبر اپتیکی می‌توان برای اندام‌های داخلی نظیر حفره شکمی و ریه نیز مورد استفاده قرار داد.
- معایب استفاده از لیزرهای به عنوان منابع نوری برای PDT عبارتند از:
 - گران قیمت بودن خدمات
 - حفظ و نگهداری پیچیده
 - لیزرهایی که با استفاده از فیبرهای اپتیکی انتقال می‌یابند فقط برای ضایعات کوچک روی پوست مفید هستند.

انتخاب منبع نوری ممکن است متأثر از نوع کاربردهای آن باشد. برای اهداف درماتولوژی که در آنها نور باید به لایه‌های پوستی نفوذ کند، پراکندگی زیادی رخ داده و بنابراین عمق تأثیر در مورد ALA PDT در طول موج ۶۳۰ نانومتر ۱-۳ میلی متر می‌باشد. تعداد و اندازه ضایعات، ضرورت وجود یک منبع قابل حمل فشرده با یک منبع زمینه‌ای کوچک‌تر، انعطاف‌پذیر، دفعات درمان و هزینه آن نیز فاکتورهای مهم دیگری هستند که باید برای انتخاب منبع نوری مد نظر قرار گیرند.

موارد استعمال در درماتولوژی:

در حال حاضر سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) فقط دو روش درمانی MAL PDT و ALA PDT را برای درمان آکتینیک

قابل بررسی خواهد بود که یا موج نوری پیوسته با میزان فلوئنس پایین تر بکار رود یا نور به صورت چند مرحله‌ای استفاده شود. به علاوه سطح اکسیژن در سلول‌های در معرض تابش نور پیوسته بطور بازی متأثر از درجه پدیده Photobleaching ترکیب حساسگر نوری مورد استفاده است [۱۵].

مکانیسم پیشنهادی PDT با استفاده از نور پالسی اساساً مشابه استفاده از نور با پرتو پیوسته است که بستگی به شرایط نور موجود دارد. به همین دلیل بدون توجه به منبع نور لیزر، آثار سیتوتوکسیک، رابطه مستقیمی با هر دو عامل مصرف اکسیژن طی PDT و نیز Photobleaching بعد از PDT دارد. بنابراین مکانیسم‌های متداول مورد انتظار خواهند بود به هر حال به نظر می‌رسد که اثر سیتوتوکسیک بسته به منبع نور لیزری متفاوت باشد [۱۶].

دلیل عقلانی دیگری نیز برای تفاوت میان اثر سیتوتوکسیک PDT با استفاده از لیزر پالسی و یک لیزر با پرتو پیوسته گزارش شده است. Mayamoto و همکاران نشان داده‌اند که PDT با استفاده از نور پالسی، نوع خاصی از مرگ سلولی را القا می‌کند که با آنچه که در PDT با استفاده از نور دارای موج پیوسته رخ می‌دهد متفاوت است [۱۷]. با این وجود مطالعات بیشتری برای توضیح جزئیات مکانیسم کاهش اثر PDT با استفاده از لیزر پالسی مورد نیاز است.

لیزرهای معمول مورد استفاده برای فتوبدینامیک تراپی، Pulsed Dye Laser و لیزرهای دیودی هستند. در یک مطالعه ارزیابی اینمی ۵۹۵ نانومتر با PDT با پالس بلند (LP PDL) و طول موج ۵۹۵ نانومتر با PDT برای درمان بیماری Actinic Cheileitis (AC) ۲۱ بیمار تحت درمان با محلول ۲۰ درصد ALA و فعال شده با LP PDL قرار گرفتند [۱۸]. در این مطالعه ۳۷ درصد از بیماران با یک جلسه درمان کاملاً درمان شدند، ۶۸ درصد بعد از ۱/۸ جلسه درمان شده و ۲۱ درصد نیز بعد از سه جلسه درمان شدند. در سه بیمار با AC اروزیو، زرد زخمی شدن بعد از عمل رخ داد.

دو منبع نوری که برای درمان برخی از تظاهرات آسیب نوری flashlamp-pumped PDL و دیگری flashlamp فیلتر دار یا IPL است. این دو اخیراً همراه با ALA برای ایجاد آسیب نوری بکار می‌روند.

پاسخ-دوز کمی روی فعلی کردن روند PDT دارند، اما قابلیت کمتری را نسبت به فلوئنس کمتر نور آبی با موج پیوسته دارا می‌باشند [۱۹]. Karrer و همکاران [۲۰] اثر بخشی PDT با داروی ALA را با استفاده از پالس‌های طولانی لیزر LPDL (در حدود ۱/۵ میلی ثانیه) در شرایط in vivo و in vitro مطالعه قرار دادند. کراتینوسیت‌های انسانی HaCaT با ALA انکوبه شده بودند و به

اکسید کربن در جایی تنها گزینه درمانی مورد استفاده بوده و بهترین نتایج درمانی را در زیر گروه BCC‌های سطحی به دنبال خواهد داشت. زمانی که این اقدامات به تنها بکار روند وقتی که با برداشتن ضایعه توسط جراحی مقایسه شوند محدودیت هایی خواهند داشت که از آن جمله می‌توان به عمق محدود نفوذ PDT (جدب در ۲ میلیمتر) اشاره کرد که به صورت بالقوه باعث کاهش کارآیی درمان در BCC ندولاری که مقدار ضخامت بیشتری دارد یا به عمق تهاجم یافته است، خواهد شد.

Actinic Cheilitis: این عارضه وضعیت پاتولوژیکی است که عموماً لب پایین را مبتلا می‌کند و به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت لب‌ها در معرض تابش اشعه فرابینفس نور آفتاب به وجود می‌آید. همانند آکتینیک کراتوزیس پوست، Actinic Cheilitis یک ضایعه پیش سرطانی به شمار می‌آید و ممکن است به اسکواموس سل کارسینوما تبدیل شود.

عفونت‌های ویروسی پوست: در اندیکاسیون‌های جدید، انواع زیادی از عفونت‌های ویروسی پوستی که در ارتباط با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) هستند مانند Verrucae در دست و پاها، کوندیلوما آکومیناتا، زگیل‌های اطراف ناخن، epidermodysplasia verruciformis و نیز ضایعات ویروسی پوستی غیرمرتبط با HPV، مانند molluscum contagiosum در عفونت‌های PDT به خوبی درمان شوند. استفاده از HPV مربوط به خصوصیات ضدالتهابی و ضدتکثیری آن در ضایعات درمان شده است که در آنها آزاد شدن رادیکال‌های سیتوتونکسیک باعث آسیب کراتینوسیت‌های آلوده به ویروس HPV شده و منجر به القای آپوپتوز و نکروز انتخابی ضایعه می‌گردد [۲۳].

Cutaneous T-cell lymphoma: بیماری مایکوزیس فونگوئیدس (MF) شایعترین نوع اولیه Cutaneous T-cell lymphoma است. تک ضایعات MF به وسیله درگیری محدود پوست و یک سیر بدون درد مشخص می‌شود. اگر ضایعات نسبت به استرتوئیدهای موضعی مقاوم باشند، درمان هایی مانند شیمی درمانی موضعی، فتوشیمی درمانی و رادیوتراپی نیز قابل انجامند. به هر حال این روش‌ها دارای اثرات جانبی حاد و مزمن هستند و در صورت تکرار و طولانی شدن زمان دوره‌های درمان ممکن است باعث تجمع توکسین‌ها شوند که به مقاومت یا عود مجدد بیماری منجر خواهد شد. فتودینامیک تراپی به دنبال استفاده از ۵-آمینولولوکسیک اسید یک درمان بسیار مؤثر برای سرطان‌های اپیتلیال پوستی غیر ملانومایی Cutaneous T-cell lymphoma است. این روش را می‌توان برای موارد استفاده نموده و نتایج موفقی را مشاهده کرد. اخیراً یک تحقیق کارآزمایی بالینی در مورد سیلیکون فتالوسیانین ۴-PDT (CWRU, Case Western Reserve University در Cleveland, USA) شروع شده است. PC4 نشان داده است که

کراتوزیس مورد تأیید قرار داده است. کاربردهای تایید نشده و قابل جایگزینی شامل بیماری‌های سلطان سلول‌های پایه‌ای پوست (BCC)، Photo-aging، Bowen و Hidradenitis suppurativa می‌باشد.

در سال ۲۰۰۱ [۱۰] و همکاران در مطالعه‌ای میزان پاسخ کامل ۹۲٪ برای بازال سل کارسینومای سطحی و نیز ۷۱٪ برای ندولار BCC را با استفاده از ALA PDT گزارش کردند. در این میان تعداد مقالات معتبر زیادی برای آزمایش اثربخشی و ایمنی PDT برای کاربرد در موارد مختلف در دسترس هستند.

موارد منع مصرف:

کاربرد ALA و MAL در بیماران با علائم زیر ممنوع است:

- حساسیت پوستی در ۴۰۰-۴۵۰ نانومتر

- پورفیری

- حساسیت‌های شناخته شده نسبت به پورفیرین‌ها

- حساسیت شناخته شده به هر یک از ترکیبات محلول ALA

- اختیاط در آزمایش در بیماران مبتلا به حساسیت به سایر طول موج‌ها

C هر دو مورد ALA و MAL در طبقه بندی FDA در طبقه حاملگی قرار گرفته است و برای استفاده در کودکان تأیید نشده است. مصرف موضعی PDT عمق محدود درمانی دارد که مربوط به محدودیت عمق نفوذ ترکیب حساسگر نوری می‌باشد. این عامل را می‌توان با افزایش برداشت دارو توسط استفاده از افزایش دهنده‌های عمق نفوذ و اقداماتی نظیر یونوفورز و electroporation بهبود بخشد.

کاربردها:

آکتینیک کراتوزیس: تومورهای پوستی اپیتلیال بیش از ۹۰٪ از تمام نئوپلازی‌ها را در بیمارانی تشکیل می‌دهد که تحت عمل پیوند اعضاء قرار می‌گیرند [۲۱].

آکنه و لگاریس: با افزایش رده‌های مقاوم به آنتی بیوتیک فایده درمان های پایه‌ای رایج را کاهش می‌دهد و در این ارتباط نیاز به درمان های جایگزین ضرورت می‌یابد. فتوتراپی درمان مؤثری برای آکنه می‌باشد و روش شناخته فتودینامیک تراپی نیز به عنوان یک اقدام درمانی نشان داده است که می‌تواند مؤثر باشد. مزایای اصلی PDT در مقایسه با دیگر اقدامات درمانی، نتایج عالی زیبایی آن و نیز میزان بهبودی بالا علیرغم ماهیت تهاجمی کم آن است.

سرطان سلول‌های پایه‌ای پوست: BCC‌ها به میزان زیادی در نواحی سر و گردن تشکیل می‌شوند جایی که خود نیازمند دقیق در رعایت درجه بالایی از زیبایی در درمان انتخاب شده است. عموماً برای BCC‌های ندولار، برداشتن ضایعه با جراحی، درمان انتخابی است. برای BCC‌های با ضخامت بیش از ۲ تا ۳ میلی‌متر، ابتدا باید قسمت‌های بر جسته ضایعات برداشته شوند [۲۲]. PDT و لیزر دی

وسيعی از اختلالات درماتولوژیک می‌توان انتظار داشت. به علاوه، استفاده از ۵-ALA دارای دوره انکوباسیون کوتاه‌تر این امکان را برای بیماران فراهم می‌آورد که تحمل بیمار حین درمان بگبود یابد و متعاقب آن عوارض جانبی کمتری را در دوره‌های بعد از عمل جراحی داشته باشند [۲۵]. (جدول شماره ۱)

جذب شدید طول موج‌های بلندتر، پایداری نوری نسبی، همراه با کاربرد موضعی ترکیبات دارویی با نیمه عمر کوتاه‌تر از مزایای این روش هستند. در مطالعات پیش‌کلینیکی، T-cell‌ها آسیب‌پذیری بیشتری را نسبت به کراتینوسیت‌ها به PC 4-PDT در آبوبیوز القا شده نشان داده‌اند [۲۶].

کاربردهای زیبایی: با ترکیب اثرات نوری حرارتی نور پالسی با اثرات فتوشیمیایی PDT، بگبود اثر زیبایی قابل مشاهده را در طیف

جدول ۱- کارآزمایی‌های انجام شده در زمینه PDT و نتایج آنها

مرجع	مورد تحقیق	نتایج
Braathen و همکاران ^{۲۶}	MAL-PDT	بررسی اثر زمان انکوباسیون (۱ در مقابل ۳ ساعت)، غلظت MAL در مقابل ۸۰ میلی گرم) و آماده سازی ضایعه در استفاده از آکتینیک کراتوز بعد از ۱ ساعت در مقابل٪ ۹۶ و٪ ۸۷ بعد از ۳ ساعت انکوباسیون با داروی MAL و غلظت mg/g ۱۶۰. میزان عود ضایعه در ۱۲ ماه بعد از دو جلسه درمان در هر دو روش مشابه بود (۳۱% مورد از ۱۶ مورد) بعد از ۱ ساعت در مقابل٪ ۱۷ (۳ مورد از ۱۸ مورد) بعد از ۳ ساعت با MAL-PDT ۱۶۰ mg/g و کمتر از آن برای ۸۰ mg/g استفاده MAL-PDT٪ ۴۴-۴۵.
Fernández-Guarino و همکاران ^{۲۷}		برای ارزیابی پیامدهای کلینیکی فتوبدینامیک تراپی در بیماران مبتلا به آکتینیک کراتوز متعدد و تصحیح آن پیامدها با استفاده از تصویرسازی فلوروسانس
Tarstedt و همکاران ^{۲۸}	MAL-PDT	میزان پاسخ کامل برای ضایعه‌ای با ضخامت کم، بعد از یک جلسه درمان٪ ۹۳ بود که مشابه با پاسخ٪ ۸۹ بعد از تکرار درمان بود. میزان پاسخ بعد از درمان یک نوبت درمان ضایعه ضخیم تر کاهش پیدا کرد (۰٪ در مقابل٪ ۸۴)، ولی بعد از تکرار درمان افزایش پیدا کرد (٪ ۸۸).
Szeimies و همکاران ^{۲۹}	PDT با استفاده از LED و MAL	برای ارزیابی اثر بخشی و قابلیت تحمل PDT با استفاده از LED و MAL موضعی برای درمان آکتینیک کراتوزهای متعدد
Piacquadio و همکاران ^{۳۰}	PDT با استفاده از ۲۰٪ وزنی حجمی آمینولینیک اسید هیدروکلراید (ALA) و نور مرئی	تعیین اثر بخشی و اینمیتی PDT با استفاده از ۲۰٪ وزنی حجمی آمینولینیک اسید هیدروکلراید (ALA) و نور مرئی این آبی برای درمان آکتینیک کراتوزیس متعدد ضایعات سر و صورت
Tschen و همکاران ^{۳۱}	چندمرکزی، ۷۴۸ ضایعه آکتینیک کراتوزیس در ۱۱ بیمار مبتلا با محلول ALA درمان شدند و به مدت ۱۲ ماه پیگیری انجام شد.	میزان بگبود بعد از گذشت ۱۲ ماه٪ ۷۸ بود. میزان عود تأیید شده توسط بافت شناسی) بعد از یک سال٪ ۱۹ بود.

نتایج	مورد تحقیق	مرجع
-ALA دوازده هفته بعد از درمان، مشخص شد patch-PDT با داروی placebo-PDT نسبت به placebo-PDT برتری دارد (p < 0.001) و سرما درمانی (p = 0.002) دارد. میزان اثربخشی روی ضایعه پایه ۸۲٪ (در گروه مطالعه AK 03) و ۸۹٪ (در گروه مطالعه AK 04) برای PDT، ۷۷٪ برای سرما درمانی و ۱۹٪ (در گروه مطالعه AK 03) و ۲۹٪ (در گروه مطالعه AK 04) برای placebo-PDT بود.	در دو مطالعه فاز III تصادفی شده کنترل دار، بررسی اثر بخشی و ایمنی patch-PDT در مقایسه با placebo-PDT (طراحی عالی، با ناظر کور از روند درمان، مطالعه AK03) و درمان استاندارد، سرما درمانی (طراحی نه چندان بد، مطالعه باز؛ مطالعه AK 04)	و Hauschild همکاران ^{۳۰}
دو جلسه درمان MAL-PDT در یک هفته انجام شد. کرم 5-FU ۵ دوبار در روز برای ۳ هفته بکار برده شد. بعد از ۶ ماه، ۸۹٪ از نواحی درمان شده با PDT، بهبود کامل را در مقایسه با ۱۱٪ پاسخ در مواردی که با 5-FU درمان شده بودند، نشان دادند.	مقایسه MAL PDT موضعی با کرم ۵٪ فلوراواراسیل (5-FU) در درمان بعد از پیوند دیسپلازی اپیدرمال	و همکاران ^{۳۱} Perrett
کاهش ضایعات آکنه درمان شده با PDL ۹۰٪ یا بیشتر بود؛ و همراه با LED و PDL کاهش‌های ۴۱٪. ۳۵٪ را به ترتیب گزارش کردند.	ارزیابی تأثیر فتوترایی با IPL، PDL و LED برای درمان آکنه ولگاریس متوسط تا شدید	و همکاران ^{۳۲} Sami
ALA-PDT با فعال سازی توسط نور IPL به نظر می‌رسد بهبودی بیشتر، بازگشت دیرتر و ثبات بیشتری نسبت به رادیوفرکوئنسی (RF)-IPL یا فعال سازی با نورآبی در درمان آکنه ولگاریس متوسط تا شدید نشان داد.	مقایسه IPL، ترکیب رادیوفرکوئنسی و IPL و نور آبی در فتودینامیک درمانی برای آکنه ولگاریس	^{۳۳} Taub
با هشت جلسه ۱۰-۲۰ دقیقه‌ای درمان، کاهش در تعداد ضایعات ملتهب در موارد آکنه‌های خفیف تا متوسط در ۴ هفته، و حداکثر اثر بین ۸ تا ۱۲ هفته مشاهده شد.	یک مطالعه باز برای تعیین اثر نورآبی با باند باریک بر روی کاهش ضایعات التهابی و غیر التهابی بیماران مبتلا به آکنه خفیف و متوسط برای ارزیابی پاسخ به درمان	و همکاران ^{۳۴} Morton
برتری مشخصی در اثر ILI-PDT بعد از اولین و دومین جلسات PDT (p < 0.05)؛ بر اساس شمارش تعداد ضایعات بعد از یک ماه و تأثیر مشابه کلی بعد از سومین جلسه PDT وجود داشت.	ارزیابی اثر بخشی و ایمنی تزریق درون ضایعه‌ای (ILI)-PDT (ILI) با ILA از ALA در بیماران با آکنه مقاوم موضعی. بهبودی در گروه ILI-PDT با PDT رایج مورد استفاده (PDT با کاربرد موضعی ALA) مقایسه شد.	و همکاران ^{۳۵} Ryou
ضایعات التهابی کاهش بیشتری با MAL-LPDL در مناطق درمان شده نسبت به مناطق تحت درمان با LPDL (هفت‌چهارم ۷۰٪ در مقابل ۵۰٪، p = 0.003) در ۱۲ هفته ۸۰٪ در مقابل ۶۷٪ (p = 0.004) نشان داد.	ارزیابی اثر بخشی و ایمنی LPDL به تنها در مقابل LPDL در فتودینامیک تراپی با MAL-LPDL برای آکنه ولگاریس	و همکاران ^{۳۶} Haedersdal
مشاهده شد که PDT یک درمان اثر بخش برای کاهش آکنه ولگاریس التهابی است و هیچ تفاوت معنی‌داری در میزان پاسخ بین ALA-PDT و MAL-PDT وجود ندارد. نتیجه ALA-PDT در ضایعات مزمون و شدید، عوارض جانبی بیشتری را بعد از درمان به دنبال داشت.	درمان فتودینامیکی آکنه ولگاریس با استفاده از ۵-آمینولولوکسیک اسید در مقابل متیل آمینولولوکنات	^{۳۷} Wiegell and Wulf
اکثر بیماران درمان شده با استفاده از PDT توسط متیل آمینولولوکنات در مقایسه با جراحی (۵۴٪) نتایج زیبایی و ظاهری بهتری داشتند. پیگیری طولانی مدت بیانگر تأثیر برتر جراحی بر PDT توسط متیل آمینولولوکنات در BCC‌های ندولار بود.	برای مقایسه میزان عود ضایعات ۵ ساله در BCC ندولار اولیه درمان شده توسط PDT با متیل آمینولولوکنات موضعی یا جراحی متداول	^{۳۸} Rhodes
بر اساس یافته‌های محققین بعد از ۱۲ ماه، ۹۴٪ ضایعات درمان شده با MAL-PDT در مقایسه با ۵۹٪ برای جراحی پیامدهای عالی یا خوبی داشتند.	مقایسه اثربخشی و پیامدهای زیبایی (CO) فتودینامیک تراپی با استفاده از متیل آمینولولوکنات (MAL-PDT) با جراحی متداول برای BCC‌های سطحی در طول یک دوره یک ساله	و همکاران ^{۳۹} Szeimies
سرما درمانی (۱۹٪) منجر به میزان بهبودی قابل مقایسه ای با درمان PDT (۲۲٪) بعد از ۴۸ ماه شد. در پیگیری ۶۰ ماهه، میزان بهبودی تقریباً یکسان بود (۷۵٪ برای PDT و ۷۴٪ برای سرما درمانی)	یک مطالعه چند مرکزی، تصادفی شده مقایسه فتودینامیک تراپی با استفاده از متیل آمینولولوکنات (MAL PDT) به عنوان یک اقدام درمانی غیر تهاجمی با سرما درمانی برای BCC‌های سطحی	و Basset-Seguin همکاران ^{۴۰}

مرجع	مورد تحقیق	نتایج
de Haas و همکاران ^{۴۳}	مقایسه پاسخ sBCC به تابش منفرد و تابش دو برابری در دو گروه متفاوت تابشی ۲۰ ژول و ۸۰ ژول در ۴ تا ۶ ساعت بعد از استعمال یک دوز ALA٪۲۰	دوازده ماه بعد از درمان، میزان پاسخ کامل به شدت تابش دوبرابری بود، در حالیکه این مقدار برای تابش منفرد ۸۹٪ بود.
Whitaker و همکاران ^{۴۴}	درمان ترکیبی با دو روش PDT (توسط لیزر CO2) در ۱۲ بیمار، با هدف بهبود کارآیی درمان	تمامی ضایعات به درمان پاسخ دادند که بر اساس ارزیابی کلینیکی و بر پایه یک پیگیری منظم ۳ ماهه بود. هیچ عودی طی این زمان مشاهده نشد.
Morton و همکاران ^{۴۵}	مقایسه اثربخشی، توانایی تحمل، و پیامدهای ظاهری PDT با استفاده از متیل آمینولولینات موضعی با سرمادرمانی یا فلورواوراسیل موضعی برای درمان SCC نوع in situ	در ۱۲ ماه، تخمین زده شد که میزان پاسخ کامل مستمر ضایعات بعد از درمان با متیل آمینولولینات PDT نسبت به سرمادرمانی یا فلورواوراسیل موضعی بهتر از استفاده از آن با فلورواوراسیل است. پیامدهای ظاهری بعد از ۳ ماه در ۹۴٪ از بیمارانی که با استفاده از متیل آمینولولینات PDT درمان شده بودند در مقابل ۶۶٪ برای آنها که با کرایوتراپی و ۷۶٪ برای آنها که با فلورواوراسیل درمان شده بودند، خوب یا عالی بود و تا ۱۲ ماه نیز باقی ماند.
Varma و همکاران ^{۴۶}	بررسی ایمنی و اثربخشی منبع نوری با میدان بزرگ، Waldmann 1200 PDT، در درمان بیماری Bowen's (BD)، BCC ها و کراتوزهای آفتایی (SK) برای SK٪۷۲ و BCC٪۸۲، BD٪۶۹ برای BD٪۸۸	در دو جلسه درمانی، ۸۸٪ از ضایعات BD، ۹۵٪ از BCC ها و ۹۹٪ از SK ها بهبود کامل کلینیکی نشان دادند. در ۱۲ ماه میزان پاسخ کامل کراتوزهای آفتایی (SK) گزارش شد.
Berking و همکاران ^{۴۷}	ارزیابی اثربخشی PDT در درمان cheilitis آکتینیک لب تحتانی	بهبود کامل کلینیکی در ۴۷٪ از بیماران و درمان نسبی در ۴۷٪ دیگر از بیماران مشاهده شد. با استفاده از آنالیز هیستوپاتولوژی مقدار باقیمانده بیماری در ۶۲٪ یافت شد.
Smucler and Jatsova ^{۴۸}	مطالعه مقایسه فتوبدینامیک تراپی آمینولولینیک اسید به همراه PDL در مقابل PDL به تنها درمان زگیل های ویروسی	هر سه روش درمانی قادر به بهبود زگیل های آلوده با توانایی بالای بودند (٪۸۰). به هر حال ترکیب درمانی PDT و PDL مؤثرترین روش بود.
Chen و همکاران ^{۴۹}	برای بررسی اثربخشی و ایمنی استعمال موضعی ALA PDT برای درمان کوندیلوما آکومیناتا	بعد از یک جلسه درمان میزان برداشت کامل ۹۵٪ در گروه ALA-PDT و ۱۰۰٪ در گروه کنترل بود. بعد از دو جلسه درمان با ALA-PDT میزان برداشتن کامل در گروه درمان ۱۰۰٪ شد. میزان عود مجدد در گروه ALA-PDT ۶/۳٪ بود که به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود ($p<0.05$ ، $p<0.01$)
Wang و همکاران ^{۵۰}	فتوبدینامیک تراپی با استفاده از آمینولولینیک اسید ۲۰٪ برای درمان زگیل های ویروسی مقاوم به درمان در یک جمعیت آسیایی	پنج بیمار (۴۲٪) از بین رفتن کامل زگیل ها را نشان دادند ۱ بیمار (۸٪) پاک شدن نسبی (بیش از ۵٪ کاهش در اندازه زگیل) و ۵ نفر (٪۴۲) باقی ماندن بیماری را گزارش نمودند (کمتر از ۵٪ کاهش در اندازه سطح زگیل) و ۱ نفر (٪۸) بدتر شدن بیماری را گزارش کرد (افزایش در اندازه زگیل). عوارض جانبی شامل ارتیم خفیف تا متوسط بود، که بیش از ۴۸ ساعت در تمام بیماران به طول نیانجامید.
Bissonnette و همکاران ^{۵۱}	مطالعه فلوروسانس پلاک های پسوریاتیک و سلول های خون محیطی به وسیله آمینولولینیک اسید خوراکی	نسبت بیماران فلوروسانس بیش از ۱۰ برای پروتوبورفیرین IX (PpIX) بین پوست پسوریاتیک و پوست طبیعی با استفاده از یک دوز ۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم از ALA بدست آمد. مشاهده فلوروسانس PpIX در پوست سالم صورت نیز اتفاق افتاد و حساسیت نوری غیراختصاصی فقط در بیمارانی روی داد که دوزهای ۲۰ و ۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم را دریافت کرده بودند.
Robinson و همکاران ^{۵۲}	پاسخ های بالینی ۱۰ بیمار مبتلا به پلاک های پسوریازیس به درمان های متعدد با فتوبدینامیک تراپی، با استفاده از ۵-آمینولولینیک اسید و تابش نور مرئی با پهنه ای باند عریض متعاقب	از مجموع ۱۰ بیمار ۸ نفر از آنها پاسخ های بالینی نشان دادند. از ۱۹ تابش نور مرئی با پهنه ای باند عریض متعاقب نشان ندادند.

نتایج	مورد تحقیق	مرجع
درصد میانگین بهبود به ترتیب ۳۷/۵٪، ۴۵/۶٪ و ۵۱/۲٪ در گروه‌های ALA PDT درمان شده با ALA در غلظت‌های ۱/۱٪، ۰/۱٪ و ۰/۵٪ بود. موضعی درمان مناسبی برای پلاک‌های پسوریازیس نبود که مربوط به فرآیند درمانی پر زحمت و زمانبر می‌باشد.	یک مطالعه تصادفی شده آینده نگر، دوسو کور، مقایسه فاز I/II در ۱۲ بیمار برای بررسی اینکه آیا ALA PDT موضعی به عنوان یک درمان مؤثر برای پلاک‌های مزمن پسوریازیس محسوب می‌شود یا خیر؟ انجام شد.	^{۵۳} Schleyer و همکاران
دو ماه بعد از پایان درمان، ۹۳/۵٪ از ضایعات در اولین گروه (که PDT را به صورت هفتگی دریافت کرده بودند) کاملاً پاک شدند در مقابل ۴۱/۲٪ در گروه دوم (دوبار در روز با استفاده از پارمومایسین درمان شده بودند) و ۱۳/۳٪ در گروه دارونما.	مقایسه انگل شناسی و اثر بخشی بالینی PDT در مقابل پارمومایسین موضعی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی دنیای قدیم (CL) ایجاد شده به وسیله لیشمانیا مازور در ایران	^{۵۴} Asilian and Davami
تمام ۵ ضایعه درمان شده با استفاده از PDT و دو پلاک درمان شده به وسیله پارمومایسین سولفات از نظر بالینی و بافت شناسی پاک بودند. سه ضایعه‌ای که میزان پاسخ ضعیفی به پارمومایسین سولفات نشان داده بودند نهایتاً به درمان‌های بعدی PDT پاسخ دادند. ده ماه بعد از درمان هیچ عود مجدد وجود نداشت و نتیجه ظاهری بعد از درمان با PDT عالی بود.	مقایسه اثربخشی PDT همراه با پارمومایسین سولفات در ۱۰ ضایعه لیشمانیوز جلدی	^{۵۵} Gardlo و همکاران
از ۵ بیمار مورد مطالعه، بهبود کامل در چهار مورد و بهبود نسبی در یک مورد مشاهده شد. میانه تعداد جلسات درمانی ۶ (حداقل ۱ و حداکثر ۹) بود. در هیچ موردی عود مجدد در پیگیری ها مشاهده نشد (دوره پیگیری از ۱۲ ماه تا ۳۴ ماه).	ارزیابی اثر بخشی PDT با استفاده از داروی MAL موضعی در درمان ضایعه منفرد MF	^{۵۶} Zane و همکاران
بهبود کامل در هر ۳ بیمار به حداکثر ۲ جلسه درمانی با فواصل یک هفته بدست آمد.	گزارشی در مورد درمان موفق ALA PDT در ۳ بیمار مبتلا به لنفوم سلول B جلدی	^{۵۷} Mori و همکاران
این سیستم مجموعه‌ای از طیف سنجی به همراه PDT برای کار آزمایی‌های بالینی رایج و پیش از این با کمک PC 4-PDT و انبات اهمیت دوزسنجی نوری در مراحل اولیه کارآزمایی های بالینی انجام شده با PDT است.	بررسی فتودینامیکترایپی با استفاده از فتالوسیانین سیلیکون 4 PC (PC4-PDT) در کارآزمایی‌های بالینی لنفوم سلول T جلدی با استفاده از طیف سنجی غیر تهاجمی	^{۵۸} Lee و همکاران
۳ نفر از ۷ بیمار مبتلا به پلاک MF که رفع بالینی و بافت شناسی را در اولین پیگیری نشان داده بودند، قبل از انجام دومین پیگیری به دلیل مرگ MF از تحقیق خارج شدند زیرا که مبتلا به مراحل پیشرفته تومورهای MF همراه با متاستازهای آن بوده اند که این متاستازها در ناحیه مورد درمان به وسیله PDT نبود. ۴ بیمار دیگر هیچ عود MF را در ناحیه مورد درمان با PDT نداشتند. چهارمین بیمار با استفاده از متوروسکیات، رتینوئیدها، اینترفرون، Psoralea ultraviolet A(PUVA) و فابنیش (UVA1) و رادیوتراپی موضعی برای ناحیه صورت، بانس، ران و گردن قرار گرفته بود. نمونه برداری های انجام شده در دومین پیگیری کاهش انفلتراسیون لنفوسيتی در تمام ۴ بیمار نشان داد.	پیگیری بلند مدت (۶-۹ ساله) ۱۰ بیمار مبتلا به مرحله پلاکی MF درمان شده با PDT	^{۵۹} Edström و Hedblad
۳۳ تا از ۳۸ AK با دو جلسه درمانی به وسیله ALA-PDT با بکارگیری IPL از بین رفتند. دوره پیگیری ۳ ماه بود.	برای نشان دادن کاربرد فتودینامیک تراپی با استفاده از محلول موضعی ۵-آمینولولینیک اسید (ALA-PDT) با IPL به عنوان یک منبع نوری برای درمان AK در بیمارانی که جوان سازی با IPL داشتند.	^{۶۰} Ruiz-Rodriguez و همکاران

مرجع	مورد تحقیق	نتایج
Gold و همکاران ^{۶۱}	ALA-PDT با استفاده از IPL در مقایسه IPL با ALA-PDT-IPL	سیزده بیمار کارآزمایی را به پایان رساندند. سه ماه بعد از اتمام درمان، بهبود در گروه ALA-PDT-IPL ۵۵ در ناحیه درمان بیشتر از ناحیه درمان شده به وسیله IPL تنها برای تمام سطوح آسیب دیده نوری بود: ظاهر پای کلاخی (۵۵ در مقابل ۲۹/۵ درصد)، زبری پوست در لمس (۵۵ در ۳۷/۲ مقابل ۲۹/۵ درصد)، هیپرپیگماتانتاسیون نقطه‌ای (۶۰/۳ در مقابل ۴۶ درصد) و تلائزکتازی (۸۴/۶ در مقابل ۵۳/۸). میزان از بین رفتن ضایعات AK نیز بیشتر بود (۷۸ در مقابل ۵۳/۶ درصد).
Zane و همکاران ^{۶۲}	بیست بیمار مبتلا به AK های متعدد (تعداد=۱۳۷) و آسیب نوری شدید صورت تحت درمان قرار گرفتند. MAL، را ۳ ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض تابش ۳۷ ژول بر سانتیمتر مربع نور قرمز به صورت پانسمان بسته روی موضع بکار گرفته شد. دو جلسه درمانی در فواصل ماهانه انجام شدند.	میزان از بین رفتن AK ها ۸/۳ درصد، و امتیاز کلی مورد استفاده برای Photoaging، هیپرپیگماتانتاسیون نقطه‌ای، خطوط ظریف، زبری و زردی پوست بهبود یافت، اما چینهای عمیق، تلائزکتازی‌ها، اریتم سطحی، و هیپرتروفی غدد زیر جلدی تغییری نکرد.
Serrano و همکاران ^{۶۳}	مطالعه مشتمل بر ۶ بیمار مبتلا به ویتیلیگو که یکی از آنها دارای ویتیلیگوی segmental در سینه و پشت بود. بیماران تحت ۴ جلسه PDT با بکارگیری ALA دو درصد روی ضایعات در فواصل ۳۰ روزه مشاهده شد.	پیگماتانتاسیون پری فولیکولار بعد از اولین جلسه درمان شروع شده، بعد از دومین جلسه تقریباً دو برابر پیگماتانتاسیون مجدد مشاهده شد. در پایان درمان، یک پیگماتانتاسیون مجدد نسبی در ضایعات در ۴ تا از ۶ نفر بیمار مشاهده شد.

گرفتن در معرض نور به وسیله یک دوزسنجد مچی الکترونیکی اندازه‌گیری شد. بعد از ۳ ماه، میزان پاسخ کامل ۷۶/۹٪ برای استفاده از ترکیب MAL ۱۶٪ و ۷۹/۵٪ برای MAL ۸٪ گزارش شد (۰/۳۷). دوزهای تابش نور ۸-۷۰ ژول بر سانتیمتر مربع میزان پاسخ مشابهی را به همراه داشتند (۰/۲۵). بیماران درد خفیف تا متوسطی را حین مواجهه با نور روز بیان نمودند (با میانگین امتیاز درد ۳/۷. هیچ تفاوتی میان امتیازهای درد و اریتم بین نواحی درمان شده با MAL ۱۶٪ و ۸٪ مشاهده نشد [۶۴].

هایپرپیگماتانتاسیون [۶۴] و هایپوپیگماتانتاسیون [۴۴] هر دو به عنوان عوارض جانبی PDT گزارش شده‌اند. همچنین مواردی مبنی بر کهیر [۶۵] و درماتیت تماسی [۶۶] متعاقب درمان با MAL مشاهده شده‌اند. درمان‌های موضعی PDT اساساً بسیار ایمن هستند. اگرچه به صورت تئوری، کاربرد موضعی می‌تواند منجر به جذب سیستمیک شود، که اگر تمام محتوای ALA موجود در یک Kerastick کاملاً جذب شود، ALA به مقدار ۵ میلی گرم در هر کیلوگرم برای یک فرد ۷۰ کیلوگرمی جذب خواهد شد. کاربرد موضعی ALA در مقادیر ۰/۰۵ گرم بر سانتی متر مربع تا ۰/۲ گرم بر سانتی متر مربع منجر به ایجاد مقادیر پوروفیرین‌های سیستمیک قابل اندازه‌گیری در انسان نخواهد گردید [۶۸].

عوارض جانبی

شکایت بیماران از سوختگی و احساس سوزش یا خارش، محدود به ناحیه‌ای است که تحت تابش نور قرار می‌گیرد. این احساسات عموماً با قطع تابش و پایان درمان از بین خواهد رفت. در AK ها، واکنش‌ها ممکن است با اریتم، ادم، خشکی، ایجاد وزیکول یا سایش همراه باشد و در صورت نیل به درمان مطلوب قابل قبول هستند و می‌توانند در حدود ۷ تا ۱۰ روز هم طول بکشند. این واکنش فتوتوکسیک ممکن است شدت متفاوتی داشته باشد و در بیمارانی که در ۲ روز اول بعد از استعمال موضعی در معرض نور آفتاب و یا نورهای مصنوعی پرقدرت دیگر قرار گیرند، افزایش می‌یابد. واکنش شدید فتوتوکسیک سوختگی شدید، تشکیل وزیکول، پوسته پوسته شدن و peeling در صورت به وجود آمدن، ممکن است به عنوان انتهای طیف شدت و موارد ناخواسته تلقی شود [۵۵].

در یک مطالعه اخیراً مقایسه ای میان میزان های پاسخ و عوارض جانبی بعد از PDT به دنبال استفاده از ۱۶٪ و ۸٪ داروی MAL با قرار داشتن در معرض تابش نور روز برای درمان بیماری AK انجام شده است. ۳۰ بیمار را که اکثر آنها با درجه‌های پایین AK در نواحی صورت یا پوست سر درمان شده بودند با ۱۶٪ و ۸٪ MAL-PDT در نواحی متقارن بعد از استعمال ضد آفتاب بررسی نمودند. بلاعده بیماران، بیمارستان را ترک کردند با این دستورالعمل که باقیمانده روز را در نور خارج از منزل بگذرانند. امتیاز درد بیماران حین درمان و قرار

دورنما

همچنین، PDT بطور گسترده‌ای در بسیاری از موارد تأیید نشده با درصد موفقیت بالا بکار رفته است. تحقیق و اطلاعات بیشتری در مورد کارآیی و ایمنی PDT در افراد مبتلا به بیماری‌های نظری آکنه ولگاریس، پسوریازیس و آکتینیک cheilitis تحت درمان قرار گرفته‌اند که لازم است به تأیید FDA برسد.

حقیقت آن است که بکارگیری PDT برای کاربردهای زیبایی در درمان‌هایی به آهستگی در حال پیشرفت بوده و نیاز به بررسی بیشتر برای کاربرد ایمن و گسترده آن دارد.

کاربردهای PDT مفهوم ساده‌ای دارد اما پارامترهای متعددی آنرا پیچیده‌تر می‌سازند و تحقیقات بیشتری برای تعیین پارامترهای مناسب و دقیق برای درمان هر بیماری ضروری می‌باشد. این موارد شامل عوامل موجود در ترکیبات حساسگر نوری نظری طریقه انتقال و مدت کاربرد آن و پارامترهای مرتبط با نور نظری طول موج، مدت و شدت تابش می‌باشد.

منبع

- Choudhary S, Nouri K, Elsaie ML. Photodynamic therapy in dermatology: a review. Lasers Med Sci 2009; 24(6): 971-80.