

تأثیر پانسمان‌های بیولوژیک، سنتی بر شدت درد زخم‌های سوتگی کودکان

شمسی رسولی^۱ مژگان لطفی^۲
بهانه سیدامینی^۳ وحید زمان زاده^۴
بهروز نقیلی^۵

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه کنترل درد و زخم سوتگی در سال‌های اخیر بهتر شده، اما انتخاب پانسمان اثر بخش هنوز هم یک مشکل جهانی و چالش انگیز برای پرسنل مراقبت سلامت بشمار می‌آید. هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیر پانسمان‌های بیولوژیک، سنتی و سنتی بر درد زخم سوتگی در کودکان است.

روش بررسی: این مطالعه تجربی روی ۹۰ کودک که در بخش سوتگی مرکز آموزشی درمانی سینا-تبریز در سال ۱۳۸۷ تحت درمان بودند، انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه تحت درمان با پانسمان سنتیک (۳۰ بیمار) با تعویض پانسمان هر سه روز یکبار، گروه تحت درمان با پانسمان بیولوژیک (۳۰ بیمار) و گروه تحت درمان با پانسمان‌های سنتی (۳۰ بیمار) با تعویض پانسمان روزانه. شدت درد در دو مرحله شامل درد پروسیجرال و درد زمینه‌ای در روز ۳ و ۶ بستره با استفاده از ابزار استاندارد از جمله مقیاس Wong Baker NIPS، ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ و آزمون‌های توصیفی (فراوانی، میانگین رتبه‌ها) و آمار استنباطی Kruskal-wallis، Chi-square (انجام شد).

یافته‌ها: نمرات درد در طول تعویض پانسمان بین گروه‌های تحت درمان با پانسمان سنتیک، بیولوژیک و سنتی مقایسه شد. میانگین رتبه‌ی درد بطور معنی داری در صبح روز سوم بستره (درد پروسیجرال) (۲۴/۷ در برابر ۵۶/۱ و ۵۳/۵)، شب سوم بستره (درد زمینه‌ای) (۲۸/۷ در برابر ۵۴/۵ و ۵۱/۳) و در صبح روز ششم بستره (درد پروسیجرال) (۲۵/۳ در برابر ۴۵/۲ و ۵۱/۶) در گروه تحت درمان با پانسمان سنتیک پایین تر از دو گروه دیگر بود ($P<0.001$).

نتیجه گیری کلی: این مطالعه نشان داد که پانسمان سنتیک درد را کاهش داده و به علت کاهش دفعات تعویض پانسمان، آسایش بیمار را افزایش می‌دهد. نتایج حاصل از این مطالعه، کارایی پانسمان‌های سنتیک در درمان سوتگی با ضخامت نسبی و عمیق را تایید می‌کند. انجام تحقیقات در آینده، روی انواع پانسمان‌های مدرن در درمان زخم سوتگی پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها: سوتگی، پانسمان، درد، کودکان

تاریخ دریافت: ۹۲/۷/۶

تاریخ پذیرش: ۹۲/۹/۲۳

^۱ کارشناس ارشد پرستاری-سوپر واپر آموزشی بیمارستان امام خمینی مهاباد، آذربایجان غربی، ایران

^۲ دانشجوی دکترا پرستاری-مربي دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

^۳ دانشجوی دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مربي گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، آذربایجان غربی، ایران
(**نویسنده مسئول) تلفن: ۰۹۱۴۱۴۸۴۱۸ Email: seyedaminibayanah@yahoo.com

^۴ دکتوری آموزش پرستاری، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

^۵ متخصص بیماریهای عفونی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

مقدمه

سوختگی، مشکلات خواب، اختلالات دفعی، یادگیری و توجه، ناراحتی و نارضایتی بیمار، تاخیر در بهبودی، طولانی شدن زمان بستری در بیمارستان و مشکلاتی در پذیرش درمان می شود^(۱۱-۱۵). همچنین درد باعث افزایش متابولیسم بدن می شود که خود سوء تغذیه، نقص سیستم ایمنی و حساسیت به عفونت را تشیدید می کند^(۱۶). بر این اساس، تسکین درد سوختگی باید در اولویت اول تمام تصمیمات مراقبتی قرار گیرد^(۱۷). بیشتر بیماران دچار سوختگی به صورت سنتی تحت درمان قرار می گیرند و هنوز پانسمانی ایده آل، برای زخم‌های سوختگی مشخص نشده است^(۱۸). امروزه انواع مختلفی از پانسمان‌های نوین شامل پانسمان‌های بیولوژیک و سنتیک در مراقبت از زخم سوختگی مورد استفاده قرار می گیرند^(۱۹). پانسمان‌های سنتیک از پلیمرهای صناعی تهیه شده و ویژگی پانسمان‌های ایده‌آل را دارا می باشند. پانسمان‌های بیولوژیک بر اساس وجود کلاژن، فاکتورهای رشد و ... تولید و توسعه پیدا کرده‌اند. بیشتر این پانسمان‌ها از پوست حیوان (Heterograft) و انسان (Hemograft, Allograft) زنده و یا از فردی که به تازگی مرده است تهیه می شوند^(۱۹). این پانسمان‌ها رطوبت زخم را حفظ کرده^(۲۰) و باعث تسریع التیام زخم می شوند^(۲۰). همچنین به دلیل پیشگیری از خشکی انتهای اعصاب و عدم چسبندگی به سطح زخم، کاهش درد را نیز به همراه دارند^(۲۱). در رابطه با کاربرد پانسمان‌های سنتیک، بیولوژیک و نقش آن‌ها در کاهش درد زخم سوختگی در کل کشور مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته و مطالعاتی هم که در رابطه با این پانسمان‌ها صورت گرفته بیشتر به تاثیر آن‌ها بر التیام زخم پرداخته اند و کمتر به درد بیماران اشاره شده است. به دلیل وجود اختلاف نظر در مورد کاربرد پانسمان‌های نوین در امر مراقبت از بیماران، مطالعه‌ای با هدف مقایسه تاثیر پانسمان‌های بیولوژیک، سنتیک و سنتی بر شدت درد زخم سوختگی در کودکان بستری در بیمارستان سوختگی شهر تبریز طرح ریزی شد.

درد یکی از مشکلاتی است که از بدو تولد تا آخرین مرحله حیات وجود دارد و ترس از آن همواره انسان را آزار می دهد. امروزه بیش از ۹۰٪ کودکان بستری در بیمارستان‌ها، روش‌های تهاجمی دردناک را به وفور تجربه می کنند و در این میان بیماران سوخته درد و اضطراب زیادی را متحمل می شوند^(۱). براساس مطالعات تخمين زده می شود که بیش از نیم میلیون کودک سالیانه به علت سوختگی در بیمارستان بستری می شوند^(۲). درد ناشی از سوختگی، شدیدترین نوع درد حاد می باشد^(۳). بیماران این درد را به عنوان "جهنم زندگی" یا کشنده‌ترین دردی که تجربه کرده اند، به یاد می آورند^(۴). درد این بیماران نه تنها نتیجه آسیب سوختگی است بلکه ناشی از اقدامات درمانی دردناک مانند تعویض پانسمان، دبریدمان زخم، برش جراحی و فیزیوتراپی است^(۵). اگرچه کترول درد و زخم سوختگی در سال‌های اخیر بهتر شده، اما انتخاب پانسمان مناسب هنوز هم یک مشکل جهانی و چالشی برای پرسنل مراقبت سلامت بشمار می آید. درد ناشی از تعویض پانسمان یک مشکل معمول در زخم سوختگی است^(۶). به طور سنتی، زخم سوختگی با حمام و شستشوی روزانه و گاهی دو بار در شبانه روز و به دنبال آن استعمال کرم‌های آنتی‌باکتریال درمان می شود و کودک باید به طور منظم استحمام نموده و درعرض پانسمان‌های دردناک و اضطراب‌زا قرار گیرد^(۷). پاک کردن پماد همراه با چسبندگی نخ‌های پانسمان و برداشت گازهای معمولی از روی زخم، منبع اصلی ایجاد درد در طی تعویض پانسمان هستند^(۸,۹). دردی که بیمار موقع تعویض پانسمان تجربه می کند را درد پروسیجرال و دردی که به هنگام استراحت، به صورت درد سوزشی مداوم احساس می شود، درد زمینه ای نامیده می شود^(۱۰). در صورت عدم کترول درد، خطرات فیزیولوژیک و روانی - اجتماعی متعددی بیمار را تهدید می کند. درد حاد تسکین نیافنه، منجر به افسردگی، کاهش کیفیت زندگی، طولانی شدن پاسخ استرس بعد از آسیب

روی سطح مورد نظر مالیده شده و روی آن پدهای آنتی باکتریال ACTISORB قرار داده می شد و با باند معمولی بانداز شد. پانسمان‌های سنتیک بعد از سه روز باز شده و بعد از ارزیابی مجدد، در صورت نیاز، روش درمانی مذکور تکرار و در غیر این صورت بعد از استحمام و شستشو با نرمال سالین از گاز-NA-ULTRA استفاده می شد.

در گروه تجربی ب، پس از استحمام و خشک نمودن کودک با ملحفه استریل، زخم سوختگی با نرمال سالین شستشو داده شده و پانسمان با محصولات بیولوژیک متعلق به شرکت کیتوتک، طبق پروتکل ارسالی انجام می گرفت. بعد از شستشو با نرمال سالین، سطح زخم با اسپری آنتی‌باکتریال Silvosept ضدعفونی شده و به طور معمول به صورت روزانه تعویض پانسمان صورت می گرفت اما در صورت نیاز به دیرید، پد ChitoDebrid روی زخم قرار می گرفت و با چسب Chitotrans روی پوست ثبیت می شد. در مرحله آخر نیز پانسمان با باند بسته شده و بعد از ۴۸ ساعت مجدداً باز می شد. در صورت نیاز به دیرید مجدد، روش مذکور تکرار می شد و در غیر این صورت، پس از استحمام، شستشو با نرمال سالین و ضدعفونی با اسپری Silvosept، از اسپری ChitoHeal استفاده می شد. سپس ورقه ChitoHeal روی زخم قرار گرفته و با ChitoPad پوشانده می شد. در نهایت پانسمان بانداز می شد.

برای بیماران گروه کنترل تعویض پانسمان به صورت روزانه بود که طبق روش سنتی و رایج بخش سوختگی کودکان مرکز سینا، بعد از استحمام روزانه و شستشوی زخم با نرمال سالین، پمادهای آنتی‌باکتریال شامل Mafenaide، Silver sulfadiazine (Flamazine) و Nitrofurazone (furacin) (sulfamylon) زخم مالیده شده، سپس با گاز ساده پوشانده و پانسمان شد. دیرید بیماران گروه کنترل به روش مکانیکی، شیمیایی و یا جراحی انجام می شد. در روش مکانیکی از

روش برونسی

تحقیق حاضر یک مطالعه تجربی است که در بخش سوختگی کودکان مرکز آموزشی-درمانی سینا در شهر تبریز در سال ۱۳۸۷ انجام شده است. جهت انجام پژوهش، تاییدیه رعایت اصول اخلاقی از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معرفی نامه از ریاست محترم دانشکده دریافت و تحويل بیمارستان مورد نظر شد. از والدین واحدهای مورد پژوهش نیز بعد از ارایه توضیحات لازم، رضایت نامه کتبی اخذ شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان بستری در بخش سوختگی کودکان مرکز سینا بود. معیارهای ورود به مطالعه شامل محدوده سنی ۱۴ سال و کمتر، درصد سوختگی ۲۰ و کمتر با سوختگی درجه ۲ و ۳، سوختگی با مایعات داغ و آتش، عدم وجود سوختگی در ناحیه صورت، انگشت و پرینه، عدم وجود بیماری زمینه ای و گذشت حداقل ۲۴ ساعت از سوختگی بود. بیمارانی که در طی درمان با رضایت شخصی والدین ترجیح می شدند از گروه مورد مطالعه خارج شدند.

بعد از انجام مطالعه مقدماتی بر روی ۵ بیمار در سه گروه و با توجه به آماره‌های محاسبه شده ($\alpha = 0.05$ ، $\beta = 0.95$ ، $Power = 0.95$)، حجم نمونه برای هر گروه ۲۷ نفر برآورد شد که به ۳۰ نفر افزایش یافت. طی نمونه‌گیری آسان، ۹۰ بیمار براساس معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب شدند که به صورت تصادفی در گروههای مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه تجربی الف (۳۰ نفر) با پانسمان سنتیک (ACTISORB، NA-ULTRA)، گروه تجربی ب (۳۰ نفر) با پانسمان Silvosept، ChitoHeal Spray، ChitoDebrid Spray ChitoDebrid Pad، ChitoHeal Pad، ChitoPad، ChitoTrans، گروه کنترل (۳۰ نفر) با پانسمان سنتی (گاز ساده و پمادهای Antibacterial) تحت درمان قرار گرفتند. برای بیماران گروه تجربی الف، قبل از شروع پانسمان، حمام و شستشوی کامل زخم با نرمال سالین انجام می گرفت. سپس جهت انجام دیرید اتلیتیک، NU-Gel،

مشاور، ابزار مورد نیاز تهیه و محتوای آن توسط ده نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و نیز چهار تن از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت تبریز و انجمن درد ایران مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت. بعد از مطالعه توسط اعضاء محترم، پیشنهادات اساتید جمع آوری و تغییرات اصلاحی لازم اعمال شد. جهت پایایی پرسشنامه، از پایایی مشاهده‌گرها استفاده شد. تعداد ده پرسشنامه و چک لیست، هم زمان توسط سرپرستار بخش و پژوهشگر تکمیل شد و در ۹۶ درصد موارد ضریب همبستگی بالای ۰/۹۵ بود.

در این پژوهش، شدت درد بیماران در هر سه گروه در روز سوم و ششم بستری، در دو مرحله صبح حین تعویض پانسمان (درد پروسیجرال) و ساعت ۹ شب، هنگام استراحت (درد زمینه‌ای) به کمک ابزارهای استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. بهنگام تعویض پانسمان توسط پژوهشگر، درد پروسیجرال با توجه به پارامترهای فیزیولوژیک موجود در ابزار، توسط سرپرستار بخش در شیفت صبح و درد زمینه‌ای توسط پرستار شیفت شب، بررسی و امتیاز بدست آمده قید شد. عدم آگاهی سرپرستار از نوع پانسمانهای بکار رفته، بهنگام ارزیابی درد پروسیجرال و استفاده از پوشش خارجی مشابه برای همه پانسمان‌ها (باند معمولی) و معلوم نبودن نوع پانسمان بکار رفته برای بیمار به هنگام ارزیابی درد زمینه‌ای، خطر سوگیری را به حداقل رساند. از ارزیابی شدت درد در روز اول بسترهای بویژه نوبت اول پانسمان پرهیز شد. فرض بر این بود که گذشت زمان و حضور مادر در بالین کودک بتواند تا حدودی در کاهش اضطراب نقش داشته باشد^(۲۳) و جهت حذف عامل مخدوش کننده اضطراب جدایی در روزهای اول بستری، ارزیابی شدت درد در روز سوم و ششم بستری و در شرایطی که مادر با پوشش مناسب بخش سوختگی در بالین کودک حضور داشت، انجام گرفت.

گاز ساده و در روش شیمیایی نیز پماد Eleeza مورد استفاده قرار می‌گرفت. در صورت عدم پاسخ گویی دو روش مذکور، بیمار جهت دریید به اتاق عمل ارجاع داده می‌شد.

ابزار گردآوری داده‌ها مستمل بر پرسشنامه مشخصات فردی اجتماعی و ابزار استاندارد ارزیابی درد بود. برای ارزیابی شدت درد در نوزادان و شیرخواران از معیار NIPS (Neonatal/Infant Pain Scale) استفاده شد. در این ابزار حالت صورت، گریه، وضعیت تنفسی، بازوها، پاهای و وضعیت بیداری کودک مشاهده شده و به آن امتیاز داده می‌شد (امتیاز کل ابزار: حداقل صفر و حداکثر ۷). برای کودکان ۱-۷ ساله از معیار CHEOPS (Children's Hospital Eastern Ontario Pain Scale) استفاده شد. در این معیار نیز مشاهده گر، رفتارهای کودک را نظیر حالات صورت، گریه، بیانات کلامی، حس لامسه، وضعیت پاهای و حرکات چرخشی بدن را مورد ارزیابی قرار داده و با توجه به رفتارهای کودک نمره ای به آن اختصاص می‌داد (امتیاز کل ابزار: حداقل ۴ و حداکثر ۱۳). برای کودکان ۷-۱۲ ساله که قادر به بیان درد خود می‌باشند از معیار Wong Baker استفاده شد که در این معیار شش صورت با شدت درد متفاوت نشان داده شده است که از صفر تا ۵ نمره گذاری می‌شود. نمره صفر یعنی کودک دردی ندارد و نمره ۵ شدیدترین درد را نشان می‌دهد و از کودک خواسته می‌شود تا شدت درد خود را با یکی از تصاویر مطابقت دهد^(۹،۲۲). برای مقایسه نتایج حاصل از سه ابزار مورد استفاده، داده‌ها را به مقیاس رتبه‌ای تبدیل کرده به طوری که عدد صفر بیانگر فقدان درد، عدد ۱، درد خفیف، عدد ۲، درد متوسط و عدد ۳، درد شدید را نشان می‌داد. پس از جمع آوری داده‌ها، میانگین رتبه‌ها در سه گروه با آزمون‌های Non-parametric مقایسه شد.

برای تعیین روایی ابزار گردآوری داده‌ها، از روش روایی محتوایی استفاده شد. برای این منظور بعد از مطالعه کتابخانه‌ای، کمک گرفتن از کتب، مجلات، مقالات، پژوهش‌های مشابه و نظرخواهی از اساتید راهنمای و

اکثر نمونه‌ها در هر سه گروه، بین ۱-۳ سال سن و دارای جنسیت مذکور و بر اساس منحنی رشد، بین صدک ۳ و ۹۷ قرار داشتند. در هر سه گروه، اکثر نمونه‌های مورد پژوهش دارای سوختگی درجه ۲ و ۳ با حداقل ۱۰٪ سوختگی بودند که بیشتر مربوط به اندام‌های تحتانی بود. آب جوش بیشترین علت سوختگی در هر سه گروه مطرح شد و اغلب سوختگی‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۲۰ رخ داده بود. سابقه بیماری و مصرف داروی خاص در هیچ-کدام از نمونه‌ها مشاهده نشد (جدول شماره ۱)

اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در آمار توصیفی از میانگین چون فراوانی، جداول توزیع فراوانی، میانگین رتبه‌ها و در آمار استنباطی از آزمون‌های آماری Kruskal-wallis، Chi-square کمتر از ۰/۰۵ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

نتایج آماری نشان داد که سه گروه مورد مطالعه از نظر مشخصات دموگرافیک، تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند.

جدول شماره ۱ : مقایسه توزیع فراوانی برخی از مشخصات فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش (n=90)

*P	مشخصات فردی و اجتماعی واحدهای گروه‌های مورد پژوهش				مشخصات فردی و اجتماعی واحدهای گروه‌های مورد پژوهش			
	(درصد) تعداد		اجتماعی واحدهای موردن پژوهش		(درصد) تعداد		اجتماعی واحدهای موردن پژوهش	
	بیولوژیک	ستیک	ستی	موردن پژوهش	بیولوژیک	ستیک	ستی	موردن پژوهش
۰/۴۴	۲۹(۳۵)	۲۷(۳۲/۵)	۲۷(۳۲/۵)	۱۰٪ کمتر	درصد	۸(۲۹/۶)	۱۰(۳۷/۱)	۹(۳۳/۳)
	۱(۱۸/۲)	۳(۴۲/۹)	۳(۴۲/۹)	بیش از ۱۰٪ سوختگی	سوختگی	۲۲(۳۵)	۲۰(۳۱/۷)	۲۱(۳۳/۳)
۰/۵	۲۲(۳۴/۴)	۲۳(۳۵/۹)	۱۹(۲۹/۷)	شهر محل	سن	۱۴(۲۹/۸)	۱۶(۳۴)	۱۷(۳۶/۲)
	۸(۳۰/۸)	۷(۲۶/۹)	۱۱(۴۲/۳)	روستا سکونت	(سال)	۸(۵۷)	۶(۴۳)	۰(۰)
۰/۰۹	۳(۵۰)	۱(۱۶/۷)	۲(۳۳/۳)	درجه ۲	۰/۲۰	۳(۲۷/۳)	۵(۴۵/۴)	۳(۲۷/۳)
	۲۷(۳۲/۲)	۲۹(۳۴/۵)	۲۸(۳۳/۳)	درجه ۳ و ۲ سوختگی	زمان سوختگی	۱۷(۳۱/۵)	۱۹(۳۵/۲)	۱۸(۳۳/۳)
۰/۴۱	۰(۰)	۰(۰)	۰(۰)	درجه ۲ و ۳	امانه (am)	۷(۳۶/۸)	۴(۲۱/۱)	۸(۴۲/۱)
	۲۸(۳۳/۳)	۲۷(۳۲/۲)	۲۹(۳۴/۵)	زوختگی	عصر (۱۲/۰۱)	۱۷(۳۱/۵)	۱۹(۳۵/۲)	۱۲(۳۳/۳)
۰/۱۵	۱۸(۲۹/۵)	۲۴(۳۹/۳)	۱۹(۳۱/۲)	آب جوش	سبیج (pm)	۶(۳۵/۳)	۷(۴۱/۲)	۸/۰۱
	۶(۳۱/۶)	۵(۲۶/۳)	۸(۴۲/۱)	رشد	زمان (mn)	۶(۴۰)	۶(۴۰)	۱۲(۳۳/۳)
۰/۰۱	۰(۰)	۰(۰)	۰(۰)	زیرصدک ۳	عامل سوختگی	۱۸(۲۹/۵)	۲۴(۳۹/۳)	۱۹(۳۱/۲)
	۹۷/۳	۹۷/۳	۹۷/۳	بین صدک ۳	مایعات داغ	۶(۳۱/۶)	۵(۲۶/۳)	۸(۴۲/۱)
۰/۰۵	۱(۱۶/۷)	۱(۱۶/۷)	۱(۱۶/۷)	صدک ۹۷	آتش	۶(۴۰)	۶(۴۰)	۳(۲۰)
	۹۷/۳	۹۷/۳	۹۷/۳	بالای (منحنی) رشد				

۰/۸۹	۷(۲۵.۹)	۵(۱۸.۵)	۱۵(۵۵.۶)	بی سواد	۰/۷۴	۸(۲۹.۶)	۱۰(۳۷.۱)	۹(۳۳.۳)	اندام فوقانی
۸(۵۰)	۶(۳۷.۵)	۲(۱۲.۵)	ابتدایی		۱۳(۴۱.۹)	۱۰(۳۲.۳)	۸(۲۵.۸)	اندام تحتانی	نواحی
۱۳(۲۹.۵)	۱۸(۴۱)	۱۳(۲۹.۵)	دیبرستان	تحصیلات	۳(۳۰)	۳(۳۰)	۴(۴۰)	فقط تنہ	دچار
۲(۶۶.۷)	۱(۳۳.۳)	۰(۰)	و دپلم	مادر	۱(۲۰)	۲(۴۰)	۲(۴۰)	فرقانی، تحتانی و تنہ	سوختگی
			دانشگاهی					فرقانی و تنہ	
					۱(۱۰۰)	۰(۰)	۰(۰)	و تنہ	
					۲(۲۲.۲)	۴(۴۴.۵)	۳(۳۳.۳)	فرقانی و تنہ	
					۲(۲۸.۶)	۱(۱۴.۳)	۴(۵۷.۱)	تحتانی و تنہ	

* Kruskal-Wallis test

ستتیک دارای درد خفیف تا متوسط بوده درحالی که سطح درد در دو گروه دیگر متوسط تا شدید ارزیابی شد. (جدول شماره ۲).

در رابطه با درد پروسیجرال، صبح روز سوم بستری، اکثر بیماران گروه ستتیک (۵۱/۷٪) دارای درد متوسط بودند، در حالی که گروه سنتی و بیولوژیک، درد شدیدی را نشان داده اند. در روز ششم بستری، اکثر نمونه های

جدول شماره ۲: آماره های توصیفی مربوط به سطح درد در بیماران سوخته تحت درمان با پانسمان ستتیک، بیولوژیک و سنتی (n=90)

روش های پانسمان	زمان بررسی	صبح روز سوم بستری			شب سوم بستری			صبح روز ششم بستری			ستی	
		تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)		
فقدان درد: ۲۶(۸۶/۷)	متوسط: (۴۶/۷)	خفیف: ۲	خفیف: (۷/۷)	فقدان درد: (۳۰)	۹	خفیف: (۳۰)	۱۴	خفیف: (۴۱/۴)	۱۲	خفیف: (۴۱/۸)	ستتیک	
خفیف: ۴	متوسط: (۱۳/۳)	۱۸	خفیف: (۶۰)	خفیف: (۷/۷)	۲۰	خفیف: (۶۷/۷)	۱۶	خفیف: (۵۱/۷)	۱۵	خفیف: (۵۱/۸)		
-	شدید: (۳/۳)	۱۰	شدید: (۳)	شدید: (۳)	۱	شدید: (۳/۳)	-	شدید: (۶/۶)	۲	شدید: (۶/۹)		
فقدان درد: ۲۱(۱۰۰)	فقدان درد: (۱۳)	۳	خفیف: (۳۹/۱)	خفیف: (۱۳)	۲۴(۸۲/۸)	خفیف: (۱۷/۲)	۱۲	خفیف: (۴۱/۴)	۱۲	خفیف: (۴۱/۸)	ستتیک	
-	-	۹	خفیف: (۴۷/۸)	خفیف: (۱۱)	۵	خفیف: (۱۷/۲)	۱۵	خفیف: (۵۱/۷)	۱۵	خفیف: (۵۱/۸)		
فقدان درد: ۲۳(۷۹/۳)	متوسط: (۴۰)	۵	خفیف: (۱۶/۷)	خفیف: (۵)	فقدان درد: (۳۰)	۹	خفیف: (۳۰)	۱۲	متوسط: (۴۰)	۱۸	متوسط: (۴۰)	بیولوژیک
خفیف: ۵	متوسط: (۱۷/۲)	۱۸	خفیف: (۶۰)	خفیف: (۱۶)	خفیف: (۵۳/۳)	۱۶	خفیف: (۵۳/۳)	۱۸	شدید: (۶۰)	-	شدید: (۶۰)	
متوسط: (۳/۴)	شدید: (۲۳/۳)	۷	شدید: (۲۳/۳)	متوسط: (۵)	متوسط: (۱۶/۷)	۵	متوسط: (۱۶/۷)	۵	متوسط: (۱۶/۷)	۵	متوسط: (۱۶/۷)	

فقدان درد = (۰) درد خفیف = (۱) درد متوسط = (۲) درد شدید = (۳)

مقایسه شدت درد سوختگی با استفاده از پانسمان های بیولوژیک، ستتیک و سنتی حاکی از تفاوت شدت درد پروسیجرال و زمینه ای بین سه روش پانسمان بود. در همه موارد شدت درد با پانسمان های ستتیک کمتر از دو روش دیگر بود. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان داد که این بیماران تحت درمان با پانسمان ستتیک در صبح و شب سوم بستری (درد پروسیجرال و درد

در ارتباط با درد زمینه ای نتایج نشان داد که در شب سوم بستری، در گروه ستتیک اکثر نمونه ها فاقد عالیم درد بودند (۸۲/۸٪) و در دو گروه دیگر درد خفیف گزارش شد. در شب ششم بستری، همه نمونه ها در گروه ستتیک فاقد عالیم درد بودند در حالی که بعضی از بیماران در گروه سنتی و بیولوژیک، سطح خفیفی از درد را تجربه کرده بودند (جدول ۲).

پانسمان شده بودند (۲۸/۷)، کمتر از گروه سنتی (۵۱/۳) و بیولوژیک (۵۴/۵) گزارش شده بود (P<۰/۰۰۱). بین روش بیولوژیک و سنتی از نظر آماری تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (P<۰/۰۵). (جدول شماره ۳).

بحث و نتیجه گیری

در مطالعه حاضر تاثیر سه روش پانسمان بیولوژیک، سنتیک و سنتی بر شدت درد زخم‌های سوختگی کودکان مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که پانسمان‌های سنتیک در کاهش شدت درد بیماران سوخته موثر هستند.

در مطالعه Muangman، ارزیابی درد در روز اول، سوم و هفتم، با هدف مقایسه اثرات Aquacel با پانسمان سنتی (Silver sulfadiazine 1%) انجام گرفت. نتایج نشان داد که درد در گروه Aquacel در روز اول $1/4 \pm 2/1$ در برابر $2/1 \pm 2/3$ ، روز سوم $1/8 \pm 2/1$ در برابر $5/2 \pm 2/1$ و روز هفتم $1/4 \pm 1/4$ در برابر $3/3 \pm 1/9$ بود و تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (P=۰/۰۲). نتایج این مطالعه موثر بودن Aquacel را در کاهش درد بیماران دچار سوختگی نسبی تایید نمود^(۸). که این نتایج، با نتایج مطالعه ما همخوانی زیادی دارد.

Twomey و همکارانش، شدت درد را در کودکان دچار سوختگی که با پانسمان سنتیک (Aquacel) و سنتی (Silver) تحت درمان قرار گرفته بودند، مقایسه کرده‌اند. نتایج آن‌ها نشان داد که بیماران تحت پانسمان (P=۰/۰۰۹)، درد Aquacel، درد Twomey کمتری داشته و به مسکن کمتری جهت تخفیف درد پروسیچرال نیاز داشته‌اند (P=۰/۰۱)^(۲۴). نتایج Opasanon و همکارانش نیز نشان داد که گروه تحت درمان با پانسمان Askina Calgitrol، درد کمتری احساس کرده‌اند (۱/۸۷ در برابر $2/33 \pm 2/33$ ، P=۰/۰۲)^(۲۵).

نتایج مطالعه White، Morris نیز حاکی از آن بود که استفاده از پانسمان Mepitel (سنتیک) در مقایسه با

زمینه‌ای) و صبح روز ششم بستری (درد پروسیچرال) نسبت به گروه بیولوژیک و سنتی درد کمتری را تجربه کرده بودند که این تفاوتها، از نظر آماری معنی دار بود (P<۰/۰۰۱). (جدول شماره ۳).

جدول شماره ۳: میانگین رتبه‌ی درد در بیماران سوخته تحت درمان با پانسمان سنتیک، بیولوژیک و سنتی (n=۹۰)

تکیت	پانسمان	میانگین رتبه‌ها	مقطع زمانی	
			X ² / Sig*	df=2
صبح روز سنتی	بیولوژیک	۵۳/۵	۳۲/۰۶	p=۰/۰۰۰۱
شب سوم سنتیک	بیولوژیک	۲۴/۷	۵۶/۱	
شب سوم سنتی	سنتیک	۵۱/۳	۲۱/۸۸	p=۰/۰۰۰۱
صبح روز سنتیک	سنتیک	۲۸/۷	۵۴/۵	
شب ششم سنتیک	سنتیک	۲۵/۳	۵۱/۶	p=۰/۰۰۰۱
شب ششم سنتیک	بیولوژیک	۴۰/۸	۴/۷۹	p=۰/۰۹۱
شب ششم سنتیک	بیولوژیک	۳۵/۵	۴۳/۸	

* Kruskal-Wallis test

ارزیابی درد پروسیچرال نشان داد که در صبح روز سوم بستری، میانگین رتبه درد در گروه سنتیک، ۲۴/۷ است که در مقایسه با گروه سنتی (۵۳/۵) و بیولوژیک (۵۶/۱) کمتر بود. صبح روز ششم بستری نیز، شدت درد حین تعویض پانسمان در بیمارانی که با این محصولات پانسمان شده بودند، کمتر از دو گروه دیگر بود (۲۵/۳ در ۵۱/۶ سنتی و ۴۵/۲ بیولوژیک) (P<۰/۰۱). (جدول شماره ۳).

تفاوت شدت درد زمینه‌ای، فقط در شب سوم بستری معنی دار بود و درد در بیمارانی که با محصولات سنتیک

شواهد موجود باشند. آنان باید تصمیمات خود را بر اساس مدارکی پایه گذاری کنند که نشان دهنده اقدامات انجام شده برای بیماران مناسب و اثربخش است. کسب مهارت در بکار بردن پانسمان مناسب و شناختن محصولات جدید پانسمانی از مسئولیت‌های مهم یک پرستار است^(۲۹). علاوه بر این پرستاران باید از شواهد و تحقیقات موجود در رابطه با زخم‌ها و پانسمان‌ها آگاه بوده و اطلاعات خود را در این رابطه به کمک پروتکل‌های موجود به روز نمایند^(۳۰). در ایران مدارک محکمی دال بر تاثیر پانسمان‌های نوین در کاهش شدت درد وجود ندارد و لازم است پرستاران قبل از اقدام به استفاده از محصولات نوین، مستندات بالینی لازم را در دسترس داشته باشند و در رابطه با اثربخشی انواع بسیار متنوع پانسمان‌های جدید به تحقیق پردازند.

تقدیر و تشکر

این مقاله منتج از پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد شمسی رسولی با شماره پایان‌نامه ۲۳۲ و مطالعه با حمایت مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرم‌سیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عنوان طرح شماره ۸۸-۰۳۱۸۹/۲/۳۱ آن مرکز اجرا گردیده است. در پایان از حمایت دانشگاه و همچنین پرسنل دلسرور بخشن سوختگی کودکان مرکز درمانی سینا بویژه خانم‌ها ناهید عالی و نژلا عبدالله زاده که نهایت همکاری را در انجام این طرح داشتند، قدردانی می‌شود.

پانسمان‌های سنتی، درد و ترومای کمتری حین تعویض پانسمان ایجاد می‌کنند^(۲۶).

در مطالعه Saba و همکارانش نیز نتایج ارزیابی درد نشان داد که بیماران تحت درمان با پانسمان‌های Aquacel در مقایسه با پانسمان‌های سنتی (گاز Bacitracin Xerophile) درد کمتری را تجربه کرده‌اند. میانگین درد با پانسمان Aquacel ۷/۴ در برابر ۸/۲ بود^(۲۷).

ایمنی و همکارانش مطالعه‌ای را روی ۳۰ بیمار که دارای دو زخم سوختگی بودند، انجام دادند. یک زخم به عنوان گروه آزمون با ژل کتیرا (Hydro colloid) و زخم Silver sulfadiazine 1% دیگر به عنوان شاهد با (ستی)، پانسمان شد. میانگین نمره درد در گروه آزمون، $۳/۶۴ \pm ۰/۵۴$ (درد ضعیف) و در گروه شاهد، $۱/۹۷ \pm ۰/۳۹$ (درد متوسط) گزارش شده است ($p=0/000$)^(۲۸). نتایج مطالعات مذکور، نتایج مطالعه حاضر را حمایت می‌کنند. از آنجایی که یکی از اهداف مراقبتی در زخم‌های سوختگی کترل درد است لذا پانسمان‌های سنتیک می‌توانند جایگزین پانسمان‌های سنتی شوند و در مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرند. اما با توجه به معیارهای ورود به مطالعه، نتایج این مطالعه، قابل تعمیم به سنین بالای ۱۴ سال، سایر علل سوختگی، درجات بیشتر و درصد سوختگی بالاتر نمی‌باشد، لذا انجام پژوهش بر نمونه‌هایی با سنین بالاتر و درصد سوختگی بیشتر و دیگر محصولات پانسمان‌های نوین پیشنهاد شود.

به منظور ارتقای کیفیت مراقبت‌های پرستاری، پرستاران باید قادر به تغییر در عملکرد بالینی بر اساس بهترین

فهرست منابع

- 1- Nilsson A, Steinvall I, Bak Z, Sjöberg F. Patient controlled sedation using a standard protocol for dressing changes in burns: patients' preference, procedural details and a preliminary safety evaluation. *Burns*. 2008;34(7):929-34.
- 2- Simons MA, Kimble RM. Pediatric Burns. International Encyclopedia of Rehabilitation. 2013. Available: <http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/119>
- 3- Brown NJ, Rodger S, Ware RS, Kimble RM, Cuttle L. Efficacy of a children's procedural preparation and distraction device on healing in acute burn wound care procedures: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*. 2012; 13(1):238.

- 4- De Jong AE, Gamel C. Use of a simple relaxation technique in burn care: literature review. *J Adv Nurs.* 2006; 54(6):710-21.
- 5- De Jong A, Middelkoop E, Faber A, Van Loey N. Non-pharmacological nursing interventions for procedural pain relief in adults with burns: a systematic literature review. *Burns.* 2007; 33(7):811-27.
- 6- Girtler R, Gustorff B. Pain management after burn trauma. *Handbook of Burns:* Springer; 2012. p. 339-60.
- 7- Mandal A. Paediatric partial-thickness scald burns—is Biobrane the best treatment available? *Int Wound J.* 2007;4(1):15-9.
- 8- Muangman P, Pundee C, Opasanon S, Muangman S. A prospective, randomized trial of silver containing hydrofiber dressing versus 1% silver sulfadiazine for the treatment of partial thickness burns. *Int Wound J.* 2010; 7(4):271-6.
- 9- Nam-Nabati M. [The effect of attendance deviation on pain intensity in burn dressing of Burn center of Isfahan]. *The Journal of Research in Medical Sciences.* 2002; 1: 67-9. Persian
- 10- Summer GJ, Puntillo KA, Miaskowski C, Green PG, Levine JD. Burn injury pain: the continuing challenge. *J Pain.* 2007; 8(7):533-48.
- 11- Kassam-Adams N, Palmieri PA, Rork K, Delahanty DL, Kenardy J, Kohser KL, et al. Acute stress symptoms in children: results from an international data archive. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.* 2012; 51(8):812-20.
- 12- De Young AC, Kenardy JA, Cobham VE, Kimble R. Prevalence, comorbidity and course of trauma reactions in young burn-injured children. *J Child Psychol Psychiatry.* 2012; 53(1):56-63.
- 13- Pardo GD, García IM, Marrero FDRM, Cía TG. Psychological impact of burns on children treated in a severe burns unit. *Burns.* 2008; 34(7):986-93.
- 14- Pope S, Solomons W, Done D, Cohn N, Possamai A. Body image, mood and quality of life in young burn survivors. *Burns.* 2007; 33(6):747-55.
- 15- Liber J, List D, Van Loey N, Kef S. Internalizing problem behavior and family environment of children with burns: a Dutch pilot study. *Burns.* 2006; 32(2):165-71.
- 16- Rafii F, Mohammadi Fakhar F, Jamshidi Ourak R, Inanlou M. [Effect of jaw relaxation on pain intensity of burn dressing.] *I J C C N.* 2010; 3(2): 51-56. Persian
- 17- Faucher L, Furukawa K. Practice guidelines for the management of pain. *J Burn Care Res.* 2006; 27(5):659-68.
- 18- Gurfsinkel R, Palivatkel-Naim M, Gleisinger R, Rosenberg L, Singer AJ. Comparison of purified olive oil and silver sulfadiazine in the treatment of partial thickness porcine burns. *Am J Emerg Med.* 2012; 30(1):79-83.
- 19- Lotfi M. [Nursing and Care of the Burn Wound]. University of Tabriz Medical Sciences, University of Tabriz Medical sciences press,2005; pp: 40-48. Persian
- 20- Ganjeie Sh. [The new types of dressing in burning.] Burn national Congress. Tehran, University of Iran Medical Sciences. 10-12 January 2002; p.115 . Persian
- 21- Stashak TS, Farstvedt E, Othic A. Update on wound dressings: Indications and best use. *Clinical Techniques in Equine Practice.* 2004; 3(2):148-63.
- 22- Walker G, Arnold R. Pediatric Pain Assessment Scales. Fast Facts and Concepts. June 2004; 117. Available at: http://www.eperc.mcw.edu/EPERC/FastFactsIndex/ff_117.htm.
- 23- Wong DL, Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's Nursing care of infant and children. 8thed. Philadelphia: Mosby's company. 2007.
- 24- Twomey JA, Caruso D, Silverstein P, Bauer G, Antimarino J, Blome-Eberwein S, et al. Randomized Controlled Study of Silver Dressing Effects on Partial- Thickness Burn Outcomes. *Ann Emerg Med.* 2005; 46(3): 48.
- 25- Opasanon S, Muangman P, Namviriyachote N. Clinical effectiveness of alginate silver dressing in outpatient management of partial-thickness burns. *Int Wound J.* 2010;7(6):467-71.
- 26- White R, Morris C. Mepitel: a non-adherent wound dressing with Safetac technology. *Br J Nurs.* 2009;18(1):58.
- 27- Saba SC, Tsai R, Glat P. Clinical Evaluation Comparing the Efficacy of Aquacel (R) Ag Hydrofiber (R) Dressing Versus Petrolatum Gauze With Antibiotic Ointment in Partial-Thicknes Burns in a Pediatric Burn Center. *J Burn Care Res.* 2009; 30(3):380-5.

- 28- Imani B, Kermanshahi S, Moosavi S. [To Comprare Effecy of HydrocolloidD Dressing and 1% Silver Sulfadiazine Dressing on Burn Status Wounds in Patients with Second-Degree Burn.] *DANESHVAR MEDICINE*. 2010;16 (84):63-70. Persian
- 29- Ziaeian B, Roudbari M. [The comparison of biologic dressing with amniotic membrane and anti-microbial dressing in wounds of burned patients.] *The Horizon of Medical Sciences*. 2004;10(3):15-9. Persian
- 30- Watret L, White R. Surgical wound management: the role of dressings. *Nurs Stand*. 2001;15(44):59-69.

Archive of SID

The Effects of Biological, Synthetic and Traditional Dressing on Pain Intensity of Burn Wound in children

Rasuli Sh. Ms¹

Lotfi M. Ms²

*Seyedamini B. Ms³

Zamanzadeh V. PhD⁴

Naghili B.PhD⁵

Abstract

Background & Aim: Although burn wound and its pain management has gradually improved in recent years, but selection of an efficient dressing is yet a global problem and a major challenge for health care personnel. The aim of this study was comparing the effect of biological, synthetic and traditional dressing on burn wound pain in children.

Material and Methods: This experimental study was conducted on 90 patients who were treated in burn ward of Sina health center in Tabriz city during 2008-2009. Patients were randomly assigned into three groups: synthetic dressing group with dressing changes every 3 days (30 patients), biological dressing group (30 patients) and traditional dressing group (30 patients), with daily dressing changes. Pain intensity (procedural pain and backgrounds pain), was evaluated using NIPS, CHEOPS and Wong Baker at days 3 and 6. Data was analyzed by descriptive (Mean, frequencies) and inferential statistics (Kruskal-wallis, Chi-square) using SPSS-PC (v. 13).

Results: Pain score during dressing change were compared among synthetic, biological and traditional dressing groups. Mean ranks of pain in synthetic dressing group was significantly lower than other groups, in third morning and night of hospitalization (procedural and background pain) (24.7 versus 56.1 and 53.5; 28.7 versus 54.5 and 51.3, respectively, $P < 0.001$) and in the morning of sixth day of hospitalization (procedural pain) (25.3 versus 45.2 and 51.6, respectively, $P < 0.001$).

Conclusions: This study showed that synthetic dressing decreased pain and increased patient comfort because of reducing the frequency of dressing changes. The results confirm the efficacy of synthetic dressing for the treatment of partial and deep thickness burns. It provides insights and suggestions for future research on modern dressing for burn wounds treatment..

Key words: Burn, Dressing, Pain, Children

Received: 28 Sep 2013

Accepted: 14 Des 2013

¹ MS in Nursing, Training Supervisor Emam Khomeyni Hospital-Mahabad, West Azarbaijan, Iran.

² Ph.D candidate in Nursing, Senior lecturer of Nursing Faculty, Tabriz University of Medical Sciences, Iran

³ Ph.D student in Health care services management, Senior Lecturer, Dept of Nursing, Mahabad branch- Islamic Azad University, West Azarbyjan, Iran (*Corresponding Author)

Email: seyedaminibayanh@yahoo.com , Tel: 09141468418

⁴ Associate Professor, Dept of Nursing, Tabriz University of Medical Sciences, East Azarbyjan Iran.

⁵ Assistant Professor, Tabriz infectious and diseases Tropical research Center, Dept. of Infectious diseases, Tabriz University of Medical Sciences, East Azarbyjan, Iran.