

## گزینش همزمان هیبرید های ذرت سیلویی برای عملکرد و پایداری

محمود باصفا<sup>۱\*</sup> - مجید طاهریان<sup>۲</sup> - تقی بنایی

او ۲ - عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور،

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

\*نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیک: mbasafa@yahoo.com

## چکیده

به منظور شناسایی و کاهش اثر متقابل ژنوتیپ × محیط (GE) و گزینش دقیق تر، عملکرد و پایداری ژنوتیپ ها را باید به طور همزمان مورد نظر قرار داد. یکی از روش های کاربردی گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری، آماره عملکرد-پایداری (YSi) می باشد. در این پژوهش نتایج حاصل از گزینش هیبریدها بر اساس YSi با نتایج حاصل از گزینش ارقام بر اساس آماره های مختلف پایداری مورد مقایسه قرار گرفت. شش هیبرید داخلی حاصل از تلاقی های جدید با دو هیبرید شاهد SC 704 (دیررس) و SC 647 (متوسط رس) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۵ منطقه در سال ۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از آماره YSi، سه هیبرید انتخاب شدند. با توجه به LSD محاسبه شده ( $LSD\ 5\% = 3/978$ ) تفاوت معنی داری بین معیارهای مختلف گزینش شامل گزینش بر اساس عملکرد، گزینش بر اساس عملکرد به علاوه واریانس محیطی ( $S^2_{di}$ ) یا ضریب تغییرات محیطی ( $CV_i$ )، گزینش بر اساس عملکرد به علاوه ضریب رگرسیون ( $b_i$ ) و انحراف از خط رگرسیون ( $S^2_{di}$ ) یا ضریب تبیین ( $R^2_i$ ) و گزینش بر اساس آماره عملکرد-پایداری (YSi) وجود نداشت. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که با استفاده از روش گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری (با تاکید بیشتر بر جزء پایداری) عمل گزینش را با اطمینان بیشتری می توان انجام داد.

## واژه های کلیدی

ذرت سیلویی،  
گزینش همزمان،  
آماره های پایداری

## مقدمه

همه ساله تلاقی های جدیدی برای بررسی و استفاده، توسط محققین اصلاح نباتات معرفی می گردند. یکی از جنبه های مهم مورد بررسی علاوه بر عملکرد و سایر خصوصیات، پایداری صفات مورد بررسی به ویژه پایداری عملکرد دانه یا علوفه در محیط های مورد تحقیق می باشد. اثر متقابل ژنوتیپ × محیط (GE) به حالتی گفته می شود که ژنوتیپ های متفاوت به تغییرات محیطی واکنش های مختلف نشان می دهند (۱۳ و ۲۷).

گنينبرگ، ۱۹۷۸) آن منطبق با پايداری نوع I، گروه B همانند اكوالانس،  $W_i$  (ريک، ۱۹۶۲) و واريانس پايداری،  $\sigma_i^2$  (شوگلا، ۱۹۷۲) منطبق با پايداری نوع II و گروه D همانند MS انحرافات از خط رگرسيون،  $S_{di}^2$  (ابرهارت و راسل، ۱۹۶۶) منطبق با پايداری نوع III می باشند (۲۶، ۱۳، ۲۸، ۲۹ و ۹). آماره های گروه C همانند ضريب رگرسيون،  $b_i$  (فينلی و ويلکنسون، ۱۹۶۳)، بسته به نوع تفسير می توانند در آماره های نوع I يا II قرار گیرند (۱۲). به عنوان مثال، اگر ژنوتیپ پايدار با دارا بودن  $b_i = 1$  (ابرهارت و راسل، ۱۹۶۶) يا  $B=0$  (پركينز و جينكس، ۱۹۶۸) تعريف گردد در زمرة آماره های نوع II و اگر ژنوتیپ پايدار با  $b_i = 0$  يا  $B_i = -1$  مشخص شود در زمرة آماره های نوع I قرار می گیرد (۹ و ۲۴). آماره های پايداری که انحرافات از یک ژنوتیپ فرضی و مطلوب را در نظر می گیرند (مثل گروه A و C) عمدتاً با جزء عملکرد مرتبط بوده و ارتباط کمی با پايداری نشان می دهند (۲۱)، در نتیجه برای استفاده در گزينش همزمان برای عملکرد و پايداری مناسب نيستند (۱۷). محققين چندین روش برای بررسی همزمان عملکرد و پايداری ارائه کرده اند (۷، ۱۰، ۱۵، ۱۷ و ۱۹). کنگ (۱۵، ۱۶ و ۱۷)، روش های گزينش همزمان برای عملکرد و پايداری را براساس واريانس پايداری ( $\sigma_i^2$ ) شوگلا (۱۹۷۲) ارائه و مورد استفاده قرار داد. لين و همكاران (۲۲) واريانس پايداری ( $\sigma_i^2$ ) را جزء آماره های نوع II پايداری طبقه بندی کردند. اين آماره سهم هر ژنوتیپ را از کل اثر متقابل GE تعيين نموده و به همین دليل برای متخصصين امر می تواند مفيد و قابل قبول باشد. پايداری نوع II یک معيار نسبی است که بستگی به ژنوتیپ موجود در آزمایش دارد و وسعت نتايج حاصل از آن فقط در رابطه با همان مجموعه آزمایش ها صادق بوده و نباید به کل تعميم داده شود، مگر اين که ژنوتیپ های مورد آزمایش نماينده ژنوتیپ های مورد کشت در مناطق مورد بررسی باشند. با اين حال، واريانس پايداری ( $\sigma_i^2$ ) همانند عملکرد، به عنوان نمود (Performance) ژنوتیپ ها در محیط مورد نظر و همچنين متناسب با عملکرد ساير ژنوتیپ ها در آزمایش مدنظر قرار می گیرد. کنگ (۱۹۸۸) روش مجموع رتبه (Rank-sum method) را برای گزينش ژنوتیپ های پايدار با عملکرد بالا پیشنهاد کرد. در

اثر متقابل GE به خاطر کاهش پيشرفت گزينش در هر محیط به عنوان یک نکته مهم در نظر گرفته می شود (۱۴). اثر متقابل GE معنی دار ناشی از تغيير در ميزان اختلاف بين ژنوتیپ ها در محیط های متفاوت و يا تغيير در رتبه بندی نسبی ژنوتیپ ها می باشد (Fernandez, 1991). اگر رتبه عملکرد ژنوتیپ ها در دامنه ای از شرایط محیطی ثابت بماند اثر متقابل GE وجود نخواهد داشت (۲۷). اثر متقابل GE در آزمایش های کوتاه مدت (۳-۴ سال در یک مکان يا یک سال در چند مکان) و آزمایش های بلند مدت (چند سال در چند مکان) رخ می دهد. معمولاً محققين از اثرات متقابل GE به ویژه در آزمایش های مقایسه عملکرد کوتاه مدت صرف نظر کرده و يا اهميت اندکی برای آن قائل شده، و پایه گزينش ژنوتیپ ها را فقط بر اساس متوسط عملکرد قرار می دهند. بنا بر اين به نژادگران و متخصصين زراعت احتياج به یک روش کاربردی گزينش داشته که از اثرات متقابل GE بهره برداری کنند (۶ و ۱۷). طی دهه گذشته توجه زیادی به ادغام مؤثر اثرات متقابل GE با عملکرد برای گزينش ارقام در آزمایش های کوتاه مدت شده است. کنگ و فام معتقدند که عملکرد و پايداری عملکرد برای کاهش اثر GE و انجام گزينش دقيق تر باید به طور همزمان در نظر گرفته شوند (۱۹). آماره های پايداری متعددی برای بررسی پايداری ژنوتیپ ها نسبت به یک صفت ابداع و آزمون شده اند (۱۸۸، ۲۰ و ۲۳). لين و همكاران (۱۹۸۶)، آماره های پايداری را به سه نوع (I, II, III) و چهار گروه (A, B, C, D) دسته بندی کردند (۲۳). لين و بينز (۱۹۸۸) آماره واريانس درون مکانی را به عنوان آماره نوع چهارم (IV) به اين دسته بندی اضافه نمودند (۲۲). در آماره های نوع I، یک ژنوتیپ زمانی پايدار می باشد که واريانس بين محیطی آن کوچک است. آماره های نوع II ژنوتیپی را پايدار معرفی می نمايند که پاسخ يا عکس العمل آن نسبت به محیط های مورد آزمایش موازی (Paralle) با متوسط عکس العمل کلیه ژنوتیپ ها در آزمایش باشد. در آماره های نوع III، یک ژنوتیپ پايدار دارای میانگين مربعات (MS) باقیمانده کوچک حاصل از یک مدل رگرسيونی نسبت به شاخص محیطی است. آماره های گروه A همانند واريانس محیطی،  $S^2_i$  (رومر، ۱۹۱۷) و ضريب تغييرات محیطی،  $CV_i$  (فرانسیس و

بالای سطح خاک برداشت و عملکرد محاسبه گردید. زمان برداشت از اواخر مرحله خمیری تا اواسط مرحله دندانی متغیر بود (خط شیری در فاصله ۱/۳ تا ۲/۳ طول دانه). تجزیه واریانس مرکب برای تعیین معنی دار بودن اثرات متقابل GE بر اساس هر دو مدل ثابت و تصادفی فرض کردن مکان صورت پذیرفت. مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن (DMRT) در سطح احتمال  $\alpha = 0/05$  انجام گرفت. آماره های پایداری واریانس محیطی،  $S^2_i$  (رومر، ۱۹۱۷)، ضریب تغییرات محیطی،  $CV_i$  (فرانسیس و گنیرگ، ۱۹۷۸)، واریانس پایداری،  $\sigma^2_i$  (شوکل، ۱۹۷۲)، ضریب رگرسیون  $bi$  (فینلی و ویلکنسون، ۱۹۶۳)، میانگین مربعات انحرافات از خط رگرسیون،  $S^2_{di}$  (ابرهارت و راسل، ۱۹۶۶)، ضریب تبیین،  $R^2_i$  (پیتوس، ۱۹۷۳) و آماره عملکرد-پایداری،  $YS_i$  (کنگ، ۱۹۹۳) برای ژنوتیپ های مورد بررسی محاسبه گردیدند (۲۶، ۱۳، ۲۸، ۱۲، ۹، ۲۵ و ۱۷). آماره های فوق غیر از آماره عملکرد-پایداری ( $YS_i$ )، در مقاله لین و همکاران (۱۹۸۶) ذکر شده است بنابراین از تکرار آن خودداری می گردد. نحوه محاسبه آماره عملکرد-پایداری ( $YS_i$ ) طبق روش پیشنهادی کنگ (۱۹۹۳) به شرح زیر بود:

- ۱- سهم هر یک از ژنوتیپ ها در تشکیل اثر متقابل GE به وسیله آماره واریانس پایداری  $\sigma^2_i$  (شوکل، ۱۹۷۲) تعیین گردید.
- ۲- ژنوتیپ ها از بیشترین به کمترین عملکرد مرتب و رتبه مربوط به هر ژنوتیپ مشخص گردید ( $Y'$ )، در اینجا کمترین مقدار عملکرد رتبه I دریافت می کند.
- LSD  $\alpha_{(2)}$  برای مقایسه عملکرد  $\alpha_{(2)}$  [ اشاره به آزمون دو دامنه در سطح  $\alpha$  مورد نظر دارد. در اینجا  $\alpha = 0.05$  می باشد ] به صورت  $t \alpha_{(2)} = (2EMS/nr)^{0.5} \times df_e$ ، محاسبه شد. EMS میانگین مربعات اشتباه،  $df_e$  درجه آزادی مربوط به EMS،  $n$  تعداد محیط و  $r$  تعداد تکرار می باشد.
- ۳- مطابق با LSD،  $Y'$  تصحیح شد و رتبه عملکرد تصحیح شده ( $Y$ ) برای هر ژنوتیپ مشخص گردید. تصحیح بدین صورت بود که برای ژنوتیپ هایی که کمتر از یک LSD بالا یا پائین متوسط عملکرد کل باشند به ترتیب +۱ و -۱ به رتبه آنها اضافه شد. به همین ترتیب برای ژنوتیپ هایی که دو LSD بالا یا پائین

این روش بالاترین میانگین عملکرد، رتبه I را دریافت کرده و همچنین، واریانس پایداری،  $\sigma^2_i$  (شوکل، ۱۹۷۲) برای ژنوتیپ ها محاسبه و کمترین مقدار نیز رتبه I را دریافت می کند. بنابراین برای هر ژنوتیپ دو رتبه خواهد بود که هر دوی آنها را جمع جبری نموده و پائین ترین مجموع رتبه (Rank-sum) به عنوان مطلوب ترین ژنوتیپ در نظر گرفته می شود. در این روش وزنه های برابری برای عملکرد و پایداری در نظر گرفته می شود. کنگ (۱۹۹۱) روش تغییر یافته مجموع رتبه (KMR) و سپس در سال ۱۹۹۳ روش تغییر یافته KMR با قابلیت تعیین مقادیر اشتباه نوع اول و دوم برای جزء عملکرد و جزء پایداری را پیشنهاد نمود (۱۶). آماره جدید به عنوان آماره عملکرد-پایداری ( $YS_i$ ) نامیده شد (۱۶ و ۱۷). هدف از این مقاله علاوه بر بررسی و انتخاب هیبرید ها از طریق گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری، مقایسه متوسط عملکرد هیبرید های انتخابی توسط روش های مختلف مورد بررسی عبارت از (۱) گزینش فقط بر اساس میانگین عملکرد هیبرید ها، (۲) گزینش بر اساس میانگین عملکرد هیبریدها بعلاوه آماره های پایداری گروه A، (۳) گزینش بر اساس میانگین عملکرد هیبرید ها بعلاوه پایداری گروه C و D و (۴) گزینش بر اساس روش پیشنهادی کنگ (۱۹۹۳) بودند.

### مواد و روش ها

تعداد ۶ هیبرید ذرت با دو رقم شاهد میان رس و دیررس (SC 704، SC 647)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۵ منطقه کرج، نیشابور، گرگان، اصفهان و بروجرد طی سال زراعی ۱۳۸۵ از نظر تولید علوفه سیلویی مورد مقایسه قرار گرفتند. هر رقم در ۴ ردیف به فاصله ۷۵ سانتی متر به صورت کپه ای با فاصله ۳۳ سانتی متر بین کپه ها و در هر کپه دو بوته کشت شد. تراکم کاشت ثابت و ۸۱۰۰۰ بوته در هکتار برای کلیه ارقام بود. طول خطوط کاشت ۵/۹۴ متر بود. میزان کود مصرفی در کلیه مناطق بر مبنای ۲۵۰ کیلو گرم فسفات آمونیوم و ۲۰۰ کیلو گرم اوره قبل از کاشت و ۲۰۰ کیلو گرم اوره به طور سرک در مرحله ۵-۷ برگی بود. برای تعیین عملکرد علوفه سیلویی، بوته های دوخط وسط پس از حذف اثر حاشیه ای از ارتفاع ۱۰ سانتیمتری

اشتباه ۵٪ مقایسه بین میانگین ها (با روش های مختلف گزینش) صورت گرفت. در گزینش بر اساس عملکرد تنها هیبریدهایی که بیشترین عملکرد را داشته و در یک گروه قرار دارند انتخاب شدند. در گزینش بر اساس عملکرد به علاوه واریانس محیطی یا ضریب تغییرات محیطی، عملکرد بالا (بیش از میانگین) و واریانس یا ضریب تغییرات محیطی پائین (کمتر از میانگین) مد نظر بود. در گزینش بر اساس عملکرد بالا به علاوه ضریب رگرسیون و میانگین مربعات انحراف از خط رگرسیون (یا ضریب تبیین)، عملکرد بالا، ضریب رگرسیون نزدیک به یک (عدم تفاوت معنی دار با یک) و میانگین مربعات انحراف از خط رگرسیون کوچک و غیر معنی دار (و یا ضریب تبیین بالا) در نظر گرفته شد.

### نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد علوفه تازه (تن در هکتار) در جدول ۱ درج شده است. با توجه به تصادفی فرض کردن عامل مکان، تفاوت بین مکان های مورد آزمایش در سطح یک در هزار معنی دار بود. تفاوت بین هیبرید ها (ژنوتیپ ها) نیز در سطح یک درصد معنی دار بود. به علت اینکه هدف این پژوهش معرفی هیبرید برای مناطق مورد بررسی و مناطق مشابه بود، بهتر است که به علت کاهش میزان اشتباه نوع دوم که زیان آورتر از ارتکاب اشتباه نوع اول می باشد (۵)، مکان عامل تصادفی فرض گردد. اثر متقابل ژنوتیپ × مکان در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار بود، بنابراین وجود اثر متقابل GE معنی دار مؤید این مطلب است که گزینش هیبریدها بر اساس عملکرد تنها مناسب نبوده و علاوه بر آن، پایداری عملکرد برای ارزیابی کارایی ژنوتیپ ها لازم می باشد.

متوسط عملکرد کل باشند، به ترتیب +۲ و -۲ به رتبه آنها اضافه گردید و الی آخر.

۴- مقادیر آماره واریانس پایداری ( $\sigma_i^2$ ) مربوط به هر ژنوتیپ را محاسبه و معنی دار بودن آنها در سطوح آماری  $\alpha_{(2)} = 0.10, 0.05, 0.01$  با استفاده از آزمون F تقریبی با درجات آزادی صورت (n-1) و مخرج  $df_e$  (درجه آزادی EMS در تجزیه مرکب) مشخص گردید. آزمون F تقریبی عبارت بود از:

بیانگر این نکته است که عملکرد ژنوتیپ در محیط های مورد آزمایش پایدار نمی باشد.

۵- نمرات پایداری (S) به شرح ذیل تعیین شد: نمرات -۸، -۴ و -۲ به ترتیب به  $\sigma_i^2$  های معنی دار در سطح  $\alpha = 0.10, 0.05, 0.01$  نمرات صفر نیز به  $\sigma_i^2$  غیر معنی دار اختصاص یافت. نمرات پایدار -۸، -۴ و -۲ به دلیل تاکید بیشتر بر جزء پایداری و تغییر رتبه های حاصله از عملکرد تنها ( $Y'$ ) می باشد. در این مقاله از نمرات پایداری پیشنهاد شده توسط کنگ (۱۹۹۳) استفاده شد. محققین بسته به نظر خود می توانند از ترتیب دیگری از نمرات استفاده کنند (۱۷).

۶- رتبه تصحیح شده عملکرد (Y) و نمره پایداری (S) هر رقم را جمع کرده تا مقدار آماره پایداری-عملکرد ( $ys_i$ ) برای هر ژنوتیپ مشخص شود.

۷- میانگین ( $ys_i$ ) به صورت  $\frac{\sum ys_i}{n}$  محاسبه شد. ژنوتیپ های که  $YS_i$  بالاتر از میانگین دارند انتخاب خواهند شد. برای مقایسه معیارهای مختلف گزینش با آماره  $YS_i$ ، میانگین عملکرد هیبرید های انتخابی بر اساس هر یک از روش های گزینش تعیین و سپس بر اساس LSD (دو طرفه) محاسبه شده در سطح احتمال

جدول ۱: تجزیه واریانس مرکب عملکرد علوفه (تن در هکتار) ذرت

S.O.V.	منابع تغییرات	درجه آزادی DF	میانگین مربعات (MS)	آزمون F رقم ثابت (F)، مکان تصادفی (R)
Location	مکان	۴	۷۰۹۳/۳	xxx
Rep(Loc.)	تکرار داخل مکان	۱۵	۹۶/۸	
Genotype	ژنوتیپ	۷	۴۵۰/۰۵	xxx
Genotype × location	مکان × ژنوتیپ	۲۸	۶۴/۰۵	x
Error	اشتباه	۱۰۵	۴۰/۲۵۱	

x و xxx: معنی دار در سطح احتمال ۰/۰۵ و ۰/۰۰۱ ثابت = F(Fixed) و تصادفی = R(Random)

دانه ای با استفاده از معیار های مختلف پایداری اظهار داشت که هیبرید های پایدار بر اساس روش ابرهارت و راسل (۱۹۶۶)، هیچ کدام بر محصول نبودند ولی بر اساس معیار CV یک هیبرید پر محصول گزارش شد (۲).

دهقانیپور و مقدم (۱۳۷۸) در بررسی گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری هیبرید های زودرس و خیلی زودرس ذرت، روش های مختلف پایداری از قبیل واریانس محیطی، ضریب تغییرات، اکووالانس ریک، ضریب تبیین و ضریب رگرسیون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گزارش کردند که استفاده از ضریب تبیین در گزینش ارقام پر محصول مفیدتر از سایر روش ها بوده به طوری که هر رقمی که  $R^2$  بزرگتری داشته باشد رقم پایدار محسوب می شود (۳). همچنین مقدم (۱۳۸۲)، از معیارهای مختلف جهت انتخاب هیبرید یا هیبرید های برتر و پایدار ذرت دانه ای استفاده نمود و با توجه به LSD(0/05) که محاسبه کرد، تفاوتی بین معیارهای مختلف گزینش گزارش نکرد (۴).

نتایج حاصل از این بررسی نمایانگر آن است که در هر چهار معیار گزینش استفاده شده در این پژوهش، هیبرید های SC 700 و K354/212111 x K 74/1، مورد انتخاب قرار گرفتند. با توجه به مقدار LSD(0/05) محاسبه شده (۳/۹۷۸) که بزرگتر از تفاضل بزرگترین و کوچکترین میانگین (۳/۹۷۸ < ۷۲/۹۹ - ۷۳/۸) بوده، تفاوتی بین معیارهای متفاوت گزینش وجود نداشت، هر چند که

مراحل و نتایج محاسبه آماره عملکرد-پایداری  $ys_i$  (کنگ، ۱۹۹۳) و گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری در جدول ۲ درج گردیده است. با این روش به ترتیب ۳ هیبرید SC 700، K117/2، K18 x 5 - K74/1 و K354/212111 با میانگین ۷۳/۸ تن در هکتار انتخاب شدند. هیبرید SC 704 که از نظر عملکرد در گروه A قرار داشت، به واسطه عدم پایداری نمره منفی دریافت نموده و از چرخه انتخاب خارج گردید. سایر آماره های پایداری محاسبه شده مربوط به هیبریدهای مورد پژوهش در جدول ۳ و خلاصه نتایج گزینش به واسطه معیارهای مختلف در جدول ۴ ارائه شده است. اگر گزینش بر اساس معیار عملکرد بدون در نظر گرفتن پایداری هیبریدها انجام شود، به ترتیب چهار هیبرید SC 704، SC 700، K117/2-5 x K 18 و K354/212111 x K 74/1، با متوسط عملکرد ۷۳/۲۹ تن در هکتار گزینش می شوند. بر اساس معیار عملکرد به اضافه واریانس محیطی ( $S^2_i$ ) یا ضریب تغییرات محیطی ( $CV_i$ )، هیبریدهای SC 704، SC 700 و K354/212111 x K74/1 با میانگین ۷۲/۹۹ تن در هکتار مورد گزینش قرار گرفتند. بر اساس معیار عملکرد توام با ضریب رگرسیون ( $b_i$ ) و میانگین مربعات انحراف از خط رگرسیون ( $S^2d_i$ ) یا ضریب تبیین ( $R^2_i$ )، فقط دو هیبرید SC 700 و K354/212111 x K74/1 با میانگین ۷۳/۶ تن در هکتار گزینش شدند. چوگان (۱۳۷۸) در بررسی پایداری عملکرد هیبرید های ذرت

عدد)، ۲- تاکید بیشتر بر جزء پایداری (به واسطه دادن وزنه های سنگین تر)، ۳- پائین آوردن احتمال اشتباه نوع دوم (یعنی ژنوتیپی که ممکن است پایدار نباشد، ولی انتخاب شود) که بسیار زیان آورتر از اشتباه نوع اول (یعنی ژنوتیپی که پایدار بوده ولی انتخاب نشده) می باشد. با توجه به دلایل ذکر شده گزینش ارقام پایدار با عملکرد بالا با اطمینان بیشتری صورت می گیرد.

ترتیب وقوع هیبرید های انتخابی در این چهار روش متفاوت بود. بنابراین تاکید بیشتر بر روی جزء پایداری در محاسبه  $Y_{si}$ ، هیچ گونه تاثیر منفی بر روی متوسط عملکرد هیبرید های انتخابی نگذاشت. در نتیجه استفاده از آماره عملکرد - پایداری ( $Y_{si}$ ) به دلایل زیر می تواند مناسب می باشد:

۱- گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری (اثر متقابل GE) در یک معیار مشخص (انجام هر دو صفت و بدست آوردن یک

جدول ۲: محاسبه آماره عملکرد-پایداری ( $Y_{si}$ ) برای گزینش همزمان عملکرد و پایداری

هیبرید ها	میانگین عملکرد (هکتار/تن)	رتبه عملکرد ( $Y'$ )	رتبه تصحیح عملکرد ( $Y'$ )	رتبه تصحیح شده عملکرد ( $Y$ )	واریانس پایداری ( $S^2_i$ )	نمرات پایداری (S)	( $Y_{si}$ ) ( $y+S$ )
SC704(check)	۷۱/۷۷ <sup>a</sup>	۵	۱	۶	۴۳/۴۵ <sup>x</sup>	-۲	۴
SC 700	۷۳/۳۱ <sup>a</sup>	۶	۲	۸	۱۰/۵۱ <sup>ns</sup>	۰	۸ <sup>(s)</sup>
SC 647(check)	۶۱/۹۴ <sup>c</sup>	۱	-۲	-۱	۱/۴۸ <sup>ns</sup>	۰	-۱
T.W.C 647	۶۵/۶۵ <sup>ab</sup>	۳	-۱	۲	۱۴/۹۶ <sup>ns</sup>	۰	۲
Kl 17/2-5 x K 18	۷۴/۲۰ <sup>a</sup>	۸	۲	۱۰	۹/۰۲ <sup>ns</sup>	۰	۱۰ <sup>(s)</sup>
K 1515 x K 74/1	۶۷/۳۱ <sup>b</sup>	۴	-۱	۳	۸/۹۳ <sup>ns</sup>	۰	۳
K 104 x MO17	۶۴/۹۵ <sup>ab</sup>	۲	-۲	۰	۲۳/۶۱ <sup>ns</sup>	۰	۰
K 3545/212 111x K 74/1	۷۳/۸۹ <sup>a</sup>	۷	۲	۹	۱۶/۳۱ <sup>ns</sup>	۰	۹ <sup>(s)</sup>
Mean	۶۹/۰۷					۴/۳۷۵	
Lsd(0/05)=3/978( $tha^{-1}$ )							

ns، x: غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۱۰ درصد، (s): ژنوتیپ های انتخاب شده مقایسه میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال ۵ درصد

جدول ۳: محاسبه آماره های پایداری هیبرید های مورد بررسی

ارقام	میانگین عملکرد (هکتار/تن)	واریانس محیطی (S <sup>2</sup> <sub>i</sub> )	ضریب تغییرات محیطی (CV <sub>i</sub> )	ضریب رگرسیون (b <sub>i</sub> )	انحراف از رگرسیون (S <sup>2</sup> d <sub>i</sub> )	ضریب تبیین (R <sup>2</sup> <sub>i</sub> )
SC 704	۷۱/۷۷	۲۴۸/۸۷	۲۱/۹۷	۰/۹۸۴ <sup>ns</sup>	۴۵/۸۶	۰/۸۶
SC 700	۷۳/۳۱	۱۸۵/۸۷	۱۸/۶	۰/۸۹۷ <sup>ns</sup>	۱۰/۰۴	۰/۹۶
SC 647	۶۱/۹۴	۲۰۰/۴۴	۲۲/۸۶	۰/۹۴۵ <sup>ns</sup>	۳/۲۶	۰/۹۹
T.W.C 647	۶۵/۶۵	۱۸۱/۹۱	۲۰/۵۴	۰/۸۸۱ <sup>ns</sup>	۱۳/۴۱	۰/۹۵
KL 17/2-5 x K 18	۷۴/۲	۳۱۳/۴	۲۳/۸۶	۱/۱۸۷ <sup>xx</sup>	۱/۳۳	۰/۹۹۷
K 1515 x K 74/1	۶۷/۳۱	۳۰۷/۰۴	۲۶/۰۳	۱/۱۷۳ <sup>x</sup>	۲/۷۶	۰/۹۹۳
K 104 x MO17	۶۴/۹۵	۱۸۶/۷۷	۲۱/۰۴	۰/۸۷۷ <sup>ns</sup>	۲۱/۸	۰/۹۱
K 3545/212 111 x K 74/1	۷۳/۸۹	۲۶۱/۱۱	۲۱/۸۷	۱/۰۵۷ <sup>ns</sup>	۱۸/۰۱	۰/۹۵

ns، x و xx: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

جدول ۴: خلاصه نتایج گزینش با روش های گوناگون

روش	معیار گزینش	هیبرید های انتخابی	میانگین عملکرد هیبرید های انتخابی ( هکتار/تن )
۱	عملکرد [Yield ( t ha <sup>-1</sup> )]	SC 704, SC 700, KL 17/2-5 x K 18, K 3545/212 111 x K 74/1	۷۳/۲۹
۲	ضریب تغییرات محیطی یا واریانس محیطی + عملکرد ( Yield + S <sup>2</sup> <sub>i</sub> Or CV <sub>i</sub> )	SC 704, SC 700, K 3545/212 111 x K 74/1	۷۲/۹۹
۳	ضریب تبیین یا میانگین مربعات انحرافات + ضریب رگرسیون + عملکرد (Yield + b <sub>i</sub> + S <sup>2</sup> d <sub>i</sub> or R <sup>2</sup> <sub>i</sub> )	SC 700, K 3545/212 111 x K 74/1	۷۳/۶
۴	آماره عملکرد - پایداری Yield- stability statistics (Y <sub>si</sub> )	SC 700, KL 17/2-5 x K 18, K 3545/212 111 x K 74/1	۷۳/۸

$$L SD \alpha_{(2)}, 0/0.5 = 3/978 \text{ ( t ha}^{-1} \text{ ) and } L SD \alpha_{(2)}, 0/1 = 3/329 \text{ ( t ha}^{-1} \text{ )}$$

منابع

- 16- Kang, M.S. (1991). Modified rank-sum method for selecting high-yielding, stable crop genotype . Cereal Research Communications, 19: 361-364.
- 17- Kang, M.S. (1993). Simultaneous selection for yield and stability in crop performance trials: Consequences for growers. Agronomy J. 81: 754-757.
- 18- Kang , M.S. and Gorman, D.P.(1989). Genotype x Environment interaction in maize. Agronomy J. 81: 662-664.
- 19- Kang, M.S. and Pham, H.N.( 1991). Simultaneous selection for high yielding and stable crop genotypes. Agronomy J. 83: 161-165.
- 20- Kang, M.S., Gorman, D.P. and Pham, H.N.( 1991). Application of a stability statistic to international maize yield trials. Theoretical and Applied Genetics, 81: 162-165.
- 21- Leon, J.(1986). Methods of simultaneous estimation of yield and yield stability , 299-308 pp. In : Biometrics in plant Breeding. Proceedings of the 6<sup>th</sup> meeting EUCARPIA Section Biometrics in plant breeding, Birmingham, UK.
- 22- Lin , C.S. and Binns, M.R.( 1988). A method of analyzing cultivar x location x year experiments : A new stability parameter. Theoretical and Applied Genetics, 76: 425-430.
- 23- Lin, C.S., Binns, M.R. and Lefkovich, L.P.(1986). Stability analysis : Where do we stand? Crop Sci. 26: 894-900.
- 24- Perkins, J.M. and Jinks, J.L.( 1968). Environmental and genotype – environmental components of variability . III. Multiple lines and crosses. Heredity , 23: 339-356.
- 25- Pinthus, M.J.( 1973). Estimate of genotypic value : A proposed method. Euphytica., 22: 121-123.
- 26- Roemer T (1917) Sin die ertragsreichen sorten ertragssichere? Mitt, DLG 32: 87-89.
- 27- Roy D(2000) Plant breeding analysis and exploitation of variation. alpha Science International Ltd., U.K.
- 28- Shukla, G.K. 1972. Some statistical aspects of partitioning genotype- environmental components of variability. Heredity .29: 237-245.
- 29- Wricke, G. 1962. Ubereine Methode Zur Erfassung der Okologischen strebreite in Feldersuchen Z. Pflanzen-Zuchtg. 47: 92-96.
- ۱- امیدی تبریزی، ا. ج، احمدی، م. ر، شهسواری، م. ر. و کریمی، س. (۱۳۷۹). بررسی پایداری عملکرد دانه و روغن در چند رقم و لاین گلرنگ زمستانه. مجله نهال و بذر، ج ۱۶، ش ۲: ۱۴۶-۱۳۰.
- ۲- چوگان، ر. (۱۳۷۸). بررسی پایداری عملکرد هیبرید های ذرت دانه ای با استفاده از معیارهای مختلف پایداری. مجله نهال و بذر، ج ۱۵، ش ۳: ۱۸۳-۱۷۰.
- ۳- دهقانپورز. و مقدم، ع. (۱۳۷۸). گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری هیبرید های زودرس و خیلی زودرس ذرت . مجله نهال و بذر، ج ۱۵، ش ۳: ۲۱۷-۲۰۶.
- ۴- مقدم، ع. (۱۳۸۲). گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری و مقایسه آن با آماره های مختلف پایداری . مجله نهال و بذر ، ج ۱۹، ش ۱: ۱-۱۳.
- ۵- ولی زاده، م. و مقدم، م. ۱۳۷۳. طرح های آزمایشی در کشاورزی. نشر انتشارات پيشتاز علم. ۳۸-۳۳.
- 6- Bachireddy, V.R., Payne, R.J.R., Chin, K. L. and Kang, M.S. (1992). Conventional selection versus methods that use genotype x environmental interaction in sweet corn trails. Horticultural Sci., 7: 436-438.
- 7- Barah, B.C., Binswanger, H.P., Rana, B.S. and Rao, N.G.P. (1981). The use of risk aversion in plant breeding ; concept and application. Euphytica , 30: 451-458.
- 8- Becker, H.C. and Leon, J. (1988). Stability analysis in plant breeding. Plant Breeding, 101: 1-23.
- 9-Eberhart, S.A. and Russel, W.A. (1966). Stability parameters for comparing varieties .Crop Sci. 6: 36-40.
- 10- Eskridge, K.M. (1990). Selection of stable cultivars using a safety-first rule. Crop Sci.30: 369-374.
- 11- Fernandez , G.C.J. (1991). Analysis of genotype x environment interaction by stability estimates. Horticultural Sci. 27: 947-950.
- 12-Finlay, K.W. and Wilkinson, G.N. (1963). The analysis of Adaptation in a plant breeding program . Australian Journal of Agricultural Research, 14: 742-754.
- 13- Francis , T.R. and Kannenberg, L.W.(1978). Yield Stability studies in short – season maize. I. A descriptive method for grouping genotypes . Canadian Journal of Plant Science ,58: 1029-1034.
- 14- Hill, J.(1975). Genotype – environments interaction , a challenge for plant breeding. Journal of Agricultural Science (Camb.) 85:477-493.
- 15-Kang , M.S.(1988). A rank-sum method for selecting high-yielding, stable corn genotype . Cereal Research Communications , 16: 113-115.