

# بررسی ژن‌های احتمالی کنترل کننده جنسیت در نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) با استفاده از نشانگرهای دی.ان.ا با آغازگرهای اختیاری

مهرنوش پورنابی<sup>\*</sup>، خلیل عالمی سعید<sup>۲</sup>، محمد حسین دانشور<sup>۳</sup>، عزیز تراھی<sup>۴</sup>  
۱، ۲، ۳- به ترتیب کارشناس ارشد، استادیار و دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی  
رامین (اهواز)

۴- کارشناس ارشد باغبانی مرکز تحقیقات میوه‌های گرمسیری استان خوزستان (اهواز)

\* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: m\_pournabi@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۸۹/۱۲/۱۰ - تاریخ پذیرش: ۹۰/۳/۲۹)

## چکیده

نخل خرما (Phoenix dactylifera L.), گیاهی تک‌لپه، دو‌پایه و با عمر طولانی است که از نظر اقتصادی از اهمیت بالایی در کشور ایران برخوردار است. از آن جا که بارده‌ی این گیاه پس از ۵ سال آغاز می‌گردد، تعیین جنسیت آن در مراحل اولیه‌ی رشد در سرعت بخشیدن به برنامه‌های اصلاحی و در هنگام احداث نخلستان بسیار مهم می‌باشد بر این اساس برنامه‌ریزی برای انتخاب نخل خرمای مقاوم و برمحصلو احتیاج به شناسایی نشانگرهای مولکولی دارد. در این تحقیق از نشانگرهای دی.ان.ا. از ۱۶ آغازگر اختیاری ۹ تا ۲۱ بازی برای تکثیر دی.ان.ا. الگو استفاده شد. از ۳۰ رقم نخل خرما (۲۰ رقم نر و ۱۰ رقم ماده) استفاده شد. دو توده ژنومی در دو میکروتیوب ۱/۵ میکرومتری تهیه گردید. آغازگرهای HB9، OPO08، A12 و K1 فقط در مخلوط دی.ان.ا. ارقام نر تولید باند نمودند و در توده‌ی ماده هیچ باندی از این ۴ آغازگر رویت نشد. آغازگرهای HB7، HB12 و 814 فقط در مخلوط دی.ان.ا. ارقام ماده تولید باند کردند سپس آغازگرهای HB9، OPO08، A12 و K1 در ۲۰ رقم نر آزمایش شدند که از این میان فقط سه آغازگر HB9 و OPO08 در تمامی ارقام نر به ترتیب باند مشترک ۳۵۰، ۱۱۰۰ و ۴۵۰ جفت‌بازی تولید نمودند. سه آغازگر HB12 و 814 هر یک به طور مجزا بر روی ۱۰ رقم ماده آزمایش شدند و فقط 7HB7 در تمامی ارقام ماده باند مشترک ۷۰۰ جفت‌بازی تولید کرد. ثبات این باندها در تکرارهای مختلف و ارقامی که از نظر ژنتیکی از هم دور بودند قابلیت آن‌ها را در تعیین جنسیت نخل خرما ثابت کرد.

## واژه‌های کلیدی

آغازگر اختیاری،

تعیین جنسیت،

نخل خرما،

نشانگرهای مولکولی.

## مقدمه

احسانپور و همکاران (۲۰۰۸)، چهار رقم ماده پسته شامل ارقام اکبری، احمد آقایی، فندقی، کله قوچی و ۴ رقم نر که از باع اردستان اصفهان برداشت شده بودند را بوسیله‌ی ۹ نشانگر آی.اس.آس.آر<sup>۲</sup> بررسی کردند که در این میان دو نشانگر با توالی‌های (AC)<sub>۸</sub>CG و (AC)<sub>۸</sub>TA قادر بودند فقط در گیاهان ماده تولید باندهای دی.ان.ا. کنند و بدین صورت ارقام ماده از نر را شناسایی کردند.

گانگوپادهایی و همکاران (۲۰۰۷) بر روی شناسایی ژن تعیین جنسیت در پاپایا<sup>۳</sup> در مراحل پیش از گلدهی بوسیله‌ی نشانگرهای رپید و آی.اس.آس آر کار کردند که آغازگر آی.اس.آس.آر (GACA)<sub>۴</sub> توانست ژن جنسیت در پاپایا را با تولید باند خاص در ارقام ماده آشکار کند.

بخیت و همکاران (۲۰۰۸) ذخیره‌ی بیوشیمیابی و نشانگرهای مولکولی را در شناسایی جنسیت نخل خرماهای تمایز یافته‌ی بدست آمده از کشت درون شیشه‌ای را بررسی کردند. از نظر بیوشیمیابی آنزیم‌های فسفاتاز و گلوتامات اکسالوات است تفاوت بسیاری را بین نر و ماده نشان دادند ولیکن در تجزیه نشانگر رپید ارتباط کمی بین جنسیت‌ها پیدا شد و نتایج بررسی تشابه ژنتیکی آن‌ها نتوانست پیوستگی با جنسیت یا تخمین نوع جنسیت را در کلون‌های ناشناخته مشخص کند. گرچه یونیس و همکاران (۲۰۰۸) اعلام کردند که ۵ آغازگر HB10، HB9، HB12، 814 و ۸۴۴A قادر به تشخیص جنسیت‌نر هستند ولی بررسی آن‌ها فقط روی سه رقم نخل خرمای مصری صورت گرفته بود که از قابلیت اعتماد چندانی برخوردار نبود و باستی در ارقام متعدد و غیر خویشاوند با ارقام مورد بررسی آن‌ها نیز آزمایش می‌شد. علاوه بر این‌ها نشانگر مناسبی برای تشخیص ارقام ماده نیز تا کنون معرفی نشده است. در همین راستا تحقیق حاضریا هدف شناسایی نشانگرهای دی.ان.ا. ژن تعیین جنسیت در نخل خرما طراحی شد.

## مواد و روش‌ها

مواد گیاهی برگ‌های حاصل از برگ‌های تازه مرکز تاج درخت نخل که از ۳۰ کلون موجود در مؤسسه تحقیقات میوه‌های

نخل خرما (Phoenix dactylifera L.)، گیاهی تک لپه، دوپایه و با عمر طولانی است که از اهمیت اقتصادی بالایی در کشور ایران برخوردار است (۱). تعیین جنسیت، گلدهی و میوه‌دهی در این درختان کند بوده و در اواخر سال پنجم رشد نر یا ماده بودن آن‌ها محرز می‌گردد. بنابراین برای انتخاب نخل خرماهای مفید و تعیین جنسیت آن‌ها در سنین اولیه رشد جهت احداث نخلستان‌ها به استفاده از نشانگرهای مولکولی احتیاج است (۶).

بکارگیری نشانگرهای مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ساده‌ترین روش دستیابی به اطلاعات ژنتیکی است. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با آغازگر اختیاری<sup>۱</sup> یکی از این نشانگرهای است که به خوبی تفاوت‌های موجود در دی.ان.ای الگو را آشکار می‌کند. این نشانگرها برای ارزیابی و تجزیه‌ی پیوستگی‌های بین نشانگرها و ژن‌ها در گونه‌های گیاهی مختلف به طور مؤثری به کار رفته است (۳). یکی دیگر از ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین نشانگرها، نشانگر رپید می‌باشد که نیاز به مقدار کم دی.ان.ای (۰.۵-۰.۲۵ ng) داشته و هم‌چنین امکان غربال سریع و مؤثر توالی دی.ان.ای، براساس چند شکلی در بسیاری از مکان‌های ژنی را فراهم می‌نماید (۲). تفاوت این نشانگر با نشانگرهای اپی-پی.سی.آر در تعداد واحدهای نوکلئوتیدی تشکیل دهنده آن‌ها می‌باشد (در نشانگرهای اپی-پی.سی.آر تعداد واحدهای نوکلئوتیدی بین ۱۰-۲۰mer متغیر است درحالی‌که در نشانگر رپید این تعداد از ۱۰-۲۰mer بیشتر نیست). یکی از کاربردهای این نوع از نشانگرها در شناسایی نوع جنسیت گیاهان است که بهویژه در گیاهان با غی که جنسیت بر میزان و کیفیت میوه تأثیر می‌گذارد، بسیار مفید می‌باشند. هرمزا و همکاران (۱۹۹۴)، با استفاده از ۱۴ رقم پسته و ۷۰۰ آغازگر الیگونوکلئوتیدی اقدام به شناسایی نشانگر رپید پیوسته با تعیین جنسیت پسته نمودند در میان آن‌ها آغازگر OPO08 باند ۹۴۵ جفت بازی که فقط در توده‌ی ماده رویت شده بود تولید کرد. این باند در تک‌تک ارقام (۱۴ رقم) به طور مجزا امتحان شد و به عنوان نشانگر رپیدی که می‌تواند در تعیین جنسیت گیاه پسته کارآمد باشد معرفی گردید.

## ۱ Arbitrarily primed-PCR (AP-PCR)

<sup>2</sup> Inter simple sequence repeat (ISSR)

<sup>3</sup> Carica papaya

دی.ان.ای. حجم نهایی واکنش در ۲۵ml بود. برنامه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز شامل: مرحله واسرشت آغازی در ۹۴°C به مدت ۲ دقیقه، در ۴۰ چرخه شامل ۹۴°C به مدت یک واسرشت‌سازی، دمای اتصال برای کلیه نشانگرهای ریید ۴۲°C و برای نشانگرهای اپی-پی.سی.آر متفاوت (بین ۵۱-۴۱ درجه سانتی‌گراد)، تکثیر در ۷۲°C به مدت ۳۰ ثانیه و تکثیر نهایی در ۷۲°C به مدت ۱۰ دقیقه انجام شد (۳). قطعات دی.ان.ای تکثیر شده در ژل آگارز یک درصد جداسازی شدند.

تعیین آغازگرهای کاندید

از میان آغازگرهای اپی-پی.سی.آر آغازگر HB9 فقط در توده ارقام نر (شکل ۱) و ۸۱۴، HB10 و HB7 فقط در توده ارقام ماده تولید باند نمودند (شکل ۲) و از میان آغازگرهای ریید ۴ آغازگر A12، OPO08، A10، K1 و D10 فقط در توده نر تولید باند نمودند و هیچ‌یک از آغازگرهای ریید در توده ماده باند تولید نکردند (شکل ۳). جهت اطمینان از نتایج حاصله این آزمایش با درجه حرارت مناسب تعیین شده برای هر آغازگر سه مرتبه تکرار شد.

گرمسیری استان خوزستان و منطقه کهنه‌وج جیرفت شامل ۲۰ رقم نر (سمساوی، غنامی، وردی، جارویس، نرهای شماره ۱۱-۱، سبز پرک، نر خارجی ۱، نر خارجی ۲، سبز غنامی و سرخ غنامی) و ۱۰ رقم ماده (استعمران، برخی، بریم، دیری، مضافتی، حلاوه، آلمهتری، دگلت‌نور، زاهدی و مجول) تهیه شدند.

استخراج دی.ان.ای به روش CTAB انجام شد (۳). کیفیت دی.ان.ای نمونه‌ها در ژل آگارز یک درصد و کمیت آن‌ها با استفاده از دستگاه بیوفتومنتر اندازه‌گیری گردید.

تهیه توده‌های نر و ماده

دو توده مجزا یکی فقط از دی.ان.ای تمامی ارقام نر و دیگری فقط از دی.ان.ای تمامی ارقام ماده در دو میکروتیوب تهیه شد (از هر نمونه ۵ نانوگرم در میکرولیتر برداشت شد).


تجزیه ریید و اپی-پی.سی.آر

نشانگرها به وسیله ۱۶ آغازگر شامل ۸ آغازگر ریید و ۸ آغازگر اپی-پی.سی.آر که قبلًا مورد استفاده قرار گرفته بودند (جدول شماره ۱) تجزیه شدند. ترکیبات واکنش زنجیره‌ای پلیمراز شامل: ۲۵pmol ۰/۱mM dNTPs، ۰/۱mM آنژیم تک پلیمراز، ۰/۱mM آغازگر، ۵mL ۲/۵٪ بافر X ۱۰ دی.ان.ای تک پلیمراز و ۵۰ng ژنوم

جدول ۱- مشخصات آغازگرهای مورد استفاده در واکنش

منبع آزمایشات قبلی	نام گیاه در	جنسيت گیاه در آزمایشات قبلی (اندازه باند تولید شده)	GC%	توالی	تعداد باز	کد	نام آغازگر
	خرما	(۱۰۱ bp) ♂	۵۵	GACCACAGCCTC GAGAACAT	۲۰	A	HB <sub>10</sub>
	خرما	(۳۷۵ bp) ♂	۷۲/۷۲	(CAC) <sub>۳</sub> GC	۱۱	B	HB <sub>12</sub>
	خرما	(۳۴۰ bp) ♂	۷۱/۴۳	GGGCTTGGGCCG CGACAGCTA	۲۱	C	HB <sub>9</sub>
پاپایا		(*) ♀	۵۰	(GACA) <sub>۴</sub>	۱۶	D	HB <sub>6</sub>
خرما		(۵۹۰ bp) ♂	۵۰	(CT) <sub>۸</sub> TG	۱۸	E	814
پسته		(۴۴۰ bp) ♀	۵۵/۵۶	(AC) <sub>۸</sub> CG	۱۸	F	HB <sub>7</sub>
خرما		(۹۲۰ bp) ♂	۵۴	(CT) <sub>۸</sub> AC	۱۸	G	844A
پسته		(۲۵۰۰-۲۵۰ bp) ♀	۴۴/۴۴	(AC) <sub>۸</sub> TA	۱۸	H	HB <sub>8</sub>
خرما		(۷۵۰ bp) ♀ و (۳۷۰ bp) ♂	۳۲	TCGGCGATAG	۱۰	1	A12
خرما		(۴۰۰ bp) ♀ و (۵۰۰ bp) ♂	۳۲	CCCTACCGAC	۱۰	2	K3
C. circinalis		(۶۸۶ bp) ♂	۳۲	GTTCGCTCC	۱۰	3	OPB01
خرما		(۷۰۰-۴۰۰ bp) ♀ و (۳۰۰ bp) ♂	۳۰	TCGTTCCGC	۹	4	K4
خرما		(۴۹۰ bp) ♀	۲۲	GTGATCGCAG	۱۰	5	A10
پسته		(۹۴۵ bp) ♀	۲۲	CCTCCAGTGT	۱۰	6	OPO08
خرما		(۱۰۰ bp) ♀	۲۴	TGGCGACCTG	۱۰	7	K1
خرما		(۸۰۰ bp) ♀ و (۶۷۵ bp) ♂	۲۲	GGTCTACACC	۱۰	8	D10


در حالی که آغازگرهای HB12 و 814 در گزارش قبلی، در ارقام نر خرما تولید باند کرده بودند ولی ظاهراً در ارقام ماده باندی تولید نکرده بودند (۱۱) بدليل همین وضعیت مشکوک تصمیم گرفته شد جزء آغازگرهایی قرار گیرند که برای ادامه کار انتخاب شده و نتیجه‌گیری از آن‌ها به بررسی‌های تفصیلی در تک تک ارقام ماده موکول گردید. آغازگر HB7 که قبلاً گزارش شده بود قادر به تشخیص جنس ماده پسته است (۵) نیز برای ادامه کار انتخاب شد.



شکل ۲- آزمایش نشانگرهای ریپید A12، A10، K3، K4، OPB01، OPO08، K1 و K2 (D10) بر روی هر دو توده نر (M) و ماده (F) سایز مارکر یک کیلو بازی


همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود از میان نشانگرهای ریپید، آغازگرهای OPB01، K3، A10 و K4 هیچ‌یک در توده‌های نر و ماده ارقام خرما باند تولید ننمودند. آغازگر OPB01 بنا به گزارش گانگوپادهیایی و همکاران (۲۰۰۷)، در ارقام نر *Cycas circinalis* تولید باند ۶۸۶ جفت‌بازی کرده است که در مورد عدم بانده‌ی این آغازگر نیز می‌توان گفت که هیچ جایگاه مکملی در خرما ندارد که نشان‌دهنده فاصله ژنومی این گیاه با خرما است. بخیت و همکاران (۲۰۰۸) از جنین‌های بذری خرما که از میوه‌های نرسیده و رسیده واریته زعلول تهیه کرده بودند به عنوان ریز نمونه در کشت بافت استفاده نموده و گزارش کرده بودند که آغازگر K3 در جنین‌های بذری نر باند ۵۰۰ جفت‌بازی و در جنین‌های بذری ماده باند ۴۰۰ جفت‌بازی تولید نموده است. همچنین آغازگر K4 در جنین‌های بذری نر خرما تولید باند ۲۰۰ جفت‌بازی و در جنین‌های بذری ماده باندهای ۴۰۰ و ۷۰۰ جفت‌بازی تولید نموده است. عدم تشکیل باند در توده‌های ارقام نر و ماده در این تحقیق و همچنین وجودشان در جنین‌های بذری نر و ماده آزمایش بخیت و همکاران (۲۰۰۸) را باید ناشی از روابط

همان‌گونه که شکل ۱ نشان می‌دهد آغازگر HB10 (A) با ۴ باند ۲۵۰ تا ۷۰۰ جفت‌بازی و آغازگر 844A (G) با تولید ۳ باند ۶۰۰-۲۵۰ جفت‌بازی هم در مخلوط نمونه‌های ماده و هم در مخلوط نمونه‌های نر باند تولید کردن. آغازگر HB6 (D) که قبلاً برای تشخیص جنسیت ماده در پایپایا (۶) گزارش شده بود و آغازگر HB8 (H) که قبلاً قادر به تشخیص جنسیت ماده در پسته گزارش شده بود (۵) نتوانستند هیچ باندی در خرما تولید کنند این نشان می‌دهد که این دو آغازگر آی.اس.آر هیچ جایگاه مکملی در خرما ندارند که نشان‌دهنده فاصله ژنومی این دو گیاه با خرما است. بنابراین آغازگرهای HB10 و 844A به علت اینکه باندهای حاصل از آن‌ها قادر به تشخیص پایه‌های نر از ماده نیستند و آغازگرهای HB6 و HB8 به علت اینکه هیچ باندی تولید نکردن از ادامه کار گذاشته شدند. اما آغازگر HB9 (C) فقط در مخلوط دی.ان.ا نمونه‌های نر باند داد (شکل ۱). این آغازگر آی.اس.آر که قبلاً در ارقام نر نیز توانسته بود باند ۳۴۰ جفت بازی بدهد (۱۱) به عنوان آغازگر مناسب تشخیص جنسیت نر برای ادامه کار انتخاب گردید. آغازگر HB12 (B) و آغازگرهای آی.اس.آر 814 (E) و HB7 (F) فقط در مخلوط دی.ان.ا نمونه‌های ماده باند تشکیل دادند ولی در مخلوط دی.ان.ا نمونه‌های نر هیچ باندی تشکیل ندادند (شکل ۱ و ۲).




شکل ۱- باندهای تولید شده از ۸ آغازگر (A-H) در توده ماده (شکل A با نشانه F) و در توده نر (شکل B با نشانه m)، L: سایز مارکر یک کیلو بازی، C-: کنترل آب، که آغازگرهای B، E و HB12 (HB7) ۸۱۴ و F فقط در توده ماده (BFB، BFE) و (BFF) و آغازگر C (HB9) فقط در توده نر (BmC) (BmC) باند تولید نمودند.

آغازگر OPO08 دو باند ۳۵۰ و ۱۰۰ جفت‌بازی تولید نمود که قضاوت درباره آن احتیاج به بررسی‌های بیشتری دارد (شکل ۵). آغازگر K1 که در آزمایش بخت و همکاران (۲۰۰۸)، در کلون‌های ماده تولید باند ۱۰۰۰ جفت‌بازی نموده بود در این تحقیق در ارقام نر مورد مطالعه باند مشترک ۴۵۰ جفت‌بازی نمود (شکل ۶) که نشان می‌دهد بسته به رقم و واریته این آغازگر که دارای جایگاه ژنومی در کروموزوم نخل خرما است، متفاوت عمل می‌کند و نمی‌تواند به عنوان یک نشانگر جنسیت در خرما بکار گرفته شود.




شکل ۴- آزمایش آغازگر HB9 بر روی بیست رقم نر (M1 تا M20). چاهک‌های L, C, BF و BM به ترتیب سایز مارکر ۱ Kb، شاهد آب، مخلوط نرها و مخلوط ماده‌ها را نشان می‌دهد. باندهای ۳۵۰ جفت‌بازی در ۲۰ رقم ماده دیده می‌شود.



شکل ۵- آزمایش آغازگر OPO08 بر روی ۲۰ رقم نر (M1 to M20) (چاهک‌های L, C, BF و BM به ترتیب سایز مارکر ۱ Kb، شاهد آب، مخلوط نرها و مخلوط ماده‌ها را نشان می‌دهد. باندهای ۳۵۰ و ۱۱۰۰ جفت‌بازی در ۲۰ رقم ماده دیده می‌شود).

خویشاوندی موجود بین ژنتیپ‌های مورد بررسی آن‌ها داشت ولی در تعیین جنسیت ارزشی ندارند چرا که فقط از یک نوع رقم واریته زغلول استفاده نموده بود و تنوع ارقام در تحقیق ایشان وجود نداشت. آغازگر A10 بنا به گزارش یونیس و همکاران (۲۰۰۸)، در ارقام ماده ساکوتی، برتمودا، مالکابی و داگانا تولید باند ۴۹۰ جفت‌بازی نموده در حالی که در ارقام موردن بررسی در تحقیق حاضر باندی تولید نکرد که دلیل آن را نیز می‌توان وجود روابط خویشاوندی بین ارقام مذکور در تحقیق آن‌ها ذکر کرد.

نتایج آزمایش آغازگرها کاندید بر روی تک تک ارقام توانایی تولید باند ۴ آغازگر کاندید ابجی-پی-سی-آر (HB9)، HB7 و ۸۱۴ و ۴ آغازگر کاندید رپید (A12)، OPO08، K1 و D10 بر روی تک تک ارقام موردن بررسی با دمای‌های اتصال بهینه آن‌ها آزمایش شدند. آغازگرها HB12 و ۸۱۴ به علت این‌که در بعضی ارقام ماده باند مشترک تولید نکردند، از ادامه کار حذف شدند. از بین این آغازگرها تنها ۲ آغازگر، آغازگر HB7 در تعیین جنسیت ارقام ماده (شکل ۳) و آغازگر HB9 در تعیین جنسیت ارقام نر (شکل ۴) مؤثر بودند. آغازگر HB7 به طول ۱۸ باز در تمامی ارقام ماده یک باند مشترک ۷۰۰ جفت‌بازی تولید نمود (شکل ۳) که در هر سه مرحله تکرار آزمایش بدون هیچ تغییری این باند در تمامی ارقام ماده دیده شد و می‌توان آن را باند شاخص مادگی خرما معرفی کرد




شکل ۳- تکثیر باندهای آغازگر HB7 بر روی ده رقم ماده (F1 تا F10). چاهک‌های L, C, BF و BM به ترتیب سایز مارکر ۱ Kb، شاهد آب، مخلوط نرها و مخلوط ماده‌ها را نشان می‌دهد. باند ۷۰۰ جفت‌بازی در ۱۰ رقم ماده دیده می‌شود. آغازگر HB9 نیز توانایی تولید باند مشترک ۳۵۰ جفت‌بازی (شکل ۴) را در هر ۲۰ رقم نر موردن بررسی اثبات کرد. از آنجایی که این باند در هر سه مرحله تکرار در ۲۰ رقم که خویشاوندی چندانی با هم ندارند دیده شد با اطمینان می‌توان این باند را باند شاخص نرینگی معرفی کرد.

بررسی نتایج حاصل از تعیین جنسیت ارقام مورد مطالعه و نتایج حاصل از تحقیقات قبل نشان دادند که فقط آغازگرهای HB7 و HB9 را می‌توان با اطمینان به صورت آغازگرهای اختیاری به ترتیب در تعیین جنسیت ماده و نر نخل خرما بکار گرفت.

#### سپاسگزاری

نویسنده‌گان از ریاست محترم مرکز تحقیقات میوه‌های گرم‌سیری استان خوزستان جناب آقای دکتر رهنما و مسئولین و کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رامیم خوزستان خصوصاً سرکار خانم صدر به خاطر حمایت‌ها و کمک‌های بی‌دریغشان کمال تشکر را دارند.



شکل-۶- آزمایش آغازگر K1 بر روی ۲۰ رقم نر (M1 to M20) چاهک‌های L، C-، BF و BM به ترتیب سایز مارکر ۱ Kb، شاهد آب، مخلوط نرها و مخلوط ماده‌ها را نشان می‌دهد. ۳۵۰ جفت بازی در ۲۰ رقم ماده دیده می‌شود.

#### منابع

- داوسن و. هـ. و (۱۳۷۰) تولید و مراقبت خرما. ترجمه: سندگل ر، انتشارات سازمان ترویج کشاورزی.
- نقوی م. ر، قره‌یاضی ب و حسینی سالکده ق (۱۳۸۴) نشانگرهای مولکولی. انتشارات دانشگاه تهران.
- Ahmed A A A, Soliman S S and Elsayed E H (2006) Molecular identification of some Egyptian date palm males by females varieties (*phoenix dactylifera* L.) using DNA markers. App. Sci. Res. 2(5): 270-275.
- Bakheet S A, Taha H S, Hanafy M S and Solliman M E (2008) Morphogenesis of Sexual embryos of date palm cultured in vitro and early Identification of sex type. App. Sci. Res. 4(4): 345-352,208.
- Ehsanpour A A, Tavassoli M and Arab L (2008) Sex determination of *Pistacia vera* L. Malays. Appl. Biol. 37(2): 25-28.
- Gangopadhyay G, Roy S K, Ghose K, Podar R, Bandyopadhyay T, Basu D and Mukherjee k k (2007) Sex

detection of *carica papaya* and *cycas circinalis* in preflowering stage by ISSR and RAPD. Current sci., 92(4): 524-526.

- Hormoza J I, Dollo L and polito V S (1994) Identification of a RAPD Marker linked to sex determination in *pistacia vera* using bulked segregant analysis. Theor. Appl. Genet. 89(1): 9-13.
- Kafkas S, Cetiner M S and perl-Treves R (2007) RAPD markers linked to sex in the genus *Pistacia*. www. Ciheam. Org/om/ pdf/ c56/ 251-255.
- Ouenzar B, Hartmann C, Rode A and Benslimane A (1998) Date palm DNA mini-preparation with out liquid nitrogen. Plant mol. Biol. Rep., 16: 263-269.
- Shirkot P, Sharma D R and Mohapatra T (2002) Molecular identification of sex in *Actinidia deliciosa* var. *deliciosa* by RAPD markers. Sci. Hort., 94(2002): 33-39.
- Yonis R A A, Ismail O M and Soliman S S (2008) Identification of sex- specific DNA markers for date palm *phoenix dactylifera* L. using RAPD and ISSR techniques. Journal of Agri. and Biol. Sci., 4(4): 278-284