

مقایسه تنوع ژن سیتوکروم *b* در ماهیان شاه کولی (*Alburnus chalcooides*) رودخانه های هراز، شیروود و گزارفورد به روش PCR-RFLP

حسین رحمانی^{۱*} - بهرام کاظمی^۲ - محمد پورکاظمی^۳

- ۱- استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
- ۲- استاد مرکز تحقیقات بیولوژی، سلوولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
- ۳- دانشیار موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت.

* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: Shemaya1975@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۸۹/۶/۲۸ - تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۲/۹)

چکیده

در این پژوهی ۷۱ نمونه ماهی شاه کولی *Alburnus chalcooides* از رودخانه های هراز، شیروود و گزارفورد در استان های مازندران و گیلان صید شدند. استخراج DNA با روش فنل - کلروفرم از بافت باله ماهیها انجام شد. براساس توالی نوکلئوتیدهای ژن سیتوکروم *b* ماهی شاه کولی یک جفت پرایمر طراحی گردید و واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام شد که نتیجه محصول PCR ۸۳۱ جفت باز بوده است. به کمک نرم افزار DNAsis آنزیم های *HaeIII*, *EcoRV*, *BamHI*, *TaqI*, *Tsp45I*, *RsaI*, *PpuMI*, *HinfI*, *HincII* استفاده قرار گرفت. الگوهای هضم آنزیمی یا ژل آکارز دورصد و رنگ آمیزی نیترات نقره مشاهده گردید. الگوهای برشی در تمام نمونه های مورد مطالعه غیر از الگوهای برشی آنزیم *TaqI* در ماهیان رودخانه گزارفورد یکسان بوده است. بر این اساس می توان گفت که پدیده پلی مرفیسم با استفاده از آنزیم های فوق و ژن سیتوکروم *b* در ماهی شاه کولی قابل مشاهده نبوده و نمونه ها به کمک این ژن و این تکنیک به یک جمعیت تعلق داشته و تمام افراد از ژنوتیپ یکسان برخوردار می باشند.

واژه های کلیدی

آنژیم برشی،
تنوع ژنتیکی،
سیتوکروم *b*

A. chalcooides
شاه کولی
PCR- RFLP

مقدمه

گونه شاه کولی *A. chalcooides* از گونه های بتپولازیک بوده و در آبهای لب شور و شیرین زندگی می کند و برای تولید مثل به رودخانه ها مهاجرت می نماید (Slastenko 1955). این گونه دارای پراکنش وسیعی در رودخانه های حوزه دریای خزر، آرال و سیاه می باشد (Bogutskaya 1997). شاه کولی یک ماهی ریز جثه و مورد پسند مردم شمال ایران است که از اواخر فروردین تا اواخر تیر جهت تولید مثل وارد رودخانه های حوزه جنوبی دریای خزر می شوند (Rahmani 2006; Berg 1949). میزان صید این ماهی در سالهای اخیر در سواحل خزر کاهش یافته است (Ghaninejad et al. 2000). تاکنون روشهای متعددی برای شناسایی ذخایر آبزیان بکار رفته، امروزه از مطالعات مولکولی جهت تفکیک جمعیتها و یا ذخایر آبریان بر حسب گونه، زیر گونه و یا جمعیت به عنوان یک روش قابل اعتماد استفاده می شود (Nahavandi et al. 2007).

آزمایشگاه منتقل شد) Pourkazemi 1996; Rezvani Gilkolai (1997).

برای استخراج DNA بر اساس روش استاندارد، ۳۰ میلی گرم از باله‌ها بطور کامل خرد شد و در لوله‌های ۱/۵ میلی لیتری ریخته و مقدار ۳۰۰ میکرولیتر بافر لیز جهت باز شدن بافت‌ها و یک میکرولیتر پروتئیناز K جهت هضم پروتئین‌ها اضافه نموده و به مدت یک شبانه روز در بن ماری با دمای 55°C قرار داده شد. سپس مقدار ۳۰۰ میکرولیتر فنل به آن اضافه شده و پس از مخلوط کردن، به مدت ۵ دقیقه در سانتریفیوژ $5366/4\text{ g}$ قرار داده، محلول لایه رویی به دقت جدا و به لوله دیگری منتقل شد. هم حجم محلول فوق، کلروفرم اضافه نموده و به مدت ۵ دقیقه در سانتریفیوژ $5366/4\text{ g}$ قرار داده و مجدداً لایه رویی به آرامی جدا و به لوله دیگر منتقل شد. سپس $1/10$ حجم محلول به دست آمده، استاتس سدیم و ۲ برابر حجم آن الكل مطلق سرد اضافه نموده و در سانتریفیوژ یخچال دار به مدت ۱۰ دقیقه، $12074/4\text{ g}$ و در دمای 4°C سانتریفیوژ نموده، محلول حاصل را دور ریخته و لوله حاوی DNA را با الكل 70 درصد شستشو داده و به مدت دو دقیقه و 12074 g مجدداً سانتریفیوژ نموده و محلول را دور ریخته و لوله‌ها در دمای آزمایشگاه کاملاً خشک شدند. به رسوب حاصل مقدار ۴۰ میکرولیتر آب مقطر اضافه نموده و به مدت نیم ساعت در بن ماری 37°C قرار داده شد (Sumbrook and Russell 2001). استخراج شده با استفاده از ژل آگاراز 0.8% درصد (Russell 2001) درصد (0.80 گرم آگاراز و 10 میلی لیتر بافر TBE یک درصد) لود شده و با ولتاژ $60-80$ ولت کاترونوفورز شدند. با مقایسه باند DNA با مارکرهای کمی مقدار آن برای واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تعیین شد.

آغازگرهای مورد استفاده برای ژن سیتوکروم b (دارای 1140 جفت باز است) از ژنوم میتوکندری ماهی *A. chalcoides* (Gupta et al. 1997) استفاده از نرم افزار DNAsis طراحی گردید. ترتیب نوکلوتیدهای هر یک از آغازگرهای 20 نوکلوتیدی به صورت زیر می‌باشد.

آغازگر پیشرو²: ۵'-CTAGTCGATCTTCCAACACC-3'
آغازگر پسگرد³: 5'-TAGTGCAAGAACCCCGCCTA-3'

تنوع ژنتیکی، در جمعیت‌هایی که از نظر جغرافیایی فاصله زیادی از هم دارند (Karakousis et al. 1991) و یا در جمعیت‌هایی که از نظر اکولوژیکی با هم متفاوت هستند، وجود دارد (Hindar et al. 1991). برای مطالعات مولکولی معمولاً از DNA میتوکندری به عنوان یک نشانگر بسیار مناسب که عمدتاً به صورت وراست مادری منتقل می‌شود، استفاده می‌گردد (Avise 1994) که می‌توان با استفاده از روش PCR-RFLP تنوع ژنتیکی جمعیتها را مشخص نمود (Berrebi 1996). همچنین ژن سیتوکروم b دارای محل‌های اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی ارتباط فیلوژنی بین گونه‌هایی است که از نظر مرفولوژیکی خیلی به هم نزدیک هستند. لذا این ژن یک نشانگر قابل اعتماد و مناسب برای مطالعات فیلوژنیک محسوب می‌گردد (Zardoya and Meyer 1998) علیرغم ارزش اقتصادی شاه کولی در حوزه جنوبی دریای خزر و ارزش حفاظتی آن که از نظر طبقه بندی¹ IUCN¹ جزء گونه‌های آسیب‌پذیر تا در معرض تهدید محسوب می‌شود (Kiabi et al. 1999) در حوزه دریای خزر Karimpour et al. 1993; Khaval 1997; Azari Takami and Rajabinejad 2002). تاکنون مطالعات مولکولی در مورد گونه شاه کولی انجام نشده ولی با استفاده از این روش و این ژن در مورد سایر گونه‌ها، مطالعات بسیاری انجام شده است (Zardoya and Meyer 1996; Brioly et al. 1998; Imsiridou et al. 1998; Laloui et al. 2003). هدف از این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی گونه *A. chalcoides* در نمونه‌های رودخانه‌های هزار، شیرود و گرافرود و شناخت ذخایر ژنی این گونه با استفاده از روش PCR-RFLP می‌باشد.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق، نمونه‌های شاه کولی در بهار 1384 از سه رودخانه حوزه جنوبی دریای خزر بوسیله تور سالیک صید شد. تعداد 24 نمونه شاه کولی از رودخانه هزار، 20 نمونه از رودخانه شیرود و 27 نمونه از رودخانه گرافرود مورد بررسی قرار گرفتند (شکل ۱). مقدار 200 میلی گرم از باله ماهی در الكل مطلق تشییت و به

² Forward

³ Reverse

¹ International Union for Conservation of Nature

نتایج و بحث

استخراج DNA با روش فنل کلروفرم به خوبی انجام شده و محصول PCR قطعه ای ۸۱۰ bp با استفاده از آغازگرها تکثیر شد. برای هضم آنزیمی قطعه فوق از ۹ آنزیم استفاده شد و الگوهای الکتروفورزی با ژل آگارز ۲-۳ درصد به دست آمد. الگوی هضم آنزیمی قطعات ایجاد شده بر اثر آنزیم های برش دهنده روی تمامی نمونه ها در جدول ۳ آمده است.

با توجه به الگوهای هضم آنزیمی، باندهای DNA ایجاد شده برای تمام آنزیم ها و برای تمام نمونه های DNA مورد استفاده هم اندازه بوده و بینگر این است که ژن سیتوکروم b مستقر روی mtDNA با این آنزیم ها، تنوع ژنتیکی و یا پلی مورفیسم بین افراد داخل یک منطقه و یا افراد مناطق مختلف را نشان نمی دهد (شکل های ۳ و ۲). لذا انجام هر گونه آنالیز آماری برای محاسبه تنوع نوکلئوتید یا هاپلوتیپی و رسم درخت خویشاوندی بین افراد یا گروه ها با استفاده از نرم افزارهای اختصاصی شامل Reap و Phyliip امکان پذیر نبوده است. از بین نمونه های مورد مطالعه، فقط محصول PCR یک نمونه از رودخانه گرافورد با آنزیم برش دهنده متفاوت با الگو برش داده شد (شکل ۴).

جدول ۳- تعداد و طول قطعات ایجاد شده بر اثر هضم آنزیمی محصولات PCR

نام آنزیم	تعداد قطعات	bp
BamHI	۲	۷۸۱ + ۴۹
EcoRV	۲	۷۱۰ + ۱۲۱
HaeIII	۲	۱۷۱ + ۶۶۰
HincII	۲	۶۶۵ + ۱۶۶
HinfI	۳	۲۵۲ + ۳۰۰ + ۱۷۹
PpuMI	۲	۲۰۲ + ۶۲۹
RsaI	۳	۴۸۸ + ۴۲ + ۳۰۱
Tsp45I	۲	۹۵ + ۷۳۶
TaqI	۳	۵ + ۸۱ + ۶۴۵

*جمع اندازه های تمام الگوها برای هر آنزیم ۸۳۱ bp است.

جدول ۱- شرایط انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ژن سیتوکروم b در این تحقیق.

DNA	1µg (1-4µl)
Taq Polymerase (5unit/ µl)	1unit (0.2µl)
Buffer PCR 10x	1x (5µl)
MgCl ₂ (50mM)	1.5mM(1.5µl)
dNTP (10mM)	0.2mM(0.5µl)
Primer (1)	20 Pmol (1µl)
Primer (2)	20 Pmol (1µl)
dH ₂ O	37-40 µl
حجم نهایی	50 µl

محلول فوق در لوله های ۰/۵ میلی لیتری تهیه شده و لوله ها را در دستگاه مولد حرارتی قرار داده و واکنش زنجیره ای انجام شد. (جدول ۲).


جدول ۲- برنامه حرارتی واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ژن سیتوکروم b

مرحله اول: (یک چرخه): واسرشه سازی اولیه	۹۴ °C ۵ دقیقه
مرحله دوم: (۳۰ چرخه): واسرشه سازی	۹۴ °C ۳۰ ثانیه
اتصال آغازگر	۵۷ °C ۴۰ ثانیه
بسط	۷۲ °C ۴۰ ثانیه
مرحله سوم: (یک چرخه): بسط نهایی	۷۲ °C ۵ دقیقه

در انجام تجزیه RFLP با توجه به توالی ژن مورد نظر و جایگاه HincII HaeIII EcoRV BamHI انتخاب شدن و جهت انجام واکنش محلول زیر تهیه شد.

PCR	۱۰-۵ میکرولیتر
آنزیم برش دهنده	۰/۱-۲ Unit میکرولیتر
بافر مخصوص هر آنزیم	۱ x ۲ میکرولیتر
آب مقطر دو بار تقطیر	۸-۱۳ میکرولیتر
حجم نهایی	۲۰ میکرولیتر

محلول فوق در دمای بھینه هر آنزیم به مدت یک ساعت در بن ماری قرار داده و سپس روی ژل آگارز دو درصد به همراه مارکر Fast Ruler™ DNA Ladder Low Range گرفته شد (جدول ۱ و ۲). جهت تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه تنوع نوکلئوتیدی یا هاپلوتیپی بین افراد یا گروه ها با استفاده از نرم افزارهای اختصاصی شامل Reap و Phyliip استفاده خواهد شد.




شکل ۴- الگوی هضمی محصول PCR ماهی شاه کولی با آنزیم *TaqI* روی ژل آگارز دورصد. شماره های ۷ و ۹ مربوط به رودخانه گرافرود ، شماره های ۸ و ۱۰ به ترتیب مربوط به رودخانه های شیرود و هراز می باشد.


دانستن ساختار ژنتیکی آبزیان کمک مهمی در بررسی تنوع ژنتیکی آنها می نماید و یکی از راههای مطالعه ساختار ژنتیکی، استفاده از ژنتیک جمعیت می باشد. شناسایی تحولات درون گونه ای و ساختار جمعیت ها یکی از نیازهای اساسی در اعمال مدیریت صحیح بهره برداری می باشد (Rezvani Gilkolai 1997).

RFLP نیز یکی از تکنیک های مناسب در زمینه ژنتیک مولکولی برای مطالعات سیستماتیک و تعیین نشانگرها ی ژنتیکی گونه ها و همچنین تجزیه جمعیت ها می باشد (Avise 1994). به طور کلی در جانوران دریایی، احتمال تنوع DNA میتوکندری خیلی کم می باشد و عواملی مانند شرایط ناساعد و محدود محیطی و یا مرگ و میر که بنا به دلایل خاصی اتفاق می افتد، یکی از عوامل بروز اختلافات نوکلئوتیدی می باشند (Ovenden and White 1990). اغلب گزارشات در زمینه تجزیه DNA میتوکندری ماهی ها، تنوع هاپلوئیدی کمی را نشان داده و در واقع تعداد هاپلوتیپ های Billington and Herbert موجود مشتقات جهش یافته می باشند (Billington and Herbert 1991). تغییرات DNA میتوکندری ممکن است به عنوان ابزاری در تفکیک و مدیریت ذخایر گونه های مختلف ماهی مفید باشد (Billington et al. 1992).


نوترکیبی در آن صورت نمی گیرد و این خاصیت سبب بروز



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی رودخانه های هراز، شیرود و گرافرود.



شکل ۲- الگوی هضمی محصول PCR ماهی شاه کولی با آنزیم *EcoRV* روی ژل آگارز دورصد. شماره های ۱ و ۲ مربوط به رودخانه هراز، شماره های ۳ و ۴ مربوط به رودخانه شیرود و شماره های ۵ و ۶ مربوط به رودخانه گرافرود می باشد.



شکل ۳- الگوی هضمی محصول PCR ماهی شاه کولی با آنزیم *HaeIII* روی ژل آگارز دورصد. شماره های ۱ و ۲ مربوط به رودخانه هراز، شماره های ۳ و ۴ مربوط به رودخانه شیرود و شماره های ۵ و ۶ مربوط به رودخانه گرافرود می باشد.

محدود کننده را به عنوان مارکرهای مولکولی بیان داشتند (Wolf et al. 1999). همچنین در مطالعه دیگر تنوع ژنتیکی ۱۲ جمعیت مختلف ماهی سفید رودخانه ای (*Leuciscus cephalus*) به کمک ژن سیتوکروم b مورد بررسی قرار گرفت و ۹ آنزیم از ۱۰ آنزیم Imsiridou (et al. 1998) که نتایج آنها برخلاف نتایج حاضر در مورد ژن سیتوکروم b در گونه شاه کولی می باشد با توجه به اینکه ژن سیتوکروم b توائیسته در گونه های دیگر خانواده کپور ماهیان تنوع ژنتیکی را بین جمعیتها نشان دهد لذا برای اطمینان بیشتر از تعلق این نمونه ها به یک جمعیت واحد می توان از نمونه های بیشتر و یا آنزیم های برش دهنده موثرتر و یا از نشانگر های دیگری نظیر AFLP و Microsatellite استفاده نمود.

تشکرو قدردانی

از ریاست و کارشناسان آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیولوژی، سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای در اختیار قرار دادن امکانات آزمایشگاهی و همکاری های صمیمانه شان کمال تشکر را دارم.

منابع

- Avise JC (1994) Molecular Markers, Natural History and Evolution. Chapman & Hall, London.
 Azari Takami G, Rajabinejad R (2002) A study of fecundity in Shemaya, *Chalcalburnus chalcooides* in Sefidrud River. Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources 6(4): 231-239.(In Farsi)
 Berg L S (1949) Freshwater Fishes of the USSR. and Adjacent Countries. Trady institute Acad, USSR. (Translated to English in 1962), 2, 469p.
 Berrebi P (1996) Speciation of the genus *Barbus* in the north Mediterranean basin: recent advances from biochemical genetics. Journal of Biological Conservation 72: 237-249.
 Billington N, Barrette RJ, Herbert PDN (1992) Management implication of mtDNA variation in walleye stocks. North American Journal of Fisheries Management 12: 276-284.
 Billington N, Herbert PDN (1991) Mitochondrial DNA diversity in fishes and its implication for introduction. Canadian Journal of Fish Aquatic Science 48: 80-94.
 Bogutskaya NG (1997) Contribution to the knowledge of Leuciscine fishes of Asia Minor. Part 2. An annotated check- list of Leuciscine fishes (Leuciscinae, Cyprinidae) of Turkey with descriptions of a new species and two new subspecies. Mitt Hamb Zool Mus Inst 94, 161-186.

اختلاف ژنتیکی بیشتر در ژنوم میتوکندری نسبت به ژنوم هسته شده است(Berrebi 1996).

جهت استخراج DNA با وزن مولکولی و کیفیت بالا از روش فل- کلروفرم استفاده شد. زیرا فل- کلروفرم، پروتئین ها را تا حد زیادی جدا کرده و نسبت به روش های دیگر، احتمال استخراج DNA خالص بیشتر است (Bonnaud et al. 1997). در این مطالعه، اندازه محصول PCR ژن سیتوکروم b، ۸۳۱ جفت باز بود که برای ۷۱ نمونه از ماهیان رودخانه های هراز، شیرود و گزافرود بدست آمد. از ۹ آنزیم قطع کننده جهت استخراج مطالعه هضم آنزیمی استفاده شد که از بین آنها فقط یک نمونه از محصولات PCR جمعیت گزافرود توسط آنزیم *TaqI* با الگوی متفاوتی قطع شده و در بقیه نمونه ها با آنزیم های برش دهنده مورد استفاده تنها یک الگوی برش مشاهده شده و تنوع نوکلوتیدی و هاپلوتیپی را نشان نداد. با توجه به نتایج به دست آمده، انجام هر گونه آنالیز آماری برای محاسبه تنوع هاپلوتیپ ها و نوکلوتیدها بین جمعیت ها و یا درون هر یک از جمعیت ها به وسیله نرم افزارها امکان پذیر نبود. علت این امر را می توان به نوع ژن، تعداد کم نمونه ها و یا تعداد کم آنزیم های قطع کننده مرتبط دانست. تاکنون در دنیا مطالعات ژنتیکی در مورد گونه شاه کولی انجام نشده و هیچگونه اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد و به این دلیل نتایج بدست آمده در این تحقیق با گونه های دیگر مقایسه شدند. Laloui et al. (2003) در بررسی تنوع ژنتیکی سس ماهی دریای خزر (*Barbus capito*) با استفاده از ژن سیتوکروم b و ۱۰ آنزیم برش دهنده و به کمک روش RFLP پلی مرفیسم را بین جمعیت ها و یا درون آنها مشاهده نکردند (Brioly et al. 1998). ایشان معتقدند که موانع فیزیکی رودخانه ها و دریای خزر و موانع زیستی که موجب ایجاد تفاوت های معنی دار بین افراد جمعیت سس ماهی در مناطق مورد مطالعه شده، وجود ندارد و در واقع آن جمعیت ها را از نظر ژنتیکی یکنواخت بیان کرده و معتقدند که ژن سیتوکروم b ژن مناسبی برای بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت سس ماهی نبوده و نمی تواند اختلافات ژنتیکی بین جمعیت ها و یا درون جمعیت ها را نشان دهد. در تحقیقی محصول PCR ۴۶۴ جفت بازی ژن سیتوکروم b با روش RFLP در تاسماهیان بررسی شده که علاوه بر پلی مرفیسم و تعیین تنوع بین گونه ها ۴ آنزیم

- Bonnaud L, Boucher- Rodoni R, Monnerot M (1997) Phylogeny of cephalopods inferred from mitochondrial DNA sequences. Journal of Molecular Phylogenetic Evolution 7 : 44-54.
- Brioly J, Galyiev N; Brito RM, Bouvet Y (1998) Molecular phylogeny of Cyprinidae inferred from cytochrome *b* DNA sequence. Journal of Molecular Phylogenetic Evolution 9 : 100-108.
- Ghaninejad D, Abdolmaleki SH, Fazli H (2000) Stock assessment of bony fish in Caspian Sea. Iranian Fisheries Research and Training Organization, 90p. (In Farsi)
- Hindar K; Jonson B; Ryman N, Sthal G (1991) Genetic relationships among landlocked, resident, and anadromous brown trout, *Salmo trutta* L. Journal of Heredity 66:83-91.
- Imsiridou A; Aostolidis AP, Durand JD, Brioly J; Bouvet Y, Triantaphyllidis C (1998) Genetic differentiation and phylogenetic relationships among Greek Chub *Leuciscus cephalus* L. (Pisces, Cyprinidae) populations as revealed by RFLP analysis of mtDNA. Journal of Biochemical Systematics and Ecology 26: 416-429.
- Karakousis Y; Triantaphyllidis C, Economidis PS (1991) Morphological variability among seven populations of brown trout, *salmon trutta* L., in Greece. Journal of Fish Biology 38: 807-817.
- Karimpour M, Hosseinpour N, Haghghi D (1993) Biological survey of *Chalcalburnus chalcooides* spawning migration in Anzali Lagoon. Iranian scientific Fisheries Journal 4: 39-52. (In Farsi).
- Khaval A (1997) The migration of *Rutilus frissi Kutum*, *Vimba vimba* and *Chalcalburnus chalcooides* to the Sefidrud River. Iranian scientific Fisheries Journal 6(4):75-86. (In Farsi).
- Kiabi BH; Abdoli A, Naderi M (1999) Status of the fish fauna in the south Caspian basin of Iran. Journal of Zoology in the Middle East 18: 57-65.
- Laloui F, Rezvani Gilkolai S, Pourkazemi M (2003) Investigation the molecular of *Barbus capito* in South Caspian Basin by using PCR-RFLP. Iranian Scientific Fisheries Journal 12(1): 117-130. (In Farsi).
- Nahavandi RA, Rezvani Gilkolai S, Vosoughi GH, Kazemi B (2005) A survey of Gene diversity 18s rRNA of Squid, *Sepia pharaonis*, in Persian Gulf and Oman Sea by using PCR-RFLP method. Iranian Scientific Fisheries Journal 14(2): 157-168. (In Farsi).
- Ovenden JK, White RWG (1990) Mitochondrial and Allozyme genetics of incipient speciation in a landlocked population of *Galaxias truttaceus* (pices: Galaxiidae). Journal of Genetics 124: 237-249.
- Pourkazemi M (1996) Molecular and Biochemical genetic analysis of sturgeon stock from the South Caspian Sea. School of Biological Science, University of Wales. 258p.
- Rahmani H (2006) Population dynamics and genetic diversity of Shemaya, *Chalcalburnus chalcooides*, in Haraz, Shirud and Gazarud rivers. Gorgan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran. (In Farsi).
- Rezvani S (1997) Molecular population genetic of Sturgeon species in the south Caspian Sea. A ph.D. Thesis. School of Biological Sciences University of Wales.P.196.
- Sumbrook J, Russell DW (2001) Molecular Cloning a Laboratory Manual. Cold spring Harbor laboratory press. Cold spring Habor, New York.
- Slastenenko E (1955) The Fishes of the Black Sea Basin. The publication of the Meat and Fish Office, Istanbul-Turkey (in Turkish with English summery). 165p.
- Zardoya R, Meyer A(1996) Phylogenetic performance of mitochondrial protein coding genes in resolving relationships among vertebrates. Journal of Molecular Biology of Evolution, 13, 933-942.
- Wolf C, Hubner P, Luthy J (1999) Differentiation of the Sturgeon species by PCR- RFLP. Journal of Food Research International 32: 699-705.