

## بررسی نوع آکتینومیستهای کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA

Molecular identification of actinomycetes in the button mushroom compost using analysis of 16S rRNA gene restriction fragment patterns

محمد فارسی<sup>\*</sup>، علی پاکدین پاریزی<sup>۱</sup>، خلیل ملک زاده<sup>۲</sup>

۱- استاد گروه زیست فناوری قارچ‌های صنعتی جهاد دانشگاهی واحد مشهد  
۲- دانشجویان دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

Farsi M<sup>1</sup>, Pakdin Parizi A<sup>2</sup>, Malekzadeh KH<sup>1</sup>

1. Professor, Research group of Industrial Fungi Biotechnology, ACECR, Mashhad, Iran

2,3. PhD Students, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

\* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: mohfarsi@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۹۰/۰۲/۲۰ - تاریخ پذیرش: ۹۱/۰۷/۰۴)

### چکیده

آکتینومیستهای گرمادوست بدلیل توانایی تجزیه مواد سلولزی از اجزای اصلی میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای محسوب می‌شوند. این گروه همراه با میکرووارگانیسم‌های گرمادوست دیگر نقش مهمی در فرایند کمپوست‌سازی ایفا می‌کنند. از روش‌های مختلف مورفو‌لوزیکی، بیوشیمیایی و مولکولی برای شناسایی این گروه از باکتری‌ها استفاده شده است. روش‌های مولکولی مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) از جمله آنالیز الگوی برشی جزء کوچک ژن RNA ریبوزومی (16S rRNA) با آنزیم‌های برشی سریع و مطمئن برای شناسایی باکتری‌ها می‌باشد. مقایسه الگوی قطعات برشی ایزوله‌های جدادشده با الگوی تهیه شده از هضم توالی‌های متبر منشر شده از جنس‌های آکتینومیستهای آنالوگ در GenBank به صورت این سیلیکو، برشی سریع برای شناسایی آکتینومیستهای می‌باشد. آکتینومیستهای گرمادوست موجود در کمپوست با استفاده از روش ARDRA از روی محیط کشت و گرمخانه‌گذاری در دمای ۴۶°C جدادسازی شدند. ژن 16S rRNA هر ایزوله به طور جداگانه، با استفاده از PCR تکثیر و با آنزیم‌های برشی مورد هضم قرار گرفت. پس از تعیین الگوی برشی هر آنزیم با الکتروفورز روی ژل آکارز، از تکنیک تجزیه و تحلیل قطعات DNA ریبوزومی تکثیر شده (ARDRA) برای شناسایی ایزوله‌های ناشناخته استفاده شد. بیشترین آکتینومیستهای جدادسازی شده از کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای به جنس استرپتومایسنس تعلق داشتند. این گروه دارای اهمیت زیادی در تجزیه بقاوی‌گیاهی و تولید کمپوست می‌باشد.

### واژه‌های کلیدی

آکتینومیست،  
ژن 16S rRNA،  
کمپوست،  
*Agaricus bisporus*  
ARDRA

## مقدمه

کمپوست در زمان مایه‌زنی مخلوط کرده به طوریکه افزایش در عملکرد گزارش شده است (Fordyce 1970; Wiegant 1992). برای شناسایی آکتینومیست های هوایی از روش های مورفولوژیکی، تعیین خصوصیات شیمیایی دیواره سلولی، قندهای تشخیصی موجود در عصاره سلولی و تست های بیوشیمیایی استفاده می شود. با این وجود، این روش ها به صرف هزینه و زمان زیادی نیاز داشته و غالباً نمی توانند یک ایزو له را به یک جنس خاص منتسب کنند. روش های مبتنی بر PCR یک راه سریع و مطمئن برای شناسایی باکتری ها ارائه کرده اند (Cook and Harris 1987). در فرایند کمپوست سازی میکرووارگانیسم های گرمادوست متفاوتی از قبیل آکتینومیست ها، قارچ های گرمادوست و باکتری های گرمادوست فعالیت دارند. این میکرووارگانیسم ها علاوه بر فراهم کردن یک محیط مطلوب برای رشد میسلیوم قارچ، سوبستر ای نامناسبی برای ارگانیسم های رقابت کننده به وجود می آورند (Fordyce 1970).

آکتینومیست ها به عنوان اجزای اصلی میکروفلور کمپوست ها شناخته شده اند. این گروه از باکتری ها قادر به تولید آنتی بیوتیک ها و آنزیم های مختلف بوده و توانایی تجزیه مولکول های پیچیده مخصوصاً سلولز، لیگنوسلولز و لیگنین را دارا می باشند (Lacey 1997; Chang and Miles 2004; Busti et al. 2006). بهبود فرایند تهیه کمپوست و بدست آوردن کمپوست عالی برای پرورش قارچ با بهینه کردن ترکیب فلور میکروبی کمپوست می تواند عملکرد قارچ را افزایش دهد. برای بهینه نمودن ترکیب میکروفلور کمپوست، بایستی قارچها و باکتریهایی که در مرحله دوم کمپوست سازی دخالت دارند شناسایی شوند. در مرحله اول کمپوست سازی فرایندهای شیمیایی رخ می دهنند و در مرحله دوم کمپوست سازی تخمیر میکروبی اتفاق می افتد. با شناسایی دقیق باکتری های موثر در مرحله دوم کمپوست سازی و تلقیح انتخابی آنها به کمپوستی که مرحله اول را به خوبی پشت سر گذاشته است می توان کمپوستی انتخابی تولید کرد که از رشد میسلیوم (Pakdin et al. 2009) قارچ خوارکی بیشترین حمایت را داشته باشد. برخی از محققین به منظور سرعت بخشیدن به فرایند تهیه کمپوست یا افزایش عملکرد قارچ، تعدادی از میکرووارگانیسم های گرمادوست را به طور مصنوعی به کمپوست اضافه کرده اند. به طور مثال قارچ های گرمادوست در حین تهیه کمپوست اضافه شده اند و یا آکتینومیست ها را با

کارچ های خوارکی به دلیل ارزش غذیه ای و خصوصیات دارویی از مهم ترین محصولات باگبانی بوده و اهمیت تجاری قابل ملاحظه ای دارند (Fan et al. 2006; Farsi and Gordan 2009).

قارچ خوارکی تکمه ای سفید برای رشد بهینه به محیط رشد انتخابی و با کیفیت عالی به نام کمپوست نیاز دارد (Singer and Cook 2003). در فرایند کمپوست سازی میکرووارگانیسم های گرمادوست متفاوتی از قبیل آکتینومیست ها، قارچ های گرمادوست و باکتری های گرمادوست فعالیت دارند. این میکرووارگانیسم ها علاوه بر فراهم کردن یک محیط مطلوب برای رشد میسلیوم قارچ، سوبستر ای نامناسبی برای ارگانیسم های رقابت کننده به وجود می آورند (Fordyce 1970).

آکتینومیست ها به عنوان اجزای اصلی میکروفلور کمپوست ها شناخته شده اند. این گروه از باکتری ها قادر به تولید آنتی بیوتیک ها و آنزیم های مختلف بوده و توانایی تجزیه مولکول های پیچیده مخصوصاً سلولز، لیگنوسلولز و لیگنین را دارا می باشند (Lacey 1997; Chang and Miles 2004; Busti et al. 2006). بهبود فرایند تهیه کمپوست و بدست آوردن کمپوست عالی برای پرورش قارچ با بهینه کردن ترکیب فلور میکروبی کمپوست می تواند عملکرد قارچ را افزایش دهد. برای بهینه نمودن ترکیب میکروفلور کمپوست، بایستی قارچها و باکتریهایی که در مرحله دوم کمپوست سازی دخالت دارند شناسایی شوند. در مرحله اول کمپوست سازی فرایندهای شیمیایی رخ می دهنند و در مرحله دوم کمپوست سازی تخمیر میکروبی اتفاق می افتد. با شناسایی دقیق باکتری های موثر در مرحله دوم کمپوست سازی و تلقیح انتخابی آنها به کمپوستی که مرحله اول را به خوبی پشت سر گذاشته است می توان کمپوستی انتخابی تولید کرد که از رشد میسلیوم (Pakdin et al. 2009) قارچ خوارکی بیشترین حمایت را داشته باشد. برخی از محققین به منظور سرعت بخشیدن به فرایند تهیه کمپوست یا افزایش عملکرد قارچ، تعدادی از میکرووارگانیسم های گرمادوست را به طور مصنوعی به کمپوست اضافه کرده اند. به طور مثال قارچ های گرمادوست در حین تهیه کمپوست اضافه شده اند و یا آکتینومیست ها را با

در شناسایی باکتری‌ها از مشاهده میکروسکوپی و تست‌های بیوشیمیایی مانند رنگ‌آمیزی اسید-فست جزئی، هیدرولیز اوره، احیای نیترات، کاتالاز و تست مقاومت به لیزوزیم استفاده شد (Schaad 1988). ظاهر کلی باکتری‌ها بر روی محیط کشت آب-آگار نیز مورد بررسی قرار گرفت. کلیه ای متفاوت از نظر شکل ظاهری و بیوشیمیایی بر روی محیط کشت جدید برای اطمینان از خلوص آنها به صورت مخاطط کشت داده شدند. DNAی ژنومی باکتری از هر کشت خالص، برای بررسی‌های مولکولی جداسازی شد. برای این منظور تک کلیه‌ها در محیط کشت مایع LB در ۴۶ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت با ۲۰۰ دور در دقیقه رشد داده شدند. برای تهیه رسوب باکتری، چهار میلی‌لیتر محیط کشت باکتری به مدت ۹۰ ثانیه در ۱۳۰۰۰ pH ۷/۷) حل شد و به مدت دو دقیقه در ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. رسوب حاصل در بافر TE (۵۰۰ میکرولیتر بافر TE بصورت محلول درآمد. میکروتیوب‌ها به مدت ۱۰ دقیقه در آب جوش قرار داده شدند. نمونه‌ها بعد از جوشیدن به مدت پنج دقیقه در دمای محیط برای سرد شدن قرار گرفتند و سپس در ۷۵۰۰ دور در دقیقه به مدت سه دقیقه سانتریفیوژ شدند. محلول رویی (۳۰۰ میکرولیتر) به تیوب‌های جدید منتقل و برای آزمایشات بعدی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد.

#### واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

از آغازگرهای عمومی ۵'-AGAGTTGATCCTGGCTCAG-3' و ۳'-5'-ACGGCTACCTTGTACGACTT ۵ برای تکثیر توالی ژن ۱۶S rRNA استفاده شد (Weisburg et al. 1991). تکثیر ژن ۱۶S rRNA با استفاده از واکنش PCR با حجم نهایی ۵۰ میکرو لیتر برای هر مخلوط واکنش انجام شد. مواد لازم برای انجام واکنش از شرکت سیناژن خریداری شدند. چرخه حرارتی PCR به صورت مرحله و اسرشت سازی اولیه در دمای ۹۶ درجه سانتی‌گراد به مدت دو دقیقه، و اسرشت سازی در دمای ۹۶ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۵ ثانیه در بقیه چرخه‌ها، مرحله اتصال در دمای ۵۶ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۵ ثانیه، مرحله طویل شدن در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت دو دقیقه انجام گرفت. مرحله

فیلوزنیک در باسیلوس، کلوستریدیوم، موراکسلا و زانتاموناس استفاده شده است (Vaneechoutte 1998).

هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی مولکولی آکتینومیست‌های گرمادوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای بود تا با ایزوله نمودن نژادهای خالص و تکثیر و معروف آنها به کمپوست در اوایل مرحله دوم کمپوست‌سازی، تاثیر انفرادی و یا چند تابی آنها بر عمل آوری کمپوست و در نتیجه عملکرد قارچ خوراکی بررسی شود.

## مواد و روش‌ها

### نمونه‌های کمپوست

نمونه‌های مورد استفاده در این تحقیق در زمان‌های مختلف مرحله دوم تهیه کمپوست از مرکز تحقیقات قارچ‌های خوراکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و کارخانجات صنعتی تولید قارچ خوراکی در استان خراسان رضوی جمع آوری شدند. نمونه‌ها تا زمان بررسی در کیسه‌های پلاستیکی در دمای ۴°C نگهداری شدند.

### روش‌های جداسازی

از تکنیک رقیق‌سازی و تهیه غلاظت‌های سریالی برای جداسازی آکتینومیست‌ها استفاده شد. برای بررسی تاثیر محیط کشت‌های مختلف در جداسازی این دسته از باکتری‌ها از محیط کشت‌های کمپوست مخمر آگار (Rainey 1989)، نوترینت آگار با غلاظت نیمه، آب Czapek Dox (WYA) و زاپکدکس آگار (Atlas 2004) حاوی قارچ کش نیستاتین (۱۰۰ واحد در میلی‌لیتر) به منظور جلوگیری از رشد قارچ‌ها، استفاده شد. در تیمار دیگر از محلول ۰/۰۵ درصد سدیم دودسیل سولفات (SDS) برای کشتن باکتری‌های ناخواسته و فعال کردن اسپور آکتینومیست‌ها استفاده شد. به منظور جداسازی انتخابی باکتری‌ها آنتی‌بیوتیک ریفارپیسین (۵ میکروگرم در میلی‌لیتر) به محیط کشت اضافه شد. پلیت‌های جداسازی در ۴۶°C نگهداری و به مدت دو هفته روزانه مورد بررسی قرار گرفتند. تک کلیه ای ظاهر شده به محیط کشت جدید منتقل و خالص سازی شدند.

### روش‌های شناسایی

زایپکدکس آگار نگهداری شده در دمای  $46^{\circ}\text{C}$  در مدت زمان کوتاهتری ظاهر شده و رشد سریع تری داشتند. دلیل این امر تشابه ترکیب این محیط کشت با شرایط طبیعی رشد این دسته از میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. محیط کشت WYA به علت ضعیف بودن از نظر غذایی محیط بسیار مناسبی برای جداسازی آکتینومیست‌ها بود. در این محیط باکتری‌های ناخواسته به ندرت رشد نمودند. هرچند مدت زمان نسبتاً طولانی برای ظاهر شدن کلته باکتری‌ها نیاز بود. آکتینومیست‌ها به خوبی در محیط کشت زایپک دوکس آگار رشد کردند، هر چند باکتری‌های دیگر نیز به خوبی دارای این توانایی بودند. عملاً هیچ کلنه باکتری‌ای به علت رشد بسیار سریع باکتری‌های گرمادوست در محیط نوتریت آگار از این محیط جداسازی نشد. قارچ‌کش نیستاتین در مدت زمان جداسازی و رشد باکتری‌ها به صورت کامل از رشد قارچ‌ها جلوگیری کرد. افزودن ریفامپیسین به محیط کشت سبب جداسازی انتخابی باکتری‌هایی شد که در آزمایشات بعد مشخص شد متعلق به جنس‌های ترمومونوسپورا و استرپتومایسین می‌باشند. در تیمار دیگر که با استفاده از  $0.05\text{ }\mu\text{g}/\text{mL}$  درصد SDS انجام شد، علاوه بر اینکه رشد باکتری‌های ناخواسته در محیط کشت محدود شد، باکتری‌های با ظاهر گچی و خشی در محیط ظاهر شدند که نتیجه فعال شدن اسپور آکتینومیست‌ها بود. بعد از جداسازی و خالص کردن باکتری‌ها، ظاهر کلنه برخی از آنها بر روی محیط کشت کمپوست آگار با سه محیط دیگر متفاوت بود.



شکل ۱- اندام هوایی و ظاهر گچی بر روی محیط کشت کمپوست آگار

آخر طویل شدن به مدت ۷ دقیقه بود. این برنامه در ۳۰ چرخه تکرار شد. برای اطمینان از اندازه صحیح قطعه تکثیر شده از الکتروفورز در ژل آگارز یک درصد استفاده شد.

هضم توالي‌های ژن 16S rRNA موجود در پایگاه داده NCBI در این سیلیکو


توالي‌های ژن 16S rRNA آکتینومیست‌های گرمادوست موجود در پایگاه داده NCBI پس از استخراج و دسته‌بندی با استفاده از نرم‌افزار تحت وب v2 NebCutter با آنزیم‌های برشی تجاری هضم شدند. براساس الگوهای برشی بدست آمده، آنزیم‌هایی که توانایی تفکیک آکتینومیست‌های گرمادوست را دارا بودند از بین آنزیم‌های موجود انتخاب شدند.

هضم با آنزیم‌های برشی و تجزیه و تحلیل الگوهای برشی از آنزیم‌های برشی *MboI*, *KpnI*, *SphI*, *PstI*, *HindIII*, *SnaBI*, 16S rRNA برای تجزیه و تحلیل ژن *Sall*, *Scal*, *AgeI*, *AsnI* استفاده شد. این آنزیم‌ها از شرکت فرمتاز (Fermentas, St. Leon-Roth, Germany) خریداری شدند. هضم محصولات واکنش PCR براساس شرایط بهینه برای هر آنزیم انجام گرفت. محصولات هضم آنزیمی در ژل آگارز ۱/۵ درصد الکتروفورز شدند. الگوهای برشی بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار TotalLab TL120 تجزیه و تحلیل شدند.

## نتایج و بحث

از آنجا که میکروارگانیسم‌های دخیل در کمپوست‌سازی نقش عملده‌ای در کیفیت نهایی کمپوست و عملکرد آن ایفا می‌نمایند، می‌توان با شناسایی و دستورالعمل میکروفلور کمپوست در طی مراحل مختلف فرایند کمپوست‌سازی و مهیا کردن زمینه رشد برای ارگانیسم‌های مطلوب، به اهداف مورد نظر دست یافت. با توجه به این که فلور میکروبی کمپوست تحت تاثیر ترکیبات متفاوت مواد خام آن و نوع اقلیم قرار می‌گیرد، شناسایی آکتینومیست‌های با قدرت تجزیه کنندگی بالا و گزینش آنها برای تلقیح به کمپوست مرحله دوم به افزایش عملکرد قارچ خوارکی دکمه‌ای کمک قابل توجهی می‌نماید.

کلنه‌ای باکتری روی محیط کشت کمپوست آگار نسبت به محیط کشت‌های نوترینت آگار با غلظت نیمه و WYA و



شکل ۲- ظاهر کلی باکتری‌ها روی محیط کشت آب آگار (بزرگنمایی ۲۵ برابر)

آکتینومیست شد. براساس الگوهای برشی این سیلیکو بدست آمده از توالی‌های زن 16S rRNA آکتینومیست‌های گرمادوست، آنزیم *MboI* به عنوان آنزیم کلیدی برای گروه‌بندی جدایه‌ها استفاده شد. بر اساس الگوی برشی این آنزیم (شکل ۳) آکتینومیست‌های گرمادوست، که براساس اطلاعات بدست آمده از تحقیقات انجام گرفته بر میکروفلور کمپوست‌ها انتخاب شده بودند، را می‌توان به سه گروه اصلی با الگوی باندی متمايز (جدول ۱) تقسیم‌بندی کرد. Cook and Meyers (2003) در تحقیق خود این آنزیم را مبنای گروه‌بندی آکتینومیست‌ها برای شناسایی بر اساس الگوی هضم حاصل از آنزیم‌های برشی قرار دادند.

بر اساس جدول ۱، باکتری‌های جداسازی شده از کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از الگوی برشی آنزیم *MboI* را می‌توان در یکی از سه گروه جدول ۲ قرار داد. بر اساس الگوی برشی این سیلیکو بدست آمده از هضم زن 16S rRNA آکتینومیست‌های گرمادوست (شکل ۴)، جدایه‌های هر گروه از جدول شماره ۲ با استفاده از

اندام‌های هوایی و ظاهر گچی باکتری‌ها در محیط کشت کمپوست آگار کاملاً مشخص بود (شکل ۱)، درحالی که در سه محیط دیگر یا این اندام‌های هوایی تشکیل نمی‌شد یا بعد از مدت زمان نسبتاً طولانی با نمود کم ظاهر می‌شدند. اندام هوایی جدایه‌های مختلف بر روی محیط کشت آب آگار با هم متفاوت بودند. در شکل ۲ ظاهر کلی چند جدایه باکتری روی محیط کشت آب آگار نشان داده شده است. پس از انتخاب جدایه‌های آکتینومیست براساس خصوصیات ظاهری بر روی محیط کشت، این جدایه‌ها مورد بررسی‌های شیمیابی قرار گرفتند. پس از انجام رنگ‌آمیزی گرم برای اطمینان از گرم مثبت بودن باکتری‌های انتخاب شده، تست‌های رنگ‌آمیزی اسید-فست جزئی، هیدرولیز اوره، احیای نیترات، کاتالاز و تست مقاومت به لیزوزیم نیز بر روی جدایه‌ها انجام شد. جدایه‌های با ظاهر مورفولوژیکی و خصوصیات شیمیابی متفاوت برای بررسی‌های مولکولی انتخاب شدند.

تکثیر زن 16S rRNA با استفاده از آغازگرهای عمومی منجر به تولید قطعه‌ای با طول تقریبی ۱۵۰۰ جفت باز در جدایه‌های

جدول ۱- گروه بندی آکتینومیست ها بر اساس الگوی برشی آنزیم *MboI*


گروه ۱	بزرگترین قطعه DNA کوچکتر از ۷۵۰ جفت باز
گروه ۲	دو قطعه متمایز کوچکتر از ۹۸۰ جفت باز: ۳۲۰ تا ۳۵۰ جفت باز و ۷۶۰ تا ۹۸۰ جفت باز)
گروه ۳	بزرگترین قطعه DNA ۹۸۰ تا ۱۳۵۰ جفت باز

جدول ۲- تقسیم بندی جدایه های آکتینومیست به سه گروه اصلی براساس الگوی برشی آنزیم *MboI*


الگوی برشی با آنزیم <i>MboI</i>	جدایه باکتری
گروه شماره ۱	<i>ic24, ic21, ic20, ic19, ic17, ic15, ic11, ic9, ic8, ic7, ic22, ic14, ic12, ic1</i>
گروه شماره ۲	<i>ic23, ic18, ic16</i>
گروه شماره ۳	<i>ic13</i>

تولید کمپوست می باشدن (Tuomela et al. 2000). از این رو حضور اعضای مختلف این جنس در جمعیت میکروبی کمپوست منطقی به نظر می رسد. در سایر تحقیقات انجام شده بمنظور بررسی جمعیت میکروبی کمپوست نیز بیشترین جدایه های آکتینومیست به این جنس تعلق داشته اند (Boulter et al. 2002; Ryckeboer et al. 2003; Silva et al. 2009) که در جنس ترمومونوسپورا قرار گرفته است از محیط کشت حاوی ریفامپیسین (۵ میکرو گرم در میلی لیتر) بدست آمد. با استفاده از این آنتی بیوتیک در محیط کشت به صورت انتخابی می توان به جدا کردن باکتری های این جنس پرداخت. از ریفامپیسین برای جداسازی آکتینومیست ها در چندین تحقیق استفاده شده است (Athalye et al. 1981; Zakhrova et al. 2003). ساکارومونوسپورا، ساکارولپلی سپورا و میکروبیسپورا از دیگر جنس های متعلق به آکتینومیست های گرمادوست نسبت به جنس استرپتو مایسنس دارای فراوانی کمتری در کمپوست قارچ خوارکی می باشدند. شکل ظاهری کلی باکتری های جنس نوکاردیا روی محیط کشت آگار شبیه جنس استرپتو مایسنس می باشد. استفاده از تفاوت های مورfolوژیکی برای تمایز میان این دو جنس به تنها ی کافی نیست، در حالیکه با استفاده از تکنیک ARDRA می توان تفاوت میان این دو جنس را به آسانی مشخص کرد. برای

آنژیم های برشی مناسب مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. در شکل ۳ الگوی برشی و آنزیم های مورد نیاز برای شناسایی آکتینومیست های گرمادوست هر گروه نشان داده شده است. با استفاده از آنزیم های برشی *KpnI, AsnI, SphI, Scal* و *PstI* و الگوی برشی بدست آمده از آنها آکتینومیست های گرمادوست گروه اول تا حد جنس شناسایی شدند. آکتینومیست های این گروه در سه جنس استرپتو مایسنس، نوکاردیا و میکروبیسپورا قرار گرفتند. گروه دوم با استفاده از الگوی برشی بدست آمده از آنزیم های *SphI, AsnI, KpnI, PstI, HindIII* و *HindIII* بررسی شده و در دو جنس ساکارومونوسپورا و ترمومونوسپورا قرار داده شدند. در شناسایی گروه سوم نیز که تنها دارای یک عضو بود، پس از هضم محصول PCR ۱۶S rRNA با آنزیم *AsnI* براساس شکل ۳ از آنزیم های *SnaBI, SalI, SphI* و *AgeI* و *SnaBI* استفاده شد. براساس تجزیه و تحلیل الگوی برشی مشخص شد که این جدایه متعلق به جنس ساکارولپلی اسپورا می باشد. الگوی برشی برای هر جدایه با استفاده از آنزیم های استفاده شده برای شناسایی در جدول ۳ و نتایج نهایی شناسایی در جدول ۴ آورده شده است. با توجه به اطلاعات خلاصه شده جدول ۴، بیشترین آکتینومیست های جدایه ای به جنس استرپتو مایسنس تعلق دارند. این دسته از باکتری ها دارای نقش مهم و محوری در تجزیه بقا یابی گیاهی و



شکل ۳- الگوی هضم زن 16S rRNA با استفاده از آنزیم *MboI*. از سمت چپ، چاهک شماره ۱) سایز مارکر 100 bp؛ سایر چاهک‌ها الگوی هضم تعدادی از باکتری‌های جداسازی شده (نام جدایه در بالای چاهک آورده شده است).



شکل ۴- گروه‌بندی آکتینومیستهای گرمادوست قارچ دکمه‌ای براساس الگوی هضمی آنزیم‌های برشی. جنس‌های هر گروه در پایان مسیر برشی مشخص شده است. در هر مسیر پس از هضم با آنزیم برشی ذکر شده در مستطیل، عدم برش با علامت  $\times$  و باندهای حاصل از هضم در مستطیل نشان داده شده است.

بورسی تنوع آکتینومیست های کمپوست قارچ خود را کی ...

محمد فارسی و همکاران

جدول ۳- نتایج هضم هر جدایه با استفاده از آنزیم های برشی مناسب برای شناسایی اعضای گروه های سه گانه مشخص شده با الگوی برشی آنزیم *MboI*

		شماره ایزو لوهای جداسازی شده																	
		<i>ic1</i>	<i>ic7</i>	<i>ic8</i>	<i>ic9</i>	<i>ic11</i>	<i>ic12</i>	<i>ic13</i>	<i>ic14</i>	<i>ic15</i>	<i>ic16</i>	<i>ic17</i>	<i>ic18</i>	<i>ic19</i>	<i>ic20</i>	<i>ic21</i>	<i>ic22</i>	<i>ic23</i>	<i>ic24</i>
<i>AgeI</i>								—											
<i>AsnI</i>	—	۵۵۰ ۹۵۰	— —	۵۵۰ ۹۵۰	— —	۵۰۰ ۱۰۰	— —	— —	— —	۵۵۰ ۹۵۰	— —	۵۵۰ ۹۵۰	— —	۵۵۰ ۹۵۰	۵۵۰ ۹۵۰	— —	— —	۵۵۰ ۹۵۰	— —
<i>HindIII</i>										— —									
<i>KpnI</i>	۴۰۰ ۱۰۰۰		۴۰۰ ۱۰۰۰	۴۰۰ ۱۰۰۰		۴۰۰ ۱۰۰۰		۴۰۰ ۱۰۰۰	— —	۴۰۰ ۱۰۰۰	۴۰۰ ۱۰۰۰	۴۰۰ ۱۰۰۰	۴۰۰ ۱۰۰۰	۴۰۰ ۱۰۰۰			۴۰۰ ۱۰۰۰		
<i>MboI</i>	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۲۵۰ <۲۰۰	۶۵۰ ۶۰۰ ۲۵۰	۱۰۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۲۵۰ <۲۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۹۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۹۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۲۵۰ <۲۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۲۵۰ <۲۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۲۵۰ <۲۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰	۷۰۰ ۲×۳۰۰ ۲۰۰
<i>PstI</i>									— —								۴۰۰ ۱۰۰۰		
<i>Sall</i>								— —											
<i>Scal</i>	۶۰۰ ۹۰۰				۶۰۰ ۹۰۰									۶۰۰ ۹۰۰	۶۰۰ ۹۰۰			۶۰۰ ۹۰۰	
<i>SnaBI</i>								۵۰۰ ۱۰۰۰											
<i>SphI</i>	—		— —	۴۰۰ ۱۰۰۰		۴۰۰ ۱۰۰۰	۲×۳۰۰ ۹۰۰	— —			— —		۴۵۰ ۱۰۵۰			— —	— —		

نمونه‌های آنالیز الگوهای هضم ژن rRNA 16S در آکتینومیست‌های هوایی گرمادوست با استفاده از آنزیم‌های برشی ما را قادر به گروه‌بندی و شناسایی ایزووله‌های جداسازی شده تا حد جنس نمود. با استفاده از این روش مولکولی، کلندی‌های باکتریایی که دارای خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی متفاوت بودند، بررسی شدند و نشان داده شد که این کلندی‌ها علیرغم وجود تفاوت می‌توانند به یک جنس تعلق داشته باشند.

هرچند در تحقیق حاضر تنها از کمپوست‌های قارچ خوراکی موجود در استان خراسان رضوی نمونه‌گیری انجام گرفته است، اما الگوی کلی فراوانی و جنس‌های آکتینومیست‌های گرمادوست در کمپوست‌های قارچ خوراکی با توجه به نتایج سایر محققین نسبتاً ثابت می‌باشد. بنابراین از الگوی انگشت‌نگاری ARDRA جدایه‌های آکتینومیست بدست‌آمده در این تحقیق می‌توان برای ساخت پایگاه داده برای شناسایی این گروه از باکتری‌ها در تحقیقات دیگر استفاده نمود.

#### منابع

- Athalye M, Lacey J, Goodfellow M (1981) Selective Isolation and Enumeration of Actinomycetes using Rifampicin. *Journal of Applied Microbiology* 51: 289-297.  
 Atlas RM (2004) Handbook of Microbiological Media 3rd ed. CRC Press LLC.  
 Boulter J, Trevors J, Boland G (2002) Microbial studies of compost: bacterial identification and their potential for turfgrass pathogen suppression. *World Journal of Microbiology and Biotechnology* 18: 661-671.  
 Buchanan RE, Gibbons NE (1974) Bergey's manual of determinative bacteriology. 8th ed. The Williams and Wilkins Co, Baltimore 747-842.  
 Busti E, Monciardini P, Cavaletti L (2006) Antibiotic-producing ability by representatives of a newly discovered lineage of actinomycetes. *Microbiology* 152:675-683.  
 Chang S, Miles PG (2004) Mushrooms cultivation Nutritional value Medicinal effect and environmental Impact.2<sup>nd</sup> edn. Bocaraton CRC press.  
 Clarridge JE (2004) Impact of 16S rRNA gene sequence analysis for identification of bacteria on clinical microbiology and infectious diseases. *Clinical Microbiology Reviews* 17: 840-862.  
 Cook AE, Meyers PR (2003) Rapid identification of filamentous actinomycetes to the genus level using genus-specific 16S rRNA gene restriction fragment patterns.

شناسایی گونه‌های اسیتوباکتر تکنیک ARDRA با سایر روش‌های مولکولی مقایسه شده و توانایی این تکنیک در شناسایی این گروه از باکتری‌ها نشان داده شده است. (Koeleman et al. 1998). در بررسی نوع میکروبی در کمپوست‌های سنتیک از تکنیک ARDRA استفاده شده و با استفاده از این روش شناسایی طیف گسترده‌ای از گونه‌های بسیار زندیک به هم آکتینومیست‌های موجود در کمپوست انجام گرفته است (Dees and Ghiorse 2001).

در این تحقیق نشان داده شد که با استفاده از تکثیر ژن محافظت شده 16S و هضم آن با استفاده از آنزیم‌های برشی مناسب می‌توان برای هر باکتری یک الگوی برشی تهیه نمود. با مقایسه الگوی برشی تهیه شده با الگوهای برشی بدست آمده از هضم این سیلیکو توالی‌های ژن rRNA 16S ثبت شده در پایگاه داده GenBank می‌توان آکتینومیست‌های موجود در کمپوست را برای تسهیل شناسایی به گروه‌های مجزا دسته‌بندی کرد. به دلیل وجود خصوصیات مختلف در هر جنس و متفاوت بودن مشخصه‌های بیوشیمیایی گونه‌ها، این دسته‌بندی می‌تواند کمک مؤثری در انتخاب آکتینومیست‌های مورد نظر و متمنظر بررسی روابط تکاملی میان باکتری‌ها نیز می‌توان استفاده کرد (Heyndrickx et al. 1996). پس از شناسایی باکتری‌ها با استفاده از تکنیک ARDRA نتایج بدست‌آمده از تست‌های بیوشیمیایی برای هر جدایه با اطلاعات موجود در کتاب‌های راهنمای Bergey مقایسه شد (Buchanan and Gibbons 1974; Goodfellow and Jones 2009). بدلیل اینکه شناسایی جدایه‌ها تا حد گونه هدف این تحقیق نمی‌باشد، با وجود انتباط میان این نتایج و اطلاعات موجود برای جنس‌های مختلف آکتینومیست، نتیجه‌گیری کلی و انتساب جدایه‌ها به یک گونه خاص انجام نشد. منظور شناسایی گونه‌های آکتینومیست جداسازی شده انجام تست‌های بیوشیمیایی تکمیلی مورد نیاز می‌باشد. علاوه بر این می‌توان از تکنیک‌های دیگر مانند توالی‌یابی ژن‌های 16S rRNA (Janda and Abbott 1997) یا ITS (Mollet et al. 2007)، بررسی نواحی<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Multilocus sequence typing

<sup>1</sup> Internal Transcribed Spacer region

- Dees PM, Ghiorse WC (2001) Microbial diversity in hot synthetic compost as revealed by PCR-amplified rRNA sequences from cultivated isolates and extracted DNA. FEMS Microbiology Ecology 35: 207-216.
- Dietz A (1988) Practical and proposed cooperative investigational criteria for taxonomic studies of the actinomycetes. In: Okami Y, Beppu T, Ogawara H (Eds.) Biology of Actinomycetes. Japanese Scientific Societies Press Tokyo 203-209.
- Dijkshoorn LB, van Harsselaar I, Tjernberg PJ, Bouvet M, Vaneechoutte M (1998) Evaluation of amplified ribosomal DNA restriction analysis for identification of *Acinetobacter* genomic species. Systematic Applied Microbiology 21: 33-39.
- Fan L, Pan H, Soccol AT, Pandey A, Soccol CR (2006) Advances in Mushroom Research in the Last Decade. Food Technology Biotechnology 44: 303-311.
- Farsi M, Gordani HR (2009) Cultivation and breeding of mushrooms. Jahad-e Daneshgahi Mashhad 2<sup>nd</sup> ed. (In Farsi)
- Fordyce C (1970) Relative numbers of certain microbial groups present in compost used for mushroom (*Agaricus bisporus*) propagation. Applied Microbiology 196-199.
- Goodfellow M, Jones AL (2009) Family IX. Thermoactinomycetaceae. In: De Vos P, Garrity GM, Jones D, Krieg NR, Ludwig W, Rainey FA, Schleifer K, Whitman WB (Eds). Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Vol 3: The Firmicutes. 2nd edn. Springer London 434- 453.
- Goto K, Omura T, Hara Y, Sadaie Y (2000) Application of the partial 16S rDNA sequence as an index for rapid identification of species in the genus *Bacillus*. Journal of Genetics Applied Microbiology 46: 1-8.
- Heyndrickx M, Vauterin L, Vandamme P, Kersters K, De Vos P (1996) Applicability of combined amplified ribosomal DNA restriction analysis (ARDRA) patterns in bacterial phylogeny and taxonomy. Journal of Microbiology Methods 26: 247-259.
- Janda JM, Abbott SL (2007) 16S rRNA Gene Sequencing for Bacterial Identification in the Diagnostic Laboratory: Pluses, Perils, and Pitfalls. Journal of Clinical Microbiology 45: 2761-2764.
- Koeleman JGM, Stoop J, Biesmans DJ, Savelkoul PHM, Vandebroucke-graafs CMJE (1998) Comparison of Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis, Random Amplified Polymorphic DNA Analysis and Amplified Fragment Length Polymorphism Fingerprinting for Identification of *Acinetobacter* Genomic Species and Typing of *Acinetobacter baumannii*. Journal of Clinical Microbiology 36: 2522-2529.
- Lacey J (1997) Actinomycetes in composting. Annual Agricultural and Environmental Medicine 4: 113-121.
- Li H, Medina F, Vinson SB, Coates CJ (2005) Isolation characterization and molecular identification of bacteria from the red imported fire ant (*Solenopsis invicta*) midgut. Journal of Invertebrate Pathology 89: 203-209.
- Misbah S, Hassan H, Yusof MY, Hanifah YA, AbuBakar S (2005) Genomic species identification of *Actinobacter* of clinical isolates by 16S rDNA sequencing. Singapore Medicine Journal 46: 461-464.
- International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 53: 1907-1915.
- Molle C, Drancourt M, Raoult D (1997) *rpoB* sequence analysis as a novel basis for bacterial identification. Molecular Microbiology 26: 1005-1011.
- Pakdin A, Farsi M, Marashi H (2010) Effect of biomass and incubation of actinomycetes in compost on mycelium growth of button mushroom. Journal of Water and Soil 23: 10-19. (In Farsi)
- Rainey PB (1989) A new laboratory medium for the cultivation of *Agaricus bisporus*. New Zealand Natural Sciences 16:109-112.
- Ryckeboer J, Mergaert J, Vaes K, Klammer S, De Clercq D, Coosemans J, Insam H, Swings J (2003) A survey of bacteria and fungi occurring during composting and self-heating process. Annual Microbiology 53: 349-410.
- Schaad NW (1988) Laboratory guide for identification of plant Pathogenic bacteria 2nd edition APS Press.
- Scott R, Santos SR, Ochman H (2004) Identification and phylogenetic sorting of bacterial lineages with universally conserved genes and proteins. Environmental Microbiology 6: 754-759.
- Silva CF, Azevedo RS, Braga C, Da Silva R, Souza Dias E, Schwan RF (2009) Microbial diversity in a bagasse-based compost prepared for the production of *Agaricus brasiliensis*. Brazilian Journal of Microbiology 40: 590-600.
- Singer R, Harris B (1987) Mushrooms and Truffles Botany cultivation and utilization. 2<sup>nd</sup> rev. Koeltz Scientific Books, Koenigstein Federal republic of Germany.
- Trcek J (2005) Quick identification of acetic acid bacteria based on nucleotide sequences of the 16S-23S rDNA internal transcribed spacer region and of the PQQ-dependent alcohol dehydrogenase gene. Systematic and Applied Microbiology 28: 735-745.
- Tuomela M, Vikman M, Ataca A, Itävaara M (2000) Biodegradation of lignin in a compost environment: a review. Bioresource Technology 72: 169-183.
- Vaneechoutte M, Boerlin P, Tichy H, Bannerman E, Jager B, Bille J (1998) Comparison of PCR-based DNA fingerprinting techniques for the identification of *Listeria* species and their use for atypical *Listeria* isolates. International Journal of Systematic Bacteriology 48: 127-139.
- Wiegant WM (1992) Growth characteristics of the thermophilic fungus *Scytalidium thermophilum* in relation to production of mushroom compost. Applied and Environmental Microbiology 1301-1307.
- Weisburg WG, Barns SM, Pelletier DA, Lane DJ (1991) 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. Journal of Bacteriology 173: 697-703.
- Zakharova OS, Zenova GM, Zvyagintsev DG (2003) Some approaches to the selective isolation of actinomycetes of the genus *actinomadura* from soil. Microbiology 72: 110-113.