

گزینش به کمک نشانگر SCAR برای تولید ارقام مقاوم به فوزاریوم (*Fusarium oxysporum* f.sp. *melonis*) در طالبی

Marker assisted selection using SCAR to develop *Fusarium* (*Fusarium oxysporum* f.sp. *melonis*) resistant melon

شیمای تقی‌خانی^۱، حسین رامشینی^{۱*}، سیداحمد سادات‌نوری^۱، محمود لطفی^۲، علی ایزدی‌دربندی^۱، محمدرضا نقدی^۲

- ۱- به‌ترتیب دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشیار، استاد، دانشیار، پاکدشت، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
۲- به‌ترتیب دانشیار، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، پاکدشت، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه علوم باغبانی

Taghikhani Sh¹, Ramshini H^{*1}, Sadat Noori SA¹, Lotfi M², Izadi Darbandi A¹,
Naghdi MR²

- 1- Graduate Student, Associate professor, Professor, Associate professor, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Agricultural College of Aburaihan, University of Tehran
2- Associate professor, Graduate Student, Department of Horticulture, Agricultural College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran

* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: ramshini_h@ut.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۹۶/۲/۵ - تاریخ پذیرش: ۹۶/۵/۱۷)

چکیده

طالبی محصول مهمی است که به‌صورت گسترده در کشورهای مناطق معتدله رشد می‌کند. یکی از مهم‌ترین بیماری‌های این گیاه پژمردگی آوندی ناشی از *Fusarium oxysporum* f.sp. *melonis* (Fom) است. این قارچ سبب ضرر و زیان‌های مهم عملکردی و کاهش کیفیت میوه در طالبی در سراسر جهان می‌شود. اصلاح ژنتیکی گیاه مؤثرترین راه برای کنترل این بیماری است. تاکنون برای این قارچ چهار نژاد صفر، ۱، ۲ و ۱/۲ گزارش شده‌است که نژاد ۱ از نظر اقتصادی ضررهای زیادی در کشور به‌ویژه در نیمه شمالی وارد می‌کند. ارقام محلی مهم از جمله ساوه، ریش بابا و تیل طرق به‌نژاد ۱ حساس هستند. در این مطالعه ژن مقاومت از یک رقم خارجی به‌نام ایزابل به ارقام حساس یاده شده با کمک گزینش به کمک نشانگر انتقال داده شد. غربال گیاهان در نسل اول و دوم تلاقی برگشتی با روش مایه‌زنی گیاه‌چه‌ها انجام گرفت. تک ژن غالب Fom-2 باعث ایجاد مقاومت در برابر نژاد صفر و ۱ می‌شود. این ژن توالی‌یابی شده و تفاوت‌های موجود در توالی آلل‌های مقاوم و حساس شناسایی شده‌است. به‌منظور تایید گیاهان مقاوم در نسل دوم تلاقی برگشتی پس از غربال با روش مایه‌زنی، از نشانگر SCAR مبتنی بر تفاوت توالی استفاده شد. مقاومت بیش‌تر گیاهان حاصل از غربال با روش مایه‌زنی با روش مولکولی نیز تایید شد اگر چه تعدادی گیاه حساس شناسایی شدند که بیانگر نقص در روش مایه‌زنی و اعتبار بیش‌تر روش مولکولی در تعیین ژنوتیپ گیاهان بود. گیاهان تایید شده برای تولید نسل BC₃F₁ با سه والد تکراری تلاقی برگشتی داده شدند. با توجه به عملکرد و کیفیت والد بخشنده و نتایج ارزیابی نسل BC₂F₁ به‌نظر می‌رسد با خودگشتی گیاهان BC₃F₁ بتوان ارقام خالص مقاوم را معرفی کرد.

واژه‌های کلیدی

پژمردگی آوندی

تلاقی برگشتی

رقم ایزابل

ژن مقاومت Fom-2

مقدمه

طالبی (*Cucumis melo* L.) به خانواده کدوئیان تعلق دارد. این خانواده شامل گیاهان مهم دیگری مانند خیار، هندوانه و کدو است. این گونه دارای انواع مختلفی است که طالبی متعلق به گروه *Cantalupensis* است (Prohens and Nuez 2007). این گیاه یک محصول مهم باغبانی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است، اما به صورت گسترده در کشورهای مناطق معتدله نیز رشد می کند (Oumouloud et al. 2013). به گزارش فائو ایران با تولید حدود یک و نیم میلیون تن در سال ۲۰۱۳ پس از چین و ترکیه سومین تولیدکننده انواع طالبی و خربزه در جهان بوده است (FAO 2013).

یکی از جدی ترین و مهم ترین بیماری هایی که باعث بروز خسارت در این محصول می شود، پژمردگی آوندی است. عامل این بیماری یک قارچ خاکزی به نام *Fusarium oxysporum* f.sp. *melonis* (Fom) است (Oumouloud et al. 2012). بر اساس بیماری زایی روی ارقام افتراقی طالبی، این قارچ به چهار نژاد صفر، ۱، ۲ و ۱/۲ طبقه بندی شده است (Tezuka et al. 2011) که نژاد ۱ از نظر اقتصادی ضررهای زیادی در کشور ایران وارد می کند (Madadkhah et al. 2012). عامل این بیماری روی بقایای محصولات غیرمیزبان و ریشه گیاهانی که در تناوب قرار می گیرند زنده می ماند و یا به صورت کلأمیدوسپور برای چند دهه دوام می آورد (Tezuka et al. 2011). برای کنترل این بیماری می توان از روش های گوناگونی مانند از بین بردن بقایای گیاهی حامل قارچ، تناوب با گیاهان غیرمیزبان مانند گندم و جو، ضدعفونی کردن بذر و بستر آن، به کارگیری ترکیبات بیولوژیک داخل خاک علیه این قارچ و روش های طبیعی مانند آفتاب دهی خاک ها در تابستان استفاده کرد. هم چنین تقویت گیاه با استفاده از کودهای مناسب، مراقبت های زراعی و آبیاری به موقع می تواند تا حدی موثر باشد. کاربرد سموم شیمیایی نیز در کنترل این بیماری مؤثر است، اما به علت سرطان زایی، ممنوع شده اند. بنابراین در حال حاضر کارآمدترین و مؤثرترین روش ایجاد مقاومت در برابر پژمردگی آوندی، استفاده از ژن های مقاومت می باشد (Tezuka et al. 2009). تک ژن های غالب *Fom-1* و *Fom-2* به ترتیب باعث ایجاد مقاومت در برابر نژادهای صفر و ۲ و نژادهای صفر و ۱

می شوند (Yi-HongWang et al. 2000). از بین دو نژاد ۱ و ۲، نژاد ۱ گسترش بیش تری در ایران به ویژه در استان های نیمه شمالی کشور دارند و خسارت این نژاد به محصول نیز بیشتر از نژاد ۲ است (Banihashemi 2010). تک ژن غالب *Fom-2* باعث ایجاد مقاومت در برابر نژاد صفر و ۱ می شود که با وجود نشانگر مولکولی مرتبط با این ژن می توان در برنامه اصلاحی "تلاقی برگشتی به کمک نشانگر" برای اصلاح ارقام به منظور مقاومت به این نژاد استفاده کرد. ژن *Fom-2* پس از نقشه یابی در سال ۲۰۰۴ توالی یابی شد که با شماره دسترسی DQ287965 در پایگاه اطلاعاتی داده های زیست فناوری (NCBI) توالی آن را می توان مشاهده کرد (Joobeur et al. 2004). از آن پس بر اساس توالی این ژن نشانگرهای مبتنی بر توالی^۱ طراحی و استفاده شده اند که می توان از آنها در برنامه های اصلاحی استفاده کرد (Oumouloud et al. 2012). در این روش برای شناسایی گیاهان مقاوم و حساس استفاده از عامل بیماری زا برای غربال گیاهان ضرورتی ندارد و با توجه به ژنوتیپ نشانگری می توان ژنوتیپ گیاه برای مکان ژنی مقاومت را تعیین کرد.

تاکنون از روش تلاقی برگشتی به کمک نشانگر برای اصلاح بسیاری از گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی استفاده شده است. بیماری کوتولگی زرد جو توسط ویروس BYDV ایجاد می شود. ژن مقاومت به این بیماری از واریته Franklin به واریته Sloop توسط روش اصلاحی تلاقی برگشتی به کمک نشانگر طی دو نسل تلاقی برگشتی و یک نسل خودگشنی انتقال داده شد (Jefferies et al. 2003). کپک سیاه حاصل از قارچ *Alternaria alternate* یک بیماری عمده گوجه های رسیده در حال فرآوری است. پنج QTL با استفاده از گزینش به کمک نشانگر از *Alternaria alternata* به گوجه فرنگی زراعی منتقل شدند. RFLP و نشانگرهای مبتنی بر PCR پیرامون و درون نواحی کروموزومی حاوی QTL ها، برای گزینش به کمک نشانگر در طی نسل های تلاقی برگشتی و خودگشنی استفاده شدند (Foolad et al. 2012). روش اصلاحی تلاقی برگشتی به کمک نشانگر برای بهبود مقاومت لاین HN189 به پژمردگی باکتریایی در برنج موفق

¹ Sequence characterized amplified region

چه در منابع گوناگون مقاومت و حساسیت این ارقام بررسی شده بود (Wang et al. 2000; Madadkhah et al. 2012)، در این تحقیق برای اطمینان از وضعیت آنها آزمون آلوده‌سازی انجام گرفت و مقاومت و حساسیت آنها تایید شد.

برای آلوده‌سازی ارقام مذکور با اسپور قارچ از روش فرو بردن ریشه در سوسپانسیون کنیدیوم به میزان 10^6 اسپور در میلی‌لیتر استفاده شد (Banihashemi 2010). به‌طور خلاصه مایه قارچ در محیط PDA (Potato Dextrose Agar) آماده‌سازی شد. سپس سوسپانسیون کنیدیوم‌ها تهیه شده و تعداد کنیدیوم در میلی‌لیتر تنظیم شد. بذرها پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم یک درصد به مدت چهار دقیقه در سه مرحله با آب مقطر سترون شستشو و سپس در مخلوط کوکوپیت و پرلیت اتوکلاو شده (۱۲۱) درجه سانتی‌گراد و فشار یک اتمسفر به مدت ۱۵ دقیقه در دو روز متوالی) به نسبت ۱:۱ کاشته و پس از هفت روز گیاهچه‌ها از بستر مورد نظر بیرون آورده و ریشه‌ها با آب مقطر سترون به‌طور کامل شسته شدند. ریشه‌ها به مدت یک دقیقه در سوسپانسیون اسپور قرار گرفتند. ریشه‌های گیاهچه‌های شاهد نیز در آب مقطر سترون قرار گرفتند. سپس گیاهچه‌ها در گلدان‌هایی به قطر ۱۳ سانتی‌متر حاوی پیت ماس و ماسه بادی اتوکلاو شده (با نسبت ۲:۱) کشت شدند. گلدان‌ها در دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. سپس گیاهان هر روزه بررسی شده و گیاهانی که در مدت ۷-۵ روز نخست به علت شوک نشا از بین رفتند حذف شدند. از روز هفتم علائم ایجاد شده روی گیاهچه‌ها شامل زردی و پژمردگی ساقه یادداشت شد. یک هفته پس از آلوده‌سازی آثار بیماری در گیاهان حساس کم کم آشکار شد. دو هفته پس از آلودگی گیاهان حساس کاملاً زرد شدند. پس از سه هفته گیاهان حساس کاملاً از بین رفتند. به این ترتیب گیاهان حساس و مقاوم شناسایی شدند. تعدادی از گیاهچه‌های دارای علائم برای بررسی علت ظهور این علائم، انتخاب و در محیط PDA کشت شدند و به این ترتیب عامل بیماری دوباره از این گیاهان جداسازی شد.

در این آزمایش نخست تلاقی بین رقم مقاوم (ایزابل با ژنوتیپ *Fom-2/Fom-2*) با ارقام حساس (ساوه، ریش بابا و تیل طرق با ژنوتیپ *fom-2/fom-2*) انجام شد. از آنجاکه ارقام ایرانی ساوه،

گزارش شده‌است. دو لاین بهبودیافته HB145 (با یک نسل تلاقی برگشتی) و HB146 (با دو نسل تلاقی برگشتی) به‌دست آمد که مقاومت به پژمردگی باکتریایی پیدا کردند (Zhijuan et al. 2014). پژمردگی ورتیسیلیومی در بادمجان (*Solanum melongena*) توسط *Verticillium dahlia* که یک قارچ خاکزی است ایجاد می‌شود. نمونه جمع‌آوری شده P1388846 از گونه‌های وحشی *S. linnaenum* به این قارچ مقاومت نشان داده است. ورود ژن مقاومت به بادمجان توسط روش اصلاحی تلاقی برگشتی به کمک نشانگر انجام شد. نتایج نشان داد که انتقال ژن مقاومت به ورتیسیلیوم به بادمجان موفقیت‌آمیز بوده است. علاوه بر این یک نشانگر مخصوص که با ژن مقاومت موجود در P1388846 پیوسته بود برای ردیابی این ژن در جمعیت‌های تلاقی برگشتی مورد استفاده قرار گرفت (Liu et al. 2014).

اگر چه بیماری فوزاریوم در ایران در مناطق کشت این گیاه خسارت زیادی به بار می‌آورد ولی متأسفانه با وجود حساس بودن بسیاری از ارقام مهم، هیچ اقدامی در خصوص اصلاح ژنتیکی آنها انجام نشده است. ارقام ساوه، ریش بابا و تیل طرق سه رقم مهم طالبی در ایران هستند. رقم ساوه در زمین‌های واقع در اطراف شهر ساوه در استان مرکزی کشت می‌شود. از طرفی رقم ریش بابا یک رقم معروف طالبی در شهر کاشان است و رقم تیل طرق نیز در خراسان کشت می‌شود. این سه رقم به نژاد یک این بیماری حساس هستند (Madadkhah et al. 2012). هدف از این تحقیق انتقال مقاومت از رقم مقاوم فرانسوی به‌نام ایزابل (به‌عنوان والد بخشنده) به ارقام حساس داخلی ساوه، ریش بابا و تیل طرق (به‌عنوان ارقام تکراری) با روش تلاقی برگشتی بود. در این تحقیق علاوه بر به‌کارگیری روش تلاقی برگشتی کلاسیک، از گزینش به کمک نشانگر نیز برای تایید گیاهان مقاوم و اثبات کارآمدی نشانگر در شناسایی گیاهان مقاوم و حساس استفاده شد.

مواد و روش‌ها

در این آزمایش از چهار رقم طالبی استفاده شد. رقم ایزابل یک رقم فرانسوی و مقاوم به نژاد یک بیماری فوزاریوم *Fusarium oxysporum* f.sp. *melonis* (Fom) است و ارقام ایرانی ساوه، ریش بابا و تیل طرق که هر سه به این نژاد حساس هستند. اگر

شد. استخراج DNA از تمام نمونه‌ها با استفاده از روش CTAB¹ صورت گرفت (Murray and Thompson 1980). به منظور تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از دستگاه اسپکتروفوتومتری استفاده شد. با توجه به توالی آلل مقاوم و حساس ژن *Fom-2* (Joobeur et al. 2004; Oumouloud et al. 2012) و با کمک نرم‌افزار Primer3 دو جفت آغازگر طراحی شد (جدول ۱). واکنش زنجیره‌ای پلیمرز با دو جفت آغازگر به صورت چندگانه^۲ انجام شد. با آغازگرهای *Fom2-R*₄₀₉ تکثیر آلل غالب با طول ۴۰۹ جفت‌باز و با جفت آغازگر *Fom2-S*₂₅₃ آلل حساس با طول ۲۵۳ جفت‌باز تکثیر شد. واکنش زنجیره‌ای پلیمرز در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر در دستگاه ترموسیکلر (SimpliAmp™ Thermal Cycler, Applied biosystems) انجام شد. هر واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) حاوی ۱۲/۵ میکرولیتر از PCR Mastermix با غلظت ۱/۵ میلی‌مولار $MgCl_2$ ، ۰/۶ میکرولیتر از هر آغازگر با غلظت ۱۰ میکرومولار، یک میکرولیتر از DNA ژنومی (با غلظت ۵۰ نانوگرم در میکرولیتر) و ۹/۱ میکرولیتر آب مقطر بود. همچنین برنامه انجام مراحل PCR به این ترتیب انجام شد: مرحله اول در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه (واسرشت سازی اولیه) انجام شد. مرحله دوم شامل دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۵ ثانیه، دمای ۶۱ درجه سانتی‌گراد به مدت یک دقیقه و دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت دو دقیقه به تعداد ۳۵ چرخه تکرار شد. به منظور تکثیر تکمیلی قطعات ناقص، مرحله پایانی در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه انجام گرفت.

ریش بابا و تیل طرق ارقام ناهمگن هستند و با وجود یکنواختی بالا در رسیدگی و شکل میوه، از نظر ژنتیکی به طور کامل خالص نیستند از هر رقم ۱۵ گیاه برای تلاقی با والد بخشنده انتخاب شد. سپس گیاهان F_1 (با ژنوتیپ *Fom-2/fom-2*) با والدین حساس (ارقام تکراری) تلاقی برگشتی داده شدند تا نسل BC_1F_1 تولید شود. به این ترتیب برای هر والد تکراری تعداد ۱۵ خانواده تلاقی برگشتی تولید شد. با توجه به تک ژن بودن مقاومت و بر اساس توارث مندلی انتظار این است که در هر خانواده نیمی از گیاهان مقاوم و نیمی حساس باشند. این نسل با روش آلوده‌سازی غربال شد. به این ترتیب که نخست با روش آلوده‌سازی گیاهان مقاوم هتروزیگوت (*Fom-2/fom-2*) از گیاهان حساس (*fom-2/fom-2*) جدا شدند. در این مرحله برای هر خانواده از ۱۲ گیاه استفاده شد. به طوری که ۲ گیاه به عنوان شاهد آلوده‌سازی نشدند و ۱۰ گیاه بعدی آلوده‌سازی شدند. در هر گلدان چهار گیاه کشت شد. گیاهان مقاوم تایید شده به مزرعه منتقل شده و در فصل گلدهی برای تولید نسل BC_2F_1 با والدین تکراری تلاقی برگشتی داده شدند. در نسل BC_2F_1 نیز به همین ترتیب عمل شد و گیاهان مقاوم با روش آلوده‌سازی مصنوعی شناسایی شدند. سپس برای تایید گیاهان مقاوم با روش مولکولی، از گیاهان مقاوم DNA استخراج شده و ژنوتیپ این گیاهان با نشانگر SCAR تعیین شد. گیاهان مقاوم برای تولید نسل BC_3F_1 (تلاقی برگشتی سوم) دوباره کشت شدند.

به منظور تعیین ژنوتیپ گیاهان با نشانگر SCAR، از تمام گیاهان والدی و نسل BC_2F_1 در مرحله ۲-۳ برگی نمونه‌برداری انجام

¹ Cetyltrimethyl Ammonium Bromide

² Multiplex PCR

جدول ۱- توالی آغازگرهای به کار گرفته شده در واکنش زنجیره‌ای پلیمرز چندگانه به همراه دمای اتصال. آغازگرهای به کار گرفته شده عبارت بودند از *Fom2-R*₄₀₉ و *Fom2-S*₂₅₃ که به ترتیب آلل مقاوم (با طول ۴۰۹ جفت‌باز) و آلل حساس (با طول ۲۵۳ جفت‌باز) را تکثیر می‌کنند.

نام آغازگر	توالی (۳' → ۵')	دمای اتصال (T_m) به درجه سانتی‌گراد
<i>Fom2-R</i> ₄₀₉	GAGAAATTTGCAATGGGTGG TTACACTATTATTGCTCAACTAC	۶۱
<i>Fom2-S</i> ₂₅₃	GACTTTACAGAAAGGCGTTTA ATTGCTCTAAGTTGATCATATTCTG	۶۰



شکل ۱- تصویر گیاه مقاوم در سمت راست (ایزابیل) و حساس در سمت چپ (ریش بابا) پس از سه هفته آلوده‌سازی با نژاد یک عامل بیماری‌زای فوزاریوم (*Fusarium oxysporum f.sp. melonis*).



شکل ۲- نتیجه غربال گیاهان نسل BC₁F₁ برای خانواده شماره ۱۰ از رقم ریش بابا. گیاهان موجود در این دو گلدان آلوده شده‌اند. ولی به دلیل اینکه در خانواده BC₁F₁ دو گروه گیاه مقاوم و حساس (به ترتیب Fom-2/fom-2 و fom-2/fom-2) وجود دارد برخی گیاهان مقاوم بوده و سالم هستند در حالی که برخی گیاهان حساس بوده و دو هفته پس از آلوده‌سازی کاملا از بین رفته‌اند.

هم‌چنین میزان مواد جامد محلول با دستگاه رفرکتومتر اندازه گیری شد.

نتایج

شکل ۱ گیاهان مقاوم و حساس را سه هفته پس از آلوده‌سازی نشان می‌دهد. این شکل تصویر دو رقم ایزابیل و ریش بابا را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشخص است رقم ایزابیل با وجود آلوده سازی کاملا سالم است در حالی که گیاهان رقم ریش بابا کاملا از بین رفته‌اند.

شکل ۲ واکنش گیاهان BC₁F₁ را به عامل بیماری‌زا نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در هر گلدان تعداد چهار نشا کشت شده بود طبق وراثت مندلی این احتمال وجود دارد که در یک گلدان

در پایان از هر محصول واکنش زنجیره‌ای پلیمرز ۵ میکرولیتر روی ژل آگارز ۱/۲ درصد آماده‌سازی شده در بافر TAE یک درصد الکتروفورز شده، سپس با اتیدیوم بروماید ۰/۵ μg/ml به مدت ۲۰-۳۰ دقیقه رنگ‌آمیزی شد و در نهایت طبق تصاویر گرفته شده زیر نور UV، آنالیز نشانگری برای تعیین مقاوم یا حساس بودن ژنوتیپ موردنظر طبق باند حاصل از PCR انجام شد.

از آنجاکه هدف از تلاقی برگشتی اصلاح والد تکراری است بنابراین گیاهانی باید در نسل‌های تلاقی برگشتی گزینش شوند که بیش‌ترین شباهت را به والد تکراری داشته باشند. برای این منظور صفات مرتبط با میوه از جمله طول و عرض میوه و ضخامت گوشت در گیاهان نسل BC₂F₁ و گیاهان والدی اندازه‌گیری شد.

سازای مصنوعی گیاهان حساس حذف شده بودند و تنها از گیاهان مقاوم برای تعیین ژنوتیپ، DNA استخراج شده بود انتظار این بود که گیاهان باقی مانده که مقاوم بودند طبق توارث مندلی به صورت *Fom-2/fom-2* باشند. طبق همین پیش‌بینی بسیاری از گیاهان غربال شده نسل BC_2F_1 دارای دو باند تکثیر شده بودند (۲۵۳ و ۴۰۹ جفت‌باز). بنابراین ژنوتیپ این گیاهان به صورت *Fom-2/fom-2* تایید شد. البته طبق محاسبه انجام شده از تعداد ۱۳۰ گیاه غربال شده در نسل BC_2F_1 تعداد ۱۲ گیاه دارای ژنوتیپ حساس بودند. واکنش زنجیره‌ای پلیمرز برای این ۱۲ گیاه دوباره تکرار شد که همان نتیجه به دست آمد. بنابراین گیاهان حساسی که به دلیل خطا در آلوده‌سازی مصنوعی حساسیت خود را نشان نداده بودند در این مرحله شناسایی و از ادامه برنامه اصلاحی حذف شدند.

بحث

یکی از عوامل بیماری‌زای خطرناک در خربزه و طالبی قارچ خاکزی *Fusarium oxysporum* f.sp. *melonis* (Fom) است که باعث ایجاد بیماری پژمردگی آوندی می‌شود (Oumouloud et al. 2012). عامل این بیماری در خاک باقی مانده و تولید کلأمیدئوسپور با دوام و پایدار می‌کند (Tezuka et al. 2011). یکی از روش‌های مناسب کنترل این عامل بیماری‌زا، استفاده از ارقام مقاوم و به طور کلی استفاده از ژرم‌پلاسما مقاومت می‌باشد. در این آزمایش در مرحله غربال گیاهان نسل BC_1F_1 و BC_2F_1 برای مقاومت به بیماری گیاهانی که آلوده‌سازی شدند یا به طور کامل مقاوم بودند و یا پس از سه هفته کاملاً از بین رفتند. در این مدت گیاهانی که مقاومت کمی از خود نشان دهند دیده نشد. بنابراین به نظر می‌رسد ژن‌های کوچک اثر یا تغییر دهنده نقش چندانی در کم یا زیاد کردن مقاومت به بیماری ندارند و مقاومت به طور کامل عمودی بوده و توسط یک ژن کنترل می‌شود. مشاهده نسبت ۱:۱ در نسل‌های یاد شده از نظر گیاهان مقاوم و حساس نیز تک ژن بودن این صفت را تایید می‌کند (جدول ۲).


گیاهان حساس و مقاوم وجود داشته باشند. در واقع در شکل ۲ این نکته به صورت آشکار مشخص شده است. در این تصویر در یک گلدان یک گیاه سالم باقی مانده در حالی که بقیه گیاهان از بین رفته‌اند. بنابراین گیاه سالم دارای ژنوتیپ *Fom-2/fom-2* و گیاهان حساس از بین رفته دارای ژنوتیپ *fom-2/fom-2* هستند. آزمون مربع کای برای نسبت گیاهان مقاوم و حساس برای هر دو رقم در نسل BC_1F_1 و BC_2F_1 انجام گرفت. در هر دو نسل نسبت گیاهان مقاوم و حساس (*Fom-2/fom-2* و *fom-2/fom-2*) در هر سه رقم انحراف معنی‌داری با نسبت مندلی ۱:۱ نشان نداد (جدول ۲).

برای شناسایی گیاهان مقاوم و حساس در نسل BC_2F_1 نیز همانند نسل اول تلاقی برگشتی آزمایش آلوده‌سازی انجام شد. در این نسل نیز نسبت ۱:۱ به دست آمد. گیاهان مقاوم به دست آمده از این مرحله با روش مولکولی نیز غربال شدند. گیاهان مقاوم تایید شده به مزرعه منتقل شده و هنگام رسیدگی صفات گوناگون اندازه‌گیری شد. در این نسل مقایسه بین خانواده‌های BC_2F_1 با گیاهان والدی (والد تکراری) انجام گرفت. نتایج نشان داد برای بیشتر صفات تفاوت معنی‌داری بین خانواده‌های BC_2F_1 و والد تکراری وجود نداشت. تنها در دو مورد تفاوت معنی‌دار دیده شد (جدول ۳)

باتوجه به توالی کامل ژن *Fom-2* و تفاوت‌های موجود بین آلل مقاوم و حساس آغازگرهایی که بتوانند به صورت ویژه آلل مقاوم و حساس را تکثیر کنند طراحی شد. انتظار این بود که آغازگر *Fom2-R409* و *Fom2-S253* قطعاتی با طول ۴۰۹ و ۲۵۳ جفت‌بازی را تکثیر کنند. طول قطعات تکثیر شده طبق همین پیش‌بینی به دست آمد. تصویر الکتروفورز محصولات واکنش زنجیره‌ای پلیمرز در شکل ۳ نمایش داده شده است. در گیاه مقاوم ایزابل قطعه‌ای با طول ۴۰۹ جفت‌بازی تکثیر شده است. با توجه به اینکه در هر واکنش PCR هر دو جفت آغازگر حضور داشته‌اند بنابراین ژنوتیپ رقم ایزابل به صورت *Fom-2/Fom-2* بوده است. به همین ترتیب در رقم حساس ریش بابا یک قطعه با طول ۲۵۳ جفت‌باز تکثیر شده است. بنابراین ژنوتیپ این گیاه به صورت *fom-2/fom-2* است. بقیه چاهک‌های ژل نمایش داده شده در شکل ۳ مربوط به گیاهان خانواده BC_2F_1 است. از آنجاکه نخست با کمک آلوده

جدول ۲- تعداد خانواده‌ها و گیاهان غربال شده در نسل BC₁F₁ با روش مایه‌زنی. نسبت ۱:۱ برای گیاهان مقاوم و حساس در هر رقم به دست آمد.

ژنوتیپ	تعداد خانواده غربال شده	تعداد کل گیاهان ارزیابی شده	تعداد مقاوم	تعداد حساس	برای انحراف از نسبت ۱:۱ X ² آماره
تیل طرق	۱۳	۱۳۰	۵۲	۶۴	۱/۳ ^{NS}
ریش بابا	۱۵	۱۵۰	۶۵	۷۳	۰/۵ ^{NS}
ساره	۱۵	۱۵۰	۷۳	۶۶	۰/۳۵ ^{NS}



شکل ۳- غربال گیاهان نسل BC₂F₁ که با روش مایه‌زنی مقاوم تشخیص داده شده بودند با نشانگر SCAR. قطعه تکثیر شده با طول ۴۰۹ جفت‌بازی مربوط به آلل مقاوم و قطعه تکثیر شده با طول ۲۵۳ جفت‌بازی مربوط به آلل حساس است. از نمونه‌های DNA ایزابل و ریش بابا به عنوان شاهد مقاوم و حساس برای PCR استفاده شد. در این شکل تعداد ۹ گیاه نسل BC₂F₁ نمایش داده شده که همگی هتروزیگوت مقاوم هستند. NC: شاهد منفی است که در آن DNA در واکنش PCR وجود ندارد.

در PCR چند گانه نزدیک بودن دمای اتصال آغازگرها و عدم تشکیل جفتی‌های آغازگر^۱ از اهمیت بالایی برخوردار است. بهینه‌سازی واکنش زنجیره‌ای پلیمرز در این آزمایش با صرف وقت زیاد و تغییر دادن دما و مقدار DNA به دست آمد. در حین آزمایش مشاهده شد با کم کردن دمای اتصال به میزان دو درجه، یک باند غیر اختصاصی با طول حدود ۵۱۰ جفت‌باز تکثیر می‌شد. برای اینکه مشخص شود این باند توسط کدام جفت آغازگر تکثیر می‌شود PCRهای جداگانه با هر کدام از جفت آغازگرها در دمای پایین‌تر (۵۹ درجه سانتی‌گراد) انجام گرفت. در واکنشی که Fom2-S₂₅₃ قرار داشت قطعه ۵۱۰ جفت‌بازی تکثیر نشد ولی زمانی که از آغازگرهای Fom2-R₄₀₉ استفاده شد این قطعه تکثیر شد. بنابراین این نتیجه نشان داد که این قطعه توسط آغازگرهای Fom2-R₄₀₉ تولید شده‌است. همچنین در صورتی که تیوب‌های آماده برای انجام واکنش PCR برای مدتی روی یخ (دمای ۴

در مورد مقاومت‌های تک ژنی همواره این نگرانی وجود دارد که ممکن است به دلیل آشکار شدن نژادهای جدید، مقاومت به این بیماری شکسته شود. با این وجود اگر چه از این ژن سال‌ها برای اصلاح این گیاه برای مقاومت به فوزاریوم استفاده شده‌است، تاکنون گزارشی از شکسته شدن مقاومت دیده نشده است و تعداد نژادهای این بیمای هم‌چنان عبارتند از نژادهای صفر، ۱، ۲ و ۱/۲ (Zheng et al. 1999; Oumouloud et al. 2008; Wang et al. 2013; Ivarez 2012; Oumouloud et al. 2011).

توالی DNA رمزگردان ژن *Fom-2* طولی برابر ۳۳۰۷ جفت‌باز دارد که پروتئینی با طول ۱۰۷۳ جفت‌باز را رمز می‌کند. این ژن پروتئین R از نوع NBS-LRR رارمز می‌کند (Joobeur et al. 2004). مطالعات گذشته نشان داده‌اند که تفاوت توالی بین آلل مقاوم و حساس بسیار زیاد است به طوری که بین نوکلوتید ۱۵۷۷ تا ۳۲۲۱ در انتهای ۳' این ژن بیش از ۲۸ تفاوت نوکلوتیدی بین آلل مقاوم و حساس گزارش شده‌است (Oumouloud et al. 2012).

¹ Primer dimer

اگرچه براي بازيايي ژنوم والد تكراري به حدود ۵ تا ۶ تلاقي برگشتي نياز است اما در نسل توليد شده در تحقيق حاضر يعني BC_3F_1 به طور متوسط ۹۳/۷۵ درصد از ژنوم مربوط به والد تكراري هستند. با توجه به اينكه رقم ايزابل خود يك لينه اصلاح شده است و از نظر بسياري از صفات از مطلوبيت بالايي برخوردار است به نظر مي رسد انجام تلاقي برگشتي چهارم نياز نيست. بنابر اين با غربال گياهان در اين نسل و شناسايي گياهان $Fom-2/fom-2$ و سپس خودگشني اين گياهان مي توان فرزندان $Fom-2/2/Fom-2$ را شناسايي کرده و سه رقم جديد ريش بابا، ساوه و تيل طرق که مقاوم به اين نژاد هستند را معرفي کرد. نتيجه به دست آمده از ارزيايي صفات ميوه در نسل BC_2F_1 نيز نشان داد گياهان اين نسل از نظر صفات مهم خيلي به نسل والدين نزديک شده اند و تنها يك نسل ديگر تلاقي برگشتي کافي به نظر مي رسد. در تحقيقاتي که در مورد ديگر گياهان انجام شده است تعداد تلاقي برگشتي کمتر از ۴ نسل بوده است. به طوري که به منظور اصلاح برنج براي مقاومت به بلايت باکتريايي از سه نسل تلاقي برگشتي استفاده کردند (Win et al. 2013). در تحقيق ديگري با سه تلاقي برگشتي و سپس خودگشني گياهان سورگوم، مقاومت به علف هرز استريگا^۱ را به اين گياه منتقل کردند (Yohannes et al. 2015).

درجه) نباشند به دليل اتصال غير اختصاصي گاهي اين قطعه توليد مي شد، هر چند توليد اين قطعه تبديلي در نتيجه گيري نهايي براي تعيين مقاومت يا حساسيت نمي کرد. زيرا با وجود قطعه ۴۰۹ جفت بازي گياه مورد نظر مقاومت به بيماري را دارا بود. يکي از ايرادهاي روش گزينش به كمك نشانگر اين است که ممکن است در حين ميوه، پيوستگي بين ژن و نشانگر به دليل وقوع کراسينگ اور بشکند و گياهان حساس به جاي مقاوم گزينش شوند. در مورد تحقيق حاضر اين مشکل وجود ندارد زيرا نشانگر به کار گرفته شده يک نشانگر کارکردي است، به اين معني که از توالي خود ژن مقاومت به دست آمده است. اين نشانگرها در به نژادي گياهي و جانوري کاربرد زيادي دارند. کارآمدی اين نشانگرها در تحقيقات گوناگون اثبات شده است (Hayashi et al. 2010; Li et al. 2009; Whitaker et al. 2006). اگر چه آلوده سازي مصنوعي با دقت بالا انجام گرفت اما غربال گياهان مقاوم با نشانگر SCAR وجود تعدادي گياه حساس را در بين گياهان گزينش شده آشکار کرد. اين نتيجه نشان مي دهد کارآيي نشانگرهاي مولکولي براي شناسايي گياهان مقاوم بهتر از روش آلوده سازي مصنوعي است. به اين مزيت مي توان اين نکته را نيز افزود که با به کارگيري نشانگرهاي مولکولي در وقت و هزينه صرفه جويي قابل توجهي مي شود.

¹ Striga

جدول ۳- مقايسه ميانگين صفات براي نسل والدي و BC_2F_1 در سه رقم طلبي مورد استفاده در اين آزمايش. مقايسه ميانگين با آزمون t انجام شده است. تنها دو مورد معني دار به دست آمد که نشان دهنده نزديک شدن ريخته ارثي گياهان نسل BC_2F_1 به گياهان والدي است.

نام رقم	نسل	مواد جامد محلول	ضخامت گوشت	عرض ميوه	طول ميوه
ریش بابا	والدي	۷/۵	۳/۶	۱۳/۸	۱۳
	BC_2F_1	۸/۱	۳/۵	۱۴	۱۳/۶
ساوه	والدي	۷	۲/۷	۱۱/۱	۱۲
	BC_2F_1	۸/۴*	۳/۵	۱۳/۵	۱۴/۵*
تيل طرق	والدي	۷	۲/۷	۱۰	۹/۸
	BC_2F_1	۸/۱	۲/۱	۱۱/۷	۱۳

* معني دار در سطح ۰/۰۵

انجام شده است (Feyzian et al. 2009; Madadkhah et al. 2012;) اما تحقیق حاضر اولین مطالعه در مورد اصلاح این گیاه با روش تلفیقی کلاسیک و مولکولی است. رتبه بندی ایران به عنوان سومین تولیدکننده این محصول در جهان نشان دهنده توانایی بالای کشور در تولید این محصول است اما متأسفانه ارقام کشت شده در کشور هنوز ارقام بومی هستند که عملکرد و کیفیت بالایی ندارد. بنابراین به کارگیری روش‌های اصلاحی کلاسیک و مولکولی برای اصلاح این گیاه ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر نشان داد این روش‌ها برای اصلاح این گیاه امکان‌پذیر است.

سپاسگزاری

بدین وسیله نگارندگان از صندوق حمایت از پژوهشگران و فن‌آوران کشور که با تامین اعتبار پژوهشی (شماره گرنت ۳۶۹۹۸/ص/۹۳) انجام این تحقیق را ممکن ساخت تشکر می‌کنند. هم‌چنین گروه محترم گیاهپزشکی پردیس ابوریحان اسپور قارچ عامل بیماری‌زا را در اختیار گروه تحقیقاتی این طرح گذاشت که به این ترتیب از این همکاری صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

منابع

Banihashemi Z (2010) Reaction of *Cucumis melo* cultivars to races of *Fusarium oxysporum* f.sp. *melonis* the cause of melon vascular wilt. Iranian Journal of Plant Pathology 46: 11-22. (In Farsi).
FAO (2013) FAOSTAT. Food and Agricultural Organization of the United Nations. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_commodity. FAO. Rome, Italy.
Feyzian E, Dehghani H, Rezai AM, Javaran MJ (2009) Diallel cross analysis for maturity and yield-related traits in melon (*Cucumis melo* L.). Euphytica 168:215-223
Foolad MR, Panthee DR (2012) Marker-Assisted Selection in Tomato Breeding (Review). Critical Reviews in plant sciences 31: 93-123.
Jefferies S P, King B J, Barr A R, Warner P, Logue S J and Langridge P (2003) Marker-assisted backcross introgression of the Yd2 gene conferring resistance to barley yellow dwarf virus in barley. Plant Breeding 122: 52-56.

هم‌چنین برای اصلاح برنج به بیماری بلاست از دو تلاقی برگشتی و سپس خودگشتی استفاده کرده و در نهایت لینه‌هایی تولید شد که سهم ژنوم والد تکراری در آن‌ها کمتر از ۹۰ درصد بود. در این تحقیق گزینش ژنوم والد تکراری با نشانگرهای مولکولی انجام شد (Singh et al. 2012). هم‌چنین با توجه به اینکه هدف از تلاقی برگشتی اصلاح یک صفت در رقم تکراری است اگر گیاهان در هر نسلی از تلاقی برگشتی به اندازه کافی شبیه والد تکراری باشند می‌توان تلاقی برگشتی را متوقف کرد. نتیجه مقایسه گیاهان نسل BC₂F₁ نشان می‌دهد که میوه از نظر بسیاری از ویژگی‌ها شبیه والد تکراری بوده و به نظر می‌رسد رقم بخشنده ایزابل صفات نامطلوب نداشته است (جدول ۳).

در این تحقیق گزینش ژنوم والد تکراری با نشانگرهای مولکولی انجام شد (Singh et al. 2012). هم‌چنین با توجه به اینکه هدف از تلاقی برگشتی اصلاح یک صفت در رقم تکراری است اگر گیاهان در هر نسلی از تلاقی برگشتی به اندازه کافی شبیه والد تکراری باشند می‌توان تلاقی برگشتی را متوقف کرد. نتیجه مقایسه گیاهان نسل BC₂F₁ نشان می‌دهد که میوه از نظر بسیاری از ویژگی‌ها شبیه والد تکراری بوده و به نظر می‌رسد رقم بخشنده ایزابل صفات نامطلوب نداشته است (جدول ۳).

هر چند تحقیقات زیادی در زمینه تخمین تنوع ژنتیکی، ارزیابی مقاومت به بیماری و برآورد اجزا واریانس ژنتیکی در این گیاه

Joobeur T, King JJ, Nolin SJ, et al (2004) The fusarium wilt resistance locus Fom-2 of melon contains a single resistance gene with complex features. Plant J 39:283-297
Hayashi K, Yoshida H, Ashikawa I (2006) Development of PCR-based allele-specific and InDel marker sets for nine rice blast resistance genes. Theor Appl Genet 113:251-260.
HongWang Y, Claude Thomas E, Ralph Dean A (2000) Genetic mapping of a fusarium wilt resistance gene (*Fom-2*) in melon (*Cucumis melo* L.). Molecular Breeding 6: 379-389.
Li Y-H, Zhang C, Gao Z-S, et al (2009) Development of SNP markers and haplotype analysis of the candidate gene for rhg1, which confers resistance to soybean cyst nematode in soybean. Mol Breed 24:63-76.
Liu J, Zheng Z, Zhou X, Feng C, Zhuang Y (2014) Improving the resistance of eggplant (*Solanum melongena*) to Verticillium wilt using wild species *Solanum linnaeanum*. Euphytica 201: 463-469

- Madadkhah E, Lotfi M, Nabipour A, Rahmanpour S, Banihashemi Z, Shoorooei M (2012) Enzymatic activities in roots of melon genotypes infected with *Fusarium oxysporum* F.sp. melonis race 1. *Scientia Horticulturae* 135: 171-176.
- Murray HG, Thompson WF (1980) Rapid isolation of high molecular weight DNA. *Nucleic Acids Res* 8:4321-4325
- Oumouloud A, Arnedo-Andres MS, Gonzalez-Torres R, Alvarez JM (2008) Development of molecular markers linked to the Fom-1 locus for resistance to Fusarium race 2 in melon. *Euphytica* 164:347-356.
- Oumouloud A, Mokhtari M, Chikh-Rouhou H, et al (2012) Characterization of the Fusarium wilt resistance Fom-2 gene in melon. *Molecular Breeding* 30:325-334.
- Oumouloud A, El-Otmani M, Chikh-Rouhou H, et al (2013) Breeding melon for resistance to Fusarium wilt: recent developments. *Euphytica* 192:155-169.
- Prohens J, Nuez F (2007) *Vegetables I: Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, and Cucurbitaceae*. Springer Science and Business Media.
- Raghami M, López-Sesé AI, Hasandokht MR, et al (2014) Genetic diversity among melon accessions from Iran and their relationships with melon germplasm of diverse origins using microsatellite markers. *Plant Systematics and Evolution* 300:139-151. doi: 10.1007/s00606-013-0866-y
- Singh VK, Singh A, Singh SP, et al (2012) Incorporation of blast resistance into "PRR78", an elite Basmati rice restorer line, through marker assisted backcross breeding. *Field Crops Research* 128:8-16. doi: 10.1016/j.fcr.2011.12.003.
- Tezuka T, Waki K, Yashiro K, Kuzuya M, Ishikawa T, Takatsu Y, Miyagi M (2009) Construction of a linkage map and identification of DNA markers linked to *Fom-1*, a gene conferring resistance to *Fusarium oxysporum* F.sp. melonis race 2 in melon. *Euphytica*, 168:177-188.
- Tezuka T, Waki K, Kuzuka M, Ishikawa T, Takatsu Y, Miyagi M (2011) Development of new DNA markers linked to the Fusarium wilt resistance locus Fom-1 in melon. *Plant Breeding* 130, 261-267.
- Wang S, Yang J, Zhang M (2011) Developments of functional markers for Fom-2-mediated fusarium wilt resistance based on single nucleotide polymorphism in melon (*Cucumis melo* L.). *Molecular Breeding* 27:385-393.
- Wang Y-H, Thomas CE, Dean RA (2000) Genetic mapping of a fusarium wilt resistance gene (*Fom-2*) in melon (*Cucumis melo* L.). *Molecular Breeding* 6:379-389.
- Whitaker VM, Bradeen JM, Debener T, et al (2010) *Rdr3*, a novel locus conferring black spot disease resistance in tetraploid rose: genetic analysis, LRR profiling, and SCAR marker development. *Theoretical and Applied Genetics* 120:573-585.
- Win KM, Korinsak S, Sirithunya P, et al (2013) Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blight resistance into aromatic Myanmar rice MK-75. *Field Crops Research* 154:164-171. doi: 10.1016/j.fcr.2013.08.002.
- Yohannes T, Tesfamichael A, Kiambi D, et al (2015) Marker-assisted introgression improves Striga resistance in an Eritrean Farmer-Preferred Sorghum Variety. *Field Crops Research* 173:22-29. doi: 10.1016/j.fcr.2014.12.008.
- Zheng XY, Wolff DW, Baudracco-Arnas S, Pitrat M (1999) Development and utility of cleaved amplified polymorphic sequences (CAPS) and restriction fragment length polymorphisms (RFLPs) linked to the *Fom-2* fusarium wilt resistance gene in melon (*Cucumis melo* L.). *Theoretical and Applied Genetics* 99:453-463
- Zhijuan Ji1, Jianyao Shi, Yuxiang Zeng1, Qian Qian1, Changdeng Yang1. (2014) Application of a simplified marker-assisted backcross technique for hybrid breeding in rice. *Biologia* 69: 463-468.