

پیش‌بینی اثرات SNP غیرمتراff ژن Hsp70 گاومیش بر ساختار و عملکرد پروتئین آن

Prediction of nonsynonymous SNP consequences in heat shock protein 70 (Hsp70) gene of *bubalus bubalis* on structure and function of its protein

آرزو عسکری راد^۱، جمال فیاضی^{*}^۲، محمود نظری^۲، محمدرضا حجاری^۳

- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

- بهترتب دانشیار، استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، گروه علوم دامی

- استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه ژنتیک

Askari Rad A^۱, Fayazi J^{*۲}, Nazari M^۲, Hajjari MR^۳

۱- MSc Student, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University

۲- Associate Professor, Assistant Professor, Khuzestan Agricultural Sciences and

Natural Resources University, Department of Animal Science

۳- Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Department of
Genetic

* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: j_fayazi@ramin.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۹۶/۳/۱۳ - تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۲/۱۳)

چکیده

پیشرفت‌های اخیر در توالی‌بایی DNA و الگوریتم‌های محاسباتی منجر به تشخیص اسینیپ‌هایی با ارزش بالاتر شده‌است. از طرفی مطالعه آزمایشگاهی آل‌های حاصل از اسینیپ‌ها دشوار و زمان بر است. در این تحقیق از چندین الگوریتم محاسباتی برای بیان تاثیر ساختار و عملکرد اسینیپ‌های ژن پروتئین شوک حرارتی (HSP70) بر عملکرد پروتئین در ژنوم گاومیش استفاده شد. HSP70 یک چاپرون مولکول است که در پاسخ به استرس گرمایی است. در این بررسی از تراشه اسینیپ 90K افیمتریکس در ۱۱۲ دام‌های مقاوم به استرس گرمایی است. در این بررسی از تراشه اسینیپ 90K افیمتریکس در Data گاومیش خوزستانی و اطلاعات توالی منتشر شده برای گاومیش هندی استفاده شده است. در Data Set گاومیش خوزستانی اسینیپ یافت نشد، اما در Data Set گاومیش هندی، یک اسینیپ تشخیص داده شد. آنالیز اسینیپ M5T (Methionine/Threonine) با استفاده از نرم‌افزارهای SIFT و PROVEAN انجام شد. SIFT با محاسبه ضریب ۰/۳۳ PROVEAN با محاسبه ضریب ۰/۳۳ این جهش یا اثر اسینیپ را غیر مخرب و پروتئین را با عملکرد طبیعی نشان دادند. الگوریتم I-mutant که برای بررسی ثبات پروتئین جهش یافته hsp70 استفاده شد و تاثیر اسینیپ بر پایداری و استحکام پروتئین را با کمک رگرسیون برآسانس تغییر در انرژی آزاد (DDG=۰/۴۷) پیش‌بینی می‌کند، نشان داد که اسینیپ Met5Thr در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و pH=۷ ثبات پروتئین را کمی کاهش می‌دهد. اعتبارسنجی مدل به کمک نقشه‌های راماجاندران و Prosa Z-Score حاکی از انحراف جزئی در پروتئین جهش یافته در مقایسه با مدل طبیعی است. داکینگ مولکولی نحوه اتصال HSP70 به لیگاند آدنوزین دی‌فسفات (ADP) در هر دو مدل طبیعی و جهش یافته نشان می‌دهد که جهش منجر به کاهش پایداری پروتئین و تغییر ساختار آن می‌شود که ضمن تغییر اتصال جایگاه اتصال لیگاند نیز تغییر می‌کند. با این وجود به طور کلی جهش پیدا شده تاثیر مخرب و بزرگی بر ساختار پروتئین در این بررسی نشان نمی‌دهد.

واژه‌های کلیدی

اسینیپ

پروتئین شوک حرارتی ۷۰

گاومیش

داکینگ

همولوژی مدلینگ

مقدمه

گاویش‌های باتلاقی و گاویش‌های رودخانه‌ایی. گاویش و تولیدات اقتصادی آن تحت تاثیر تعداد زیادی فاکتور است مخصوصاً شرایط محیطی و خوراک، که تاثیر بعضی فاکتورها ممکن است بیشتر باشد، اثر منفی درجه حرارت محیطی بالا بر اشتها و مصرف خوراک در نهایت با رشد کند و اختلال در تولید مثل به پایان می‌رسد (Patir et al. 2010). فهمیدن تنوع DNA در ژنوم می‌تواند به طور اساسی اجزاء ژنتیکی صفات انطباقی پیچیده را شناسایی و تفسیر کند. تحمل حرارت یک صفت کمی است که جهش در ژن آن، اثرات مختلفی بر رفتار تحمل حرارت دارد (Sodhi et al. 2013). گاهی اوقات ایجاد جهش در نواحی پرموتر ژن یا نواحی ایترنون ژن سبب تغییر در بیان رونویسی ژن و پایداری RNA و در نهایت تغییر بیان پروتئین مربوطه می‌گردد (Bhattacharya et al. 2016). یافتن اثر تغییر یک نوکلئوتید در ژنوم دام بر روی عملکرد دام، حوزه مطالعاتی بنام پویش ژنومی (GWAS) را ایجاد نموده است. بر این اساس تراشه‌های اسینپ با تراکم مختلف برای هر دام طراحی شده است. با توجه به اینکه اخیراً تراشه اسینپ برای گاویش خوزستان در دسترس قرار گرفت، لذا یافتن اسینپ‌های احتمالی در بخشی از ژنوم مرتبط با استرس گرمایی (پروتئین شوک حرارتی ۷۰) در دام مقاومی هم‌چون گاویش و برآورد اثر جهش منجر به اسینپ بر روی عملکرد پروتئین، حاصل از اهداف این تحقیق بود. برای این بررسی از دو مجموعه داده (data set) استفاده شد. الف) اطلاعات ژنوتاپینگ ۱۱۲ گاویش خوزستانی که به کمک تراشه اسینپ ۹۰k شرکت افیمتیکس تعیین ژنوتاپ شده‌اند و پس از اعمال فیلترهای معمول و مرسوم، بیش از ۸۰ هزار اسینپ را در سرتاسر ژنوم نشان دادند و ب) توالی‌های منتشر شده در بستر اینترنست برای گاویش هندی. گاویش‌های خوزستانی با استفاده از آرایه‌های Genotyping Array Axiom Buffalo 90k افیمتیکس و با استفاده از پروتکل استاندارد افیمتیکس ژنوتیپ شدند. آرایه‌های طراحی شده جهت تعیین ژنوتیپ گاویش، امکان ژنوتیپ ۸۹۹۸۰ جایگاه مارکری SNP را فراهم می‌آورد. هر چیپ دارای ۹۶ آرایه می‌باشد و هر آرایه برای بررسی یک حیوان مورد استفاده قرار می‌گیرد. توالی پروتئینی مربوط به گاویش هندی با شماره دستیابی (ADQ27309.1) از پایگاه داده پروتئین

در حوزه ژنتیک و اصلاح، اطلاع از ساختار ژنتیکی جمعیت‌ها می‌تواند کمک بزرگی برای برنامه‌ریزی در اجرای طرح‌های اصلاح نژادی و از همه مهم‌تر، حفظ ذخایر ژنتیکی باشد. روش‌های مولکولی و استفاده از نشانگرهای مولکولی در این زمینه یکی از بهترین گزینه‌ها به حساب می‌آید، زیرا با توجه به اطلاعات زیادی که به دست می‌دهد می‌تواند نتایجی که از تجزیه و تحلیل رکوردها با روش‌های آماری به دست آمده است را تأیید و تکمیل نموده و حتی ممکن است که آن‌ها را رد کند (Alinaghizadeh et al. 2010). بعلاوه، استفاده از ژنتیک مولکولی فواید زیادی دارد که یکی از این فواید معنی‌دار تعیین ژنوتیپ افراد برای جایگاه خاصی است (Mousavizadeh et al. 2009) هم‌چنین استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در انتخاب و اصلاح نژاد حیوانات ممکن است به طور مهیجی پیشرفت ژنتیکی را تسريع کند (Javanmard et al. 2008). هم‌چنین مطالعه تنوع ژنتیکی نژادهای بومی برای حفاظت از منابع ژنتیکی ذخایر بومی لازم و ضروری است (Mohammadi et al. 2009). حفاظت باید بر اساس دانش عمیقی از منابع ژنتیکی نژادهای خاص باشد، لذا تلاش برای شناسایی و تعیین خصوصیات ژنتیکی نژادهای بومی و محلی بسیار اهمیت دارد (Shojaei et al. 2010; Zamani et al. 2013).

پروتئین‌های شوک حرارتی، حفظ‌کننده فیلوژنتیکی محصولات ژن هستند که کاتالیزکننده مناسبی برای تاخوردگی مجدد پروتئین‌های تغییریافته در طول دناتوره شدن یا دیگر حوادث فیزیکوشیمیایی هستند. ترکیب مناسب و عمل این پروتئین‌ها در طول تغییرات زیست محیطی و هم‌چنین در حفظ فعالیت‌های عادی و بیوشیمیایی سلول برای زندمانی سلول ضروری هستند (Marai et al. 2014). شرایط استرس گرمایی اثرات منفی بر پارامترهای تولیدی شامل: تخمک‌گذاری، تولیدشیر، مصرف خوراک، سرعت رشد و سلامتی حیوان دارد. نگرانی در مورد اثرات تنش محیطی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. تاکنون به طور کامل مشخص نشده است که استرس گرمایی چرا و چگونه بر تولید شیر تاثیر می‌گذارد. گاویش تنها در مناطق مرکزی دنیا، آسیا، بعضی کشورها در اروپا شرقی و بیشتر کشورهای آمریکا لاتین یافت می‌شود. گاویش‌های آبی به دو گونه تقسیم می‌شوند:


Rampage در صد در منطقه‌ی غیرمجاز می‌باشد. در مقایسه نتایج مدل جهش‌یافته با مدل طبیعی، ۸۷ درصد از مدل جهش‌یافته در منطقه‌ی ایده‌آل می‌باشد که در مقایسه با مدل طبیعی این مقدار کاهش‌یافته است، ۱۰ درصد در منطقه‌ی مجاز که این مقدار نسبت به مدل طبیعی افزایش‌یافته است و دو درصد در منطقه‌ی غیرمجاز می‌باشد. این نتایج نشان می‌دهد که جهش منجر به تغییر مدل از منطقه‌ی ایده‌آل به منطقه قابل قبول شده است. نرم‌افزار Pro-SA با استفاده از برآورده Z-SCORE ارزش کلی را برای هر دو مدل طبیعی و جهش‌یافته محاسبه می‌کند. ارزش Z-SCORE برای مدل طبیعی و جهش‌یافته به ترتیب ۷/۸۵ و ۶/۶۲- برآورد شده است. این نتایج نشان می‌دهد که یک انحراف جزئی در پروتئین جهش‌یافته در مقایسه با مدل طبیعی وجود دارد. تغییر در یک آمینواسید ممکن‌باید باعث تخریب جایگاه اتصال لیگاند یا جایگاه اتصال پروتئین شود و بر عملکرد پروتئین با استفاده از تغییر ثبات پروتئین یا سرعت تاخوردگی پروتئین تاثیرگذار باشد (Rasel et al. 2015). به هر حال جایگزینی یک آمینواسید در توالی پروتئینی ممکن‌باید میل اتصال پروتئین به لیگاندش تاثیرگذار باشد (Ng et al. 2001). متیونین در مکانیسم دفاعی آنتی‌اکسیدانی و همچنین در تنظیم متابولیسم سلولی نقش مهمی دارد، یکی از نقش‌های دفاعی آن باعث حفاظت سلول در برابر آسیب‌های اکسیداتیو SIFT می‌شود (Levine et al. 1998) طبق پیش‌بینی نرم‌افزار PROVEAN، این اسینیپ یک اسینیپ طبیعی و غیرمخرب می‌باشد و در اکتیوسایت نمی‌باشد، طبق پیش‌بینی I-MUTANT این اسینیپ با ارزش ۰/۴۷ DDG باعث کاهش ثبات پروتئین می‌شود.

موجود در مرکز ملی اطلاعات بیولوژی (NCBI) به دست آمد. ساختارهای الگو از پایگاه داده پروتئین (PDB) با مشخصات 5FPN_A, 3C7N_B, 1YUW_A, 2V7Z_A, 2E88_A, 2E8A_A, 3A8Y_A, 5BN8_A, 3JXU_A (5BN8_A, 3JXU_A, 5BN9_A) برای مدل‌سازی به دست آمدند. ساختار سه‌بعدی پروتئین برای پیش‌بینی اثر اسینیپ‌های غیرمتراff بر ساختار کلی پروتئین بسیار موثر می‌باشد (Topham et al. 1997). برای مدل‌سازی، ساختارهای همولوگ از پایگاه داده پروتئین (PDB) به دست آمدند. توالی‌های شناسایی شده از مدل‌های انتخاب شده، با پروتئین hsp70 گامیش ۸۹٪، ۸۸٪، ۸۸٪ و ۹۹٪ شباهت داشتند. پیش‌بینی شکل سه بعدی SWISS-MODEL پروتئین hsp70 گامیش با سه نرم‌افزار MODELER و I-TASER انجام شده است. سپس مدل‌های ساخته شده با نقشه‌های راماچاندران اعتبارسنجی شده‌اند. برای افزایش صحت مدل نهایی، مجدداً سه مدل ساخته شده به همراه توالی پروتئینی hsp70 گامیش به نرم‌افزار مدلر داده شد. مدل نهایی مدلی است که توسط نرم‌افزار مدلر ساخته شده (شکل A2). تابع ارزیابی نرم‌افزار برای مدل ساخته شده: Dope Score می‌باشد که هر چقدر Dope Score منفی‌تر باشد، مدل بهتر ترسیم شده است (Fiser et al. 2003). تابع ارزیابی شده برای این hsp70 Dope Score=-37503 مدل، Dope Score=0 می‌باشد. مدل جهش‌یافته Met5Thr (با استفاده از نرم‌افزار SIFT) می‌باشد (شکل B2). اعتبار سنجی هر دو مدل با استفاده از نقشه‌های راماچاندران و pro-SA انجام شد. در نقشه، زوایای فی و سای برای مدل طبیعی ساخته شده توسط نرم‌افزار مدلر ۹۰ درصد در منطقه‌ی ایده‌آل، ۴ درصد در منطقه‌ی مجاز و ۴


جدول ۱- نتایج پیش‌بینی شده برای اسینیپ غیرمتراff و تغییر اسیدآمینه M5T توسط سه نرم‌افزار SIFT، PROVEAN و I-MUTANT

I-MUTANT نتایج	PROVEAN نتایج	SIFT نتایج
عملکرد	عملکرد	عملکرد
کاهش می‌باشد	* DDG امتیاز	قابل تحمل
۰/۴۷	طبیعی	۱

* این امتیاز در دمای ۲۵ و pH برابر ۷ به دست آمده است.



شکل ۱- دیاگرام ایترکشن میان پروتئین طبیعی و جهش‌یافته با لیگاند. ایترکشن میان پروتئین hsp70 طبیعی با لیگاند ADP (A). ایترکشن میان hsp70 جهش‌یافته با لیگاند ADP (B).



شکل ۲- مدل طبیعی و جهش‌یافته HSP70. مدل طبیعی (A) با نرم‌افزار مدل‌طرزی شده است که اسید‌آمینه متیونین طبیعی را در جایگاه ۵ نشان می‌دهد. مدل پروتئین hsp70 جهش‌یافته که آمینواسید تغییریافته ترئونین را نشان می‌دهد.

بررسی شد. ضمن بررسی نتایج داکینگ و مقایسه داکینگ دو مدل طبیعی و جهش‌یافته، سه آمینواسید کلیدی که در پاکت حضور دارند شامل: ASP366, ArG272, Gly339 می‌باشد که در مقایسه دو مدل جهش‌یافته و طبیعی، جهش باعث تغییر جایگاه اتصال لیگاند شده است که لیگاند به GLy339 متصل نشده است و به

نقشه‌های راماچاندران در هر دو ساختار طبیعی و جهش‌یافته نشان می‌دهند که جهش باعث تغییر در چه مناطقی شده است. بنابراین میل اتصال ADP به هر دو ساختار طبیعی و جهش‌یافته hsp70 با استفاده از نرم‌افزار AutoDock4.2 (با گرید باکس: ۸۰× ۸۰× ۸۰) (تعداد ران: ۱۰۰) (الگوریتم: ژنتیک لاماکرین)

al. 2005) و تغییری که این جهش می‌تواند در پایداری پروتئین ایجاد کند و تغییر در ساختار پروتئین و جایگاه اتصال لیگاند می‌تواند بر عملکرد پروتئین موثر باشد، اما این تاثیر خیلی چشمگیر نخواهد بود.

سپاسگزاری

از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به خاطر حمایت مالی و معنوی و از جانب آقای دکتر محمدمهدی رنجبر به خاطر توصیه‌های علمی کمال تشکر را داریم.

منابع

- Alinaghizadeh H, Mohammad Abadi MR, Zakhizadeh S (2010) Exon 2 of BMP15 gene polymorphism in Jabal Barez Red Goat. Journal of Agricultural Biotechnology 2:69-80 (In Farsi).
- Bhattacharya R, Rose PW, Burley SK, Prlic A (2016) Impact of genetic variation on three dimensional structure and function of proteins. PLOS One 12:e0171355.
- Fiser A, Sali A (2003) Modeller: generation and refinement of homology-based protein structure models. Methods Enzymology 374:461-491.
- Javanmard A, Mohammad Abadi MR, Zarigabayi GE, Gharahedaghi AA, Nassiry MR, Javadmansh A, Asadzadeh N (2008) Polymorphism within the intron region of the bovine leptin gene in Iranian Sarabi cattle (Iranian Bos taurus). Russian Journal of Genetics 44:495-497.
- Levine RL, Berlett BS, Moskovitz J, Mosoni L, Stadtman ER (1998) Methionine residues may protect proteins from critical oxidative damage. Mechanisms of Ageing and Development 107:323-332.
- Marai IFM, Haeeb AAM (2010) Buffalo biological functions as affected by heat stress. Livestock science 127:89-109.
- Mayer MP, Bukau B (2005) Hsp70 chaperones: Cellular functions and molecular mechanism. Cellular and Molecular Life Science 62:670-684.
- Mohammadi A, Nassiry MR, Mosafer J, Mohammadabadi MR, Suimova GE (2009) Distribution of BOLA-DRB3 allelic frequencies and identification of a new allele in the Iranian cattle breed Sistani (Bos Indicus). Russian Journal of Genetics 45:198-202.
- Mousavizadeh A, Mohammadabadi MR, Torabi A, Nassiry MR, Ghiasi H, Esmailizadeh AK (2009) Genetic Polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP). Iranian Journal of Biotechnology 7:51-53.

اسیدآمینه دیگری متصل شده است (شکل ۱). در نتایج هکس (Hex 8.0.0) برای ایترکشن میان پروتئین اولیه و لیگاندش، انرژی اتصال: -۳۰۵/۶۰ و در مدل جهش یافته انرژی اتصال ۲۸۲/۵۲ - گزارش شد. این یافته‌ها با استفاده از تغییر در زوایا فی و سای و انحراف Z-SCORE حمایت می‌شوند. هم‌چنین تغییر در جایگاه اتصال لیگاند نیز تغییر ساختار و ثبات پروتئین را تایید می‌کند. این نتایج پیشنهاد می‌کنند که ساختار اولیه hsp70 در مقایسه با ساختار جهش یافته بیشتر قابل قبول است. با توجه به نقشی که hsp70 در فولیدینگ پروتئین‌های دیگر دارد (Mayer et

- Ng PC, Henikoff S (2001) Predicting deleterious amino acid substitutions. Genome Research 11:863-874.
- Patir H, Upadhyay RC (2010) Purification, characterization and expression kinetics of heat shock protein 70 from Bubalus bubalis. Research in Veterinary Science 88:258-262.
- Rasel KD, Chakrapani V, Patra SK, Jena S, Mohapatra SD, Nayak S, Sundaray JK, Jayasankar P, Barman HK (2015) Identification and prediction of the consequences of nonsynonymous SNPs in glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) gene of zebrafish Danio rerio. Turkish Journal of Biology 40:43-54.
- Shojaei M, Mohammadabadi MR, Asadi Fozi M, Dayani O, Khezri A, Akhondi M (2010) Association of growth trait and leptin gene polymorphism in Kermani sheep. Journal of Cell and Molecular Research 2:67-73.
- Sodhi M, Mukesh M, Kishore AM, Mishra BP, Kataria RS, Joshi BK (2013) Novel polymorphisms in UTR and coding region of inducible heat shock protein 70.1 gene in tropically adapted Indian zebu cattle (Bos indicus) and riverine buffalo (Bubalus bubalis). Gene 527:606-615.
- Topham CM, Srinivasan N, Blundell TL (1997) Prediction of the stability of protein mutants based on structural environment-dependent amino acid substitution and propensity tables. Protein Engineering 10:7-21.
- Zammani P, Akhondi M, Mohammadabadi MR, Saki AA, Ershadi A, Banabazi MH, Abdolmohammadi AR (2013) Genetic variation of Mehraban Sheep using two intersimple sequence repeat (ISSR) markers. Afrighan Journal of Biotechnology 10:1812-1817.