

تأثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوھیدرولاز کبد و میزان چربی ها و لیپوپروتئین های سرم موش صحرایی

اسفندیار حیدریان^{*}، رضا حاجی حسینی^۱، عصمت جعفری دهکردی^۲، حسن امیدی^۳

- (۱) استادیار، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
- (۲) استادیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه پیام نور واحد تهران
- (۳) پژوهش عمومی، مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
- (۴) کارشناس ارشد زیست شناسی با کاریشن بیوشیمی، دانشگاه پیام نور واحد تهران

تاریخ پذیرش: ۱۰/۱۲/۸۶

تاریخ دریافت: ۱۰/۱۰/۸۶

چکیده

مقدمه: هر چند مصرف داروهای شیمیابی ضد چربی مثل ژمفیبروزیل، کلوفیرات و استاتین‌ها باعث کاهش چربی خون می‌شوند ولی اینگونه داروها معمولاً عوارض جانبی به همراه دارند. نتایج مطالعات اثبات کرده که مصرف محصول درختان خانواده آناکاردیاسه دارای اثرات کاهنده چربی خون می‌باشد ولی مکانیسم دقیق اثرات کاهنده‌گی آنها بر چربی‌های خون مشخص نشده است. با توجه به این که آنزیم فسفاتیدات فسفوھیدرولاز آنزیمی کلیدی در متابولیسم گلیسرولپیدها است، هدف از این پژوهه بررسی تأثیر مصرف پسته وحشی بر فعالیت آنزیم مذکور، میزان تری گلیسرید کبد و چربی‌های سرم موش صحرایی بوده است.

مواد و روش‌ها: این آزمایش تجربی در یک دوره ۱۵ و ۶۰ روزه بر روی موشهای صحرایی انجام گرفت. گروه‌ای شاهد ($n=6$) تحت رژیم معمولی استاندارد ولی گروه‌های تست ($n=6$) تحت رژیم معمولی بعلاوه ۱۰ درصد پودر پسته قرار گرفتند. پس از اتمام هر دوره فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوھیدرولاز کبدی، تری گلیسرید، توتال کلسترول، HDL کلسترول، LDL کلسترول، VLDL کلسترول سرم و میزان تری گلیسرید کبدی اندازه گیری شد.

یافته‌های پژوهش: پسته وحشی در دوره ۱۵ روزه باعث افزایش میزان کلسترول در کلیه فراکسیون‌های لیپوپروتئنی و کاهش میزان تری گلیسرید کبدی شد ($P<0.05$) و فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوھیدرولاز را به میزان ۱۱ درصد نسبت به گروه کنترل کاهش داد. در دوره بلند مدت ۶۰ روزه تفاوت معنی داری در میزان کلسترول فراکسیون‌های لیپوپروتئنی و تری گلیسرید سرم با گروه کنترل مشاهده نشد ($P>0.05$)، ولی فعالیت آنزیم مذکور به میزان ۱۶ درصد نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود و میزان تری گلیسرید کبدی نیز به طور معنی داری در گروه تست نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود ($P<0.05$).

بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از وجود یک یا چند ماده موثر در پسته وحشی است به طوری که در کوتاه مدت باعث افزایش کلسترول در کلیه فراکسیون‌های لیپوپروتئینی می‌شود. برای درک بهتر مکانیسم اثر آن بایستی از پسته وحشی عصاره الکلی و آبی تهییه و بر روی متабولیسم چربیها آزمایش نمود. از طرف دیگر در دراز مدت این اثر افزایشی بر متابولیسم کلسترول مشاهده نمی‌شود. این پدیده احتمالاً ناشی از وجود فراوان اسیدهای چرب ضروری لینولئیک و لینولینیک در پسته می‌باشد که در دراز مدت باعث کاهش کلسترول می‌شود. با توجه به اینکه آنزیم فسفاتیدات فسفوھیدرولاز در تشکیل کبد چرب نقشی مهم دارد و پسته وحشی می‌تواند باعث کاهش فعالیت آن و در نتیجه کاهش میزان سنتز تری گلیسرید کبدی در کوتاه مدت و بلند مدت گردد، می‌توان از پسته وحشی در درمان کبد چرب از طریق جدا سازی و تخلیص اجزاء موثر آن استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: پسته وحشی، فسفاتیدات فسفوھیدرولاز، تری گلیسرید، کلسترول

* نویسنده مسئول: استادیار، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

E-mail: heidarian46@yahoo.com

آنزیم در بیوستزر فسفولیپیدهای غشاء اثر می گذارد(۶). در سلول پستانداران دو نوع آنزیم فسفاتیدات فسفوھیدرولاز شناسایی شده است؛ ۱) PAP₁ که بین سیتوزول و شبکه آندپلاسمی توزیع شده است و در تنظیم سنتر گلیسرولیپیدها دخالت می کند، ۲) فرم دیگر آنزیم که PAP₂ نامیده می شود غالباً در غشاء پلاسمایی یافت می شود و در انتقال سیگنال سلولی (Signal transduction) (دخالت دارد)(۷).

با توجه به اینکه درخت پسته وحشی به شکلی گسترده در کشور ایران رشد می کند، هدف از این تحقیق بررسی تأثیر پسته وحشی بر فعالیت آنزیم کلیدی مسیر بیوستزر چربیها یعنی فسفاتیدات فسفوھیدرولاز، چربیها و لیپوپروتئینهای سرم موش صحرایی (رت) بوده است.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت تجربی در سال ۱۳۸۶ در گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت.

۱) مواد

اسید فسفاتیدیک و دی تیوتیریتول از شرکت Sigma (آمریکا)، سدیم تترابورات، سرم البومن گاوی و تریس هیدروکلراید، اتانول، کلروفرم، دی اتیل اتر، سدیم پیروسولفت، هیدروکینون، اسید آسکوربیک، سدیم کربنات، سدیم سولفت، اسید تری کلرواستیک، EGTA، EDTA، PMSF از شرکت Merck (آلمان) خریداری و تهیه گردید.

۲) حیوانات مورد آزمایش

در این تحقیق از موشهای صحرایی نر سفید از نژاد Wistar با میانگین وزنی 20 ± 16 گرم استفاده گردید. موشهای از انستیتو پاستور تهران خریداری و در اتاق حیوانات در دمای $5^{\circ}\text{C} \pm 20$ در گروه های ۶ تایی در قفس های جداگانه قرار گرفته و تحت شرایط ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی نگهداری شدند.

موشهای آزادانه به آب، غذای مخصوص موش پودر پسته وحشی به نسبت مشخص دسترسی داشتند. موشهای ۱۲ ساعت قبل از کشته شدن از آب و غذا منع شدند. به منظور حصول سازش با محیط، تمامی

مقدمه

عادات غذایی یکی از عوامل موثر بر روی ریسک فاکتورهای کرونری و هیپرلیپیدمی است. هر چند مصرف داروهای شیمیایی ضد چربی مثل ژمفیبروزیل، کلوفیرات و استاتین ها باعث کاهش چربی خون و عوارض قلبی عروقی می شوند ولی اینگونه داروها عموماً دارای عوارض جانبی نیز هستند. در جستجو برای ترکیبات فعال زیستی غذاها، که به شکلی موثر ریسک بیماری قلبی-عروقی و هیپرلیپیدمی را تحت تاثیر قرار دهند بیشتر به مصرف زیاد آجیل ها (Nuts) توجه شده است(۱). اخیراً در نتایج مطالعات انجام شده، اثرات مفید آجیلهای، خصوصاً بادام و گردو بر سطح لیپیدهای سرمی و متعاقب آن عوارض سرخرگ کرونری گزارش شده است. مکانیسم اختصاصی و یا مکانیسمهای تعیین کننده این بهبودی بر پروفیل لیپیدی و یا کاهش ریسک بیماری سرخرگ کرونری ناشناخته است، اما ممکن است با محتوای چربی غیراشباع آجیل ارتباط داشته باشد. همه آجیلهای دارای سطح بالایی از چربیهای غیراشباع مونو یا پلی و سطح پایینی از چربیهای اشباع هستند. ترکیب اسید چرب هر نوع آجیل با قیمه انواع آن متفاوت است. بعلاوه آجیلهای از نظر فیبر، ویتامین E و ترکیبات دیگر غنی هستند(۲).

پسته وحشی (Pistachia) متعلق به خانواده آناتاکاردیاسه (Anacardiaceae) می باشد. گونه های خنجوک (Pistachia khinjuk) و آتلاتیک (Pistachia atlantica) دو گونه مهم هستند که با درختان مختلف در منطقه زاگرس ایران رشد می کنند(۳). با توجه به وجود میزان زیاد اسیدهای چرب غیر اشباع در پسته(۴،۵)، می توان به تأثیر این آجیل بر پروفایل لیپیدی و آنزیمهای درگیر در متابولیسم چربیها اشاره نمود. یکی از مهمترین آنزیمهای کلیدی درگیر در متابولیسم چربیها فسفاتیدات فسفوھیدرولاز (Phosphatidate phosphohydrolase، PAP) می باشد. آنزیم فسفاتیدات فسفوھیدرولاز (PAP,EC 3.1.3.4) اسید فسفاتیدیک را به دی اسیل گلیسرول و فسفات معدنی تبدیل می کند. این واکنش در نقطه ابتدایی متابولیسم گلیسرولیپیدها واقع شده است. تغییر فعالیت

درمان کاو(ایران) انجام شد. HDL-کلسترول با روش رسوبی HDL اندازه گیری شد. در مرحله اول، معرف رسوب دهنده به سرم افزوده شد تا ترکیبات غیر لیپوپروتئینی HDL مجتمع شوند. سپس این ترکیبات با استفاده از سانتریفیوز به مدت ۱۰ دقیقه رسوب داده شدند. آنگاه HDL-کلسترول با روش آنزیمی اندازه گیری شد(۱۰). LDL-کلسترول بر اساس فرمول فرید-والد (Fridewald) (۱۱) محاسبه گردید و کلسترول از تقسیم تری گلیسرید بر عدد ۵ محاسبه گردید(۱۱). تخلیص تری گلیسرید از بافت کبد بر اساس این تغییر یافته فولج که توسط نورمن (Norman) (۱۲)، سپس میزان تری گلیسرید موجود در آن مطابق با روش تعیین تری گلیسرید نمونه های پلاسما اندازه گیری شد.

۴) تحلیل آماری

نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد آنالیز آماری قرار گرفت. با بدست آوردن میانگین، میانگین خطای استاندارد متغیر دو گروه (رزیم غذایی حاوی ۱۰ درصد پسته وحشی و شاهد)، با استفاده از روش مقایسه ای T-test معنی دار بودن اختلاف بین دو متغیر در دو گروه درسطح ۵ درصد مورد بررسی قرار گرفت.

یافته های پژوهش

۱) تاثیر پودر پسته وحشی

نتایج بدست آمده از سنجش فعالیت آنزیم در دوره ۱۵ روزه در جدول ۱ و نمودار شماره ۱ نشان داده شده است. یافته ها نشان می دهد که فعالیت آنزیم در این دوره حدوداً ۱۱ درصد کاهش یافته است. هر چند این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نیست ($P>0.05$).

نتایج نشان می دهد که غلظت کلسترول توتال، تری گلیسرید سرم، HDL-کلسترول، LDL-کلسترول و VLDL-کلسترول در دوره ۱۵ روزه نسبت به شاهد به ترتیب $۲۴/۰۲$ ، $۲۲/۳۱$ ، $۱/۳۹$ و $۳۰/۵۴$ درصد افزایش داشته است(جدول شماره ۲). به طوری که افزایش کلسترول توتال، HDL-کلسترول و LDL-کلسترول معنی دار بود($P<0.05$). اما افزایش تری گلیسرید سرم و VLDL-کلسترول در این دوره معنی دار نبود($P>0.05$). تری گلیسرید کبدی در این

آزمایشها پس از گذشت یک هفته از استقرار حیوانات در لانه حیوانات انجام گردید.

۳) روش تهیه ی غذای حاوی پسته وحشی

پس از خریداری پسته وحشی دانه های سالم و مغز دار جدا و تمیز شده و در درجه حرارت اطاق و در سایه خشک گردید. پس از آسیاب نمودن، پودر بدست آمده با نسبت ۱۰ درصد با غذای پودر شده استاندارد موش مخلوط و مجدداً غذای مخصوص موش (حاوی ۱۰ درصد پسته وحشی) تولید گردید.

۴) گروه بندی و دوره های غذایی

این تحقیق در یک دوره کوتاه مدت ۱۵ و یک دوره بلند مدت ۶۰ روزه انجام گردید. ۲۴ سر موش به طور تصادفی به ۴ گروه شامل شاهد ۱۵ روزه، تست ۱۵ روزه، شاهد ۶۰ روزه و تست ۶۰ روزه تقسیم شدند. گروه شاهد از غذای معمولی پلیت شده و گروه تست از غذای معمولی حاوی ۱۰ درصد پسته وحشی تغذیه شدند.

۵) اندازه گیری فعالیت آنزیم PAP و لیپوپروتئین ها

فعالیت آنزیم PAP در حجمی معادل $L_{250\mu}$ از 100 mM بافر تریس هیدروکلراید با $\text{pH}=7/4$ و شامل $2\text{ میلی مولار MgCl}_2$ ، $1\text{ میلی مولار Dی تیوتربیتول}$ ، $1\text{ میلی مولاراز EDTA}$ و 1 میلی مولار EGTA فسفاتیدات اندازه گیری شد(۸). یک واحد آنزیمی نیز مقدار آنزیمی در نظر گرفته شد که بتواند ۱ میکرومول فسفات معدنی را تحت شرایط استاندارد سنجش در مدت یک دقیقه آزاد کند(۸). مقدار پروتئین به روش برادفورد(۹) و با استفاده از سرم آلبومین گاوی به عنوان استاندارد اندازه گیری گردید.

نمونه خون مورد نیاز جهت اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی سرم از شبکه رترو اریتال چشم موش با استفاده از لوله های مویینه تهیه و بعد از لخته شدن خون سرم با سانتریفیوز در سرعت ۳۵۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه جداسازی گردید. میزان کلسترول و تری گلیسرید سرمی با استفاده از کیت شرکت درمان کاو(ایران) از طریق کالری متیریک تعیین گردید. سنجش لیپوپروتئینها بر اساس ترکیبی از روش رسوبی و اولتراسانتریفیوز(۱۰) و با استفاده از کیت های شرکت

یافته ها نشان می دهد که غلظت کلسترول توتال، HDL-کلسترول، LDL-کلسترول و VLDL-کلسترول به ترتیب $13/69$, $9/81$, $12/67$ و $25/30$ درصد نسبت به گروه شاهد افزایش داشته، ولی مقدار تری گلیسرید سرمی در این دوره کاهش $2/62$ درصدی داشت. با این وجود پارامترهای خونی مذکور اختلاف معنی داری را در گروه شاهد و تست نشان ندادند ($P>0.05$). از طرف دیگر تری گلیسرید کبدی در این دوره $20/2$ درصد کاهش یافته بود(نمودار شماره ۲) که این کاهش از نظر آماری معنی دار بود($P<0.05$).

دوره ۱۹/۵۹ درصد کاهش یافته(نمودار شماره ۲) که این کاهش از نظر آماری معنی دار بود($P<0.05$).

یافته های بدست آمده از اندازه گیری فعالیت آنزیم در دوره ۶۰ روزه در جدول ۱ و نمودار شماره ۱ نشان داده شده است. فعالیت آنزیم در این دوره از کاهش ۱۶ درصدی نسبت به گروه شاهد برخوردار بود اما معنی دار نبود($P>0.05$).

نتایج سنجش میزان چربیها و لیپوپروتئینها پس از مصرف جیره حاوی پودر پسته و حشی در دوره ۶۰ روزه در جدول ۳ ارائه شده است. این


جدول ۱. فعالیت مخصوص آنزیم PAP بر حسب (nmol Pi/min/mg protein) (در دورهای ۱۵ و ۶۰ روزه)

تغییرات (درصد)	گروه تست	گروه شاهد	
- % ۱۱	$6/55 \pm 0/82$	$7/36 \pm 0/72$	فعالیت آنزیم در دوره ۱۵ روزه
- % ۱۶/۵۷	$7/60 \pm 0/40$	$9/11 \pm 1/19$	فعالیت آنزیم در دوره ۶۰ روزه


اعداد به صورت Mean \pm SEM نشان داده شده اند.

افزایش و کاهش تغییرات بصورت درصد نسبت به گروه شاهد است. تعداد رتهای هر گروه ۶ سر بود.

نمودار شماره ۱. نمودار تاثیر پسته و حشی بر میزان فعالیت آنزیم PAP در دوره زمانی ۱۵ و ۶۰ روزه



نمودار شماره ۲. نمودار تاثیر پسته وحشی بر غلظت تری گلیسرید کبدی رتها در دوره زمانی ۱۵ و ۶۰ روزه



جدول ۲. غلظت چربیها و لیبوبروتئین ها در گروه شاهد و تست تحت تاثیر پسته وحشی در دوره ۱۵ روزه

تغییرات (درصد)	گروه تست	گروه شاهد	پارامتر
+ % ۲۴/۰۲	۸۱/۵۲ ± ۲/۲۶ *	۶۵/۷۳ ± ۴/۳۵	کلسترول توتال (mg/dl)
+ % ۱/۳۹	۷۴/۸۰ ± ۲/۰۷	۷۳/۷۷ ± ۱۰/۴۲	تری گلیسرید سرم (mg/dl)
+ % ۲۲/۳۱	۵۰/۲۰ ± ۲/۲۱ *	۴۱/۰۴ ± ۲/۹۳	کلسترول-HDL (mg/dl)
+ % ۱۰۰/۲	۱۶/۹۴ ± ۳/۴۷ *	۸/۴۶ ± ۱/۵۷	کلسترول-LDL (mg/dl)
+ % ۳۰/۵۴	۱۴/۹۶ ± ۰/۴۱	۱۱/۴۶ ± ۱/۰۱	کلسترول-VLDL (mg/dl)
- % ۱۹/۵۹	۳/۹۸ ± ۰/۱۵ *	۴/۹۵ ± ۰/۱۴	تری گلیسرید کبد (mg/g r)

اعداد به صورت Mean ± SEM نشان داده شده اند. افزایش و کاهش تغییرات بصورت درصد نسبت به گروه شاهد است.

ستاره ها معنی دار بودن اعداد را نسبت به گروه شاهد نشان می دهد ($P<0.05$). تعداد رتها هر گروه ۶ سر بود.

جدول ۳. غلظت چربیها و لیپوپروتئین‌ها در گروه شاهد و تست تحت تاثیر پسته و حشی در دوره ۶۰ روزه

تغییرات (درصد)	گروه تست	گروه شاهد	پارامتر
+٪ ۱۳/۶۹	۷۴/۵۶ ± ۴/۹۲	۶۵/۵۸ ± ۴/۴۴	کلسترول توتال (mg/dl)
-٪ ۲/۶۲	۷۱/۸۳ ± ۵/۹۸	۷۳/۷۷ ± ۱۰/۴۲	تری گلیسرید سرم (mg/dl)
+٪ ۹/۸۱	۴۵/۸۶ ± ۱/۳۴	۴۱/۷۶ ± ۳/۰۳	HDL-کلسترول (mg/dl)
+٪ ۱۲/۵۷	۹/۶۹ ± ۱/۷۳	۸/۶۰ ± ۱/۹۱	LDL-کلسترول (mg/dl)
+٪ ۲۵/۳۰	۱۴/۳۶ ± ۱/۱۹	۱۱/۴۶ ± ۱/۰۱	VLDL-کلسترول (mg/dl)
-٪ ۲۰/۲۰	۳/۹۵ ± ۰/۲۷ *	۴/۹۵ ± ۰/۲۲	تری گلیسرید کبد (mg/gr)

اعداد به صورت Mean ± SEM نشان داده شده اند. افزایش و کاهش تغییرات بصورت درصد نسبت به گروه شاهد است.

ستاره معنی دار بودن اعداد را نسبت به گروه شاهد نشان می دهد ($P<0.05$). تعداد رتهای هر گروه ۶ سر بود.

بحث و نتیجه گیری

بیماری آترواسکلروز توصیه کرد. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط ما، تاکنون هیچ مطالعه‌ای بر روی مکانیسم اثر پسته و حشی بر کاهش چربی‌های خون انجام نشده است. ولی مطالعات پراکنده‌ای بر روی برخی از خواص پسته و حشی انجام گرفته است. مثلاً کوماراسینگ و همکارانش آثار روغن پسته و حشی را بر روی پوست و نقش لاروشی آن بررسی کردند و یا مورائی و همکاران در سال ۱۹۹۳ اثرات روغن پسته و حشی را بر پارامترهای فارماکوکنیتیک مسدود کننده‌های بتا در موش بررسی کردند(۱۷). تنها در یک مطالعه نشان داده شد که مصرف پودر پسته و حشی (به صورت ۱۰ درصد و ۱۰۰ درصد) باعث کاهش چشمگیر غلظت تری گلیسرید، کلسترول، VLDL-کلسترول و LDL-کلسترول در خرگوش‌های نر می‌شود، در حالیکه غلظت HDL-کلسترول سرم به طور معنی داری افزایش یافته بود(۵)، ولی در این تحقیق مکانیسم اثر پسته و حشی بررسی نشده است.

از عوامل موثر در تاثیر پسته بر متابولیسم چربیها مدت زمان تغذیه رژیمی می‌باشد به طوریکه دوره

از عوامل مهم مرگ و میر در جوامع انسانی، بیماری‌های قلبی-عروقی از جمله آترواسکلروز است. در آترواسکلروز ناشی از هیپرلیپیدمی، تولید ایکوزانوئیدها (پروستاگلاندین‌ها، پروستاسیکلین‌ها و ...) تغییر می‌کند. از آنجا که پیش ساز این ترکیبات، اسیدهای چرب ضروری است، لازم است به نقش و اهمیت اسیدهای چرب خوارکی توجه شود(۱۰). نقش گیاهان مختلف در کاهش چربی‌های خون و در نتیجه کاهش بیماری‌های قلبی-عروقی شناخته شده است. در این زمینه می‌توان به شبکیه، شوید و برگ درخت گرد و اشاره نمود(۱۳،۱۴). مطالعات صورت گرفته، احتمال کاهش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی را با مصرف منظم گرد و نشان داده است. علت احتمالی این کاهش آن است که گرد و سرشار از اسیدهای چرب غیر اشباع با پیوند دوگانه است که حضور این ترکیبات سبب کاهش غلظت کلسترول تام و LDL-کلسترول سرم می‌شود(۱۵،۱۶). پسته نیز مانند گرد و دارای میزان فراوانی اسید چرب غیر اشباع است، در نتیجه می‌توان مصرف آن را همچون گرد و برای کاهش چربی‌های خون و جلوگیری از خطر

اسیدلینولئیک(۵) و عناصر معدنی(۱۸) می باشد و در این رابطه اثبات شده که این عوامل می توانند سبب کاهش فعالیت آنزیم PAP (۷) شوند. در این تحقیق، همچنین کاهش فعالیت PAP در هر دو دوره زمانی ۱۵ و ۶۰ روزه و در نتیجه کاهش مقدار تری گلیسرید موجود در کبد مشاهده شد. احتمالاً بخشی از کاهش فعالیت آنزیم به واسطه وجود اسید های اولئیک و لینولئیک در پسته است که باعث کاهش فعالیت آنزیم PAP و در نهایت کاهش میزان تری گلیسرید کبدی می شوند. بنابراین، با توجه به اینکه آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز در تشکیل کبد چرب نقشی مهم دارد و پسته وحشی می تواند باعث کاهش فعالیت آن و در نتیجه کاهش میزان ستتر تری گلیسرید کبدی در کوتاه مدت و بلند مدت گردد، می توان از پسته وحشی در درمان کبد چرب از طریق جدا سازی و تخلیص اجزاء موثر آن استفاده کرد.

غذایی ۱۰ روزه (کوتاه مدت) زمان کافی برای درک کلی اثرات رژیم غذایی بر روی متابولیسم کلسترول نیست(۱۸). به نظر می رسد عواملی که باعث افزایش کلسترول در فراکسیونهای لیپوپروتئینی سرم در دوره ۱۵ روزه می شوند عواملی مثل مقادیر زیاد صمغ(۱۹)، رزین(۲۰)، اسیدهای چرب ترانس(۲۱)، اسیدهای چرب غیراشباع پلی(۱۸)، اسیدهای چرب اشباع(۲۲)، کمبود مس(۲۳،۲۴) و اثر مهاری عنصر روی در متابولیسم مس(۲۳) باشد، اما در دوره بلند مدت تحت تاثیر ترکیبات پکتینی و استرولهای گیاهی(۲۵)، نوع فیبر غذایی(۱۵)، اسید چرب غیراشباع مونو(۲۶-۲۸) خصوصاً اسید اولئیک، اسید لینولینیک، اسید لینولئیک(۲۹،۱۵)(Lys/Arg ۱۵) آمینو اسید آرژنین(۳۰)، نسبت خلیلی پایین Arg/Lys(۳۱) این رویه بر عکس می شود، و محصولات ترپنوفئیدی(۳۱) این رویه بر عکس می شود، یعنی پارامترهای مذکور کاهش می یابند. علاوه بر این موارد، پسته وحشی حاوی مقادیر بالایی اسیداولئیک و

References

- 1-Peterson JM, et al. A Systematic review of the effects of nuts on blood lipid profiles in humans. *J Nutr*, 2005; 135: 2082-89.
- 2-Edwards K, Kwaw I, Matud J, Kurtz I. Effect of Pistachio nuts on serum lipid levels in patients with moderate hypercholesterolemia. *Am J. College of Nutrition*, 1999; 18(3):229-33.
- 3-Saffarzadeh A , et al. Determination of the chemical composition of acorn (*Quercus branti*), *Pistacia atlantica* and *Pistacia Khinjik* seeds as non-conventional feedstuffs. *Acta Agr Kapos*, 1999; 3: 59-69.
- 4- خلاصه مقالات اولین سمینار ملی بنه، ایلام، انتشارات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان ایلام. ۱۳۷۴. ص ۲۱-۳۸۱.
- 5- نظیفی سعید، صائب مهدی، یاوری مرتضی، جلالی جعفر، بررسی تاثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی ها و لیپو پروتئین های سرم خون خرگوش های نر. مجله علمی غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۸۴؛ سال هفتم شماره ۱ . ص ۷۳-۸.
- 6-Walton PA, Possmayer F. The effects of triton X-100 and chlorpromazine on the Mg²⁺-dependent and Mg²⁺-independent phosphatidate Phosphohydrolase activities of rat lung. *Biochem J*, 1989; 261:673-8.
- 7-Elabbadi N, Day CP, Gamou A, Zyad A, Yeaman SJ. Relationship between the inhibition of phosphatidic acid phosphohydrolase-1 by oleate and oleoyl-CoA ester and its apparent translocation. *Biochimie*, 2005; 87:437-43.
- 8-Haghghi B, Heidarian E. Evidence for an essential lysine residue on cytosolic phosphatidate phosphohydrolase from rat liver. *Iranian J Sci Thech*, 2001; 25:175-82
- 9-Bradford M, Anal Biochem. 1976; 72: 248-54.
- 10-Burtis CA, Ashwood ER, Tietz. *Textbook of Clinical Chemistry*. Philadelphia, WB Saunders Co. 1994; 1002-93.
- 11-Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. *Clin Chem*, 1972; 18(6):499-502.
- 12-Norman SR. Preparation of lipid extract. In Johan M.L. Ed Methods in enzymology. London, Academic press, 1969; 14: 245.
- 13- جلودار غلامعلی، نظیفی سعید. بررسی اثر پیاز، سیر و شبله بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موش های

- صحرايي ديباتي. مجله علمي دانشکده دامپيششكى شهيد چمران /هوزار، ۱۳۷۷؛ سال ۱؛ شماره ۱، ص ۷۱-۸۱.
- ۱۴- جلودار غلامعلی، نظيفي سعيد. بررسی اثر گيشنیز، انار و برج درخت گرد و بروی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موش های صحرايي ديباتي. مجله علمي پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد، ۱۳۷۸؛ سال ۷، شماره ۱؛ ص ۷۷-۸۲.
- 15-Sabate J, Fraser GE, Burke k, Knutsen SF, Bennett H, Lindsted KD. *Effects of walnuts on serum lipid levels and blood pressure in normal men.* N Engl J Med, 1993; 328(9):603-7.
- 16-Zambón D, Sabaté J, Muñoz S, Campero B, Casals E, Merlos M, Laguna JC, and Ros E. *Substituting walnuts for monounsaturated fat improves the serum lipid profile of hypercholesterolemic men and women.* PubMed, 2000; 132(7): 538-46.
- 17-Kumarasinghe SP, Karunaweera ND, Ihalamulla RL, Arambewela LS, Dissanayake RD, Larvical. *Effects of mineral turpentine, low aromatic white spirits, aqueous extracts and essential oil of betel leaf (piper betel) on Chrysomya megacephala.* Int J Dermatol, 2002, 41(12): 877-80.
- 18-Howell TJ, MacDougall DE, and Jones PJH. *Phytosterols partially explain differences in cholesterol metabolism caused by corn or olive oil feeding.* J. Lipid Res, 1998; 39:892-900.
- 19-Kang JS, Wanibuchi H, Salim EI, Kinoshita A, Fukushima S. *Evaluation of the toxicity of mastic gum with 13 weeks dietary administration to F344 rats.* Food and Chemical Toxicology, 2007; 45: 494-501.
- 20-Robins SJ, Fasulo JM, Lessard PD, and Patton GM. *Hepatic cholesterol synthesis and the secretion of newly synthesized cholesterol in bile.* Biochem J, 1993; 289: 41-44.
- 21-Hu FB, Stampfer MJ, Manson JE, Rimm EB, Colditz GA, Rosner BA, Speizer F E, Hennekens CH, Willett WC. *Frequent nut consumption and risk of coronary heart disease in women; a prospective cohort study.* BMJ, 1998; 317:1341-5.
- 22-Etherton PK, Yu-Poth S, Sabaté J, Ratcliffe HE, Zhao G, and Etherton TD. *Nuts and their bioactive constituents; effects on serum lipids and other factors that affect disease risk1,2.* Am J Clin Nutr, 1999; 70:504-11.
- 23-Klevay LM, and Combs GFJr. *Mineral elements related to cardiovascular health.* World Health Organization. Geneva, 2004.
- 24- Valsala P., and Kurup PA. *Investigations on the mechanism of hypercholesterolemia observed in copper deficiency in rats.* J Biosci, 1987;12:137-142.
- 25-O'brien BC, and Reiser R. *Comparative effects of purified and human-type diets on cholesterol metabolism in the rat.* J Nutr, 1979;109: 98-104.
- 26-Kocyigit A , Koju AA , Keles H. *Effects of pistachio nuts consumption on plasma lipid profile and oxidative status in healthy volunteers.* Nutr Meta & Cardiov Dis, 2006; 16:202-9.
- 27-Garg ML, Blake RJ, and Wills RBH. *Macadamia nut consumption lowers plasma total and LDL cholesterol levels in hypercholesterolemic men.* J Nutr, 2003;133:1060-63.
- 28-Kris-Etherton PM, Pearson TA, Wan Y, Hargrove RL, Moriarty K, Fishell V, and Etherton TD. *High-monounsaturated fatty acid diets lower both plasma cholesterol and triacylglycerol concentrations.* Am J Clin Nutr ,1999; 70:1009-15.
- 29-Grundy SM. *Monounsaturated fatty acids and cholesterol metabolism; implications for dietary recommendations.* J Nutr, 1989; 119: 529-33.
- 30-Anonymous "Source naturals cholestrex." Printed on recycled paper. Source Naturals, Inc.1995.
- 31-Elson CE, and Yu SG. *The chemoprevention of cancer by mevalonate-derived constituents of fruits and vegetables.* J Nutr, 1994;124: 607-14.



Effects of Pistachio Nut Powder on Rat Liver Phosphatidate Phosphohydrolase and Serum Lipids and Lipoproteins Profile

*Heidarian E.*¹, Hajihossaini R.², Jafari Dehkordy E.³, Omidi H.⁴*

Abstract

Introduction: Although the consumption of chemical drugs such as clofibrate and statins reduce serum lipids, they have undesirable side effects. So, at the present time the use of medicinal plants are preferred, because they are cheap, beneficially effective and of low undesirable side effects. The nuts of Anacardiace family have hypolipidemic effects on serum lipid profile by unknown mechanisms.

Phosphatidate phosphohydrolase (PAP) is a key regulator enzyme in lipid metabolism. Therefore, the aim of this study is to determine effects of Pistacia khinjuk nut on PAP, serum lipid profile and liver content triglyceride in rats.

Materials and Methods: Four groups of rats ($n=6/\text{group}$) were fed with normal diet (control) or normal diet plus 10% pistachio nut powder for 15 and 60 days . Then, PAP activity, triglyceride, total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, VLDL- cholesterol, and liver content triglyceride were measured.

Findings: Feeding rats with pistachio nut for 15 days had significant elevated cholesterol in all lipoprotein fractions and reduced liver content triglyceride ($P< 0.05$). Although, PAP activity reduced approximately 11%, it was not significant in control group ($P>0.05$). On

the other hand, rats fed with pistachio nut for 60 days had no significant differences with control group in all lipoprotein fractions ($P>0.05$), whereas the liver content triglyceride significantly decreased($P<0.05$). In addition, PAP activity also decreased nearly 16% with respect to control group.

Conclusion: The data shows that in pistachio nut, there is one or some substances able to elevate cholesterol metabolism. Hence, for understanding the effect of pistachio nut on lipid metabolism, it is necessary to prepare alcohol and water extraction of pistachio nut and examine them. On the other hand, in long time, no significant affection was seen. This may be due to the effect of essential fatty acids of nut, linoleic and linolenic, that can reduce serum lipids. Considering the fact that PAP is involved in the formation of fatty liver and also pistachio nut can result in reduction of liver content triglyceride by decreasing PAP activity in short and long courses, the pistachio nut can be used for the treatment of fatty liver through isolation and purification of effective components of it.

Key words: pistachio nut, phosphatidate phosphohydrolase, triglyceride, cholesterol

1. Assist Prof., Biochemistry Dept, Ilam University of Medical Sciences (Corresponding author)

2. Payam-e-Nour University, Tehran Branch

3. Health Center of Shahre-kord , University of Medical Sciences