

تعیین ارتباط بین دو شاخص شدت تمرین (%VO₂max و %HRmax) هنگام فعالیت ارگومتری زیربیشینه در افراد نوجوان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک (۱۰ تا ۱۴ سال)

مجتبی ایزدی^{*}، قدرت الله باقری^۱، حسین دوعلی^۲، حمید ثمری خلچ^۱، داود خورشیدی^۱

(۱) دانشجوی دکترا، گروه تربیت بدنی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
(۲) دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاریخ پذیرش: ۸۷/۱۲/۱۲ تاریخ دریافت: ۸۷/۴/۱

چکیده

مقدمه: مطابق با دستورالعمل انجمان پزشکی- ورزشی آمریکا (ACSM)، با توجه به ارتباط زیاد ضربان قلب (HR) و هزینه انرژی (VO₂) در افراد سالم، ثبت ضربان قلب در این افراد شیوه‌ای کاملاً مناسب برای کنترل فعالیتهای ورزشی است. از این رو، به دلیل سهولت و امکان پذیری ثبت ضربان قلب در فعالیت‌های ورزشی - توانبخشی، بیشتر مطالعات برای تجویز شدت تمرین از %HRmax به عنوان شاخصی پیشگو برای بیان %VO₂max استفاده می‌کنند. اخیراً، برخی مطالعات اشاره می‌کنند که ارتباط بین این دو شاخص طبق دستورالعمل ACSM در برنامه ورزشی - توان بخشی برخی بیماران و اشخاص معلول قابل اعمال نمی‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین %HRmax و %VO₂max در ۲۵ نوجوان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دایلیتی با میانگین سنی ۱۲±۲ سال بوده است.

مواد و روش‌ها: پاسخ‌های HR و VO₂ در حالت استراحت، پایان هر مرحله و انتهای آزمون ارگومتری مک مستر روی دوچرخه کارستنج با شرکت ۲۵ نوجوان فلج مغزی به صورت داوطلبانه و با رضایت والدین و همچنین تایید پزشک متخصص در این تحقیق اندازه گیری شد. سپس، از این پارامترها برای محاسبه دو شاخص %VO₂max و %HRmax استفاده گردید. از آنالیز رگرسیون برای تعیین ارتباط بین این شاخص‌ها استفاده شد و رگرسیون خطی بین این دو شاخص برای هر آرمودنی انجام شد.

یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان داد ارزش‌های %HRmax در هر مرحله از آزمون با ارزش‌های %VO₂max هم سان نبوده و با وجود ارتباط خطی، الگوی رگرسیون بین آنها از خط برازندگی فاصله دارد ($\%VO_2\text{max} = 1.55 \times \%HR_{\text{max}} - 66$, $R=0.76$). به عبارت دیگر، در هر مرحله از آزمون ارگومتری، ارزش‌های %HRmax به مرتب بالاتر از ارزش‌های %VO₂max در مقایسه با دستورالعمل ACSM بود.

بحث و نتیجه گیری: یافته‌ها اشاره می‌دارند که ارتباط بین این شاخص‌ها در بیماران اسپاستیک با دستورالعمل ACSM برای افراد سالم مشابه نیست. این یافته‌ها در کنار نتایج سایر مطالعات نشان می‌دهند که هر بیماری نسبت به تاثیر آن روی آمادگی بدنی و قلبی - عروقی و سیستم عصبی-عضلانی، ارتباط بین شاخص‌های ارزیابی شدت تمرین را بر هم می‌زند و ارتباط بین این شاخص‌ها در هر بیماری باید جداگانه بررسی شود.

واژه‌های کلیدی: اسپاستیک، شدت تمرین، ارگومتر، ضربان قلب

*نویسنده مسئول: دانشجوی دکترا، گروه تربیت بدنی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

E-mail: mojtabaizadi@yahoo.com

قلی - تنفسی یا عصبی - عضلانی یا ...، از الگوی خاصی پیروی می‌کند. برخی مطالعات دقیق دستورالعمل ACSM را در بعضی بیماریها جهت طراحی برنامه تمرینی با شدت مناسب در برنامه توانبخشی آن بیماران مورد ارزیابی قرار داده اند. اخیراً برخی مطالعات نشان داده اند که ارتباط بین %HRmax و %VO2max در افراد سالم که توسط دستورالعمل ACSM طراحی شده است برای برخی بیماریها و افراد ناتوان حرکتی قابل اعمال نمی باشد(۱،۲). بازبینی مطالعات در این زمینه نشان می دهد که علی رغم دقت دستورالعمل ACSM در خصوص تجویز شدت تمرین در افراد سالم، ارتباط بین این شاخص‌های شدت تمرین در هر بیماری باید به طور مجزا ارزیابی و تعیین شود. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و تعیین ارتباط بین %HRmax و %VO2max در بیماران فلچ مغزی اسپاستیک دایپلزی هنگام فعالیت ارگومتری زیربیشته (فعالیت روی دوچرخه آزمایشگاهی کارسنج) و ارائه فرمول و الگوی رگرسیون خطی مناسب بین این دو شاخص شدت تمرین به منظور ارائه برنامه ورزشی - توانبخشی با شدت مناسب و کارامد بدون هیچ عارضه جانبی نظری غش، تهوع، تشنج و صرع هنگام برنامه‌های توانبخشی در این بیماران بوده است.

مواد و روش‌ها

۲۵ نوجوان فلچ مغزی اسپاستیک ۱۰ تا ۱۴ ساله، داوطلبانه و با رضایت والدین و تایید پزشک متخصص از بین مدارس استثنایی شهرستان همدان به شیوه نمونه گیری دسترس در این مطالعه همبستگی شرکت کردند. شدت اسپاستیک در بیماران متوسط تا شدید و معادل درجه ۳ مقیاس تون عضلانی آشورد بود(۹).

قبل از شروع مطالعه همه آزمودنیها و والدین آنها از اهداف، مزایا و خطرات احتمالی پژوهش آگاه شدند و والدین فرم رضایت نامه را جهت شرکت فرزندان در تحقیق امضاء نمودند. همه آزمودنیها از اجرای فعالیت ورزشی جدی به مدت دو روز قبل از آزمون و همچنین از مصرف مواد مغذی برای ۲ ساعت قبل از آزمون منع شدند.

مقدمه

هر برنامه تمرینی بھینه به منظور رقابت ورزشی یا پیشرفت آمادگی قلبی - عروقی در افراد سالم یا بیمار به عواملی نظیر شدت، حجم، تکرار، طول دوره تمرین و شیوه اجرای تمرین مبتنی است. شدت تمرین عنصری اساسی در تجویز هر برنامه تمرینی هنگام فعالیتهای ورزشی - توانبخشی در افراد سالم و افراد دچار بیماری یا ناتوانی حرکتی می باشد(۱،۲). برای تجویز شدت تمرین در افراد سالم به طور گسترده ای از روش در صد حداکثر ضربان قلب(%HRmax) استفاده می شود(۳). روش دیگر تجویز شدت تمرین، شاخص درصد حداکثر اکسیژن مصرفی (%VO2Max) است(۴). شواهد پژوهشی نشان می دهند که این شاخص‌ها حسب برخی عوامل اثرگذار، میزان یا درصد متفاوتی از فشار کاری بیشینه که هنگام فعالیت روی بدن اعمال می شود را به نمایش می گذارند. به طوری که فعالیت در هر سطحی (درصد) از یکی از شاخص‌ها ممکن است از نظر شاخصی دیگر با میزان متفاوتی از درصد بیشینه آن شاخص بیان شود(۵)، امری که مریبان ورزشی و فعالیت‌های توانبخشی را در ارائه برنامه تمرینی مناسب، موثر و بدون عوارض جانبی دچار اشتباہ می کند. كالج پزشکی - ورزشی آمریکا (ACSM) شدت تمرین مناسب جهت بهبود آمادگی قلبی - تنفسی در افراد سالم را در دامنه ۵۰ تا ۸۵ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی (%VO2Max) معادل (%HRmax) گزارش می کند(۲) و برای تجویز شدت تمرین در آنان شدت‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۵ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را هم ردیف با ۷۵، ۸۰ و ۹۰ درصد حداکثر ضربان قلب گزارش می کند(۶).

نکته قابل توجه این است که آیا با کاهش عملکرد قلبی - تنفسی یا اختلال در سیستم عصبی - عضلانی در نتیجه برخی بیماریها که نقش برجسته ای روی فعالیت بدنی یا تمرینات توانبخشی دارند، در میزان هم ترازی یا عدم هم ترازی شاخص‌های ارزیابی شدت‌های تمرین باید همانند افراد سالم عمل کرد یا هر نوع بیماری براساس اثر آن روی دستگاه

روش آماری: با استفاده از اطلاعات مربوط به HR و VO₂ در هر مرحله از آزمون و همچنین در دست داشتن مقدار VO_{2max} و HR_{max} آنها، ارزشهای %VO_{2max} و %HR_{max} برای هریک از مراحل آزمون در آزمودنیها مشخص شد و ارتباط بین هر جفت از این شاخص‌ها در هر مرحله توسط آنالیز رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS تعیین شد و فرمول رگرسیون خطی بین دو شاخص در گروه تحقیق مشخص شد.

یافته‌های پژوهش

هدف از مطالعه حاضر تعیین معادله رگرسیون خطی بین دو شاخص شدت تمرین (%HR_{max} ، %VO_{2max}) در ۲۵ نوجوان مبتلا به فلجه مغزی هنگام فعالیت زیربیشینه روی ACSM دوچرخه ارگومتر و مقایسه آن با دستورالعمل بود. میانگین و انحراف استاندارد شاخص‌های فیزیکی(وزن، قد، جنس) و همچنین متغیرهای فیزیولوژیکی آزمودنیها هنگام اجرای آزمون روی ارگومتر در جدول ۱ مشخص شده است.

همه بیماران آزمون ورزشی مک مستر که یک پروتکل زیربیشینه و ویژه کودکان است را روی دوچرخه کارستج (ارگومتر پایی، تنتوری، مدل E604 ، فنلاند) در شرایط مشابه اجرا کردند(۲). قبل از شروع آزمون مرحله گرم کردن در قالب ۲ دقیقه پدال زدن روی ارگومتر بدون هیچ بار کار اجرا شد. پروتکل مک مستر در ۴ مرحله متوالی ۲ دقیقه ای اجرا می‌شود با این تفاوت که با گذر از هر مرحله بار کار افزواده می‌شود. بار کار در مرحله اول ۱۲.۵ واحد است و سپس در هر یک از مراحل بعدی به میزان ۲۵ واحد برابر کار افزوده می‌شود. در فاصله ۱۰ ثانیه آخر هر مرحله از آزمون ضربان قلب آزمودنیها توسط ضربان سنج پولار(تله متری) ثبت شد. مقدار انرژی مصرفی(VO₂) در هر مرحله و همچنین کل آزمون محاسبه شد.


از اطلاعات مربوط به HR و VO₂ برای محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی(VO_{2max}) و شاخص‌های شدت تمرین (%HR_{max} ، %VO_{2max}) استفاده شد.

جدول ۱. میانگین و انحراف استاندارد شاخص‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها

متغیر	میانگین	انحراف استاندارد
سن(سال)	۱۲	۲
قد(سانتی متر)	۱۳۱	۶/۳۳
وزن(کیلوگرم)	۲۹/۸	۵/۶
ضریبان قلب استراحت	۸۱	۵
ضریبان قلب تمرین	۱۶۳	۷
حداکثر اکسیژن مصرفی(لیتر در دقیقه)	۱/۵۱	۰/۱۲

دارد($p<0.05$). الگوی رگرسیون خطی آزمودنیها در گروه تحقیق و همچنین ضربی همبستگی عبارت است از $R=0.76$ $%VO_{2max} = 1.55(%HR_{max}) - 66$ (شکل ۱).

برخی آزمودنیها (۳ نفر) قادر به اجرای آزمون تا آخرین مرحله ارگومتری نبودند. یافته‌های این تحقیق از نوعی الگوی رگرسیون خطی بین این دو شاخص در همه آزمودنیها حکایت می‌کند. اما الگوی رگرسیون خطی به میزان معنی داری از خط برآوردگی فاصله



شکل ۱: الگوی رگرسیون خطی بین % $\text{VO}_{2\text{max}}$ و % HR_{max} در آزمونهای هنگام فعالیت ارگومتری

بحث و نتیجه گیری

اشخاصی نظریه بیماران فلج مغزی که به نوعی دچار ناتوانی حرکتی تحت بار کارهای ویژه هستند نیازمند تجویز برنامه‌ای دقیق و محاسبه شده برای تمرین بر پایه هر یک از شاخص‌های شدت تمرین در برنامه‌های ورزشی و نوتوانی می‌باشد(۱۵). به منظور کسب آمادگی بهینه این بیماران در برنامه‌های تمرینی، تجویز دقیق شدت تمرین بر پایه هریک از شاخص‌های ارزیابی شدت تمرین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه برنامه‌های تمرینی متعددی به منظور اثر تمرین روی این بیماران انجام شده است، برنامه‌های مذکور باید متناسب با ویژگی بیماری و در محدوده فشار کار مناسب و ایمن تجویز شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از ضربان قلب در تجویز تمرین برای برخی بیماران معتبر نمی‌باشد و روش VO_2 باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

در بسیاری از بیماریها که فلج مغزی در زمرة آنها قرار دارد، استفاده از برخی از داروها به تغییر پاسخهای ضربان قلب منجر می‌شود که شامل نوسانات (کاهش یا افزایش) در ضربان قلب استراحت یا تمرین یا ضربان قلب بیشینه می‌گردد. این عوامل باعث کاهش اعتبار در ارائه شدت تمرین بر اساس روش % HR_{max} می‌شود که همچنین الگو و دستورالعمل ACSM در زمینه همپوشانی شاخص‌های شدت کار(% $\text{VO}_{2\text{max}}$)، % HR_{max} برای افراد سالم را برهم می‌زند و پیامد آن ارائه برنامه تمرینی یا توانبخشی با شدت تمرین نامناسب خواهد بود.

در زمینه تجویز و ارائه برنامه تمرینی با شدت

مزایای فیزیولوژیکی تمرینات ورزشی قبل از هر چیز به شدت تمرین بستگی دارد. شدت تمرین معمولاً به دو شیوه نسیی و مطلق اعمال می‌شود. شدت مطلق در واقع اعمال بار کار معین در یک دوره زمانی نظیر بار کار ۸۰ وات روی دوچرخه ارگومتر می‌باشد(۴). شدت نسبی به وسیله فشار فیزیولوژیکی نسبی که روی بدن اعمال می‌شود مشخص می‌شود و به عنوان درصدی از یک ظرفیت بیشینه نظیر حداکثر ضربان قلب، حداکثر اکسیژن مصرفی یا حداکثر ظرفیت تمرین تعریف می‌شود(۴). مطالعات علمی نشان می‌دهند که شدت تمرین مهمترین فاکتور تداوم و گسترش آمادگی قلبی- تنفسی است(۱۱، ۱۰، ۵). شدت تمرین هنگام برنامه‌های توانبخشی باید در دامنه‌ای متناسب با اهداف تمرینی اعمال شود نه اینکه به علائم کلینیکی جبران ناپذیر منجر گردد(۱۲).

برای تجویز شدت تمرین در افراد سالم به طور گستردگی از ضربان قلب استفاده می‌شود و در اغلب موارد به عنوان فاکتور تعیین کننده میزان متابولیک استفاده می‌شود. اما اغلب در آزمونهای آزمایشگاهی میزان متابولیک به وسیله تعیین اکسیژن مصرفی(vo_2) مشخص می‌شود. از آنجائی که در اکثر موارد غیر آزمایشگاهی امکان اندازه گیری vo_2 وجود ندارد، با فرض ارتباط خطی بین ضربان قلب و اکسیژن مصرفی، اندازه گیری ضربان قلب برای تعیین میزان شدت تمرین(% HR_{max}) در بسیاری از برنامه‌های ورزشی و توانبخشی در جمعیت‌های سالم و بیمار متناول است(۱۴، ۱۳، ۲).

مطالعه جو (Joo kc) روی بیماران قلبی نیز از این نظریه حمایت می کند(۱۲). این عوامل به نوعی خود الگوی هم سانی شاخص های شدت تمرین را تحت تاثیر قرار می دهد و هر کدام نه تنها به نوعی دستور العمل ACSM را برای تجویز برنامه تمرینی در این جمعیت های بیمار جایز نمی داند، بلکه به این نکته نیز اشاره دارند که الگوی رگرسیون بین این شاخص ها در هر بیماری به نسبت تاثیر آنها روی دستگاه های قلبی-عروقی و تنفسی و سیستم عصبی-عضلانی و مصرف داروهای اثرگذار متفاوت است(۴، ۲۵، ۲۶، ۲۳، ۲۱، ۱۱، ۱۰). بنابراین، تعیین ارتباط دقیق این شاخص ها در ارائه برنامه های توانبخشی بیماری های مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است.

نتایج تحقیق ما نشان داد که دستورالعمل ACSM برای ارائه تمرین در کودکان فلچ مغزی قابل اعمال نیست و ارتباط بین این دو شاخص شدت تمرین براساس الگو و معادله رگرسیون جداگانه ای مشخص می شود. همچنین معادله رگرسیون مطالعه ما در حمایت از یافته های سایر مطالعات روی دیگر بیماران چنین نتیجه می گیرد که نوع بیماری به نسبت تاثیر آن روی سیستم قلبی-تنفسی و عصبی-عضلانی به شدت ارتباط بین دو شاخص شدت %HRmax و %VO2max را تحت الشاعر قرار می دهد. یکی از دلایل احتمالی عدم هم سانی این دو شاخص شدت تمرین در این بیماران، تاثیر اختلالات عصبی-عضلانی روی عملکرد سیستم قلبی-تنفسی است که پیشنهاد می شود در مطالعات آتی مورد مطالعه قرار گیرد. تحقیقات بیشتری برای تعیین الگوی هم سانی و هم پوشانی شاخص های شدت تمرین در سایر بیماریها نیز توصیه می گردد.

References

- 1-Jie Kang, Justin S, Schweitzer, and Jay R Hoffman. Effect of order of exercise intensity upon cardiorespiratory, metabolic, and perceptual responses during exercise of mixed intensity. Eur J Appl Physiol 2003; 90: 569–74.

مناسب بر پایه هر یک از شاخص های شدت تمرین (%HRmax و %VO2max) و تعیین الگوی ارتباط بین این شاخص ها در انواع بیماری ها نظیر بیماران ناتوان قلبی مزمن(۱۶)، انسداد ریوی مزمن(۱۷، ۱۸)، بیماران قلبی(۱۹، ۲۰)، بیماران دیابتی(۲۱، ۲۰)، بیماران ناتوانی حرکتی(۲۲) مطالعات گسترده ای صورت گرفته است که یافته های اغلب آنها با دستور العمل ACSM در زمینه ارتباط این شاخص در افراد سالم متناقض است و به این نکته اشاره دارند که برای ارائه برنامه تمرینی بهینه و موثر در تمرینات توان بخشی، ارتباط بین شاخص های شدت تمرین در هر بیماری باید مستقیماً و جداگانه بررسی شود.

یافته های پژوهشی در زمینه ارتباط بین شاخص های شدت تمرین در افراد مختلف بر حسب میزان بالیدگی، شدت کار بیشینه یا زیر بیشینه، وضعیت قلبی- عروقی، نوع بیماری و به ویژه سطح آمادگی بدن متفاوت است. یافته های وونیش کاهش قابل توجه ضربان قلب استراحت و حداکثر ضربان قلب را به واسطه مصرف بتابلوکرها در بیماران قلبی-عروقی (Mezzani) گزارش کرده است(۳). مطالعه مزمانی (Mezzani) خاطرنشان می کند که برای تجویز شدت تمرین در بیماران ناتوانی قلبی مزمن، مقادیر شاخص های شدت تمرین در هر سطح معین از تمرین هم سان نبوده و ارتباط این شاخص ها در فعالیتهای توان بخشی هر نوع بیماری باید جداگانه بررسی شود(۱۶).

یافته های کولبرگ (Colberg) اشاره دارد که بیماران دیابتی به واسطه مصرف برخی داروهای، دارای ضربان قلب استراحت بالاتر و حداکثر ضربان قلب پائین تر از افراد سالم هستند که الگوی هم سانی بین شاخص های شدت کار را بر هم می زند(۲۰).

2-American College of Sports Medicine. ACSM guidelines for exercise testing and prescripyion. Baltimore: Lippincott Williams&Wilkins 2000: (6).

3-Wonisch M, et al. Influence of beta-blocker use on percentage of target heart

- rate exercise prescription. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003 Aug; 10(4):296-301.
- 4-Jeremy A, Steve E Selig, Ralph H. Comparing Methods For Prescribing Exercise For Individuals With Chronic Heart Failure. JEP onlin. 2005; 8(4):9-19.
- 5-Lynn B, James E. Relative heart rate, heart rate reserve and VO₂ during submaximal exercise in elderly. J Gerontol A Biol Med Sci. 1996 Jul; 51(4): 165-71.
- 6-Simmons DN, Berry MJ, Hayes SI, Walschlager SA. The relationship between %HRpeak and %VO₂peak in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Med Sci Sports Exerc. 2000 May; 32(5):881-6.
- 7-Swain DP, Abernathy KS, Smith CS, Lee SJ, Bunn SA. Target heart rates for the development of cardiorespiratory fitness. Med Sci Sports Exerc. 1994; 26(1):112-6.
- 8-Panton LB et al. Relative heart rate, heart rate reserve, and VO₂ during submaximal exercise in the elderly. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1996; 51(4):M165-71.
- 9-Bove AA, Lowenthal DT. Exercise medicine, physiological principles and clinical applications. Academic Press Orlando 1983.
- 10-David P, Swain DP, Brian C. Heart rate reserve is equivalent to %VO₂ Reserve, not to %VO₂ Max. Wellness Institue and Research center 1996; 17:235-39.
- 11-David P, Swain DP, Brian C, Michele E. Relationship between %Heart rate reserve and %VO₂reserve in treadmill exercise. Wellness Institute and Research Center. Old Dominion University, Norfolk VA. 1996; 4(11): 227-31.
- 12-Joo KC, Brubaker PH, MacDougall A, Saikin AM, Ross JH, Whaley MH. Exercise prescription using resting heart rate plus 20 or perceived exertion in cardiac rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil. 2004; 24(3):178-84.(quiz 185-6).
- 13-Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, Chaitman B, Eckel R, Fleg J, et al. Exercise standards: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 2001; 104:1614-1740.
- 14-Fletcher GF, Balady G, Blair SN, Blumenthal J, Caspersen C, Chaitman B, et al. Statement on exercise: benefits and recommendations for physical activity programs for all Americans. Circulation 1996; 94:857-62.
- 15-Holly RG, Shaffrath JD. Cardiorespiratory Endurance. In: Franklin B, editor. ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2001:449-459.
- 16-Mezzani A, Corra U, Giordano A, Cafagna M, Adriano EP, Giannuzzi P. Unreliability of the %VO₂ reserve versus %heart rate reserve relationship for aerobic effort relative intensity assessment in chronic heart failure patients on or off beta-blocking therapy. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Feb; 14(1):92-8.
- 17-Wen H, Gao Y, An JY, Chen QL, Zheng JP. Evaluation of exercise intensity for pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2007 Jan; 30(1):27.
- 18-Swain DP, Franklin BA. Is there threshold intensity for aerobic training in cardiac patients. Med Sci Sports Exerc. 2002 Jul; 34(7):1071-5.
- 19-Brawner CA, Keteyian SJ, Ehrman JK. The relationship of heart rate reserve to VO₂ reserve in patients with heart disease. Med Sci Sports Exerc. 2002 Mar; 34(3):418-22.
- 20-Colberg SR, Swain DP, Vinik AI. Use of heart rate reserve and rating of perceived exertion to prescribe exercise intensity in diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Care 2003 Apr; 26(4):986-90.
- 21-Sheri R, David P, Swain DP, Aaron I, Vinik MD. Use of heart rate reserve and rating of perceived exertion to prescribe exercise intensity in diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Care 2003; 26: 980-90.
- 22-Tolfrey K, Goosey-Tolfrey VL, Campbell IG. Oxygen uptake-heart rate relationship in elite wheelchair racers. Eur J Appl Physiol. 2001 Dec; 86(2):174-8.
- 23-Davis JA, convertio VA. A comparison of heart rate methods for predicting endurance training intensity. Med, Sci. Sports 1975; 7: 295-298.

24-Swain DP. %Heart rate reserve is equivalent to %VO2Reserve. Not to %VO2Max. Med Sci Sports Exerc. 1997; 29: 410-14.

25-Jakicic J, Donnelly JE. Difference between HRR, %VO₂, and RPE for exercise prescription for obese subjects. Med Sci. Sports Exerc. 1992; 24: S 1050.

◆ Assaciations Between Two Exercise Intensity Indexes (%VO₂max & %HRmax) During Submaximal Ergometry Exercise with Spastic Cerebral Palsy Teen-agers

*Izadi M^{*1}, Bagheri Gh², Dooali H¹, Samarkhalaj H¹, Khorshidi D¹*

(Received: Accepted:)

Abstract

Introduction: American College of Sports Medicine (ACSM) presumed that for normal people, heart rate (HR) monitoring represents a promising tool for measurement, because it is a physiological parameter that correlates well with energy expenditure (VO₂) and since HR monitoring in fielded exercise or rehabilitation is facilitated and feasible, many more studies used %HRmax as a suitable method for prediction of %VO₂max. Recently, some researches showed that relationship between %HRmax and %VO₂max described by ACSM is not applicable to some patients or handicapped people. The objective of this investigation was to determine the relationship between %HRmax and %VO₂max in 25 teenagers with diplegia spastic cerebral palsy (12±2 years old).

Materials & methods: HR and VO₂ responses to McMaster ergometry protocol monitored continuously at rest, end of each stage and the end of protocol in 25 teenagers with spastic participated in this study voluntarily and the consent of their parents as well as specialist physician. These parameters were then used for calculation of %HRmax and %VO₂max in the subjects. Regression analyses were conducted to determine correlation between

these indexes. Linear regressions of %HRmax and %VO₂max were performed for the cases.

Findings: The findings showed that %HRmax is not equivalent with %VO₂max and the regression line is not according to the identity line (%VO₂max = 1.55×%HRmax - 66, R = 0.76). In the other words, at each stage of protocol the values of %HRmax were very higher than %VO₂max in comparison with those used by the ACSM.

Conclusion: These results suggested that the relationship between these indexes in spastic patients is not similar to guidelines of ACSM and each disease depends on influence in physical and cardio-respiratory fitness, while neuromuscular system affects the relationship between exercise intensity indexes. Thus, the %HRmax versus %VO₂max relationship should be determined directly in each disease.

Key word: spastic, exercise intensity, ergometry, heart ra

1. Student of PhD, Faculty Member, Azad Islamic University of Saveh, Saveh, Iran

2. Assisst Prof., PhD of Sport Sciences&physical Training, , Azad Islamic University of Saveh, Saveh, Iran