

اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

ایرج طهماسبی و محمد حسن راشد محصل^۱

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم والگوهای کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت آزمایشی در سال ۱۳۸۲ در مرکز تحقیقات کشاورزی گریزه واقع در شهر سنندج به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. این آزمایش دارای سه فاکتور تراکم (درسه سطح؛ ۷۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار)، الگوی کاشت (درسه سطح؛ معمولی: کاشت در سطح پشتہ های با فاصله ۷۵ سانتیمتر؛ پشتہ های عریض: کاشت در طرفین پشتہ های عریض با حذف یک درمیان جو پچه های آبیاری وزیگزاگ)؛ کاشت دور دیفه به صورت زیگزاگ با فاصله ۲۰ سانتیمتر برروی پشتہ های با فاصله ۷۵ سانتیمتر) و هیبرید ذرت (دردو سطح KSC700 و KSC704) بود. طبق نتایج آزمایش افزایش تراکم موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه از بالاترین تراکم بدست آمد ولی بین دو تراکم دیگر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تراکم تاثیر معنی داری بر اجزاء عملکرد و حتی شاخص برداشت نداشت. تاثیر الگوی کاشت بر عملکرد دانه معنی دار بود. الگوی کاشت زیگزاگ دارای بیشترین والگوی کاشت یک درمیان دارای کمترین عملکرد دانه بود. به استثنای وزن هزار دانه و شاخص برداشت که برتری با الگوی کاشت زیگزاگ بود، الگوهای کاشت از نظر سایر اجزاء عملکرد تفاوت معنی داری نداشتند. دو هیبرید از نظر عملکرد دانه، تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال باهم اختلاف معنی داری نداشتند. از نظر تعداد ردیف دانه در بلال هیبرید KSC700، ولی از نظر تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه و شاخص برداشت KSC704 دارای برتری بود. در بین تیمارهای مختلف بیشترین عملکرد دانه مربوط به هیبرید ۷۰ در تراکم ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار در الگوی کاشت زیگزاگ بود.

واژه‌های کلیدی: ذرت، تراکم، والگوهای کاشت، KSC 704، KSC 700.

مقدمه:

می‌تواند تغییر کند، به نحوی که برخی از ارقام پرولیفیک ذرت^۱ در تراکمهای پایین و شرایط مناسب چند بلال در هر بوته تولید می‌کنند (۳۰). تعداد دانه در بلال بالافرایش تراکم به طور ناگهانی شروع به کاهش می‌کند (۳۵، ۳۶، ۴۵). کاهش تعداد ردیف دانه در بلال با افزایش تراکم بوته توسط افراد زیادی گزارش شده است (۴۵، ۴۶، ۴۷). برخی از محققین هم اشاره کرده‌اند که تراکم تاثیری بر تعداد ردیف دانه در بلال ندارد (۱۱، ۲۶). اکثر پژوهشگران اظهار می‌دارند که بالافرایش تراکم، تعداد دانه در ردیف بلال کاهش می‌یابد (۳۵، ۲۶، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۴۵، ۴۴، ۳۸). وزن هزار دانه، صفتی است که وابستگی بیشتری به

با توجه به نیاز روزافزون کشور به تامین مواد غذایی و تولید فرآورده‌های دائمی و سهم ذرت در جیره غذایی طیور بررسی عوامل مهم افزایش تولید این محصول استراتژیک اهمیت زیادی پیدا کرده است (۱۸).

بالافرایش تراکم عملکرد و اجزاء تک بوته کاهش می‌یابد، ولی عملکرد دانه در واحد سطح تاحد مطلوب افزایش نشان می‌دهد (۴۲، ۳۰، ۲۸).

تعداد بلال در بوته یک صفت کیفی است و تحت تاثیر محیط قرار نمی‌گیرد (۱۱، ۱۰)، ولی با این وجود تعداد بلال در هر بوته بسته به رقم کشت شده و تراکم گیاهی

۱- به ترتیب دانشجوی دوره دکترای زراعت گرایش عله‌های هرز و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

۲- ارقام با توانایی تولید بیش از یک بلال در بوته.

تحت تأثیرالگوی کاشت قرارنگرفت^(۷). ولی مقنی نصري^(۱۸)، اظهارداشته است که تعداد دانه دربلال (شامل تعداد ردیف و تعداد دانه در ردیف) و همچنین وزن هزاردانه درالگوی کاشت معمولی بیشتر بود. نجفی نژاد و همکاران^(۱۹)، هم اظهارداشته‌اند که الگوهای کاشت معمولی، کشت دوردیف روی پشته با فاصله ۲۰ سانتیمتر و به صورت مستطیل و نیز کشت دو ردیف بر روی پشته با فاصله ۲۰ سانتیمتر و به صورت متوازی الاضلاع، بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه تأثیری نداشت. اصغری و همکاران^(۱)، هم گزارش کرده‌اند که الگوی کاشت یک ردیفه و دوردیفه تفاوت معنی داری از نظر عملکرد دانه کل و عملکرد دانه تک بوته نداشته‌اند.

یکی دیگر از الگوهای کاشت پیشنهادی برای ذرت کاشت به صورت دوردیفه بر روی پشته‌های عریض ویا به عبارت بهتر، حذف یک درمیان جویچه‌های آبیاری درروش کاشت جوی پیشنهای است. در این الگوی کاشت به دلیل کاهش تعداد جویچه‌های آبیاری و همچنین کاهش سطح تبخیری، راندمان مصرف آب بالا می‌رود^(۱۷). این روش همچنین می‌تواند دربهینه نمودن و کاهش مصرف آب^(۱۸) تا ۵۰ درصد)، کاهش رشد علفهای هرزبه علت کاهش رطوبت دروسط پشته‌ها و جلوگیری از کاهش عملکرد ذرت در اثر شوری نسبی خاک موثر باشد^(۹). در صورتی که در این الگوی کاشت کاهش عملکرد محصول نسبت به الگوی کاشت معمولی معنی دار نباشد به علت صرفه جویی در مصرف آب می‌تواند حائز اهمیت باشد. فیش باخ و مولینز^(۳۲)، نتیجه گیری کرده‌اند که آبیاری جویچه‌های ذرت به صورت یک درمیان در خاک لومی رسی به طور متوسط ۲۹ درصد در مصرف آب آبیاری صرفه جویی نموده در حالی که کاهش محصول قبل ملاحظه نبوده است. اکبری و همکاران^(۳)، هم گزارش کرده‌اند که آبیاری یک درمیان جویچه‌ها در مقایسه با آبیاری کامل فاروها به مقدار قابل ملاحظه‌ای مصرف آب در کاهش داده در حالی که عملکرد محصول کاهش چشمگیری نشان نداد. نتایج مشابهی هم در مورد سایر محصولات زراعی از جمله سیب زمینی^(۲۲)، پنبه^(۳۴) و چغندر قند^(۱۴)، گزارش شده است. البته برخی از افراد نیز اثرسوء آبیاری یک در میان جویچه‌های آبیاری بر عملکرد محصول را گزارش کرده‌اند^(۲۰، ۴۰).

ویژگی‌های ژنتیکی ارقام دارد و کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد^(۱۰، ۱۶، ۳۹). به نظر می‌رسد که وزن هزاردانه جزء باثبات عملکرد باشد. پونلایت و همکاران^(۴۱)، نشان دادند که وزن هزاردانه در تنظیم عملکرد جزء موثری می‌باشد، اما نسبت به سایر اجزاء عملکرد از حساسیت کمتری برخوردار است. برخی از محققین هم اظهارداشته‌اند که تراکم تأثیر معنی داری بروزن هزاردانه دارد^(۱۱، ۵). با فرازیش تراکم بوته شاخص برداشت به طور معنی داری کاهش می‌یابد^(۲۳، ۲۵، ۲۷، ۳۳). گزارشات دیگری نشان می‌دهد که با فرازیش تراکم بوته شاخص برداشت افزایش می‌یابد^(۱۱، ۱۶، ۲۴، ۴۵). برخی مانند دلوگری و کروکستون^(۲۷)، هم معتقدند که شاخص برداشت کمتر تحت تأثیر تراکم بوته قرار می‌گیرد.

درالگوی کاشت معمولی، بوته‌ها در وسط پشته‌های با فاصله ۷۵ سانتیمتر و به صورت یک ردیفه کشت می‌شوند. در این الگوی کاشت به خاطر محدودیت‌هایی که در تامین رطوبت مورد نیاز گیاه مخصوصاً در اوایل دوره رشد وجود دارد، موجب رقابت شدید بوته‌ها در تراکمهای بالا می‌شود^(۹). یکی دیگر از مشکلات الگوی کاشت معمولی آرایش نامناسب و فاصله کم بوته‌ها روی ردیف است، که موجب می‌شود با افزایش تراکم بوته در واحد سطح، رقابت بین بوته‌ها زودتر شروع شده و این رقابت شدیدتر شود. یکی از روش‌های پیشنهادی برای رفع مشکلات الگوی کاشت معمولی، کشت دو ردیف ذرت در کنار پشته‌ها به صورت زیگزاگ است، که بعلت توزیع مناسب‌تر بوته‌ها، رقابت بین آنها کاهش یافته و موجب استفاده بهتر از عوامل محیطی، درنتیجه افزایش عملکرد محصول خواهد شد^(۷، ۱۲). از مزایای دیگر این روش امکان توزیع کود پایه مورد نیاز ذرت به صورت نواری در شیار وسط پشته‌های است که از آبشویی و هدر رفتن کودها در اثر آبیاری جلوگیری خواهد شد و کودها در طول دوره رشد به تدریج مورد استفاده قرار می‌گیرند^(۹).

کاشت دو ردیف ذرت بر روی یک پشته به صورت زیگزاگ در مقایسه با الگوی کاشت معمولی موجب افزایش عملکرد بلال^(۷)، عملکرد دانه^(۱، ۷، ۱۵، ۱۸)، تعداد بلال^(۱۸) و تعداد دانه در بلال شد، ولی تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه و شاخص برداشت

شد. عملکرد براساس ۱۴٪ رطوبت دانه محاسبه گردید. تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها به روش دانکن نیز با استفاده از نرم افزار MSTATC انجام شد.

نتایج و بحث

نتایج آزمایش بیانگر افزایش عملکرد دانه با افزایش تراکم بود (جدول ۱). بیشترین عملکرد دانه از تراکم ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار بدست آمد، اما از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین تراکمهای ۷۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار مشاهده نشد. علت افزایش عملکرد دانه با افزایش تراکم را می‌توان به پوشش مناسبتر سطح مزرعه توسط بوته‌ها و استفاده بهینه از عوامل محیطی ربط داد (۲، ۶، ۱۰).

هرچند افزایش تراکم تا حدودی موجب کاهش تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه و حتی شاخص برداشت شده است، اما از این نظر اختلاف معنی‌داری بین سطوح مختلف تراکم مشاهده نشد (جدول ۱).

نتایج آزمایش بیانگر عدم تاثیر معنی‌دار تراکم بر تعداد بلال در بوته می‌باشد (جدول ۱). در این رابطه افراد دیگر نیز نتایج مشابهی بدست آورده‌اند (۱۱، ۱۰، ۱۱). دلیل آن این است که تعداد بلال در بوته یک صفت کیفی بوده و تحت تاثیر محیط قرار نمی‌گیرد (۱۱)، با وجود این نتایج برخی تحقیقات هم نشان می‌دهد که تعداد بلال در بوته بسته به رقم کشت شده و تراکم گیاهی تغییرمی‌کند به نحوی که برخی از ارقام پرولیفیک ذرت در تراکمهای پایین و شرایط مناسب تولید چند بلال در بوته می‌کنند (۳۰).

در این آزمایش اختلاف معنی‌داری بین سطوح مختلف تراکم از نظر تعداد دانه در بلال مشاهده نشد (جدول ۱). هرچند که تعدادی از محققین گزارش کرده‌اند که تعداد دانه در بلال تحت تاثیر تراکم کاهش می‌یابد (۱۰، ۱۱، ۱۶). آنان دلیل کاهش تعداد دانه در بلال با افزایش تراکم را افزایش رقابت بین محلهای پرشدن دانه برای مواد پرورده می‌دانند، همچنین فاصله زمانی بین مرحله آزاد شدن دانه‌های گرده و ظهور کاکل‌ها از عوامل عقیمی و پرنشدن دانه‌های تک بلال است (۳۵، ۴۷). ادمیدزودی نارد (۳۱)، کاهش میزان فتوستتر در واحد گیاه، تولnar و همکاران (۴۶)، کاهش سرعت رشد گیاه و آندرید و همکاران (۲۱)، کاهش نفوذ نور فعال

این مطالعه با هدف تعیین بهترین تراکم و الگوی کاشت ذرت برای سنتنج و مناطق دارای شرایط مشابه انجام گردید.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در بهار و تابستان سال ۱۳۸۲ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه واقع در سه کیلومتری شهر سنتنج انجام شد. ارتفاع ایستگاه از سطح دریا ۱۳۷۳ متر می‌باشد، که در درجه ۴۷ ویک دقیقه طول شرقی و درجه ۳۵ و ۱۶ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. طبق آزمایشات عمل آمده بافت خاک مزرعه آزمایشی رسی لومی (۲۷ درصد رس، ۳۶ درصد سیلیت و ۳۷ درصد شن)، با PH معادل ۷/۴ و ۰/۸۲ درصد مواد آلی و نیز به ترتیب ۷VPPM و ۳۵۶PPM فسفر و پتاسیم قابل جذب بود، متوسط بلند مدت بارندگی در ایستگاه گریزه ۴۴۰ میلیمتر ثبت شده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور تراکم با سه سطح ۷۵۰۰۰، ۶۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار و سه آزمایش کاشت:

- معمولی (کاشت یک ردیف ذرت در وسط پشت‌های با فاصله ۷۵ سانتی‌متر) - ۲- یک درمیان (کاشت دور دیفه ذرت در طرفین پشت‌های عریض با حذف یک درمیان جویچه‌های آبیاری و ۳- زیگزاگ (کاشت دور دیفه ذرت با فاصله ۲۰ سانتی‌متر به صورت زیگزاگ در طرفین پشت‌های معمولی با فاصله ۷۵ سانتی‌متر)، به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دوهیبرید ذرت (KSC700 و KSC704) انجام شد.
- هرواحد آزمایشی شامل ۸ خط کاشت به طول ۷ متر و عرض ۶ متر بود. عملیات کاشت به صورت دستی انجام شد و فاصله بوته‌ها روی ردیف با توجه به تراکم مورد نظر تنظیم گردید. عملیات مبارزه با علفهای هرزبه صورت دستی و توسط کارگرانجام شد. عملکرد دانه با برداشت دو خط وسط هر کرت پس از حذف یک متر از ابتدا و انتهای هر کرت به عنوان حاشیه محاسبه گردید. اجزاء عملکرد شامل: تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در هر بلال (تعداد ردیف × تعداد دانه در هر ردیف بلال) و وزن هزار دانه (براساس پنج نمونه ۲۰۰ عددی بذر به صورت تصادفی از هر کرت) بود، که از طریق انتخاب ۱۰ بوته به صورت تصادفی از هر کرت در برداشت نهایی محاسبه گردید. در این آزمایش عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت نیز محاسبه

این، برخی از افراد گزارش کرده‌اند که با افزایش تراکم بوته شاخص برداشت به طور معنی‌داری کاهش می‌باید (۲۳، ۲۵، ۲۷، ۳۳). دلیل آن این است که افزایش رقابت در تراکمهای بالا به طور نسبی عملکرد دانه را بیشتر از عملکرد بیولوژیک کاهش می‌دهد (۴۷). البته تعدادی هم اظهار داشته‌اند که با افزایش تراکم بوته شاخص برداشت افزایش می‌باید (۴۴، ۴۳، ۲۴، ۱۶، ۱۱).

هر سه الگوی کاشت از نظر عملکرد دانه اختلاف بسیار معنی‌داری با هم داشتند (جدول ۱). بیشترین عملکرد دانه (۱۱۰۵۴ کیلو گرم در هکتار) متعلق به الگوی کاشت زیگزاگ بود والگوی کاشت معمولی با عملکرد ۱۰۱۲۱ ویک در میان با ۹۴۵۶ کیلو گرم در هکتار در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در مورد الگوی کاشت زیگزاگ علت افزایش عملکرد را می‌توان با آرایش مناسبتر بوته‌ها و افزایش یکنواختی توزیع شاخص سطح برگ (۳۷) و درنتیجه استفاده بهتر از عوامل محیطی مرتبط دانست. نتایج آزمایشات رفیعی و همکاران (۱۲)، بذرافشان و همکاران (۷)، صابری و همکاران (۱۵)، مقنی نصری (۱۸)، اصغری و همکاران (۱)، بنایی و همکاران (۸)، نتایج بدست آمده از این آزمایش را تایید می‌نمایند. در رابطه با عدم تاثیر الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هم گزارشاتی وجود دارد؛ مثلاً، نجفی نژاد و همکاران (۱۹)، اظهار داشته‌اند که الگوهای کاشت (کشت یک ردیف ذرت در وسط پشت، کشت دور دیف روی پشته با فاصله ۲۰ سانتی‌متر و به صورت مستطیل و نیز کشت دور دیف بر روی پشته با فاصله ۲۰ سانتی‌متر و به صورت متوازی الأضلاع)، بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاثیری نداشت (۱۹).

الگوی کاشت تاثیر معنی‌داری بر تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال، تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف بلال نداشت؛ اما از نظر وزن هزار دانه و شاخص برداشت اختلاف بسیار معنی‌داری بین الگوهای کاشت مشاهده شد. بیشترین وزن هزار دانه متعلق به الگوی کاشت زیگزاگ (۲۸۰/۲۰۷ گرم) بود ولی بین الگوی کاشت معمولی و یک در میان به ترتیب با وزن هزار دانه ۲۴۶/۴ و ۲۴۷/۷ گرم اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۱). بیشتر بودن وزن هزار دانه الگوی کاشت زیگزاگ را می‌توان به علت استفاده بهتر بوته‌ها از عوامل محیطی بعلت آرایش

در فتوسترن را دلیل کاهش تعداد دانه در بلال بیان کرده‌اند. نتایج بدست آمده از این آزمایش بیانگر عدم تاثیر معنی‌دار تراکم بر تعداد ردیف دانه در بلال است (جدول ۱). افراد دیگری نیز نتایج مشابهی در این رابطه بدست آورده‌اند (۴۵، ۴۶). دستفال و امام (۲۶)، علت آن را ثبات نسبی این جزء از عملکرد گفته‌اند. به عقیده آنان از آنجا که تعداد نهایی ردیف دانه پیش از قیمه اجزای عملکرد ببروی ناحیه نموی بلال تعیین می‌گردد، احتمالاً در مرحله تعیین تعداد ردیف دانه در بلال رقابت چندانی بین مقصد های فیزیولوژیکی برای مواد پرورده وجود نداشته و تراکم زیاد بوته در واحد سطح باعث کاهش معنی‌دار وزن دانه‌های هر بلال و تعداد دانه در هر ردیف می‌شود.

تعداد دانه در ردیف بلال هم تحت تاثیر تراکم قرار نگرفت (جدول ۱)، ولی برخلاف نتایج بدست آمده اکثر پژوهشگران اظهار داشته‌اند که با افزایش تراکم، تعداد دانه در ردیف بلال کاهش می‌باید (۳۸، ۳۵، ۲۶، ۱۱، ۴، ۵). آنها معتقدند که کاهش قابل توجه تعداد دانه در هر ردیف بلال و وزن دانه‌های بلال با افزایش تراکم نشان دهنده آن است که این جزء از عملکرد در مقایسه با تعداد ردیف دانه در بلال نسبت به افزایش تراکم بوته حساسیت بیشتری داشته و جزء تاثیرگذاری در تنظیم عملکرد دانه است (۴۴، ۳۸، ۳۵، ۲۶، ۴).

نتایج آزمایش بیانگر عدم تاثیر معنی دار تراکم بروزن هزار دانه بود (جدول ۱). برخی از محققین اظهار داشته‌اند که وزن هزار دانه، صفتی است که وابستگی بیشتری به ویژگی‌های ژنتیکی ارقام دارد و کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد (۳۹). به نظر می‌رسد که وزن هزار دانه جزء باثبات عملکرد باشد. پونلایت و همکاران (۴۱)، نشان دادند که وزن هزار دانه در تنظیم عملکرد جزء موثری است، اما نسبت به سایر اجزاء عملکرد از حساسیت کمتری برخوردار است. نتایج بدست آمده توسط افراد دیگر (۱۰، ۱۶) نیز بیانگر عدم تاثیر معنی دار تراکم بروزن هزار دانه ذرت است. اما، گزارشات برخی دیگرانشان دهنده تاثیر معنی دار تراکم بروزن هزار دانه ذرت می‌باشد (۱۱، ۵).

از نظر شاخص برداشت هم در این آزمایش بین تراکمهای مختلف اختلاف معنی دار بدست نیامد (جدول ۱). افرادی مانند دلوگری و کروکستون (۲۷)، معتقدند که شاخص برداشت کمتر تحت تاثیر تراکم بوته قرار می‌گیرد. برخلاف

بلال در بوته و تعداد دانه در بلال است، هرچند دوهیبرید از نظر وزن هزاردانه اختلاف معنی داری با هم دارند ولی این اختلاف به حدی نبوده است که موجب اختلاف معنی دار عملکرد آنها شود (جدول ۳). همانطور که ملاحظه می شود، دوهیبرید از نظر شاخص برداشت با هم اختلاف معنی داری دارند. شاخص برداشت هیبرید 704 KSC (۵۲/۰۳۸) درصد از هیبرید 700 KSC بیشتر بود.

در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه متعلق به هیبرید KSC704 با تراکم ۸۵۰۰ بوته در هکتار والگوی کاشت زیگزاگ (معادل ۱۲۱۲۴ کیلو گرم در هکتار) و کمترین آن متعلق به هیبرید 700 KSC در تراکم ۶۵۰۰ بوته در هکتار و آرایش کاشت یک در میان بود (جدول ۲)، که می توان علت آن را در استفاده بهتر از عوامل محیطی در مورد تیمار اول مرتبط دانست.

قدرتانی

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه کردستان بعلت تخصیص بودجه برای انجام این پژوهه تحقیقاتی تشکر می گردد.

کاشت مناسبتر آنها توجیه کرد.

در رابطه با تاثیر الگوهای کاشت بر اجزاء عملکرد ذرت گزارشاتی وجود دارد؛ مثلاً بذرافشان و همکاران (۷)، گزارش کرده اند که الگوی کاشت دو ردیف ذرت بر روی پشتی به صورت زیگزاگ در مقایسه با کاشت یک ردیف در وسط پشتیها به طوری که بوته های دو ردیف مجاور روبروی هم و یا به طور زیگزاگ قرار گیرند تاثیر معنی داری بر تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزاردانه و شاخص برداشت، نداشت. مقنی نصری (۱۸)، هم در آزمایش نتیجه گیری کرد که تعداد بلال در واحد سطح در الگوی کاشت زیگزاگ بیش از الگوی کاشت معمولی بود در حالی که تعداد دانه در بلال (شامل تعداد ردیف تعداد دانه در ردیف بلال) و همچنین وزن هزار دانه الگوی کاشت معمولی (مرسوم) بیش از الگوی کاشت زیگزاگ بود.

هیبریدهای ذرت مورد بررسی (KSC700 و KSC704)، به ترتیب با عملکرد دانه ای معادل ۱۰۱۵۴ و ۱۰۲۶۸ کیلو گرم در هکتار اختلاف معنی داری با هم نداشتند که علت آن رابطه معکوس بین وزن هزار دانه و تعداد دانه در بلال در هیبرید هاست عدم اختلاف معنی دار دو هیبرید از نظر تعداد

منابع

- اصغری، ج.، ب. زراعی و م. بزرگی. ۱۳۸۵. اثر تراکم والگوی کاشت بر برخی صفات، عملکرد و اجزای عملکرد دوهیبرید ذرت (Zea mays L.). مجله علوم و صنایع کشاورزی. ج ۲۰، ش ۲: ۱۳۲-۱۲۳.
- افشار منش، غ. ۱۳۸۳. بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه ارقام ذرت در کشت تابستانه منطقه جیرفت. خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۳۳۹.
- اکبری، د.، م. پناهی و م. ر. رمضانپور. ۱۳۸۳. تاثیر روش های آبیاری فارو و مقایر آب آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دراستان مازندران. خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۳۳۹.
- امام، ی. وغ. رنجبر. ۱۳۷۹. تاثیر تراکم بوته و تنش خشکی در مرحله رشد رویشی بر عملکرد و کارایی استفاده از آب در ذرت دانه ای. مجله علوم زراعی ایران، جلد دوم شماره ۳: ۵۱-۶۲.
- امام، ی. و محمد تدین. ۱۳۷۸. تاثیر تراکم بوته و سربرداری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای در منطقه زیر سد درود زن استان فارس. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ۳۰، شماره ۴: ۷۵۰-۷۴۳.
- امیری، ح.، پ. رضوانی مقدم وح. مختارپور. ۱۳۸۳. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ذرت شیرین در منطقه گرگان. خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۳۳۴.
- بذرافشان، ف.، ق. فتحی، ع. سیادت، ا. آینه بند و خ. عالمی سعید. ۱۳۸۴. بررسی اثرات الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت شیرین. مجله علمی کشاورزی، جلد ۲۸، شماره ۲: ۱۱۷-۱۲۶.
- بنایی، ت.، ج. شاملو و ر. معینی. ۱۳۸۳. تاثیر تراکم بوته و آرایش کاشت (یک ردیف و دور دیف روی پشتی) بر عملکرد ذرت دانه ای رقم SC 704. خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۳۴۹.
- بی نام. ۱۳۸۱. طرح افزایش تولید ذرت دانه ای کشور (۱۳۸۱-۹۰). وزارت جهاد کشاورزی، دیرخانه طرح ذرت.
- حمیدی، آ.، ن. خدابنده وع. دباغ محمدی نسب. ۱۳۷۹. بررسی تاثیر تراکمهای بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی ویژگیهای ظاهری دو هیبرید ذرت. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ۳۱، شماره ۳: ۵۷۹-۵۶۷.

- ۱۱- دماندی، ع. ون‌لطینی. ۱۳۷۸. بررسی اثر فاصله ردهای کاشت و تراکم بوته بر عملکرد واجزای عملکرد دورقم ذرت دانه‌ای. علو کشاورزی و منابع طبیعی. سال ششم، شماره چهارم. ۲۵-۳۲.
- ۱۲- رفیعی، م.، ک. خادمی، ح. سبزی و ر. محمد خانی. ۱۳۸۳. اثر تراکم والگوی کاشت بر برخی خصوصیات مرغولوژیکی ذرت دانه‌ای. خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۳۸۹.
- ۱۳- زعفریان، ف.، ز. طهماسبی، م. آق‌اعلی‌خانی و م. رضوانی. ۱۳۸۳. تاثیر تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت در آرایش کشت تک ردیفه دوردیفه. خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۳۹۳.
- ۱۴- سپاسخواه، ع. و ع. ا. کامگار حقیقی. ۱۳۷۳. اثر دورآبیاری شیاری یک درمیان بروی محصول و راندمان مصرف آب چند رقد. سمینار زراعت چند رقد، ۱-۳ شهریور، دانشگاه اصفهان.
- ۱۵- صابری، ع.، د. مظاہری و ح. حیدری شریف آباد. ۱۳۸۵. بررسی تاثیر تراکم و آرایش کاشت و برخی از خصوصیات زراعی ذرت تری وی کراس ۶۴۷. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال سیزدهم، شماره اول (Z. mays L.). مجله علوم زراعی ایران، جلد ۳، شماره ۱-۱۱: ۱-۶.
- ۱۶- صادقی، ح. و م. ج. بحرانی. ۱۳۸۰. تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Z. mays L.). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ص ۳۸۳.
- ۱۷- مظاہری، د.، م. یوسف پور، م. قنادها و. باانکه ساز. ۱۳۸۱. تاثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی روی روند رشد، شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه و دانه دورقم هیبرید ذرت. پژوهش و سازندگی، شماره های ۵۶ و ۵۷: ۷۱-۷۷.
- ۱۸- مقنی نصری، م. ۱۳۸۱. تاثیر تراکم بوته و آرایش کاشت بروی عملکرد واجزاء عملکرد ذرت ۶۴۷ Ksc. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۳۸۳.
- ۱۹- نجفی نژاد، ح.، م. ع. جواهری و. ارجمند. ۱۳۸۳. بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد واجزای عملکرد هیبرید SC 704 ذرت در منطقه ارزویه کرمان. خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۴۵۶.
- ۲۰- یوسف پور، م.، د. مظاہری، م. ر. قنادها و. باانکه ساز. ۱۳۸۱. تاثیر الگوی کاشت و تراکم بروی عملکرد واجزاء عملکرد دورقم هیبرید ذرت. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۸۵.
- 21- Andrade, F. H., S. A. Uhart, and M. I. Frugone. 1993. Intercepted radiation at flowering and kernel number in maize: Shade versus plant density effects. *Crop Sci.* 33:482-485.
- 22- Box, J. E., W. H. Slettion, J. H. Kyle and A. pop. 1963. Effect of soil moisture, temperature and fertilizer on yield and quality of irrigated potatoes in southern plain. *Agron. J.* 55:492-494.
- 23- Brown, R. H., E. R. Beaty, W. J. Ethredge and D. D. Hayes 1970. Influence of row width and plant population on yield of two varieties of corn. *Agron. J.* 62:767-770.
- 24-cox, W. J., 1996. Whole-plant physiological and yield response of maize to plant density. *Agron. J.* 88:489-496.
- 25- Cummins, D. G.,and J. W. Dobson.1973. Corn for silage as influenced by hybrid maturity, row spacing, plant population and climate. *Agron. J.* 65:240-243.
- 26-Dastfal, M. , Y. Emam, and M. T. Assad. 1999. Yield and yield adjustment of nonprolific maize hybrids in response to plant population density. *Iran Agric. Res.* 18(2):139-152.
- 27-Deloughery, R. L., and R. K. Crookston. 1979. Harvest index of corn affected by population density, maturity, rate, and environment. *Agron. J.* 71:577-580.
- 28-Duncan, W. G., 1984.A theory to explain the relationship between corn population and grain yield. *Crop Sci.* 24:1141-1145.
- 29-Duncan, W. G., 1985.The relationship between corn population and yield. *Agron. J.* 50:82-84.
- 30-Durieux, R. P., E. J. Kamprath, and R. H. Moll. 1993. Yield contribution of apical and subapical area in prolific and nonprolific corn. *Agron. J.* 85:606-610.
- 31-Edmeades, G. O., and T. B. Daynard. 1979. The relationship between final yield, photosynthesis at flowering in individual maize plants. *Can. J. Plant Sci.* 59:585-601.
- 32-Fishbach, P. E., and H. R. Mulliner. 1974. Every other furrow irrigation of corn. *Trans. ASAE.* 17:426-426.
- 33-Genter, C. F., and H. M. Camper.1973. Component plant development in maize as affected by herbicide and population density. *Agron J.* 65:669-671.
- 34-Grimes,D. W., V. T. Welhold, and W. I. Dikens. 1968. Alternate furrow irrigation for San-Joa valley cotton. *Calif. Agric.* 22:4-6.
- 35-Hashemi-Dezfouli, A. and S. J. Herbert. 1992. Effect of leaf orientation and density on yield of corn. *Iran Agric. Res.* 11:89-104.
- 36-Hawkins, R. C., and P. J. cooper. 1981. Growth, development and grain yield of maize. *Exp. Agric.* 17:203-207.
- 37-Karnel, D. L., and C. R. Camp. 1985. Row spacing, plant population and water management effect on corn in the Atlantic coastal plain. *Agron. J.* 77:393-398.

- 38-Krishnamurthy, K., M. K. Jagannath, N. Venugopal, T. V. R. Prasad, G. Kaghrata, and B. G. Rajashekara. 1975. relative production of yield in hybrid, composite, and local maize as influenced by nitrogen and population level. I) Grain yield and its component. Indian J. Agron. 19:263-266.
- 39-Lafond, G. P., 1994. Effects of row spacing, seeding rate and nitrogen on yield of barley and wheat under zero-till management. Can. Plant Sci. 74:703-711.
- 40-New, L., 1971. Influence of alternate furrow irrigation and time of application on grain sorghum production. Tex. Agric. Exp. Prog. Rpt. No. 2953, pp: 26-32.
- 41-Penleit, C. G., D. B. Egli, P. L. Cornelius, and D. A. Reikosky. 1980. Variation and association of kernel growth characteristics in maize populations. Crop Sci. 20:766-770.
- 42-Robinson, D. L., and L. S. Murphy. 1972. Influence of nitrogen, phosphorus and plant population on yield and quality of forage corn. Agron. J. 64:349-351.
- 43-Roy, S. K. and P. K. Biswas. 1992. Effect of plant density and detopping silking on cob growth fodder and grain yield of maize(Z. mays L.). J. Agric. Sci. Camb. 119: 297-301.
- 44-Tetio-Kagho, F. , and F.P. Gardner. 1988. Response of maize to plant population density. II) Reproductive development, yield and yield adjustments. Agron. J. 80: 935-940
- 45-Tetio-Kagho, F., and F. P. Gardner. 1988. Response of maize to plant population density. I) Canopy development, light relationships, and vegetative growth. Agron. J. 80: 230-235.
- 46-Tollenaar, M., L. M. Dwyer, and D. W. Stewart. 1992. Ear and kernel formation in maize hybrids representing three decades of grain yield improvement in Ontario. Crop Sci. 32:432-438.
- 47-Zaffaroni,E. and A. A. Schneither.1991. Sunflower production as influenced by plant type, plant population and row arrangement. Agron. J. 83:113-118.

The effect of density and planting pattern on yield and yield components of two corn hybrids (KSC700 & KSC704) in Kurdistan

I. Tahmasebi, M. H. Rashed Mohasel¹

Abstract

This experiment was conducted to study the effect of plant density (pd) and planting pattern (pp) on yield and yield components of two corn hybrids. The type of design was randomized complete block with factorial arrangement and three replications per treatment in 2003 growing season at Gerizeh agricultural station, in Sanandaj. The treatments were plant density (65000, 75000 & 85000 plant per hectare) and planting pattern (normal planting pattern, i.e. planting seeds at the center of ridges; two rows planting on the sides of wide ridges i.e. every other furrows removed and zigzag planting pattern, i.e. two rows planting on the sides of normal ridges as zigzag) and two corn hybrids (KSC700 and KSC704). The results of the experiment showed that increasing plant density significantly increased seed yield. Maximum seed yield 11122.5 kg/ha obtained at highest plant density; but there were no significant differences between 75000 & 85000 plants/ha. Number of ears per plant, number of seeds per ear, number of seed rows per ear, number of seeds per seed row, 1000 kernel weight and harvest index were not affected by plant density. Planting pattern had significant effect on seed yield. Zigzag planting pattern produced highest seed yield (11054.7 kg/ha) and lowest seed yield was belong to every other furrow planting pattern. Number of ears per plant, number of seeds per ear, number of rows per ear and number of seeds per ear row were not affected by planting pattern; whereas, planting pattern effect on 1000 kernel weight and harvest index was significant. Zigzag planting pattern had maximum and every other planting pattern had minimum 1000 kernel weight and harvest index, respectively. Corn hybrid effect on seed yield, ear number per plant, seed number per ear and seed number per ear row was not significant. Seed rows number per ear in KSC700 and KSC704 were 16.33 and 13.92, respectively, this difference was significant. 1000 kernel weight and harvest index of two hybrids had significant differences. 1000 kernel weight of KSC700 and KSC704 were 267.97 and 244.61g and harvest index was 52.04% and 50.01%, respectively. KSC 704 in 85000 plt/ha and zigzag planting pattern produced highest seed yield and lowest seed yield was belong to KSC700 in 65000 plant/ha and every other furrow planting pattern.

Key words: Corn, plant population, planting patterns, yield, yield components

1- Contribution from College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.