

تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (*Zea mays L. var Saccharata*)

شیرین قاضیان تفریسی^{۱*} - امیر آینه بند^۲ - حسین توکلی^۳ - سعید خاوری خراسانی^۴ - محمد جلینی^۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۶/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۷/۱۸

چکیده

به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین، تحقیقی در سال ۱۳۸۹، در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل مقادیر مختلف آبیاری (تامین ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه) و در کرت های فرعی سه رقم دانه طلائی (KSC403)، مریت و آبیژن و دو روش کاشت روی پشته و کف جوی به صورت فاکتوریل قرار گرفت. صفات طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه در بلال، عمق دانه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، بیوماس اندام های هوایی، شاخص برداشت و طول دوره گرده افشانی تا کاکل دهی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که کم آبیاری سبب کاهش معنی دار کلیه صفات مورد ارزیابی به جز شاخص برداشت شد. همچنین همه صفات مورد ارزیابی تحت تاثیر رقم قرار گرفت. اثر متقابل رقم و روش کاشت بر وزن هزار دانه و عمق دانه موثر بود. بیشترین عملکرد دانه (۱۵/۲ تن در هکتار)، مربوط به تیمار آبیاری تامین ۱۰۰ درصد نیاز آبی و کمترین عملکرد (۸/۶ تن در هکتار) مربوط به تیمار تامین ۶۰ درصد نیاز آبی بود. رقم مریت بیشترین عملکرد دانه (۱۵/۹ تن در هکتار) و رقم دانه طلائی کمترین عملکرد دانه (۸/۸ تن در هکتار) را تولید کردند. شاخص برداشت ارقام مختلف تحت تاثیر کم آبی قرار نگرفت. نتایج این آزمایش نشان داد کم آبیاری اجزای عملکرد و عملکرد دانه همه ارقام را کاهش می دهد.

واژه های کلیدی: رژیم آبیاری، شاخص برداشت، روی پشته، کف جوی

مقدمه

کشت روی پشته و کف فارو از جنبه فراهمی رطوبت برای گیاه، مدیریت مطلوب علف های هرز و افزایش راندمان مصرف آب و عناصر غذایی اهمیت ویژه ای داشته، می تواند منجر به توسعه حوزه کشت و افزایش کمی و کیفی محصول گردد (۲۰). در ذرت، تنش خشکی طی مرحله گلدهی و اوایل نمو دانه، تعداد دانه در بلال ذرت را کاهش می دهد. کاهش تعداد دانه می تواند ناشی از عدم همزمانی نمو گل ها، نمو غیر عادی کیسه جنینی قبل از ظهور کاکل و عدم نمو دانه پس از گرده افشانی و باروری نیز باشد (۲۵). امام و رنجبر (۱) به منظور بررسی کمبود آب بر عملکرد و دیگر صفات وابسته به عملکرد، اثر سه سطح آبیاری معادل ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی را بر ذرت بررسی کردند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد که کم آبیاری، باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه و وزن زیستی گیاه ذرت می شود. احمدی و همکاران (۲) در بررسی تحمل به کم آبیاری در هیبریدهای دیررس تجارتي ذرت دانه ای در سه رژیم آبیاری نشان دادند که بین هیبریدها از نظر صفات رویشی، مراحل نمو، عملکرد و اجزاء آن تنوع

ذرت شیرین یک نوع ذرت جهش یافته است که میزان قند آندوسپرم آن افزایش یافته و به نام ذرت قندی نیز شناخته می شود (۱۸). به دلیل محدودیت منابع آبی و صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در مراحل اولیه آبیاری (خاک آب و ناخن آب) روش کاشت داخل شیار در سال های اخیر در برخی از محصولات زراعی از جمله ذرت مورد استفاده قرار گرفته است. انتخاب روش مناسب کاشت ذرت شیرین به منظور صرفه جویی در مصرف آب و مقایسه روش های

۱- دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
(*) نویسنده مسئول: (Email: shirin_ghazian@yahoo.com)

۲- دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

۳، ۴ و ۵- به ترتیب دانشیار و استادیاران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

6- *Zea mays convar. saccharata var. Rugosa*

یکنواخت انجام شد. به منظور اعمال کم آبیاری، میزان ورود و خروج آب در شیار به طول ۳۰ متر، به کمک فلوم اندازه گیری شد. با استفاده از اختلاف بین جریان ورودی و خروجی در فواصل زمانی معین، میزان نفوذ مشخص شد. با رسم نمودار ارتفاع آب نسبت به زمان آبیاری، معادله نفوذ تعیین گردید. در هر بار آبیاری، ارتفاع آب در سطح آبیاری کامل، بر اساس معادله نفوذ محاسبه شد. تیمارهای کم آبیاری بر اساس تامین ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه و با در نظر گرفتن ضرایب ۰/۸ و ۰/۶ اعمال گردید. در خرداد ماه سال زراعی ۱۳۸۹ آماده سازی زمین آزمایش به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع انجام و پس از تهیه بستر بذر نقشه آزمایش اجرا گردید. کشت در نیمه خرداد با تراکم ۷ بوته در متر مربع صورت گرفت. هر کرت آزمایشی شامل چهار خط کاشت با فاصله بین ردیف ۷۵ سانتی متر، فاصله روی ردیف ۱۷/۵ سانتی متر و طول ۷ متر بود. دو خط کناری به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد و دو خط میانی آن برای تعیین، کلیه عوامل مورد آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. پس از ایجاد فاروها کشت بذور بصورت کپه ای روی پشته و داخل جوی و در هر کپه سه بذر با عمق ۳ تا ۴ سانتی متر، کشت گردید. پس از استقرار گیاهچه ها در مرحله چهار برگی به یک بوته تقلیل یافت. به دلیل لزوم ایجاد زهکش در انتهای هر پلات اصلی، فاصله بین بلوک های آزمایشی ۵ متر در نظر گرفته شد. برای تعیین طول دوره گرده افشانی تا ظهور کاکل (ASI^۲)،

بازدید روزانه از سطح مزرعه صورت گرفت. تعداد روزها از زمان کاشت تا گرده افشانی و ظهور گل آذین ماده، هنگامی که حداقل ۵۰ درصد بوته های دو ردیف وسط علائم ظهور صفت را نشان دادند، ثبت و از اختلاف این دو طول ASI محاسبه شد. در پایان فصل رشد و در مرحله انتهای شیری و ابتدای خمیری شدن دانه ها، ابتدا تعداد بوته های هر کرت شمارش و سپس کل بلال های هر کرت برداشت و جداگانه توزین گردید. برای تعیین اجزای عملکرد، ۱۰ بلال تصادفی از کل بلال های برداشت شده در هر کرت توزین شد. پس از اندازه گیری طول و قطر بلال ها با کولیس و با دقت ۰/۱ میلی متر، تعداد ردیف و تعداد دانه در ردیف، در نمونه های ۱۰ تایی شمارش و میانگین این اعداد برای تجزیه واریانس استفاده گردید. سپس دانه ها از سطح چوب برش خورد و قطر چوب بلال، وزن چوب بلال، درصد دانه و وزن هزار دانه در هر کرت آزمایشی تعیین گشت. صفت عمق دانه با تفاضل قطر چوب بلال از قطر بلال محاسبه شد. عملکرد دانه و وزن هزار دانه براساس ۷۰ درصد رطوبت دانه و از طریق معادله ۱ تصحیح گردید.

$$\text{وزن هزار دانه خشک} - \text{وزن هزار دانه مرطوب} = \text{درصد رطوبت} \times \text{وزن هزار دانه مرطوب}$$

(۱)

قابل ملاحظه ای وجود دارد. در این بررسی اکثر صفات مورد بررسی نسبت به شرایط کم آبی واکنش منفی نشان دادند و بیشترین اثر تنش بر عملکرد دانه بود که ناشی از کاهش تعداد دانه در ردیف، طول بلال و وزن ۵۰۰ دانه بوده است. از آنجا که عملکرد ذرت عمدتاً یک هفته قبل و بعد از گلدهی به خشکی حساس تر است، صفاتی نظیر فاصله گرده افشانی - کاکل دهی (ASI^۱) کوتاه می تواند در گزینش برای تحمل به این شرایط مفید باشد (۱۵). به طور کلی واکنش گیاهان زراعی و ارزیابی آن ها برای عملکرد بهینه در شرایط محیطی مختلف، از طریق تنظیم اجزای عملکرد و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط به هنگام بروز شرایط مطلوب و نامطلوب در هر مرحله از رشد و نمو گیاه امکان پذیر است (۱۷). واریانس ژنتیکی و قابلیت توارث عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی، کاهش می یابد (۱۲). بنابراین صفات ثانویه ای که واریانس ژنتیکی و قابلیت توارث آن ها در شرایط تنش خشکی افزایش می یابد، به انتخاب ارقام مناسب در شرایط خشکی کمک می کند (۱۱، ۱۳ و ۲۱). این آزمایش با هدف تعیین میزان تاثیر کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد در ذرت شیرین انجام شد.

مواد و روش ها

این آزمایش در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، ایستگاه طرق، انجام شد. این ایستگاه در شش کیلومتری جنوب شرق مشهد در عرض جغرافیائی ۳۶ درجه و ۱۶ دقیقه شمالی و طول شرقی ۵۹ درجه و ۳۸ دقیقه شرقی واقع است. ارتفاع این محل از سطح دریا ۹۸۵ کیلومتر و متوسط بارندگی سالانه آن ۲۸۶ میلی متر می باشد. آب و هوای منطقه بر اساس روش آمبرژه خشک و سرد است.

طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. در کرت های اصلی تیمارهای آبیاری در سه سطح (تامین ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه) و در کرت های فرعی اثرات دو عامل روش کاشت (روی پشته و کف فارو) و هیبرید (شامل هیبریدهای شیرین مریب و دانه طلایی و هیبرید فوق شیرین آبیژن) به صورت فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. هر سه رقم مورد مطالعه، هیبریدهای زودرس ذرت شیرین بودند. در ابتدای فصل با نمونه برداری از عمق صفر تا ۳۰ و ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر، ظرفیت زراعی خاک به روش وزنی، محاسبه شد. در هر بار آبیاری، ارتفاع آب مورد نیاز بر مبنای میزان کمبود رطوبت در عمق نمونه برداری، نسبت به ظرفیت زراعی تعیین گردید. تا زمان رسیدن به مرحله چهار برگی، آبیاری در همه تیمارها

جدول ۲ - میانگین صفات مورد بررسی در ارقام ذرت شیرین مورد بررسی

شاخص برداشت	عملکرد (ton/ha)	بیوماس (ton/ha)	نیوماس (day)	وزن هزار دانه (g)	عمق دانه (mm)	گردگی افشانی تا کاکل دهی	تعداد کل دانه	تعداد دانه در ردیف	تعداد ردیف دانه	تعداد دانه در ردیف	قطر بلال (mm)	طول بلال (mm)	طول بلال (mm)	ارقام
۳۸/۳۷ b	۱۵/۸۸ a	۱۸/۱۱ b	۱۷/۲۷ a	۳۶ a	۵۶/۸ a	۳۲/۲۰ a	۱۶/۳۴ a	۲۵/۹۵ a	۱۶۴ a	۲۵/۹۵ a	۱۶۴ a	۱۶۴ a	مریت	
۵۱/۶۳ a	۹/۳۶ b	۲۲/۸۳ a	۱۵/۱۲ a	۳۰ b	۴۰ c	۳۷/۶۶ c	۱۴/۵۱ b	۲۰/۴۲ b	۱۵۱ b	۲۰/۴۲ b	۱۵۱ b	۱۵۱ b	آبسون	
۳۸/۷۵ b	۸/۸۷ b	۱۷/۰۲ b	۱۵/۰۲ a	۲۶ c	۴۲ b	۳۱/۳۴ b	۱۵/۳۹ b	۳۷/۱۰ c	۱۳۳ c	۳۷/۱۰ c	۱۳۳ c	۱۳۳ c	دانه طلایی	

در هر ستون میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد می باشند

در انتها با کف بر کردن بوته ها از سطح خاک توسط دستگاه موور عملکرد بیولوژیک (وزن بلال و علوفه تر) توزین و ثبت شد. در هر کرت، شاخص برداشت از تقسیم عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک محاسبه گردید. درصد تغییر تغییر صفات بر اثر کم آبی از معادله ۲، محاسبه گردید (۳).

$$(2) \quad \text{میزان صحت در شرایط تنش} - \text{میزان صحت در شرایط بدون تنش} = \frac{\text{درصد تغییرات} \times 100}{\text{میزان صحت در شرایط بدون تنش}}$$

پس از جمع آوری داده ها، تجزیه وریانس توسط نرم افزار آماری SAS, ver 9.1 انجام شد و برای مقایسه میانگین هیبریدها از روش چند دامنه ای دانکن استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد بلال معنی دار بود ($P \leq 0.01$) (جدول ۱).

عملکرد دانه در تیمار کم آبی شدید نسبت به تیمار آبیاری کامل، ۶۵۱۵ کیلوگرم در هکتار، معادل ۵۶ درصد کاهش یافت (جدول ۶). مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد رقم مریت بیشترین (۱۵/۸ تن در هکتار) و رقم دانه طلایی کمترین (۸/۸ تن در هکتار) عملکرد دانه را تولید کردند (جدول ۲). همچنین بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار آبیاری کامل و معادل با ۱۵/۱۶ تن در هکتار بود (جدول ۳).

اسبورن و همکاران (۲۳) نیز گزارش کردند که تنش خشکی، باعث کاهش ۱۵ تا ۲۲ درصدی عملکرد دانه می شود. اثر متقابل آبیاری و رقم بر طول بلال معنی دار بود ($P \leq 0.05$). مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین طول بلال مربوط به رقم مریت در تیمار آبیاری کامل (۲۰/۸ میلی متر) بود (جدول ۴).

صفت طول بلال، از طریق تاثیر بر تعداد دانه در ردیف، بر عملکرد دانه موثر است و کاهش طول بلال در اثر تنش خشکی، سبب کاهش مجموع تعداد دانه در بلال می شود (۶ و ۹). هتلی و همکاران (۱۹) علت اصلی کاهش دانه در ردیف را کاهش طول بلال در اثر بروز خشکی دانستند. بررسی همبستگی ساده بین صفات نشان می دهد که در محیط آبیاری کامل، طول بلال، بیشترین همبستگی مثبت معنی دار را با عملکرد دانه دارد (جدول ۷). اثر آبیاری در رقم بر تعداد دانه در ردیف در بلال معنی دار بود (جدول ۴). بیشترین تعداد دانه در ردیف مربوط به تیمار آبیاری کامل و کمترین آن مربوط به تیمار ۶۰ درصد نیاز آبی بود. بررسی همبستگی نشان داد که در همه سطوح آبیاری، بین صفت تعداد ردیف دانه در بلال با عملکرد همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد (جدول ۷). بین ارقام مختلف از نظر تعداد دانه در ردیف تفاوت بسیار معنی دار مشاهده شد (جدول ۱)

جدول ۳- میانگین صفات مورد بررسی در مقادیر مختلف آبیاری

میزان آبیاری	طول بلال (mm)	قطر بلال (mm)	تعداد ردیف دانه	تعداد دانه در ردیف	تعداد کل دانه	وزن هزار دانه (gr)	عمق دانه (mm)	گرده افشانی تا کاکل دهی (day)	بیوماس (ton/ha)	عملکرد (ton/ha)	شاخص برداشت
۱۰۰٪ نیاز آبی	۱۷۷ a	۴۷/۲a	۱۷/۲a	۳۶/۴ a	۶۳۱ a	۳۸۱ a	۱۹/۷ a	۲/۰۴ c	۲۲/۸ a	۱۵/۲ a	۴۹/۱ a
۸۰٪ نیاز آبی	۱۴۴ b	۴۰/۱b	۱/۳b	۳۰/۷ b	۴۷۶ b	۳۸۵ ab	۱۴/۶ b	۳/۵۴ b	۱۸/۷ b	۱۰/۳ b	۴۰/۴ b
۶۰٪ نیاز آبی	۱۲۷ c	۳۶/۱ c	۱۴ b	۲۶/۸ c	۳۷۹ c	۳۲۶ b	۱۳/ c	۴/۸۳ a	۱۶/۴ c	۸/۶ c	۳۹/۲ b

در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد می باشند

روش کاشت روی پشته بود (جدول ۵).

کاهش وزن دانه در شرایط کمبود آب بعد از گرده افشانی، عمدتاً به دلیل کاهش دوره پر شدن دانه است و به همین دلیل تنش‌هایی که پس از کاکل دهی به وقوع می پیوندد باعث کوچک شدن دانه‌ها می شود (۴ و ۱۰). کاهش عمق دانه نیز سبب کاهش عملکرد دانه می گرد (۶ و ۹). میزان آبیاری بر عمق دانه اثر معنی دار داشت و کم آبیاری سبب کاهش عمق دانه گردید (جدول ۱ و ۶).

همچنین اثر متقابل رقم در روش کاشت بر عمق دانه معنی دار بود (جدول ۱). بیشترین عمق دانه مربوط به رقم مریت و روش کاشت روی پشته بود (جدول ۵). همان طور که در جدول ۷ دیده می شود، اگرچه بین صفات عمق و عملکرد دانه همبستگی مثبت وجود داشت، این همبستگی معنی دار نبود.

تاخیر در ظهور کاکل منجر می شود انتشار و دریافت دانه گرده به درستی انجام نشود که منجر به عدم باروری گلچه‌ها و کاهش محصول می گردد. تأخیر در ظهور کاکل‌ها به علت کافی نبودن آب مورد نیاز جهت طویل شدن سریع سلول‌های تارهای ابریشمی است (۱۶). اثر کم آبیاری بر فاصله گرده افشانی - کاکل دهی (ASI) بسیار معنی دار بود. بیشترین ASI با میانگین ۴/۸۳ روز، مربوط به سطح آبیاری ۶۰ درصد نیاز آبی، بود. اگرچه ارقام مختلف از نظر این صفت در گروه‌های آماری مختلف قرار گرفتند (جدول ۲)، اما تفاوت بین میانگین این صفت در ارقام مختلف، معنی دار نبود (جدول ۱). با توجه به جدول ۶ مشاهده می شود که بالاترین آسیب یا تغییر در شرایط کم آبیاری، متعلق به ASI به ترتیب با ۷۳/۵ و ۱۳۶/۳ درصد تغییر، در سطح آبیاری ۸۰ و ۶۰ درصد تامین نیاز آبی بود. از آن جا که ASI بر تعداد دانه در بلال موثر است، می توان نتیجه گرفت که در این آزمایش، کاهش تعداد دانه نسبت به وزن دانه، تأثیر بیشتری بر کاهش عملکرد نهایی داشته است. نتایج جدول ۶ نیز این نتیجه را تأیید می کند.

و بیشترین تعداد دانه در ردیف مربوط به رقم مریت و کمترین آن مربوط به رقم دانه طلائی KSC403، بود (جدول ۲). میزان تغییرات در قطر بلال کمتر از تغییر در صفت طول بلال بود (جدول ۶). قطر بلال، از طریق تعداد ردیف دانه در بلال، در تعیین مجموع دانه در بلال و عملکرد دانه نقش داشت. نتایج نشان داد که کم آبیاری سبب کاهش قطر بلال در همه ارقام گردید (جدول ۴). بیشترین قطر بلال با میانگین ۵۵/۲ میلی متر، مربوط به رقم مریت در سطح آبیاری کامل بود (جدول ۴). در شرایط تامین ۸۰ درصد نیاز آبی، بیشترین همبستگی بین صفت قطر بلال و عملکرد دانه مشاهده شد (جدول ۷). اثر آبیاری ($F = 0.003$) و رقم ($F = 0.01$) بر تعداد ردیف دانه در بلال معنی دار بود. بیشترین تعداد ردیف با میانگین ۱۷/۲ مربوط به تیمار آبیاری کامل بود (جدول ۳). بین دو سطح کم آبیاری از نظر تعداد ردیف دانه، تفاوت معنی داری وجود نداشت. رقم مریت از نظر تعداد ردیف بر دو رقم دیگر برتری داشت (جدول ۲). تنش کمبود آب در دوره پر شدن دانه از طریق کاهش وزن دانه‌ها نیز عملکرد را کاهش می دهد (۲۴، ۲۴، ۲۶). از آن جا که تعداد نهایی دانه در بلال در موقع گرده افشانی تعیین می شود، تأخیر در ظهور کاکل (افزایش دوره ASI) و یا سقط جنین در اثر کمبود و ناکافی بودن مواد فتوسنتزی برای رشد همه سلول‌های جنینی، اثر منفی بر تعداد دانه در بلال دارد (۲۴ و ۸، ۴). مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش نشان داد که بیشترین تعداد دانه در بلال مربوط به تیمار آبیاری مطلوب بود و کم آبیاری سبب کاهش تعداد دانه در بلال گردید (جدول ۳ و ۶). عملکرد دانه در شرایط تامین ۶۰ درصد نیاز آبی، بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را با صفت تعداد دانه در بلال نشان داد (جدول ۷). ساجدی و همکاران (۴)، نیز نتیجه مشابهی را گزارش نمودند. کمبود آب در مرحله پر شدن دانه از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند سبب کاهش شدید عملکرد از طریق کاهش وزن دانه شود (۲۲). در این آزمایش کم آبیاری، سبب کاهش وزن هزار دانه گردید. کمترین وزن هزار دانه با میانگین ۳۲۶ گرم مربوط به تیمار ۶۰ درصد تامین نیاز آبی، بود (جدول ۳). اثر متقابل رقم در روش کاشت بر وزن هزار دانه معنی دار بود و بیشترین وزن هزار دانه مربوط به رقم مریت و

جدول ۵- مقایسه میانگین اثر متقابل روش کاشت و رقم بر صفات مورد بررسی در ذرت شیرین

شاخص برداشت	عملکرد (ton/ha)	بیوماس (ton/ha)	پدوست (day)	فاصله کرده افشانی تا ظهور کامل (mm)	عمق دانه (mm)	وزن هزار دانه (g)	تعداد کل دانه در ردیف	تعداد دانه در ردیف	تعداد ردیف دانه	قطر بلال (mm)	طول بلال (mm)	رقم کاشت	روش کاشت
-/۳۵b	۸/۲ b	۱۹/۴bc	۲/۸ ab	۱۲/۲ b	۳۵۵ c	۲۵۵d	۲۵/۴c	۱۲/۹b	۲۸۷ c	۱۲۴d	دانه	دانه	
-/۵۱a	۱۶/۲a	۳۲/۲ a	۲/۹ b	۱۸/۲ a	۴۵۳ a	۶۰۲a	۳۲/۹a	۱۶/۹a	۴۵/۹a	۱۶۲ab	طلای	طلای	روی پشته
-/۲۶b	۹/۲ b	۱۶/۷ c	۳/۳ ab	۱۲/۵ b	۲۷۷ d	۵۰۲bc	۳۲/۵ab	۱۵/۲ab	۳۶/۲ c	۱۵۳abc	دانه	دانه	آبستون
-/۴۱ ab	۹/۵ b	۱۷/۲ c	۴ a	۱۷ a	۲۸۵bc	۴۶۲c	۲۹/۸ b	۱۵ ab	۴۲/۲ b	۱۴۱ c	دانه	دانه	کف جوی
-/۵۱ a	۱۵/۵ a	۳۲/۲ ab	۳ab	۱۶/۲ab	۳۹۹ b	۵۹۱ab	۲۵/۸a	۱۶/۴ a	۴۵/۹ a	۱۶۷ a	طلای	طلای	
-/۲ ab	۹/۲ b	۱۷/۲ c	۳/۵ab	۱۶/۵ab	۲۵۷ d	۲۶۰ c	۳۰/۱b	۱۵/۳ab	۳۷/۸ c	۱۲۸ bc	دانه	دانه	آبستون

در هر ستون میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد می باشند.


جدول ۴- مقایسه میانگین اثر متقابل میزان آبیاری و رقم بر صفات مورد بررسی در ذرت شیرین

شاخص برداشت	عملکرد (ton/ha)	بیوماس (ton/ha)	پدوست (day)	گرده افشانی تا کامل دهی (mm)	عمق دانه (mm)	وزن هزار دانه (g)	تعداد کل دانه	تعداد دانه در ردیف	تعداد ردیف دانه	تعداد بلال (mm)	طول بلال (mm)	رقم آبیاری	میزان آبیاری
-/۳۴bc	۱۲/۲ b	۲۲/۷ab	۲/۲ d	۱۹/۲ a	۴۱۰bc	۵۳۳ bc	۳۲/۶bc	۱۶/۲abc	۴۷/۶b	۱۶۷b	دانه	دانه	۱۰۰٪ نیاز آبی
-/۶ a	۲۰/۸ a	۲۵/۸ a	۱/۸d	۲۲/۲ a	۴۶۰ a	۷۷۱ a	۳۱/۵a	۱۸/۴ a	۵۲/۱a	۲۰۰ a	طلای	طلای	آبی
-/۴۲bc	۱۱/۲ bc	۱۹/۹ bc	۱/۹ d	۱۷/۴ bc	۲۸۲de	۵۸۹ b	۲۴/۹b	۱۶/۸ ab	۴۱/۱cd	۱۶۲c	دانه	دانه	آبستون
-/۳۷bc	۸/۶ cd	۱۷/۳ cd	۴bc	۱۳/۸ cde	۳۲۳c	۲۸۷ de	۲۶/۸de	۱۲/۶bcd	۳۷/۴de	۱۳۰d	دانه	دانه	۸۰٪ نیاز آبی
-/۴۸ab	۱۴/۶ b	۲۲/۷ ab	۳ cd	۱۵/۶ bcd	۴۲۶ ab	۵۸۸ b	۳۵/۳b	۱۶/۶abc	۴۴/۵bc	۱۵۲cbd	طلای	طلای	
-/۳۵bc	۷/۶ d	۱۶/۲ d	۳/۶ c	۱۶/۲ bcd	۲۶۸c	۴۵۳ cd	۲۰/۸bcd	۱۲/۷bcd	۳۹/۴de	۱۴۹cbd	دانه	دانه	آبستون
-/۳۳ c	۶/۸ d	۱۴/۳ d	۵/۴ a	۱۲/۱ ed	۳۲۸d	۳۰۵ e	۲۴/۲ e	۱۲/۵d	۲۶/۳ e	۱۰۱ e	دانه	دانه	۶۰٪ نیاز آبی
-/۴۵bc	۱۲/۸ b	۱۹/۸ bc	۴/۱bc	۱۳/۸ cde	۳۹۱bc	۴۲۹ cd	۲۸/۲cde	۱۵/۲bc	۴۰/۴ ode	۱۴۰ d	طلای	طلای	
-/۳۸bc	۷/۶ d	۱۴/۹d	۵ ab	۱۱/۴ e	۲۶۰ e	۴۰۴ de	۲۸/۲cde	۱۴/۳cd	۳۰/۶ f	۱۴۱ d	دانه	دانه	آبستون

در هر ستون میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد می باشند.

جدول ۶- درصد تغییر صفات مورد آزمایش در اثر کم آبیاری

تغییرات	میانگین		تغییرات		میانگین		صفت
	تنش شدید %	نرمال	%	نرمال	تنش ملایم	نرمال	
فاصله گرده افشانی تا ظهور کاکل (day)	۱۳۶	۴/۸۳	۲/۰۴	۷۳/۴۶	۳/۵۴	۲/۰۴	
وزن ۱۰۰۰ دانه (g)	-۱۴/۴۸	۳۲۶	۳۸۱	-۶/۷۷	۳۵۵	۳۸۱	
تعداد ردیف دانه در بلال	-۱۸/۵۲	۱۴/۰۱	۱۷/۲	-۱۰/۹۲	۱۵/۳۲	۱۷/۲	
تعداد دانه در ردیف	-۲۶/۰۹	۲۶/۸۸	۳۶/۳۸	-۱۵/۴۱	۳۰/۷۷	۳۶/۳۸	
تعداد کل دانه	-۳۹/۸۶	۳۷۹	۶۳۱	-۲۴/۵۱	۴۷۶	۶۳۱	
طول بلال (mm)	-۲۷/۸۷	۱۲۷	۱۷۷	-۱۸/۷۵	۱۴۴	۱۷۷	
قطر بلال (mm)	-۲۳/۶۶	۳۶/۱۱	۴۷/۳۱	-۱۵/۲۸	۴۰/۰۸	۴۷/۳۱	
قطر چوب بلال (mm)	-۱۶/۲۳	۲۳/۰۹	۲۷/۵۷	-۷/۷۸	۲۵/۴۲	۲۷/۵۷	
عمق دانه (mm)	-۳۴/۰۴	۱۳/۰۱	۱۹/۷۴	-۲۵/۷۵	۱۴/۶۵	۱۹/۷۴	
عملکرد دانه (ton/ha)	-۴۲/۹۷	۸/۶۴	۱۵/۱۶	-۳۱/۹۲	۱۰/۲۳	۱۵/۱۶	



شکل ۱- میانگین عملکرد دانه و بیوماس ارقام مختلف ذرت شیرین در سطوح مختلف آبیاری

سطح آبیاری کامل، گیاه در هیچ یک از مراحل رشد دچار کمبود آب نبوده است. در سطح آبیاری ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز آبی، محدودیت رطوبتی در تمام طول فصل رشد وجود داشت. از آن جا که کم آبی سبب کاهش وزن تر و خشک گیاهان می شود (۵ و ۱۴). بنابراین بین میزان رشد رویشی و زایشی گیاه تعادل به وجود آمده و نهایتاً سطوح مختلف آبیاری، تاثیری بر شاخص برداشت نداشت (شکل ۱). در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که کم آبیاری سبب کاهش عملکرد دانه و بیوماس در همه ارقام مورد بررسی شد. این کاهش عملکرد به دلیل کاهش در اجزای موثر در عملکرد از جمله افزایش طول دوره گرده افشانی و ظهور کاکل و در نتیجه کاهش تعداد دانه تشکیل شده در بلال بود. بین ارقام مورد بررسی رقم مریت کمترین آسیب را در اثر کم آبیاری متحمل شد. اثر روش های کاشت بر اکثر صفات مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین اثر متقابل روش کاشت در سطح آبیاری معنی دار نشد.

بین شاخص برداشت ارقام مختلف تفاوت معنی دار وجود داشت. رقم مریت بیشترین شاخص برداشت را با میانگین ۵۱ درصد داشت. رقم آبسپژن و دانه طلائی از نظر این صفت در یک گروه آماری قرار گرفتند (جدول ۲). تفاوت معنی داری در شاخص برداشت گیاه ذرت در رژیم های مختلف آبیاری مشاهده نمی شود (جدول ۱). وستگیت (۲۶) و سپهری و همکاران (۵) نیز اعلام کردند شاخص برداشت تحت تاثیر عوامل تنش زا قرار نمی گیرد. کمبود آب در دوران پر شدن دانه، طول این دوره را کوتاه کرد ولی از آن جا که تولید بیوماس اندام های هوایی را نیز تحت تاثیر قرار داد، نهایتاً تاثیر معنی داری بر شاخص برداشت نداشت. به نظر می رسد در مدیریت نوین گیاهان زراعی، شاخص برداشت یک هیبرید معین صفت ثابتی است که حتی در شرایط تنش تغییر اندکی می کند (۷). در این آزمایش میزان دسترسی به آب در تمام طول فصل رشد متوازن بوده است. به این معنی که در

قدردانی

کلیه مراحل این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، ایستگاه طرق انجام شده است، که به این وسیله از کلیه مسئولین و کارکنان محترم آن مرکز تشکر و سپاسگزاری می شود.

جدول ۷- همبستگی ساده بین عملکرد و سایر صفات مورد آزمایش در هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط مختلف آبیاری

تعداد ردیف دانه در بلال	تعداد دانه در ردیف	تعداد کل دانه در بلال	طول بلال (mm)	قطر بلال (mm)	عمق دانه (mm)	وزن ۱۰۰۰ دانه (gr)
عملکرد دانه در تیمار ۱۰۰ درصد نیاز آبی	۰/۷***	۰/۶۹*	۰/۹۸***	۰/۸۲***	۰/۵۹ NS	۰/۷۷*
عملکرد دانه در تیمار ۸۰ درصد نیاز آبی	۰/۷۸*	۰/۶۸*	۰/۶۵*	۰/۸۳***	۰/۳۴ NS	۰/۷۹*
عملکرد دانه در تیمار ۶۰ درصد نیاز آبی	۰/۹۶***	۰/۸۳***	۰/۹۱***	۰/۸۳ NS	۰/۱۸ NS	۰/۳۲ NS

* و ** - به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد، NS: عدم وجود تفاوت معنی دار

Archive of SID

منابع

- ۱- امام، ی.، و غ. رنجبر. ۱۳۷۹. تأثیر تراکم بوته و تنش خشکی در مرحله رشد رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد د و کارایی استفاده از آب بر ذرت دانه ای. مجله علوم زراعی ایران، ۲ (۳): ۵۰-۶۲.
- ۲- احمدی، ج.، ح. زینالی خانقاه، م. رستمی، و ر. چوکان. ۱۳۷۹. بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتي ذرت دانه ای. مجله علوم کشاورزی ایران شماره ۴ ص ۸۹۱ - ۹۰۶.
- ۳- چوکان، ر.، ت. طاهرخانی، م. قنادها و م. خدارحمی. ۱۳۸۵. ارزیابی تحمل به خشکی در لاین های ذرت دانه‌ای با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش خشکی. مجله علوم زراعی ایران، ۸ (۱): ۷۹-۸۹.
- ۴- ساجدی، ن.، ع. م. ر. اردکانی، ا. نادری، ح. مدنی، م. مشهدی و ا. بوجار. ۱۳۸۸. تأثیر تنش کمبود آب و کاربرد عناصر غذایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب در ذرت. مجله پژوهش های زراعی ایران. ۷ (۲): ۴۹۳-۵۰۲.
- ۵- سپهری، ع.، س. ع. م. مدرس ثانوی، ی. یمینی و ب. قره یاضی. ۱۳۸۱. تأثیر تنش آب و مقادیر مختلف نیتروژن بر مراحل رشد و نمو، عملکرد و اجزا عملکرد ذرت. مجله علوم زراعی ایران. ۴ (۳): ۱۸۴-۱۹۵.
- ۶- شعاع حسینی، س. م.، م. فارسی، و س. خاوری خراسانی. ۱۳۸۷. بررسی اثرات تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد در چند هیبرید ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت. دانش کشاورزی. ۱۸ (۱): ۷۱-۸۵.
- ۷- غدیری، ح. و م. مجیدیان. ۱۳۸۲. تأثیر سطوح نیتروژن و قطع آبیاری در مراحل شیری و خمیری شدن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی استفاده از آب در ذرت دانه ای. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. ۷ (۲): ۱۰۳-۱۱۲.
- ۸- کریمی، ا.، م. همائی، م. معزاردلان، ع. لیاقت، ف. رئیس. ۱۳۸۵. اثر کود -آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در ذرت به روش آبیاری قطره ای -خطی. مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی. ۱۲ (۳): ۵۶۱-۵۷۵.
- ۹- گلباشی، م.، م. ابراهیمی، س. خاوری خراسانی، ر. چوکان و م. ضرابی. ۱۳۸۹. ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط آب و هوایی مشهد (*Zea mays* L.) در هیبریدهای ذرت دانه ای. نشریه بوم شناسی کشاورزی ۲ (۱): ۷۵-۸۴.
- ۱۰- مساوات، س.، ا. آساد، م. ک. حقیقی، ع. شاهی، ع. امامی و م. خرد نام. ۱۳۸۱. ارزیابی تغییرات مهم زراعی در دو شرایط تنش رطوبتی و آبیاری مطلوب در ذرت، چکیده مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ۷۳۵ ص.
- 11- Banziger, M., F. J. Betran, and H. R. Laffite. 1997. Breeding tropical maize for low N environmental. *Crop Science*, 37:1103-1109.
- 12- Blum, A. 1988. *Plant Breeding for Stress Environments*. CRC Press, Boca Raton, Florida.
- 13- Bolanos, J., and G. O. Edmeades. 1993. Eight cycles of selection for drought tolerance in lowland tropical Maize. I. Response in yield. Biomass and radiation utilization. *Field Crop Research*. 31: 233-252.
- 14- Camacho, R. G., and D. F. Caraballo. 1994. Evaluation of morphological characteristics in Venezuelan maize (*Zea mays* L.) genotypes under drought stress. *Scientia Agricola*. 51 (3):103-111.
- 15- Chapman, S. C., J. Crossa., K. E. Basford, and P. M. Kroonenberg. 1997. Genotype by environment effects and selection for drought tolerance maize. II. Three-mode pattern analysis. *Euphytica*. 95:1, 11-20.
- 16- Edmeades, G. O., J. Bolanos, and H. R. Laffite. 1990. Selection for drought tolerance in maize adapted to the lowland tropics, d. f. Mexico, CIMMYT.
- 17- Entz, M. H., and D. B. Flower. 1990. Differential agronomic response of winter wheat cultivars to pre-anthesis environmental stress. *Crop Science* 30: 1119-1123.
- 18- Erwin, A. T. 1951. Sweet Corn, Mutant or historic species?. *Economic Botany*. Springer New York. 5 (3): 302.
- 19- Heatherly, L. G., R. A. Wasley, and C. D. Elmore. 1990. Corn, sorghum and soybean response to irrigation in the Mississippi river alluvial plain. *Crop science*. 30:666-672.
- 20- Hu, X., S. Tao, and L. Wang. 1992. Research on Ridge and Furrow Planting of Proso in Semi arid and Drought inclined Areas. *Agricultural research in the arid areas*. 12: 104:1010.
- 21- Ludlow, M. M., and R. C. Muchow. 1990. A critical evaluation of traits for improving crop yields in water-limited environments. *Advanced Agronomy*. 43, 107-153.
- 22- Nesmith, D. S., and J. T. Ritchie. 1992. Maize (*zea mays* L.) responses to a sever soil water deficit during grain filling. *Field crop research*. 29:23-35.
- 23- Osbrone, S. L., J. S. Schepers, D. D. Francis, and M. R. Schlemmer. 2002. Use of spectral rdiance to in season biomass and grain yield in nitrogen and water stressed corn. *Crop Science*. 42:165-171.
- 24- Panday, R. K., J. W. Marienville, and A. Adum. 2000. Deficit irrigation and nitrogen effect on maize in a sahelian environment. I. Grain yield components. *Agricultural water management*. 46: 1-13.
- 25- Schussler, J. R., & M. E. Westgate. 1991. Maize kernel set at low water potential: II. Sensitivity to reduced assimilates at pollination. *Crop Science*, 31, 1196-1203.
- 26- Westgate, M. E. 1994. Water statues and development of the maize endosperm and embryo during drought stress. *Crop science* 34:76-83.