

بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مؤلفه های جوانی زنی بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (*Triticum aestivum L.*)

حسن عبدی^{۱*}- محمد رضا بی همتا^۲- ابراهیم عزیز اف^۳- رجب چوگان^۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۴/۱۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۷/۱

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی سطوح مختلف تنش خشکی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول (۶۰۰۰) بر روی مؤلفه های جوانی زنی و سلیکسیون اولیه ژنتیکی متحمل به خشکی گندم و همبستگی بین صفات مرتبط با جوانی زنی در آزمایشگاه و مزرعه، در قالب دو آزمایش جداگانه انجام شد. در آزمایشگاه ۴۰ ژنتیک گندم نان با ۳ تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی با استفاده از ۴ سطح پلی اتیلن گلیکول (۰، ۰-۳، ۳-۶، ۶-۹ بار) مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش صفات طول ریشه چه، طول ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، طول کلیوپتیل، وزن خشک و تر ریشه چه، سرعت و درصد جوانی زنی آزمایش مزرعه ای در هر دو شرایط مطلوب و تنش خشکی با ۳ تکرار در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی اجرا گردید. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که اعمال تبارهای تنش خشکی اثر معنی داری بر کلیه صفات مورد بررسی داشت. همچنین اختلاف بین ژنتیک های مورد بررسی برای این صفات معنی دار شد. بالاترین درصد و سرعت جوانی زنی بترتیب ۷۹/۹ درصد و ۴/۲ روز متعلق به شرایط نرمال بود. اعمال تنش (۳-) بار اثر معنی داری بر طول ساقه چه، طول کلیوپتیل، طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه نداشت اما موجب کاهش معنی دار درصد جوانی زنی شد، به گونه ای که در تیمار تنش شدید (۶- بار) به جز طول ریشه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه سایر صفات به صورت کاملاً معنی دار کاهش یافتند. در شرایط مطلوب (صفر بار) بین کلیه صفات اندازه گیری شده در آزمایشگاه با عملکرد دانه و شاخص های مقاومت، همبستگی مثبت و معنی دار بود. ولی در شرایط تنش خفیف (۳- بار) و تنش شدید (۶- بار) وزن تر و خشک ریشه چه و طول ریشه چه با عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. نتایج آزمایش مزرعه ای نشان داد که بین ژنتیک های مورد بررسی از نظر عملکرد دانه در شرایط مطلوب و تنش خشکی تقاضوت معنی داری وجود داشت. نتایج تحلیل همبستگی بین شاخص های مقاومت به خشکی و عملکرد دانه نشان داد که شاخص تحمل به تنش، شاخص میانگین بهرهوری و شاخص میانگین هندسی بهرهوری برای شناسایی ژنتیک هایی با عملکرد بالا در هر دو شرایط مطلوب و تنش خشکی مناسب هستند. بر اساس نتایج ضرایب همبستگی بین مؤلفه های جوانی زنی با عملکرد دانه و همچنین همبستگی شاخص های تحمل به تنش خشکی با عملکرد دانه در هر دو شرایط محیطی، ژنتیک های شماره ۳۸ (WS-۸۲-۹)، ۳۹ (DN-۱۱) و ۲۲ با پدیگیری (Alamo/M. 73-18) (mbul//Aldans/Las58/4/Bb//Cj"s/3/Horkk"s) پدیگیری (Horkk"s) با ۲۵ بار چشمگیر شناخته شدند.

واژه های کلیدی: ژنتیک، سرعت جوانی زنی، درصد جوانی زنی، شرایط نرمال و تنش

- ۱- دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، انسیتو ذخایر ژنتیکی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان
- ۲- استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
- ۳- استاد ژنتیک بیومتری، دانشگاه ملی جمهوری آذربایجان (باکو)
- ۴- استاد پژوهش، ژنتیک بیومتری، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مقدمه

غربال متفاوتی در این مرحله برای اصلاح و ایجاد مقاومت به خشکی راهه شده است. تعدادی از روش های کارآمد برای این منظور عبارتند از بررسی تراکم و عمق ریشه ها، نسبت طول ریشه به ساقه، بنیه اولیه گیاه، محتوای نسبی آب برگ، پایداری غشاء و جوانی زنی در شرایط تنفس (۲۴). در مطالعات مربوط به بررسی واکنش گیاهان به تنفس خشکی چون ایجاد و حفظ پتانسیل آب لازم در محیط خاک، مشکل است لذا شبیه سازی شرایط تنفس خشکی با استفاده از مواد اسموتیک مختلف برای ایجاد پتانسیل های اسمزی مورد نظر بسیار متداول بوده و یکی از مهمترین روش های مطالعه تاثیر تنفس خشکی بر جوانی زنی تلقی می شود (۸). افزودن محلول پلی اتیلن گلیکول به محیط کشت هیدروپونیک روش خوبی برای گزینش گیاهچه های گندم از نظر مقاومت به خشکی است. در سایر موارد نیز آزمایش ها بر روی محصولاتی نظیر عدس و ذرت در محیط پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰۰ ع به عنوان ایجاد کننده پتانسیل منفی آب و تنفس خشکی با موفقیت انجام شده است. تاکنون پژوهشگران زیادی به بررسی پاسخ گیاهان به تنفس اسمزی در مرحله گیاهچه ای با استفاده از PEG پرداخته اند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که می توان در مرحله گیاهچه به غربال گیاهان برای مقاومت به خشکی پرداخت (۱۱) در بررسی تأثیر طول کلئوپتیل و عمق گره یقه در تحمل به سرما و خشکی ارقام دیم نتیجه گرفته شد که طول کلئوپتیل، تشکیل گره یقه در عمق خاک و قابلیت تشکیل تعداد پنجه بیشتر در بوته، صفات بسیار مفیدی برای افزایش و پایداری عملکرد در مناطق سرد و خشک است (۳). در طبقه بندی ارقام گندم دیم از نظر مقاومت به خشکی با ایجاد سطوح مختلف توسط مانیتور در مرحله جوانی زنی، گزارش شده است که تنفس خشکی باعث کاهش طول ریشه چه و ساقه چه شده ولی نسبت ریشه چه به ساقه چه با افزایش خشکی بطور پشمگیری افزایش می یابد و نسبت ریشه به اندام های هوایی برای تفکیک ارقام متحمل به خشکی صفت مناسبی است (۹). در سطوح مختلف تنفس های غیر زنده برای جوانی زنی ارقام مختلف گندم واکنش های متفاوتی گزارش شده است (۱۹). در مطالعه ای اثر تنفس خشکی بر روی ارقام گندم، بنیه جوانی زنی را در مقایسه با طول ساقه چه، درصد جوانی زنی و طول ریشه چه حساس ترین صفت به تنفس خشکی معرفی کردند (۱۴). در تحقیق دیگری مشخص گردید نسبت بالای طول ریشه چه به ساقه چه نشان دهنده تحمل بیشتری می باشد، ولی با توجه به عکس العمل های متفاوت صفات اندازه گیری شده ژنتیک ها در پتانسیل های مختلف به نظر می رسد برای طبقه بندی و غربال ژنتیک ها از نظر تحمل به خشکی باید از معیار های چند گزینه ای استفاده نمود و از استفاده یک صفت در مشخص کردن وجود یا عدم وجود تحمل به تنفس اجتناب کرد (۹). یکی از مسائل مهم در ارزیابی ارقام و لاین ها برای مقاومت به خشکی اندازه گیری کمی معیار های

بیش از ۸۰ سال از فعالیت های اصلاحی که منجر به افزایش نسبی عملکرد گیاهان زراعی در محیط های خشک شده، می گذرد و با وجود این که تحقیقات پایه، نتایج معنی داری در درک واکنش های فیزیولوژیک و ملکولی گیاهان به کمبود آب فراهم کرده است اما هنوز شکاف بزرگی بین عملکرد در شرایط مطلوب و تنفس وجود دارد. به حداقل رساندن شکاف عملکرد و افزایش ثبات آن تحت شرایط متنوع تنفس، اهمیت استراتژیک در امنیت غذایی دارد (۱۳). تنفس های غیر زنده به عنوان منبع اصلی (۷۱ درصد) کاهش دهنده عملکرد توسط شمار می روند (۱۸). از مجموع پتانسیل کاهش عملکرد توسط تنفس های غیر زنده، حدود ۱۷ درصد مربوط به خشکی، ۲۰ درصد شوری، ۴۰ درصد دمای بالا (گرما)، ۱۵ درصد دمای پایین و ۸ درصد مربوط به سایر عوامل می باشد (۷). مرحله گیاهچه ای از مراحل حساس به تنفس خشکی است. مطالعات نشان می دهد که داشتن کلئوپتیل طویل، وضیعت استقرار گیاهچه ها را تحت تاثیر شرایط تنفس بهبود می بخشد که از عوامل اصلی در تولید نهایی گیاه محسوب می شود (۱۰).

گندم (*Triticum aestivum L.*) در مرحله جوانی زنی و سبز شدن و مراحل انتهایی فصل رشد با بروز تنفس خشکی مواجه است بنابراین انتخاب ارقامی که علاوه بر تحمل به تنفس خشکی در مرحله جوانی زنی و سبز شدن، عملکرد بالایی نیز داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار است (۲۵). گزارشات متعدد حاکی از آن است که ژنتیک هایی که بتوانند در مرحله جوانی زنی واکنش مناسبی به تنفس خشکی نشان دهند، در مرحله گیاهچه ای رشد بهتری داشته و سیستم ریشه ای قویتری تولید کرده اند (۲۶). با مطالعه بیست ژنتیک گندم نان از نظر تحمل خشکی در شرایط مزرعه و آزمایشگاه گزارش کرددند که ژنتیک های متتحمل به تنفس خشکی در شرایط مزرعه از تحمل به خشکی بالایی در شرایط آزمایشگاه (مرحله جوانی زنی) برخوردار بودند (۲۹). در تحقیقی پارامترهای مرتبط با رشد گیاه نظیر طول کلئوپتیل، طول ریشه چه و طول ساقه چه بعنوان صفات بر جسته جهت ارزیابی تحمل به خشکی معرفی شدند (۲۳). تحقیقات نشان داده است که صفت ساقه چه بیش از هر صفت دیگری تحت تاثیر تنفس خشکی قرار گرفته و با افزایش تنفس خشکی میزان رشد ساقه چه به شدت کاهش می یابد (۱). رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه به عنوان مرحله مناسب برای بررسی مقاومت به خشکی در گندم مورد قبول پژوهشگران است. جوانی زنی و بنیه قوی بذر برای استقرار اولیه مهم است. در نواحی خشک رشد گیاهچه به واسطه کمبود رطوبت محدود می شود در این نواحی سرعت و میزان استقرار گیاهچه تأثیر زیادی در زمان رسیدگی و عملکرد دارد (۱۰). تاکنون روش های

همچنین به منظور بررسی ارتباط بین صفات آزمایشگاهی با عملکرد دانه، آزمایشی در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامین، استان تهران با ۴۰ ژنتیپ گندم در دو شرایط رطوبتی نرمال و تنفس خشکی آخر فصل (۵۰درصد گلدهی) با سه تکرار اجرا گردید. پدیگیری ژنتیپ‌ها در (جدول ۱) آمده است. هر کرت آزمایشی شامل ۲ پشته به طول ۶ متر و در سه ردیف به عرض ۱/۲ متر از یکدیگر بود. مساحت کاشت ۷/۲ هکتار نیتروژن و ۱/۲ متر از یکدیگر بود. مساحت کاشت ۱۲۰ کیلوگرم در هر هکتار نیتروژن و ۹۰ کیلوگرم در هر هکتار فسفر محاسبه گردید (۶).

تمامی کود مصرفه و یک سوم کود نیتروژن همزمان با کاشت و بقیه کود نیتروژن در مراحل مختلف فنولوژی گیاه به صورت سرک مصرف شد. آبیاری در تیمار تنفس در ۵۰درصد گلدهی قطع شد و تا مرحله رسیدگی، گیاه تحت تنفس قرار گرفت. پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوطه تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار SAS و همچنین مقایسه میانگین برای همه صفات با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد صورت گرفت و برای تعیین همبستگی ساده صفات از نرم افزار SPSS استفاده شد. شاخص‌های مقاومت به خشکی محاسبه شدند و از بین آنها سه شاخص جزو بهترین شاخص‌ها انتخاب و معرفی شدند.

$$\text{MP} = \frac{(\text{YS} + \text{YP})}{2}$$

$$\text{GMP} = \frac{(\text{YS} * \text{YP})}{2}$$

$$\text{STI} = \frac{(\text{YS} * \text{YP})}{(\text{YP})}$$

YP = عملکرد پتانسیل در شرایط بدون تنفس

YS = عملکرد در شرایط تنفس

$\bar{Y}\bar{P}$ = میانگین کل ژنتیپ‌ها عملکرد در شرایط بدون تنفس

$\bar{Y}\bar{S}$ = میانگین کل ژنتیپ‌ها عملکرد در شرایط تنفس

نتایج و بحث

نتایج مزرعه‌ای

نتایج تجزیه واریانس شرایط مزرعه‌ای جداول ۲ و ۳ نشان داد که در شرایط تنفس خشکی تفاوت بین ژنتیپ‌ها برای صفات طول سنبله، طول پدانکل، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد روز تا گلدهی در سطح یک درصد و برای صفات تعداد گلچه‌های بارو، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و تعداد روز تا رسیدگی در سطح پنج درصد معنی دار و در صفات تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت غیر معنی دار بود.

مقاومت به خشکی است. در بررسی شاخص تحمل به تنفس و شاخص میانگین هندسی بهره‌وری پیشنهاد شده است که هر دو شاخص توانایی شناسایی ژنتیپ‌هایی با عملکرد بالا در هر دو شرایط تنفس و بدون تنفس را دارد (۱۵ و ۱۶). با توجه به موارد اشاره شده هدف از انجام این پژوهش بررسی عکس العمل مؤلفه‌های جوانی‌زنی و رشد اولیه در ژنتیپ‌های گندم نان به سطوح مختلف تنفس خشکی و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به تنفس در شرایط مزرعه بود.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه بخش تحقیقات اصلاح و تهییه نهال و بذر ورامین، استان تهران به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوك‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل آزمایش عبارت از پتانسیل اسمزی با سطوح صفر (شاهد)، ۳، ۶-۹-۹ بار و تعداد ۴۰ ژنتیپ گندم نان بودند. از آب مقطمر به عنوان شاهد استفاده شد. سطوح مختلف خشکی با پلی اتیلن گلیکول (۶۰۰۰) اعمال گردید. غلظت پلی اتیلن گلیکول که برای تهییه پتانسیل آب لازم بود از طریق رابطه زیر بدست آمد (۲۰):

$$\text{QS} = \frac{\text{C}^2 + (2067 \times 10^{-4})}{\text{CT} + (8039 \times 10^{-7}) \text{ C}^2 \text{T}}$$

QS: پتانسیل اسمزی بر حسب بار

C: غلظت پلی اتیلن گلیکول بر حسب گرم در لیتر

T: درجه حرارت بر حسب درجه سانتی گراد

۲۵ عدد بذر از هر ژنتیپ انتخاب و بعد از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم ۲/۵ درصد، با آب مقطمر شستشو داده شد و بذرها در داخل ظرف پتری قرار داده شدند به طوری که در کف هر پتری دو لایه کاغذ صافی واتمن قرار داشت به هر ظرف پتری ۱۰ میلی لیتر از محلول پلی اتیلن گلیکول با پتانسیل مورد نظر اضافه شد. ثبت جوانی‌زنی به صورت روزانه و ساعت خاصی از روز دوم شروع شد و تا روز هشتم ادامه داشت. خروج ریشه‌چه به اندازه دو میلی‌متر یا بیشتر به عنوان معیار جوانی‌زنی در نظر گرفته شد (۳۰). در انتهای آزمایش (روز هشتم) ۱۰ گیاه‌چه به صورت تصادفی از داخل هر پتری انتخاب و طول ریشه‌چه، ساقه‌چه و طول کلئوپتیل با خطکش و بر حسب سانتی متر اندازه‌گیری و ثبت شد. گیاه‌چه‌ها در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد در داخل آون به مدت ۴۸ ساعت قرار داده و سپس وزن خشک آنها با ترازوی حساس اندازه‌گیری شد. برای محاسبه درصد و سرعت جوانی‌زنی از فرمولهای زیر استفاده گردید (۱۳):

$$\frac{\text{تعداد کل بذور جوانه زده تا روز I}}{\text{تعداد کل بذور}} = \frac{\text{درصد جوانه زنی}}{\text{درصد جوانه زنی}}$$

$$\frac{\text{تعداد بذور جوانه زده تا روز I}}{\text{تعداد روز از شروع آزمایش}} = \frac{\sum_{n=1}^i \text{سرعت جوانه زنی روز}}{n}$$

1-Mean productivity

2- Geometric mean productivity

3- Stress tolerance index

جدول ۱- نام یا پدیگری لاین های مورد بررسی

۱	پیشتاز
۲	مرودشت
۳	شیراز
۴	M79-6
۵	گاسپارد
۶	Seri 82// shuha s/ 4/ Rbs/Anza/3/Kuz/Hys//Ymg/Tob
۷	Seri 82// shuha/ 4/ Rbs/ Anza/3/Kuz/Hys//Ymg/Tob
۸	Caspard// Aid s/ snd s/3/3/M-73-19
۹	Inia/ 90 zhong 87.
۱۰	Gov/ AZ/ Mas/ 3/ Dodo/ 5/Jup/Bjy//Kuaz
۱۱	Alvd// Aldan s/ Las 58/4/Bb//Cj's"/3/Horkk's"
۱۲	Ombu/ Alamo/ 3/ Azd/ vee//Seri/Rsh/4/Bloudan/3/Bb/7c*2//Y50/*3kal
۱۳	Fln/ Acc/ Ana/ 3/ pew s/ 4//Attila
۱۴	Ombul/ Alamo/ M- 73- 18
۱۵	Mv 22- 77// stephon/ 3/Mon"s"/Lmu"s"/Falke/4/Zarin
۱۶	PASTOR/ 3/ VORONA/CNO79//Kauz
۱۷	SLTE/ MO/ 3/ VORONA/BAU//BAU
۱۸	WEAVER/ 4/NAC/TH.AC/3*PV/3/ Mirlo/Bucn
۱۹	WEAVER/ 4/NAC/ TH.AC/3*PV/3/Mirlo/Bucn
۲۰	Bahar
۲۱	Gas pard/ 3/ jvp/ Bjy/_
۲۲	Ombul/ A/ amo/ M. 73- 18 (M-86-4)
۲۳	Alvd// A/ dan/ Las 2/ 3/ Gaspard.
۲۴	Alvd// A/ dan/ Las 2/ 3/ Gaspard.
۲۵	Alvd/ A/ dan/ las/ 3/ Druchamps/ 4/ kauz/ stm (M-86-6)
۲۶	Owl 85256- 3 * oh- o EOH/ Mv 17/ 3/ A/ vd// Aldari/ lus (M-86-8)
۲۷	Owl 85256- 3 * oh- o EOH/ Mv 17/ 3/ A/ vd// Aldari/ lus (M-86-8)
۲۸	HAAMA- 11
۲۹	FISCAL
۳۰	CROC-1/ AE. SQUARROSA (224)// OPATA/ 3/ KAUZ*2/Bow/(-12)
۳۱	EIVIRA/ M/ LAN
۳۲	PBW 343/ CAR 422/ ANA
۳۳	CHEN/ AEGIOPS _
۳۴	CROC-1/ AE. SQUARROSA
۳۵	زاگرس
۳۶	چمران
۳۷	قدس
۳۸	WS-82-9
۳۹	DN -11
۴۰	مهدوی

لاین های شماره ۲ و ۵ با داشتن ۴۱۷ و ۴۲۵ گرم در مترمربع دارای کمترین عملکرد دانه بودند. در شرایط نرمال لاین های ۱۱، ۳۷، ۳۹ و ۳۸ با عملکردهای ۵۶/۳۳، ۵۶/۵۶۸، ۵۶/۵۷۴ و ۵۶/۵۷۴ گرم در مترمربع دارای بیشترین ولاین های شماره ۳۰ و ۴۰ با داشتن ۴۹۳ و ۴۹۴ گرم در مترمربع دارای کمترین عملکرد دانه بودند. با توجه به اطلاعات جدول ۴ ژنتیپ های شماره ۳۸، ۳۷ و ۳۹ علاوه بر

در شرایط معمولی نیز به جز تعداد دانه در سنبله و تعداد روز تا رسیدگی در بقیه صفات تفاوت بین ژنتیپ ها در سطح یک و پنج درصد معنی دار بود. این امر نشان دهنده وجود تفاوت های ژنتیکی بین ارقام و ژنتیپ های مورد بررسی است. با توجه به جدول ۴ در شرایط تنفس خشکی ژنتیپ های شماره ۳۷، ۳۹ و ۳۸ با عملکردهای ۵۰۱/۳۳، ۴۸۷/۶۶ و ۵۰۱/۳۳ گرم در مترمربع دارای بیشترین و

(TOL) جزو حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها به تنش خشکی شناخته شدند. بر اساس مشاهدات مزرعه‌ای نیز لاین‌های شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ دارای بهترین مورفولوژی، رشد بوته و زودرسی در شرایط مطلوب و تنش خشکی بودند.

اینکه از بالاترین مقدار شاخص‌های MP، STI و MP برخوردار بودند میزان عملکرد دانه بالاتری نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها نیز در هر دو شرایط محیطی داشتند، جزو متتحمل‌ترین و ژنوتیپ‌های شماره ۱ و ۴۰ با داشتن بالاترین مقدار شاخص‌های حساسیت به تنش (SSI و

جدول ۲- تجزیه واریانس صفات مختلف گندم نان در شرایط تنش خشکی

تعداد روز تا رسیدگی	تعداد روز تا گلدهی	وزن هزار دانه	شاخص برداشت	عملکرد دانه	عملکرد بیولوژیکی	تعداد دانه در سنبله	تعداد گلچه‌های بارور	ارتفاع بوته	طول پدانکل	طول سنبله	درجه آزادی	منابع تغییرات	میانگین مربعات
۲۱/۲۸۶	۴/۴۲	۶/۰۶	۳/۵۳۵	۱/۷۳	۳/۷۲	۲/۷۳	۱/۸۳	۱/۰۰۳	۲/۵۴	۴/۷۴۸	۲	تکرار	
۱۱/۵۷۶*	۱/۹۱۱**	۱۲/۵۹۴**	۲/۲۷ ^{ns}	۱/۱۹۳*	۱۵۳۱۶/۹۷۴*	۳/۸۵ ^{ns}	۱/۴۶*	۲/۳۹۲**	۲/۰۵**	۴/۶۴۸**	۳۹	ژنوتیپ‌ها	
۹۱۲/۵۵	۱۰/۴۸/۳۱۷	۲۳۱/۹۳۳	۸۶۶/۷۹۳	۰۵۲۴۷۶/۴۶۴	۱۱۶۹/۹۸۸	۳۵۶/۳۱۷	۱۲۵۲/۸۷	۱۵۶۵/۶۰۸	۵۲۴/۴۲	۱۲۵/۹۰۲	۷۸	خطای آزمایشی	
۱۸/۶	۱۲/۱۱	۱۳/۵۴	۱۷/۳	۱۵/۸۲	۱۰/۰۴	۹/۶۸	۱۷/۱۹	۱۳/۹۰	۱۲/۵۴	۷/۴۸		ضریب تغییرات	(درصد)

*، ** و ns - به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۱٪ و ۵٪ و عدم معنی داری

جدول ۳- تجزیه واریانس صفات مختلف گندم نان در شرایط نرمال

تعداد روز تا رسیدگی	تعداد روز تا گلدهی	وزن هزار دانه	شاخص برداشت	عملکرد دانه	عملکرد بیولوژیکی	تعداد دانه در سنبله	تعداد گلچه‌های بارور	ارتفاع بوته	طول پدانکل	طول سنبله	درجه آزادی	منابع تغییرات	میانگین مربعات
۲/۵۴۸	۲۰/۵۳۰	۲۸/۲۳۳	۱۲/۵۰۸	/۵۰۸ ۴۱۸۴	۳۷/۲۶۴	۱۱۷۰/۴۵	۱۸/۰۳۳	۵۹/۵۰	۲۴۹/۰۵۸	۴/۷۴۸	۲	تکرار	
۴/۶۴۸**	۱۳/۸۴۷**	۴۸/۹۴۷**	۲۲/۶۰۷*	۳/۲۵ ^{ns}	۱۵۳۶/۹۷۴*	۱۴/۱۹*	۱۲۰/۸۷*	۳۷/۴۵۱*	۲۵/۶۹۷**	۶۷/۱۱ ^{ns}	۳۹	ژنوتیپ‌ها	
۱/۶۱۴	۶/۷۲۳	۲۰/۴۵۷	۱۵/۴۲۲	۴/۵۶۸	۲/۳۱۰	۱۵۳۷۹/۷۰	۶۲۷/۷۵	۱۱/۱۱۳	۲/۹۷۴	۱۲/۴۴	۷۸	خطای آزمایشی	
۱۳/۲۳	۷/۴۸	۹/۴۵	۱۳/۹	۱۷/۱۶	۹/۶۸	۱۰/۸۲	۹/۴۲	۱۰/۶۴	۱۱/۴۵	۱۰/۵۴		ضریب تغییرات	(درصد)

*، ** و ns - به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۱٪ و ۵٪ و عدم معنی داری

باشند و نتایج ذکر شده با نتایج (۲۸) و (۲۸) مطابقت دارد. محققان دیگری نیز از این شاخص‌ها برای گزینش ژنوتیپ‌های با عملکرد بالا در هر دو محیط استفاده نمودند (۱۵ و ۱۶). همچنین همبستگی مثبت بین TOL و SSI با عملکرد دانه تحت شرایط مطلوب و همبستگی منفی بین این شاخص‌ها با عملکرد دانه تحت شرایط تنش خشکی نشان می‌دهد که انتخاب بر اساس این شاخص‌ها موجب کاهش عملکرد دانه خواهد شد. در این تحقیق نیز لاین‌های با عملکرد بالاتر در شرایط تنش مقادیر کمتری از این شاخص را به خود اختصاص داده‌اند که با نتایج (۲۸) مطابقت دارد.

جدول ۵ همبستگی شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی بر اساس عملکرد دانه در دو شرایط محیطی مطلوب و تنش خشکی را نشان می‌دهد. همانگونه که مشاهده می‌شود بالاترین همبستگی محاسبه شده در هر دو شرایط مطلوب و تنش خشکی در آزمایش مزرعه‌ای، مربوط به عملکرد دانه با شاخص‌های MP و STI، GMP و MP و STI برابر با ۰/۸۸۱، ۰/۴۷۱، ۰/۱۷۸، ۰/۴۷۱، ۰/۰۳۹ و ۰/۲۲۶ (به ترتیب برابر با جدول ۵). همبستگی مثبت و بسیار معنی دار بین شاخص‌های GMP و STI با عملکرد دانه بیانگر هم جهت و مفید بودن تاثیر استفاده از این شاخص‌ها برای انتخاب تحت هر دو شرایط محیطی می‌باشد و انتظار می‌رود که ژنوتیپ‌های انتخاب شده بر اساس این شاخص‌ها عملکرد مطلوبی در شرایط مطلوب و تنش خشکی داشته

جدول ۴- محاسبه میزان مقاومت ژنوتیپ‌ها توسط شاخص‌های مقاومت به خشکی در دو محیط مطلوب و تنفس خشکی

No	Y _s g m ⁻²	Y _p g m ⁻²	TOL	SSI	STI	MP	GMP
۵	۴۲۴	۴۹۹	۱۲۰	۱/۹۶	۱۷۸۷/۹۱	۴۶۱/۵	۴۵۹/۹۱
۴۰	۴۳۳	۴۹۳	۱۱۰	۱/۸۳	۱۸۰۳/۵۸	۴۶۳	۴۶۲/۰۱
۳۰	۴۳۴/۶۶	۴۹۴	۵۹/۲۳	۱/۰۰	۱۸۱۲/۰۸	۴۶۴/۳۳	۴۶۳/۲۰
۳۵	۴۳۲	۴۹۹	۶۷	۱/۱۲	۱۸۱۹/۵۹	۴۶۵/۵	۴۶۴/۱۷
۳	۴۲۶/۳۴	۵۱۰/۲۳	۸۴	۱/۳۷	۱۸۲۳/۰۷	۴۶۸/۳۳	۴۶۶/۳۲
۲۴	۴۳۷/۲۲	۵۰۰	۶۲/۶۷	۱/۰۵	۱۸۴۹/۷۸	۴۶۸/۶۶	۴۶۷/۵۶
۸	۴۴۹/۳۳	۴۹۱/۲۳	۴۲	۰/۷۲	۱۸۶۴/۵۹	۴۷۰/۳۳	۴۶۹/۸۴
۲۶	۴۳۱/۶۶	۵۱۴/۲۳	۸۲/۶۶	۱/۳۰	۱۸۷۲/۸۸	۴۷۳	۴۷۰/۶۸
۲۲	۴۳۲/۳۵	۵۱۶/۶۶	۸۴/۲۳	۱/۳۵	۱۸۸۲/۲۵	۴۷۴	۴۷۲/۲۰
۲۰	۴۲۰/۳۶	۵۲۱	۱۰۰/۶۶	۱/۷۴	۱۸۸۳/۹۴	۴۷۵/۶۶	۴۷۱/۲۲
۷	۴۴۹/۶۶	۵۱۰/۶۶	۶۱	۱/۰۰۲	۱۹۴۲/۰۶	۴۸۰/۱۶	۴۷۹/۱۵
۳۴	۴۳۷/۵	۵۲۵/۶۶	۸۸	۱/۳۷	۱۹۳۹/۵۱	۴۸۱/۶۶	۴۷۹/۱۵
۲	۴۱۷	۵۴۷	۱۳۰	۱/۹۶	۱۹۲۴/۰۸	۴۸۲	۴۷۷/۹۸
۲۳	۴۳۱/۳۳	۵۲۳/۶۵	۱۰۲/۲۳	۱/۶۱	۱۹۴۸/۲۱	۴۸۲/۵	۴۷۹/۶۳
۱۵	۴۳۰/۶۶	۵۲۷/۶۶	۸۸	۱/۲۹	۱۹۵۷/۹۵	۴۸۳/۶۶	۴۸۰/۶۱
۱۴	۴۳۲/۳۳	۵۲۸/۶۶	۱۰۶/۳۳	۱/۵۲	۱۹۵۹/۷۷	۴۸۵/۵	۴۸۱/۰۴
۲۹	۴۴۴/۶۶	۵۲۷/۲۳	۸۲/۶۶	۱/۳۱	۱۹۷۴/۰۸	۴۸۶	۴۸۴/۰۰
۳۳	۴۳۸/۶۶	۵۲۸/۲۳	۹۹/۶۵	۱/۵۱	۱۹۹۰/۱۵	۴۸۸/۵	۴۸۵/۲۴
۳۲	۴۳۱/۳۱	۵۵۱/۶۶	۱۲۰/۳۱	۱/۷۹	۲۰۰۵/۳۷	۴۹۱/۵	۴۸۷/۱۱
۷	۴۴۲/۶۶	۵۴۱	۹۷/۲۳	۱/۵۰	۲۰۲۰/۵۷	۴۹۱/۸۳	۴۸۸/۷۸
۱۳	۴۴۰	۵۴۶	۱۰۶	۱/۶۱	۲۰۲۴/۲۱	۴۹۳	۴۸۹/۶۵
۱۸	۴۳۳/۶۶	۵۵۳	۱۱۹/۳۳	۱/۷۸	۲۰۲۰/۸۹	۴۹۳/۳۳	۴۸۹/۰۰
۲۷	۴۶۰	۵۲۹/۶۱	۶۹/۲۶	۱/۰۹	۲۰۵۸/۶۰	۴۹۴/۸۳	۴۹۳/۴۸
۱۶	۴۳۵/۳۳	۵۵۵	۱۱۹/۶۶	۱/۵۶	۲۰۳۵/۵۹	۴۹۵/۱۶	۴۹۰/۸۶
۴	۴۵۷/۳۳	۵۲۸	۸۰/۶۶	۱/۲۹	۲۰۹۰/۷۰	۴۹۷/۶۶	۴۹۵/۸۳
۱۲	۴۶۲	۵۲۶	۷۴	۱/۰۹	۲۱۱۵/۸۷	۴۹۹	۴۹۷/۳۱
۳۱	۴۴۸	۵۵۲	۱۰۴	۱/۵۲	۲۰۹۱/۹۰	۵۰۰	۴۹۶/۷۲
۱۷	۴۴۵	۵۵۷/۲۳	۱۱۷/۳۳	۱/۵۴	۲۰۹۵/۵۹	۵۰۱/۱۶	۴۹۷/۴۶
۲۵	۴۴۶/۶۶	۵۵۶	۱۰۹/۲۳	۱/۶۴	۲۰۹۷/۱۴	۵۰۱/۳۳	۴۹۸/۱۶
۹	۴۴۵/۳۳	۵۵۹/۲۵	۱۱۴	۱/۶۲	۲۱۱۲/۸۸	۵۰۲/۳۲	۴۹۸/۴۴
۳۶	۴۵۴/۳۳	۵۵۱/۶۶	۹۷/۲۶	۱/۴۴	۲۱۲۳/۰۲	۵۰۳	۵۰۰/۴۰
۲۸	۴۳۹/۳۴	۵۶۸/۲۳	۱۲۹	۱/۳۷	۲۱۱۰/۷۹	۵۰۳/۸۳	۴۹۹/۲۷۷
۱۹	۴۳۴/۶۶	۵۷۶	۱۴۱/۳۲	۱/۹۸	۲۱۰۴/۴۳	۵۰۵/۸۳	۴۹۹/۰۷
۱۰	۴۴۸	۵۶۴	۱۱۶	۱/۶۷	۱۲۲۷/۸۸	۵۰۶	۵۰۱/۸۲
۲۱	۴۶۴/۶۶	۵۴۸/۲۳	۸۴/۶۶	۱/۲۶	۲۱۴۱/۷	۵۰۶	۵۰۳/۶۴
۱۱	۴۴۹	۵۷۴/۶۶	۱۲۵/۶۶	۱/۴۱	۲۱۷۹/۹۶	۵۱۱/۸۳	۵۰۷/۶۳
۶	۴۷۸/۶۶	۵۴۸	۶۹/۲۳	۱/۰۷	۲۲۲۷/۴۹	۵۱۳/۳۳	۵۱۲/۰۵۶
۳۷	۴۸۸/۶۱	۵۶۳/۶۶	۷۵	۱/۱۱	۲۳۳۵/۸۳	۵۲۶/۱۶	۵۲۴/۷۴۸
۳۹	۵۰۱/۳۳	۵۷۴	۷۲/۶۶	۱/۰۲	۲۴۲۳/۴۳	۵۳۷/۶۶	۵۳۶/۰۴۷
۴۸	۵۱۰/۲۳	۵۸۶/۲۳	۷۶	۱/۰۱۵	۲۵۳۲/۴۲	۵۴۳/۳۸	۵۴۶/۲۳۳

جدول ۵- همبستگی شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی براساس عملکرد دانه در دو شرایط محیطی مطلوب و تنش خشکی

	YP	YS	SSI	TOL	MP	GMP	STI
YP	.۰/۱۲۳۹	.۰/۷۸۱	.۰/۱۹۹*	.۰/۱۷۸**	.۰/۸۸۱**	.۰/۴۷۱**	
YS	۱	-.۰/۳۲۴**	-.۰/۲۳۸**	.۰/۲۲۶**	.۰/۷۳۶**	.۰/۳۹**	
SSI		۱	.۰/۲۲۵**	.۰/۴۶۰**	.۰/۳۹۸**	.۰/۳۷۹**	
TOL				۱	.۰/۵۴۱**	.۰/۴۸۰**	.۰/۴۶۲**
MP					۱	.۰/۹۹۷**	.۰/۱۸۵**
GMP						۱	.۰/۹۹۹**
STI							۱

* و **- به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۱٪ و ۵٪

مذکور به علت سرعت جوانی‌زنی سریع جز لاین‌های متحمل بودند که این نتیجه موافق یا یافته‌های (۱۱ و ۹) بود. کاهش سرعت و درصد جوانی‌زنی به دلیل آن است که تنش باعث افزایش فشار اسمزی در محیط اطراف بذر یا ریشه‌چه گیاه می‌شود که در این صورت جذب آب توسط بذر یا ریشه با اشکال مواجه می‌گردد. کاهش درصد و سرعت جوانی‌زنی با افزایش خشکی در بسیاری از گیاهان بویژه غلات گزارش شده است و کاهش سرعت جوانی‌زنی را به دلیل کاهش پتانسیل آب و کاهش دسترسی بذر به آب مرتبط دانسته‌اند. همچنین قابلیت دسترسی بذر به آب با کاهش پتانسیل اسمزی (مواد محلول) و ماتریک (مکش) کاهش می‌یابد. لذا پتانسیل آب محیط تأثیر مستقیم بر سرعت جذب آب و جوانی‌زنی دارد (۸ و ۲۵).

طول ریشه‌چه و طول ساقه‌چه: با افزایش شدت تنش از پتانسیل صفر آب مقطر به (۶-بار) طول ریشه‌چه و ساقه‌چه بترتیب به مقدار ۱۵/۴ درصد و ۱۶/۱ درصد کاهش یافت و میزان کاهش در اثر افزایش شدت تنش در طول ساقه‌چه به مرتب بیشتر از طول ریشه‌چه بود (جدول ۷). بنابراین طول ریشه‌چه با توجه به اینکه کمتر تحت تأثیر تنش قرار می‌گیرد، می‌تواند صفت قابل اطمینان در برنامه‌های اصلاحی باشد و با توجه به اطلاعات (جدول ۸) ژنوتیپ‌های شماره ۳۹ و ۵ با داشتن میانگین ۷/۰۶ و ۲/۰۶ سانتیمتر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین طول ریشه‌چه بودند، همچنین ژنوتیپ‌های شماره ۳۹ و ۵ با داشتن میانگین ۶/۷۳ و ۲ سانتیمتر دارای بیشترین و کمترین مقدار طول ساقه‌چه بودند. بنابراین ارقامی که دارای بیشترین تعداد ریشه‌های جنبی در زمان جوانی‌زنی بودند، بیشترین عملکرد دانه را داشتند و مشخص شد که سیستم ریشه گستردگی با تحمل به خشکی همبستگی دارد. توسعه ریشه تحت تأثیر پتانسیل آب خاک قرار می‌گیرد. با افزایش تنش خشکی سرعت رشد ریشه‌ها کاهش می‌یابد البته رشد ریشه نسبت به رشد قسمت‌های هوای گیاه کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد به طوری که نسبت کلی اندام‌های هوایی به ریشه کاهش می‌یابد (۲۹). کاهش رشد طولی

نتایج آزمایشگاهی

نتایج آزمایشگاهی جدول ۶ نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها و سطوح مختلف تنش خشکی از لحاظ صفات طول ساقه‌چه، طول ریشه‌چه، طول کلثوپتیل و نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه، سرعت و درصد جوانی‌زنی، وزن خشک و وزن تر ریشه‌چه اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که به جز نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه، سایر صفات در سطوح خشکی معنی دار بود، اما اثر متقابل رقم × خشکی معنی دار نبود.

درصد جوانی‌زنی: مقایسه میانگین درصد جوانی‌زنی در (جدول ۷) نشان داد که با افزایش تنش خشکی درصد جوانی‌زنی کاهش یافت و میانگین درصد جوانی‌زنی در شرایط نرمال در مقایسه با شرایط تنش خشکی (۳- و ۶-بار) بیشتر بود. با توجه به اطلاعات (جدول ۸) ژنوتیپ‌های شماره ۳۸ و ۵ با داشتن میانگین ۹۲/۵ و ۲۷/۳ درصد دارای بیشترین و کمترین درصد جوانی‌زنی بودند. مشاهده شده است زمان لازم جهت سبز شدن شاخص خوبی از نظر قدرت و عملکرد بذر می‌باشد و این نتیجه در توافق با یافته (۲ و ۳) بود. کاهش شاخص‌های جوانی‌زنی را می‌توان به کاهش سرعت جذب اولیه آب دانست. تنش خشکی با محدود کردن جذب آب توسط بذر، تأثیر بر حرکت انتقال ذخایر بذر و با تأثیر مستقیم بر ساختمان آن بیشتر پرتوئین در جنبین جوانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد (۱۵). کاهش درصد جوانی‌زنی ارقام گندم در شرایط تنش خشکی بیانگر حساسیت این ارقام به تنش می‌باشد که این مورد توسط (۸ و ۲۳) گزارش شده است.

سرعت جوانی‌زنی: با کاهش پتانسیل اسمزی تا سطح ۶-بار سرعت جوانی‌زنی به میزان ۱۷/۱ درصد کاهش یافت و با توجه به اطلاعات (جدول ۸) ژنوتیپ‌های شماره ۳۹ و ۵ با داشتن میانگین ۵/۰۷ و ۱/۸۵ روز به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سرعت جوانی‌زنی بودند. از خصوصیات مهم گیاهان زراعی قابلیت واکنش آنها به تغییرات رطوبتی، از طریق رشد سریع ریشه‌های آنان به طرف منبع رطوبت قابل دسترس و سرعت جوانی‌زنی سریع است که لاین‌های

گیاهچه را تحت تنفس خشکی بهبود می‌بخشد که از عوامل اصلی در تولید نهایی گیاه محسوب می‌شود (۱۰). طول ریشه‌چه به ساقه‌چه (R/S): با افزایش شدت تنفس خشکی نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه کاهش یافت ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود و عکس العمل ژنتیپ‌ها در سطوح مختلف خشکی یکسان بود که مخالف با یافته‌های (۹) بود. نسبت زیاد ریشه به اندازه‌های هوایی یکی از روش‌های بسیار موثر سازگاری گیاهان به خشکی است. در این حالت، میزان رشد ریشه به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از رشد ساقه است بدین ترتیب تعرق کاهش می‌یابد در حالیکه سیستم ریشه گیاه، آب مورد نیاز خود را از حجم زیاد خاک دریافت می‌کند و نشان‌دهنده تحمل بیشتری می‌باشد ولی با توجه به عکس‌العمل‌های متفاوت صفات اندازه‌گیری شده ژنتیپ‌ها در پتانسیل‌های مختلف بنظر می‌رسد. برای طبقه‌بندی و غربال ژنتیپ‌ها از نظر تحمل به خشکی باید از معیارهای چند گزینه‌ای استفاده نموده و از استفاده یک صفت در مشخص کردن وجود یا عدم وجود تحمل به تنفس اجتناب کرد. در گزارش دیگری (۹) مشاهده شد که تنفس کم آبی وزن خشک اندام هوایی پنجه را کاهش داد اما با این حال وزن خشک ریشه‌چه نسبت به تیمار شاهد تغییر نکرد.

ساقه‌چه و افزایش رشد طولی ریشه‌چه از مکانیزم‌های مهم اولیه در مواجه با تنفس خشکی است که ژنتیپ‌هایی که رشد ریشه‌چه بیشتری داشته باشند می‌توانند بر روی قابلیت تامین آب برای فعالیت گیاهی تحت شرایط تنفس خشکی تاثیر گذاشته و گیاه را از اثرات مخرب تنفس مصون دارد (۱۰). با افزایش شدت خشکی تا (۹-۶) بار) بدلیل اینکه اکثر مؤلفه‌های جوانی‌زنی نتوانستند واکنش نشان دهنده، به همین دلیل سطح تنفس (۹-۶ بار) از نتایج آزمایش حذف گردید. طول کلئوپتیل: با افزایش شدت تنفس خشکی از صفر بار به سمت (۶-۶ بار) طول کلئوپتیل کاهش یافت جدول (۶). با توجه به اطلاعات (جدول ۸) ژنتیپ‌های ۲۲ و ۵ با داشتن میانگین ۴/۴۰ و ۱/۳۸ سانتیمتر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار طول کلئوپتیل بودند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد طول کلئوپتیل از طریق افزایش طول ساقه و طول ریشه بر عملکرد موثر است، بنابرین طول غلاف برگ و ریشه‌چه می‌تواند یکی دیگر از صفات به‌گزینی در مناطق خشک محسوب شود. بذر واریته‌هایی که دارای غلاف برگ طولانی‌تری هستند، می‌توانند در عمق بیشتری کشت شوند و از ذخیره آب در عمق بیشتر و بهتر استفاده کنند (۳ و ۴). گزارش شده است مرحله گیاهچه‌ای از مراحل حساس به تنفس خشکی است. مطالعات نشان می‌دهد که داشتن کلئوپتیل طویل و ضعیت استقرار

جدول ۶- تجزیه واریانس صفات مختلف برای ۴۰ ژنتیپ گندم و ۳ سطح مختلف پلی اتیلن گلیکول در شرایط آزمایشگاه

میانگین مربعات									
وزن خشک ریشه‌چه	وزن تر ریشه‌چه	درصد جوانه‌زنی	سرعت جوانی‌زنی	نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه	طول ریشه‌چه	طول کلئوپتیل	طول ساقه‌چه	درجه آزادی	منابع تغییر
۰/۶۰***	۱/۰۲۷***	۶۰/۵۶۸***	۱۰/۳۴***	۶۷/۴۲***	۳۸۶/۱۷***	۱۲۹/۱۴***	۵۱۶/۳۹***	۲	بلوک
۰/۰۲۱***	۰/۰۳۸***	۲۶/۴۰***	۲/۵۹***	۳/۹۸***	۸/۴۲***	۵/۶۶***	۹/۳۷***	۳۹	رقم
۰/۰۱*	۰/۰۰۵***	۷۲/۵۶***	۳/۹۳***	۱/۷۶ n.s	۱۷/۰۵***	۴/۳۱***	۱۳/۲۰***	۲	خشکی
۰/۰۰۳	۰/۰۰۹***	۱۸/۰ n.s	۰/۹۳۴ n.s	۱/۱۲ n.s	۱/۹۹ n.s	۱/۱۱ n.s	۲/۲۹ n.s	۷۸	رقم × خشکی
۰/۰۰۶	۰/۰۰۹	۲۰/۷۸	۰/۷ n.s	۱/۳۸	۲/۹۱	۱/۲۱	۲/۰۴۴	۲۳۸	خطای آزمایش
۸/۴۶	۱۱/۸۴	۱۲/۴۰	۵/۲۸	۸/۳۴	۶/۷۵	۱۰/۱۲	۹/۲۷	-	خریب تغییرات (%)

***، * و ns - به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۱٪ و ۵٪ و عدم معنی داری

جدول ۷- مقایسه میانگین صفات مختلف برای سطوح پلی اتیلن گلیکول در شرایط آزمایشگاه

میانگین								
وزن خشک (g)	وزن تر (g)	درصد جوانه‌زنی	سرعت جوانی‌زنی روز	نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه	طول ریشه‌چه سانتیمتر	طول کلئوپتیل (cm)	طول ساقه‌چه (cm)	تیمارهای آزمایشی
۰/۱۲۰ a	۰/۱۸۴ a	۷۹/۹ a	۴/۱۲۶ a	۲/۹۱ a	۲/۸۵ b	۲/۳۴ a	۳/۸۴ a	(۰)
۰/۱۱۲ ab	۰/۱۶۷ a	۶۱/۸ b	۳/۹۰۵ ab	۲/۸۰ a	۴/۲۹۱ a	۲/۱۴ ab	۳/۵۰۰ ab	(۳-) بار (PEG)
۰/۰۹ b	۰/۱۴۱ b	۶۶/۲ b	۳/۷۶ b	۲/۶۷ a	۳/۱۰ b	۱/۹۷ b	۳/۲۰ b	(۶-) بار

*- حروف مشابه به معنی عدم تفاوت معنی داری براساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪

جدول ۸- مقایسه میانگین صفات مختلف برای ۴ ژنوتیپ گندم نان

زنوتیپ	طول ساقه‌چه (cm)	طول کلتوپتيل (cm)	طول ریشه‌چه (cm)	نسبت طول ریشه‌چه ساقه‌چه	سرعت جوانی زنی روز	درصد جوانه‌زنی	وزن تر ریشه‌چه (g)	وزن خشک ریشه‌چه (g)
۱	۲/۵۷eh	۱/۶۳fg	۳/۸۶dg	۲/۸۹ae	۴/۰۶bf	۶۵/۵bc	۰/۰۹ij	۰/۰۵gh
۲	۳/۱۵eh	۱/۵۵fg	۴/۴۸dc	۳/۶۸df	۳/۰۰ae	۶۵/۵bc	۰/۰۱ch	۰/۰۱ch
۳	۳/۳۳eh	۱/۶fg	۳/۸۷dg	۲/۵۸dh	۳/۹۷bf	۶۵/۶bc	۰/۰۹eh	۰/۰۹eh
۴	۳/۳۱eh	۱/۹۳dg	۳/۵۳dc	۲/۲۴eg	۴/۳۴ad	۷۱/۱bc	۰/۱۳ej	۰/۰۸eh
۵	۲/۰۰e	۱/۳۸g	۲/۰۶g	۱/۲۹h	۱/۰۵g	۲۷/۳c	۰/۱۳ej	۰/۰۵eh
۶	۳/۴۶eh	۱/۹dg	۵/۱۵dg	۲/۸۵bg	۳/۹۵bf	۶۱/۱bc	۰/۱۴bc	۰/۱۴bc
۷	۳/۳۳eh	۱/۷۸dg	۴/۵۵dg	۲/۴۸fg	۴/۰۴bf	۶۴/۴bc	۰/۱۳cg	۰/۱۳cg
۸	۲/۸۵eh	۱/۴۴g	۳/۸۱dg	۲/۷۵bc	۴/۵۸ab	۷۱/۱bc	۰/۱۱ch	۰/۱۱ch
۹	۳/۸cg	۱/۹۵bc	۴/۷۱dg	۳/۳۴fh	۳/۵۴df	۷۱/۱bc	۰/۱۸ab	۰/۱۸ab
۱۰	۴/۰۳dc	۱/۷۳fg	۴/۶۸de	۲/۵۴	۳/۹۱bf	۴۶/۳bc	۰/۱۴be	۰/۱۴be
۱۱	۳/۲..eh	۱/۴۴dg	۴/۰۱dc	۲/۸۴bg	۳/۶۲df	۶۵/۵bc	۰/۱۰gh	۰/۱۰gh
۱۲	۲/۶۴eh	۱/۷۸dg	۲/۸۶fg	۲/۶..dh	۳/۸۸gf	۶۵/۵bc	۰/۱۴ej	۰/۱۴ej
۱۳	۳/۰...eh	۱/۲۳dg	۳/۵۶dc	۳/۵۱ae	۳/۸۸bf	۶۵/۵bc	۰/۱۰eh	۰/۱۰eh
۱۴	۳/۳۸eh	۱/۷۹dg	۵/۶ac	۳/۵۲ae	۴/۰..bf	۷۱/۱bc	۰/۱۳ej	۰/۱۲ch
۱۵	۳/۵۷eh	۱/۲۶dg	۵/۱۱de	۳/۵۱ac	۳/۵۴df	۷۶/۴bc	۰/۱۰ej	۰/۰۹dh
۱۶	۲/۶۴eh	۱/۷۳eg	۴/۲..de	۳/۶۱ae	۳/۶۶df	۷۱/۱bc	۰/۱۸ci	۰/۰۵fh
۱۷	۳/۶۱eh	۱/۹۴dg	۴/۶۵de	۲/۵۹bc	۳/۹۱bf	۵۵/۵bc	۰/۱۲ej	۰/۱۰ch
۱۸	۳/۳۸eh	۱/۲۴dg	۴/۴..D-E	۳/۰..bc	۳/۸۷bf	۶۴/۴bc	۰/۱۵ej	۰/۰۷eh
۱۹	۲/۴۳eh	۱/۶fg	۲/۲..F-G	۲/۲..fg	۳/۸۷bf	۷۷/۷bc	۰/۱۷cg	۰/۱۲ch
۲۰	۳/۱..eh	۱/۳۷g	۴/۳۴de	۳/۸۸ae	۳/۷۷bf	۷۷/۳bc	۰/۱۷cg	۰/۰۷eh
۲۱	۴/۴..bc	۱/۷۲cf	۴/۱۶de	۱/۷۷fa	۳/۷۶df	۷۷/۷bc	۰/۱۲ch	۰/۱۲ch
۲۲	۵/۸۳ab	۱/۳۳de	۴/۳۳de	۳/۳۳ae	۴/۷۹ab	۷۷/۹b	۰/۲۱cf	۰/۱۵be
۲۳	۳/۸۱cg	۱/۰..dg	۵/۳۶bc	۳/۱..ae	۴/۱..af	۶۳/۳bc	۰/۱۶di	۰/۱۰ch
۲۴	۲/۵۳eh	۱/۵۷fg	۳/۷۶dc	۲/۷..cg	۴/۴..ac	۷۸/۸b	۰/۰..j	۰/۰..gh
۲۵	۵/۳۳ab	۱/۶۶ac	۴/۹۷dc	۲/۲..ac	۴/۴..ac	۸۲/۱b	۰/۲۶ab	۰/۱۳dh
۲۶	۵/۳۵ab	۱/۱۹ab	۵/۳۸bc	۳/۷..df	۱/۷..df	۷۷/۷bc	۰/۲۵bd	۰/۱۹ac
۲۷	۲/۱۸..eh	۱/۰..bc	۳/۱۹fc	۱/۷..fg	۳/۷..df	۶۵/۵bc	۰/۱..hj	۰/۰..eh
۲۸	۲/۸۷eh	۱/۴۸dg	۲/۱۸..fg	۱/۸..fg	۴/..ac	۷۶/۶bc	۰/۱۵ej	۰/۱۳cg
۲۷	۷/۴۸eh	۱/۰..de	۴/۲۹de	۳/۲۸..ac	۴/۲..ac	۷۷/۷bc	۰/۱..ej	۰/۰..eh
۲۹	۴/۱..cf	۱/۷۳fg	۴/..dg	۲/۲۳..eg	۳/۵..df	۷۰/..bc	۰/۱..di	۰/۰..dh
۳۰	۳/۲۲eh	۱/۸..dg	۴/..dg	۱/۸..fh	۳/۲..e	۶۲/۲bc	۰/۱..ej	۰/۰..vh
۳۱	۳/۲۴eg	۱/۰..fg	۴/..dg	۴/..ab	۴/۵..df	۷۵/۵bc	۰/۱..fj	۰/۰..gh
۳۲	۳/۵۷eh	۱/۶۵fg	۴/۱۷dg	۲/۷..bg	۴/..ae	۷۵/۵bc	۰/۱..cf	۰/۱..bf
۳۳	۲/۰..eh	۱/۸..dg	۴/..dg	۲/۳..fg	۴/..ae	۷۵/۵bc	۰/۲۱cf	۰/۰..eh
۳۴	۲/۹۰..c-f	۱/۷۹dg	۴/..de	۲/۷..bg	۴/..ae	۷۶/۶bc	۰/۱..eg	۰/۰..eh
۳۵	۴/۴..bc	۱/۷۹dg	۵/..de	۳/۴..ae	۳/۳..e	۷۸/۷bc	۰/۱..ch	۰/۱..bf
۳۶	۳/۴۷e-h	۱/۰..dg	۴/..de	۲/۳..eg	۳/..ef	۹۲/۵a	۰/۱..di	۰/۰..df
۳۸	۵/۱۷ab	۱/۷۹..ab	۵/..a	۴/..ac	۴/..ac	۸۳/۱b	۰/۲۳ab	۰/۲..ab
۳۹	۶/۷۷a	۱/۸۴ab	۷/..ab	۳/..ac	۵/..a	۸۷/۴b	۰/۴..a	۰/۲..a
۴۰	۲/۸۲e-h	۱/۶۸fg	۱/..dc	۲/۳..fh	۳/..df	۶۶/۶bc	۰/۱..fj	۰/..h

*- حروف مشابه به معنی عدم تفاوت معنی داری براساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۹۵٪

جدول ۹- ضربه همینگی بیوسون در شرایط مطلوب (صفوفه بار)

صفت	طول ساقه (cm)	طول مساقة (cm)	کوتیپل (cm)	طول رشته (cm)	جهه رشته (cm)	سرعت جوانه زنی در روز	درصد جوانه زنی در روز	وزن تر جوانه زنی در روز	وزن خشک دهنده (g)	دینده (g)	دینده (g)	وزن خشک	وزن خشک در شرایط تنفس	عمدکرد در شرایط فرمال	عمدکرد در شرایط فرمال	TOL	SSI	STI	MP	GMP
cm	/۸۴***	/۷۴***	/۲۲۷*	/۲۲۷*	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	/۵۱***	
طول آنژنپل cm	۱	۱	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	
طول رشته cm	۱	۱	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	/۷۶***	
نسبت طول رشته /٪	۱	۱	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	/۳۶***	
جهه به ساقه /٪																				
سرعت جوانه زنی در روز																				
درصد جوانه زنی در روز																				
وزن تر رشته گرم																				
وزن خشک رشته گرم																				
حدکرد در شرایط تنفس ۲٪																				
حدکرد در شرایط فرمال ۲٪																				
TOL																				
SSI																				
STI																				
PM																				
GMP																				

*، ** و NS - ترتیب معنی دار در میان احتمال ۱/۰/۵٪ و عدم معنی دار

جدول ۱- ضریب همپسنجی بین‌سون در شرایط (۳-بار)

صفت	طول ساقه (cm)	طول چه (cm)	کلوبتپ (cm)	طول ریشه (cm)	جهد ساقه (kg)	جهد زنگ (kg)	سرعت جوانه	نسبت طولا ریشه	وزن تر (g)	وزن خشک ریشه (g)	وزن خشک در شرایط نرمال	عملکرد در شرایط نرمال	TOL	SSI	STI	MP	GMP
طول ساقه (cm)	۱	/۰۸۵۳***	/۰۷۵۲***	/۰۷۲۳*	/۰۷۳۵***	/۰۷۲۳*	/۰۷۳۵***	/۰۷۳۵***	/۰۷۳۵***	/۰۷۳۵***	/۰۷۳۵***	-/۰۷۳۵***	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
طول آنفل	۱	/۰۷۱۵***	/۰۷۱۵***	/۰۷۱۵***	/۰۷۱۵***	/۰۷۱۵***	/۰۷۱۵***	/۰۷۱۵***	/۰۷۱۵***	/۰۷۱۵***	/۰۷۱۵***	-/۰۷۱۵***	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
طول ریشه (cm)	۱	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	-/۰۵۱۳***	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
طول ریشه (cm) چه به ساقه	۱	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	/۰۵۱۳***	-/۰۵۱۳***	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
سرعت جوانه زنگ در روز																	
درصد جوانه زنگ																	
وزن تر ریشه																	
وزن خشک ریشه																	
عملکرد شرایط یS																	
عملکرد شرایط یP																	
TOL																	
SSI																	
STI																	
PM																	
GMP																	

— ترتیب معنی دار در میان انتقال ۷/۵٪ و عدم معنی داری

n.s.

جدول ۱۱ - ضریب همپستگی پیرسون در شرایط (ا-بار)

صفت	طول ساقه (cm)	طول ساقه (cm)	طول رینشه (cm)	طول رینشه (cm)	نسبت طول رینشه	نسبت طول رینشه	وزن خشک (g)	وزن تمر (g)	دوده زنی	سوزعت جوانه	چه به ساقه چه	جوانه زنی	دوده	وزن تمر	سوزعت جوانه	وزن خشک (g)	دینشه (g)	دینشه (g)	عده کاردر	شرایط نرمال	SSSI	STI	MP	GMP	
طول ساقه چه cm	/۴۱*	/۴۱*	/۷*	/۷*	/۴۱***	/۴۱***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
طول لوتینی cm	۱	۱	۰/۳۳*	۰/۳۳*	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	/۰۵***	
نسبت طول رینشه	۰/۴۶***	۰/۴۶***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	
چه به ساقه چه سوزعت جوانه زنی در روز	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	
در دوده جوانه زنی وزن تمر رینشه	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	
گرم	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	
وزن خشک رینشه	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	
عده کاردر شرایط نرمال	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	۰/۴۲***	
TOL																									
SSI																									
STI																									
PM																									
GMP																									

* - ترتیب معنی دار مسطح اختصاری /۱،/۲ و عدم معنی دار

** - ترتیب معنی دار مسطح اختصاری /۱،/۲ و عدم معنی دار

*** - ترتیب معنی دار مسطح اختصاری /۱،/۲ و عدم معنی دار

شاخص‌های مقاومت به خشکی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد. با توجه به مقادیر بالای همبستگی طول ساقه‌چه، طول ریشه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه با عملکرد دانه، این صفات می‌توانند منشا ارقام زراعی مناسبی برای مناطق خشک و نیمه خشک باشند. نسبت بالای همبستگی بین طول ساقه‌چه و ریشه‌چه با مقاومت به خشکی توسط برخی محققین دیگر نیز گزارش شده است (۲۱).

نتیجه گیری

در این تحقیق فقط اثر متقابل سطوح مختلف پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) و ارقام برای صفت وزن‌تر ریشه معنی‌دار بود و در سایر صفات اثر متقابل سطوح پلی‌اتیلن گلیکول و ارقام معنی‌دار نبود. بنابراین تغییرات صفات مورد بررسی در ارقام و در سطوح مختلف خشکی روند تقریباً یکسانی داشته است. ولی برای صفت وزن‌تر ریشه‌چه واکنش ارقام برای سطوح تنش خشکی متفاوت بود و حداقل مقدار صفات در شرایط شاهد آب مقطر بود و با افزایش شدت تنش، اکثر صفات مورد بررسی کاهش یافتند، به طوریکه کمترین تأثیر خشکی بر روی نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه و بیشترین تأثیر آن بر روی وزن خشک ریشه‌چه بود. صفات طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه و طول کلئوپتیل با عملکرد دانه در هر دو شرایط معمولی و تنش خشکی و با شاخص‌های STI، MP و GMP همبستگی مثبت و معنی‌داری را نشان داد. هرگونه تغییرات به نزدی در جهت افزایش این صفات موجب افزایش عملکرد خواهد شد. همچنین با توجه به همبستگی بالای این صفات با شاخص‌های مذکور و عملکرد دانه، می‌توانند معیار مناسبی برای انتخاب ژنوتیپ‌های متتحمل به خشکی باشند. نتایج آزمایش نشان داد که ژنوتیپ‌های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ دارای بیشترین و ژنوتیپ‌های ۵ و ۴۰ کمترین مقادیر MP, STI و GMP را به خود اختصاص دادند.

به ترتیب جزء متتحمل ترین و حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها نسبت به تنش خشکی بودند لذا می‌توان نتیجه گرفت که روش پلی‌اتیلن گلیکول روش نسبتاً سریع و مطلوب در بین روش‌های آزمایشگاهی برای انتخاب اولیه ارقام مقاوم به کمبود آب است و تنوع بین ارقام را در مراحل اولیه رشد نشان می‌دهد. بنظر می‌رسد برای طبقه بندی و غربال ژنوتیپ‌ها از نظر تحمل به خشکی باید از روش‌های آزمایشگاهی و مزرعه‌ای استفاده نمود.

وزن خشک ریشه‌چه: با افزایش تنش خشکی از شاهد صفر تا ۶- بار وزن خشک ریشه‌چه کاهش یافت. ژنوتیپ‌های شماره ۳۸ و ۵ با داشتن میانگین ۰/۰۲۶ و ۰/۰۵ گرم بترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار ماده خشک ریشه‌چه بودند. همانطوری که اشاره شد با کاهش پتانسیل اسمزی آب کاهش معنی‌داری در وزن خشک ریشه مشاهده شد. در تحقیقی (۳) عنوان شد عملکرد علاوه بر وزن کل ریشه، با عمق نفوذ ریشه نیز بستگی دارد. از طرف دیگر چنین گزارش شده است (۲۰) که ژنوتیپ‌ها از نظر وزن خشک ریشه تفاوت آماری معنی‌داری داشتند که علت آن به قدرت جذب آب توسط ریشه‌چه در پتانسیل‌های آبی کم بر می‌گردد. این پدیده ژنتیکی و ارتباط مستقیم با مقاومت گیاه دارد.

همبستگی بین صفات در دو شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای

نتایج همبستگی بین صفات آزمایشگاهی و مزرعه‌ای در جداول ۹، ۱۰ و (۱۱) ارایه شده است و در شرایط مطلوب صفر بار جدول ۹ همبستگی بین صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول کلئوپتیل، وزن تر و خشک ریشه‌چه با عملکرد دانه در هر دو شرایط محیط مثبت و معنی‌دار بود. در مطالعه زراعی و همکاران (۲۹) نیز بین صفات مذکور با عملکرد دانه همبستگی مشاهده شده بود. در شرایط تنش خفیف (۳- بار) جدول ۱۰ بین صفات آزمایشگاهی با عملکرد دانه در شرایط نرمال و با شاخص‌های مقاومت به خشکی هیچگونه همبستگی دیده نشد. اما همبستگی طول کلئوپتیل با طول ریشه‌چه، سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، وزن تر و خشک ریشه‌چه و با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی مثبت و معنی‌دار بود. در شرایط تنش شدید (۶- بار) جدول ۱۱ طول ریشه‌چه با سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، وزن تر و خشک MP و GMP، STI و MP, STI, GMP و MP را به دارای همبستگی مثبت و معنی‌دار بود. بنابراین با استفاده از PEG 6000 در غلظت‌های مختلف و اعمال تنش در آزمایشگاه و با مطالعه مولفه‌های جوانه‌زنی و ارتباط آن با صفات مزرعه‌ای و شاخص‌های مقاومت می‌توان به حساسیت یا مقاومت احتمالی ژنوتیپ‌ها پی برد. این نتایج با یافته‌های (۱۶ و ۲۳) مبنی بر اینکه همبستگی بین صفات جوانه‌زنی با شاخص‌های MP و MP در شرایط نرمال و تنش خشکی می‌تواند در جداسازی ژنوتیپ‌های متتحمل به تنش موثر واقع شود همخوانی داشت و با یافته‌های (۸ و ۲۵) در تضاد است که گزارش کردنده همبستگی مثبت و معنی‌داری بین صفات جوانه‌زنی و

منابع

- ۱- اسکوئی، ب. ۱۳۸۹. اثر تنش خشکی بر برخی از لاین‌های گندم در مرحله رشد رویشی، یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی ص ۱۲۳.
- ۲- اصغری، ع. ۱۳۷۷. طبقه‌بندی ارقام گندم دیم از نظر مقاومت به خشکی. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج. ص ۲۵۴-۲۵۳.
- ۳- روستائی، م. د. صادق زاده اهری، و ب. ارشدی. ۱۳۸۲. بررسی ارتباط صفات مؤثر بر عملکرد دانه گندم با استفاده از تجزیه به عامل‌ها در شرایط دیم. مجله دانش کشاورزی جلد یک صفحه ۱۳.
- ۴- کوچکی، ع.، م. راشد‌محصل، و م. صدرآبادی. ۱۳۶۷. مبانی فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی انتشارات آستان رضوی. ۴۰۴ صفحه.
- ۵- گروندی، م.، ع. فرشادفر، د. و کهریزی. ۱۳۸۹. ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم در شرایط آزمایشگاه و مزرعه. فصلنامه به نزادی نهال و بذر.
- ۶- ملکوتی، م. ج. و م. نبی غیبی. ۱۳۷۹. تعیین حد بحرانی عناصر غذایی موثر در خاک، گیاه و میوه در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات استراتژیک کشور. نشر آموزش کشاورزی چاپ ۲. ص ۳۴.
- 7- Ashraf, M., and P. J. C. Harris. 2005. Abiotic stresses: Plant resistance through breeding and molecular approaches. The Haworth Press, New York, pp, 725.
- 8- Azizinia., S. M. R. Ghannadha, A. A. Zali, B. Yazdi-Samadi, and A. Ahmadi. 2005. An evaluation of quantitative traits related to drought resistance in synthetic wheat genotypes in stress and non-stress conditions. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 36: 281-293 .
- 9- Baalbaki, R. Z., K. Zuray, R. A. Bleik, M. M. and S. N. Talhouk. 1999. Germination and seedling development of drought tolerant and susceptible wheat moisture stress. Seed Science and Technology. 27: 291-302.
- 10- Balouchi, H. R. 2010. Screening wheat parents of mapping population for heat and drought tolerance, Selection of wheat genetic variation. International Journal of Biological and Life Sciences. 6: 56-66.
- 11- Bayoumi, T. Y. H., M. H. Eid, and E. M. Metwali. 2008. Application of physiological and biochemical indices as a screening technique for drought to landrace in wheat genotypes. African journal of Biotechnol. 7(14), 2341-2352.
- 12- Belcher, E. W. and L. Miller. 1974. Influence of substrate moisture level on the germination of sweet gum and pin seed. Proceeding of the Association of official Seed Analysis, 65: 88-89.
- 13- Cattivelli, L., F. Rizza, F. W. Badeck, E. Mazzuotelli, A. Tondelli, and C. Mare. 2008. Drought tolerance improvement in crop plants: An integrated view from breeding to genomics. Fiehd Crop Reserch. 105: 1-14.
- 14- Dhanda, S. S., G. S. Sethi, and R. K. Behl. 2004. Indices of drought tolerance in wheat genotypes at early stages of plant growth. Journal of Agronomy and Crop Science volume 19, Issue 1. Pages 6-12.
- 15- Fernandez, G. C. J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: Proceeding of the Symposium. Taiwan, 13-16 Aug. 1992. By C. G. Kno. AVRDC.
- 16- Fischer, R. A., and R. Maurer. 1978. "Drought resistance in spring wheat cultivars, I. Grain yield responses Tour. Agricience. Reserch: 29: 897-912.
- 17- Golabadi, M., A. Arzani, and S. A. M. Mirmohamadi maibody. 2006. Assessment of drought tolerance in segregation population in durum wheat. African Journal of Agricultural Research 1: 162-17.
- 18- Hussain, S. S. 2006. Molecular breedhng for abiotic steress tolerance: droght perspective. ProcPakistan Academic Science, 43(3),189-210.
- 19- Metwali, M. R., Ehab; Manal, H. Eid. and Tarek, Y. Bayoumi. 2011. Agronomical traits and biochemical genetics markers associated with salt tolerance in wheat cultivars (*Triticum aestivum L.*). Australian journal of Basic and Applied Sciences, Volume 5 Issue5, pages 174.
- 20- Michel, E. B. and M. K. Kaufman. 1974. The osmotic potential of polyethylen glycol 6000. Plant. Physiology. 51: 914-916.
- 21- Nourmand, F., M. A. Rostami, and M. R. Ghannadha. 2001. Evaluation of drought resistance indices in bread wheat (*triticum aestivum L.*). Iranian Journal Agriculture Science. 32: 4.7, 5-805.
- 22- Ouk, M., J. Basnayake, M. Tsubo, S. Fukai, K. S. Fischer, M. Cooper, and H. Nesbitt. 2006. Use of drought response index for identification of drought tolerant genotypes in rainfed lowland rice. Field Crop Research 99: 48-58.
- 23- Pan, X. Y., Y. F. Wang, G. X. Wang, Q. D. Cao, and J. Wang. 2002. Relationship between growth redundancy and size inequality in spring wheat populations mulched with clear plastic film. Acta Phytoecol. Sinica. 26: 177-184.
- 24- Rauf, M., Munir, M. U-Hassan, M. Ahmed, and M. Afzai. 2007. Performance of wheat genotypes under osmotic stress at germination and early seedlig growth stage. African journal of Biotechnology. 8, 971- 975.
- 25- Saeidi, M., A. Ahmadi, K. Postini, and M. R. Jahansooz. 2007. Evaluation of germination traits of different genotypes of wheat in osmotic stress situation and their correlations with speed of emergence and drought tolerance

- in Farm situation. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 11: 281-293 (in Farsi).
- 26- Seefeldet, S. S., K. K. Kidwell, and J. E. Waller. 2002. Base growth temperature, germination rates and growth response of contemporary spring wheat (*Triticum aestivum L.*) cultivars from the USA Pacific North West. Field Crops Reserch. 75: 45-52.
- 27- Sio-Se Mardeh, A., A. Ahmadi, K. Poustini, and V. Mohammadi. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops research, 98: 222-229.
- 28- Soltani, A., E. Zeinali, S. Galeshi, and N. Latifi. 2001. Genetic variance for and interrelationship among seed vigor traits in wheat from the Caspian Sea Coast of Iran Seed Science andTechnology. 29: 653-662.
- 29- Zarei, L., E. Farshadfar, R. Haghparast, R. Rajabi, and M. Mohammadi SarabBadieh. 2007. Evaluation of some indirect traits and indexes to identify drought tolerance in bread wheat (*Triticum aestivum L.*). Asian Journal of Plant Science 6: 1204-1210.

Archive of SID