

بررسی شیوع عوارض بهداشتی در روستای قوپوز آذربایجان شرقی و ارتباط آن با سطح آرسنیک آب شرب

محمدعلی حسین پور فیضی^۱، محمد مسافری^۲، سعید دستگیری^۳، شهین زلالی^۴، ناصر پولادی^۵، پروین آذرفاهم^۶

^۱ استاد، گروه بیولوژی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز

^۲ استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، همکار پژوهشی مرکز کشوری مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز

^۳ دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز

^۴ دکترای تخصصی طب کار، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تبریز، تبریز

^۵ استادیار، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، آذربایجان

^۶ کارشناس ارشد، گروه بیولوژی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز

نویسنده رابط: محمد مسافری، آدرس: تبریز، دانشکده علوم پزشکی تبریز، تبریز، نمبر: ۰۴۱۱-۳۳۵۵۹۵۲، نمبر: ۰۴۱۱-۳۳۵۵۹۵۲،

پست الکترونیک: mosaferim@tbzmed.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۲/۳/۸۶؛ پذیرش: ۱۲/۴/۸۶

مقدمه و اهداف: آرسنیکوزیس یکی از جدی‌ترین بیماری‌های زیست محیطی ناشی از ماده شیمیائی آرسنیک است که اغلب به واسطه مصرف آب آلوده به آرسنیک بروز می‌نماید. عوارض و ناراحتی‌های بهداشتی شامل کراتوزیس، پیگماناتیسیون و زخم‌های پوستی و انواع سرطان در انسان‌ها می‌باشد. در مطالعه حاضر با توجه به آلودگی گزارش شده در روستای قوپوز از توابع شهرستان هشت‌رود، عوارض بهداشتی و تغییرات کروموزومی حاصل از مصرف آب آلوده به آرسنیک مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار: تحقیق یک مطالعه مقطعی است که با هدف تعیین شیوع عوارض کروموزومی، پوستی (هیپر کراتوزیس و هیپر پیگماناتیسیون) و دیگر عوارض (فسار خون بالا) حاصل از آرسنیک در آب روستای قوپوز به عنوان گروه در معرض خطر مواجهه انجام شد. در طی مطالعه ۱۰۱ نفر در روستای قوپوز و ۱۰۷ نفر در روستای مایان به عنوان روستای شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. معاینات پزشکی توسط پزشک آموزش دیده به عمل آمد. ۴۶ نمونه خون جهت مطالعه کاریوتایپ تهیه شد. آنالیز فلزات سنگین آب با استفاده از روش

Inductively Coupled Plasma (ICP) به انجام رسید.

نتایج: در روستای قوپوز آلودگی آب به آرسنیک مشاهده گردید به طوری که در آب چشم‌های یوخاری بلاغ، لوله بلاغ و آب لوله‌کشی به ترتیب ۷/۷، ۷/۷ و ۲۵/۴ برابر حداقل مجاز استاندارد ملی بود. در روستای قوپوز میانگین سطح فشار خون سیستولیک (۱۴۲-۱۳۲٪، ۹۵٪CI: ۱۱۴-۱۰۷٪) به طور کاملاً معنی‌داری بیشتر از همان مقدار در روستای مایان به عنوان گروه کنترل بود (۹۹/۹٪، ۹۵٪CI: ۱۱۴-۱۰۷٪). به همین ترتیب متوسط سطح فشار خون دیاستولیک نیز در روستای قوپوز (۸۵٪، ۹۵٪CI: ۷۹-۷۹٪) به طور معنی‌داری بیشتر از میانگین مربوطه در روستای مایان (۷۵٪، ۹۵٪CI: ۶۶-۷۵٪) بود. وقوع هیپر کراتوزیس در اثر مواجهه طولانی مدت با آرسنیک حدود ۳۴ برابر بیشتر از گروه کنترل می‌باشد ($OR=34$, $P<0.001$) که این تفاوت در شدت و قوع ضایعه و همین طور محل ایجاد آن نیز از نظر آماری معنی‌دار بود. به طور مشابهی وقوع پیگماناتیسیون نیز در اثر مواجهه طولانی مدت با آرسنیک به طور معنی‌داری در گروه مواجهه یافته افزایش یافته بود ($OR=2.4$, $P<0.007$). گسترش‌های کروموزومی به دست آمده، ناهنجاری شکاف کروماتیدی و قطعه کروموزومی را در گروه مواجهه یافته نشان داد که تفاوت موجود معنی دار بود ($P<0.05$).

نتیجه‌گیری: وضعیت آب شرب روستای قوپوز از نظر آرسنیک و نیترات و ... مغایر با استاندارد ملی بود. مصرف آب آلوده به آرسنیک باعث شده تا افراد چهار ناراحتی‌های پوستی، فشار خون بالا و برخی اختلالات کروموزومی شوند. لازم است افراد متأثر شده از موضوع تحت درمان قرار گیرند و نظارت مستمر بر تأمین آب شرب سالم در روستا به عمل آید.

واژگان کلیدی: آرسنیک، آب شرب، ناهنجاری‌های کروموزومی، عوارض پوستی، فشار خون، آذربایجان شرقی

مقدمه

آرسنیک شبه فلزی سمی است که از زمان‌های قدیم شناخته شده است. در قرن هشتم جابر ابن حیان اکسید آرسنیک را که یک

آشامیدنی آلوه به آرسنیک است. فعالیت‌های انجام شده در طول تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

نمونه برداری و آنالیز منابع آب

در روستای قوپوز ۴ منبع آب لوله بولاغ، یوخاری بولاغ، آب لوله کشی و آب تانکر سیار روستای دامناب و در روستای مایان آب لوله کشی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های آب در ظروفی که قبلاً اسید شوئی شده و تمیز شده بودند تهیه شد. یک نمونه به حجم ۴ لیتر برای آنالیز پارامترهای عمومی (آنیون‌ها، کاتیون‌ها، اسیدیته و قلیاییت و) تهیه شد و بر اساس روش‌های روتین و کتاب استاندارد متدهای انتقال به آزمایشگاه مورد آنالیز قرار گرفت. نمونه بعدی برای آنالیز فلزات سنگین تهیه شده که بعد از افزودن اسید نیتریک غلیظ pH به زیر ۲ رسید و آرسنیک، کروم، کادمیوم، سرب و ... با استفاده از روش Inductively Coupled Plasma (ICP) آنالیز گردید.

انجام معاینات پزشکی

به منظور انجام معاینات پزشکی ابتدا هماهنگی‌های اداری لازم با مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشتی شهرستان تبریز و هشتزاده به عمل آمد. تیم پزشکی به روستاهای مورد نظر مراجعه و پس از توجیه موضوع به افراد و اخذ رضایت، معاینات لازم توسط پزشک طرح به عمل آمد که در کلیه مراحل افراد به صورت کاملاً داوطلبانه همکاری داشتند. برای هر فردی پرسشنامه طراحی شده برای این منظور تکمیل شد که که حاوی اطلاعات مختلفی از جمله سن، قد، وزن، (Body Mass Index(BMI)، فشار خون، ابتلاء به ضایعات پوستی (کراتوزیس و هیپرپیگمانتسیون)، شدت، سابقه و محل ظهور علائم و ضایعات پوستی، مدت سکونت در محل و سابقه فامیلی و... بود. نمونه‌های لازم در روستای قوپوز به صورت سرشماری همه ساکنین روستا (افراد بالای ۶ سال) انتخاب شدند.

در روستای مایان با توجه به بالا بودن جمعیت نمونه‌های لازم با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی به صورت خوش‌های مشخص شد. به این صورت که با استفاده از دفتر واکسیناسیون خانه بهداشت و با در نظر گرفتن بعد خانوار ۵ نفر و جمعیت کل روستا خوش‌های به صورت کاملاً تصادفی به این صورت انتخاب و افراد مورد معاینه قرار گرفتند که اگر قرار بود از هر ۱۰ خانوار، یک خانوار مطالعه شود لذا بین عدد ۱-۱۰ یک عدد به صورت تصادفی انتخاب می‌شد و سپس اولین خانواده ما همان رقم محسوب می‌شد. به عنوان مثال چنانچه رقم ۴ انتخاب می‌شد خانوارهای بعدی را شماره‌های ۱۴، ۲۴، ۳۴ و تشکیل می‌دادند. چنان‌چه

ماده فوق العاده سمی است از رآلگار (زرنیخ قرمز) به دست آورد (۱). آرسنیکوزیس یکی از جدی‌ترین بیماری‌های زیست محیطی ناشی از ماده شیمیائی است که جمعیت زیادی را در سراسر جهان در گیر نموده است (۲،۳). اولین بار آرسنیکوزیس مزمن به صورت اندمیک از بنگلادش در سال ۱۹۹۶ گزارش شد (۴). این در حالی است که در ایران موضوع مشکلات بهداشتی ناشی از آرسنیک در سال ۱۹۸۶ در بیجار مشاهده گردید اما هیچ‌گاه در سطح جهانی گزارش نشد (۵). علائم و نشانه‌های آرسنیکوزیس مزمن در شکل انواع ناراحتی‌های پوستی از قبیل زخم‌های پوستی، هیپر کراتوزیس و ملانوزیس ظاهر می‌شود (۱-۳). براساس شواهد کافی برای سلطان‌زایی در انسان‌ها EPA ایالات متحده و IARC آرسنیک را از نظر سلطان‌زایی در گروه یک طبقه‌بندی نموده است (۶،۷). مواجهه مزمن انسان‌ها با غلظت‌های بالای آرسنیک در آب آشامیدنی مرتبط با زخم‌های پوستی (۸،۹)، بیماری عروق محیطی (۱۰)، فشار خون (۱۱)، بیماری پای سیاه (۹،۱۲)، و خطر بالای انواع سلطان‌ها (۹،۱۳) شده است.

بر اساس آنالیز نمونه‌های آب ارسال شده مربوط به روستای قوپوز از سوی مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به دانشکده‌ی بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آلوه‌گی نمونه‌های آب این روستا به آرسنیک محرز گردید (۱۴). با توجه به اهمیت اثرات شناخته شده مواجهه با آرسنیک از طریق آب شرب و تهدید سلامت مصرف کنندگان آب آلوه، این موضوع به عنوان یک مشکل بهداشتی در استان تلقی شده و مورد توجه قرار گرفت که نهایتاً مطالعه حاضر با هدف آنالیز کامل کیفیت آب‌های آشامیدنی از نظر حضور آرسنیک و فلزات سنگین و تعیین ارتباط آن‌ها با بیماری‌های شایع و تعیین شیوع تغییرات کروموزومی، عوارض پوستی (هیپر کراتوزیس و هیپر پیگمانتسیون) و دیگر عوارض (فشار خون بالا) در محل طراحی و اجرا گردید.

روش کار

تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی است که شامل بررسی عوارض بهداشتی حاصل از آرسنیک در آب روستای قوپوز از توابع هشتزاده به عنوان گروه در معرض خطر مواجهه با آرسنیک و روستای مایان از توابع تبریز به عنوان گروه مواجهه نیافته است. بر اساس آمار مرکز بهداشت استان در روستای قوپوز ۲۳ خانوار و ۱۳۳ نفر جمعیت وجود داشت که در طی مطالعه ۱۰۱ نفر بررسی شد. جمعیت روستای مایان نیز بیش از ۴۰ نفر بود که ۱۰۷ نفر مورد مطالعه قرار گرفت. منظور از مواجهه در این مطالعه مصرف آب

روستای قوپوز و ۲۲ نفر مایان به روش کشت میکرو (کشت آزمایشگاهی دیفکو) مورد بررسی قرار گرفت. برای تلقیح محیطهای کشت ۰/۵ میلی لیتر نمونه خون وریدی تهیه و در شرایط استریل به داخل محیط کشت انتقال یافت. از هر فرد ۵ لام تهیه و جهت رنگ آمیزی از دو روش رنگ آمیزی معمول گیمسا و رنگ آمیزی نواری G استفاده شد و ۱۵ پلاک متافازی در هر لام بررسی گردید.

آنالیز آماری اطلاعات تهیه شده

اطلاعات حاصل از معاینه بیماران و تکمیل پرسشنامه‌ها و اطلاعات منابع آب وارد بانک اطلاعاتی SPSS شده و آنالیزها و آزمون‌های آماری لازم انجام شد تا خطر نسبی ابتلاء به ضایعات پوستی و همچنین تأثیر دیگر عوامل مداخله‌گر در بروز بیماری در افراد بررسی شده تعیین شود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، علاوه از شاخص‌های توصیفی (درصد، میانگین، انحراف معیار) از روش‌های آماری حدود اطمینان ۹۵٪، آزمون مجذور کای، آزمون فیشر، آزمون تصحیح یاتس (Yate's) و محاسبه نسبت شانس (Odds Ratio) استفاده شد و مقدار P مساوی و یا کمتر از ۰/۰۵ معنی‌دار تلقی گردیده است.

یافته‌ها

در جدول ۱ مقایسه آنالیز کامل آب روستاهای قوپوز و مایان ارائه شده است. از نظر پارامترهای عمومی، کیفت آب منابع مختلف از هم متفاوت است. از نظر سختی آب‌های مطالعه شده در دامنه آب‌های سخت تا خیلی سخت طبقه‌بندی می‌شوند. نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود بالا بودن میزان نیترات در آب‌های مصرفی در قوپوز است (به طور میانگین ۱۱۱/۶ mg/L). بر اساس جدول در روستای قوپوز آسودگی آب به آرسنیک مشاهده می‌گردد به طوری که در آب چشم‌های یوخاری بلاغ (L) ۰/۰۳۸۶ mg/L، لوله بلاغ (L) ۰/۴۹ mg/L و آب لوله‌کشی (L) ۰/۲۵ mg/L آرسنیک وجود داشت اما در آب تانکر مربوط به روستای دامناب صفر بود. در خصوص دیگر عناصر، مقدار سلنیوم در آب لوله‌کشی روستای قوپوز ۱/۹ برابر حداقل مجاز استاندار ملی بوده و بقیه عناصر دارای مطابقت با استاندارد بودند.

در طی مطالعه در روستای قوپوز ۴۸ مرد (۴۷/۵٪) و ۵۳ زن (۵٪) و در روستای مایان ۴۱ مرد (۳۸/۳٪) و ۶۶ زن (۶۱/۷٪) مورد بررسی قرار گرفتند که تفاوت معنی‌داری از نظر جنس بین دو روستا وجود ندارد ($P=0/18$). دامنه سن جمعیت مورد مطالعه

خانه‌ای واحد تعداد لازم نبود بر اساس یک معیار از قبل تعیین شده، تعداد باقی‌مانده از همسایه دست راستی خانه مورد نظر تأمین می‌شد. برای مواردی که فرد در خانه حضور نداشت با قرار قابلی مراجعه بعد از ظهر همان روز صورت گرفت و فرد مورد معاینه واقع می‌شد.

برای کلیه افراد معاینه شده دز دریافتی روزانه و سالیانه آرسنیک از منابع مختلف آب آشامیدنی و همچنین در زمان‌های مختلف از روی میانگین غلظت آرسنیک منابع آب محاسبه شد که به راحتی می‌توان از روی اعداد به دست آمده، مجموع دز دریافتی در طول عمر را برای تک افراد بر اساس سن و زمان اقامت محاسبه نمود.

مطالعه کاریوتایپ

گسترش کروموزومی لنفوسيت‌های خون محیطی ۲۴ نفر در

جدول ۱- مقایسه مشخصات آب آشامیدنی قوپوز و مایان

مشخصات آب آشامیدنی	روستای قوپوز*	روستای مایان
هدایت الکتریکی ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	۱۰۴۴/۸	۷۰۱
PH	۸/۲۴	۸/۳
کل جامدات محلول آب (mg/L)	۶۸۹/۸	۴۶۳
قلیلیست فنلی (mg/L as CaCO ₃)	۲/۵	۰
قلیلیست متیلی (mg/L as CaCO ₃)	۳۰۰	۱۸۵
سختی کل (mg/L as CaCO ₃)	۳۶۲/۵	۲۱۰
کلسیم (mg/L)	۹۲/۵	۴۴
منیزیم (mg/L)	۳۱/۵	۲۴
سدنیم (mg/L)	۸۸/۹	۷۵
پتاسیم (mg/L)	۶/۵	۳/۶
کلرور (mg/L)	۵۴/۹	۷۸
سولفات (mg/L)	۸۳/۹	۷۰/۶
نیتریت (mg/L)	۰/۰۳۳	۰
نیترات (mg/L)	۱۱۱/۶	۸/۵
آهن (mg/L)	۰/۰۴۶	۰/۱۰۲
منگنز (mg/L)	۰/۰۰۱	۰/۰۰۲
کادمیوم (mg/L)	.	.
آرسنیک (mg/L)	۱/۰۳۱	۰
سلنیوم (mg/L)	۰/۰۰۷۵	۰/۰۰۷
کروم (mg/L)	.	.
سرب (mg/L)	.	*

* میانگین ۴ منبع آب

جدول ۲- مقایسه مشخصات عمومی افراد مطالعه شده در روستاهای قوپوز و مایان

P-Value	روستای مایان		روستای قوپوز		متغیر
	حدود اطمینان ۹۵٪	Mean±SD	حدود اطمینان ۹۵٪	Mean±SD	
>.۱	۳۳/۱-۲۵/۹	۱۷/۹±۲۹/۶	۳۷/۶-۲۹/۹	۳۳/۸±۱۶/۱	سن (سال)
>.۱	۳۲/۵-۲۵/۳	۱۷/۹±۲۸/۹	۳۳/۴-۲۶/۱	۲۹/۷±۱۵/۳	طول اقامت در روستا (سال)
>.۱	۲۳/۷-۲۱/۳	۵/۸±۲۲/۵	۲۴/۷-۲۲/۵	۴/۵±۲۳/۶	نمایه توده بدن

جدول ۳- مقایسه فشار خون در قوپوز و مایان

پارامتر	روستای مایان		روستای قوپوز		روستا
	حدود اطمینان ۹۵٪	Mean±SD	حدود اطمینان ۹۵٪	Mean±SD	
فشار خون سیستولیک	۱۱۴/۰-۹۹/۹	۱۰۷/۰±۲۴/۹	۱۴۲/۰-۱۳۲/۰	۱۳۷/۰±۲۰/۲	
فشار خون دیاستولیک	۷۵/۰-۶۶/۰	۷۱/۰±۲۲/۱	۸۵/۰-۷۹/۰	۸۲/۰±۱۱/۵	

البته وقوع هیپرکراتوزیس در کف دست در هر کدام از دو روستای مورد مطالعه یک مورد گزارش شده است که از نظر آماری معنی دار نبود ($P>0.1$).

به طور مشابهی وقوع پیگمانتاسیون نیز در اثر مواجهه طولانی مدت با آرسنیک به طور معنی داری در گروه مواجهه یافته افزایش یافته بود ($P<0.007$ ، $OR=2/4$). اثر طولانی مدت آرسنیک در محل ایجاد پیگمانتاسیون و همچنین شدت وقوع آن نیز معنی دار بود. البته لازم به ذکر است که بروز پیگمانتاسیون به طور همزمان در اندامها، تنه و زبان به تعداد ۲ مورد در روستای قوپوز (مواجهه یافته) و ۹ مورد در روستای مایان (مواجهه نیافته) مشاهده گردید که از نظر آماری معنی دار نبود ($P=0.17$ ، $OR=0.24$).

بحث

نتایج حاصل از مطالعه، شیوع بالای ضایعات پوستی در افراد ساکن در روستای قوپوز را نشان داد که در این روستا غلظت‌های آرسنیک موجود در آب در مقایسه با استاندارد ملی و رهنمود WHO بسیار بالا می‌باشد به طوری که در روستای قوپوز مقدار رسانیک در منابع آب سه‌گانه روستا به ترتیب $۷/۷$ ، $۴۹/۸$ و ۲۵ برابر حداقل مجاز استاندارد ملی (۰.۰5 mg/L) است که غلظت‌های بسیار بالائی محسوب می‌شوند. در مقایسه با رهنمود سازمان جهانی بهداشت (۰.۰1 mg/L) این مقادیر به ترتیب $۳۸/۶$ ، ۲۴۹ و ۱۲۵ برابر حد رهنمودی است. حضور نیترات در آب نیز نشان‌دهنده آلودگی شدید این آب‌ها با فضولات انسانی یا حیوانی است ($P=0.17$) و طبیعی است که در چنین آب‌هایی خطر حضور میکرووارگانیسم‌های بیماری‌زا نیز وجود خواهد داشت.

جدول ۲-۳ نشان می‌دهند که میانگین سن در روستای قوپوز $۲۸/۹2$ و انحراف معیار $۱۷/۷5$ سال بود. در جدول ۲ همان‌گونه که مشاهده می‌گردد نمونه‌ها در روستاهای قوپوز و مایان از نظر ویژگی‌های پایه دیگر شامل سن، طول مدت اقامت در روستای مورد مطالعه ($P>0.05$) و نمایه توده بدن به عنوان ساختی از سلامتی عمومی ($P>0.05$) تفاوت معنی داری با هم نداشته و از این‌رو در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز نقش مخدوش کنندگی نداشتند. نتایج به دست آمده از مطالعه گسترش‌های کروموزومی نشان داد که انواع اختلالات ساختاری و تعدادی در گسترش کروموزوم‌ها وجود دارد. بیشترین نوع ناهنجاری کروموزومی از نوع شکاف کروماتیدی و آندوردوپلیکاسیون و قطعات آسترنیک قطعه کروموزومی بود. این ناهنجاری‌ها از نوع موزائیسم بود بدین معنی که علاوه بر گسترش ناهنجار، گسترش‌های سالم نیز مشاهده گردید.

در جدول ۳ سطح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در دو گروه مورد مطالعه ارائه شده است. مشاهده می‌گردد که در روستای قوپوز میانگین سطح فشار خون سیستولیک (142) در روستای مایان به عنوان گروه کنترل بود (137)، $95\text{CI}: 132-142$ در روستای مایان به عنوان گروه کنترل بود (114)، $95\text{CI}: 99-114$ ، $95\text{CI}: 99-114$ ، $95\text{CI}: 107$ ، به همین ترتیب متوسط سطح فشار خون دیاستولیک نیز در روستای قوپوز (82)، $95\text{CI}: 79-85$ به طور معنی داری بیشتر از میانگین مربوطه در روستای مایان (71)، $95\text{CI}: 66-75$ بود. بر اساس جدول ۴ وقوع هیپرکراتوزیس در اثر مواجهه طولانی مدت با آرسنیک حدود 34 برابر بیشتر از گروه کنترل می‌باشد ($P<0.001$ ، $OR=34$) که این تفاوت در شدت وقوع ضایعه و همین‌طور محل ایجاد آن نیز از نظر آماری معنی دار بوده است.

آرسنیک mg/L ۰/۴۱ بود شیوع زخمهای پوستی به طور قابل توجهی افزایش یافته بود. در شهر مواجهه یافته ۱۷/۶٪ از هیپو پیگماناتاسیون، ۱۲/۲٪ از هیپر پیگماناتاسیون، ۱۱/۲٪ از کراتوزیس کف دست و ۰/۵٪ مواد از کراتوزیس عمومی و ۱/۴٪ از زخمهای سرطانی رنج می‌بردند (۱۹). مطالعه Mazumder در سال ۱۹۹۸ در بنگال غربی انجام نیز یافته‌های مشابهی داشت به گونه‌ای که

مطالعه Smith و همکارانش در سال ۲۰۰۰ در یکی از روستاهای شیلی تغییرات پوستی در اثر خوردن آب mg/L ۰/۸ آرسنیک را تأیید می‌کند. در این روستا مواجهه از هزاران سال قبل وجود داشته و این امر مؤید آن است که در طی گذشت زمان هیچ‌گونه سازگاری در جمعیت مواجهه یافته با آرسنیک حاصل نمی‌شود (۱۸). در مطالعه‌ای دیگر در دو شهر مکزیک که میانگین غلظت

جدول ۴- مقایسه ضایعات پوستی در قوپوز و مایان

P-Value	روستای مایان			روستای قوپوز			اختلافات پوستی
	در صد	تعداد	در صد	تعداد	در صد	تعداد	
مقایسه ضایعات پوستی در قوپوز و مایان							
<۰/۰۰۱	۰/۹	۱	۳۰/۶	۳۰			دارد
	۹۹/۱	۱۰۵	۶۹/۴	۶۸			ندارد
محل کراتوزیس							
	۹۹/۱	۱۰۵	۶۸/۷	۶۸			ندارد
>۰/۱	۰/۹	۱	۱/۰	۱			دست
<۰/۰۰۱	۰/۰	۰	۲۱/۲	۲۱			پاها
<۰/۰۰۱	۰/۰	۰	۹/۱	۹			دست و پاها
شدت کراتوزیس							
	۹۹/۱	۱۰۵	۶۸/۷	۶۸			ندارد
<۰/۰۰۱	۰/۹	۱	۲۱/۲	۲۱			خفیف
<۰/۰۰۱	۰/۰	۰	۱۰/۱	۱۰			متوسط
پیگماناتاسیون							
	۹/۳	۱۰	۲۳/۰	۲۳			دارد
۰/۰۰۷	۹۰/۷	۹۷	۷۷/۰	۷۷			ندارد
محل پیگماناتاسیون							
	۹۰/۷	۹۷	۷۷/۰	۷۷			ندارد
<۰/۰۰۱	۰/۹	۱	۰/۰	۰			اندامها
<۰/۰۰۱	۰/۰	۰	۲۱/۰	۲۱			تنه و اندامها
۰/۱۷	۸/۴	۹	۲/۰	۲			تنه و اندامها و زبان
شدت پیگماناتاسیون							
	۹۲/۴	۹۷	۷۷/۰	۷۷			ندارد
<۰/۰۰۱	۳/۸	۴	۸/۰	۸			خفیف
<۰/۰۰۱	۳/۸	۴	۱۴/۰	۱۴			متوسط
<۰/۰۰۱	۰/۰	۰	۱/۰	۱			شدید
ناهنجاریهای کروموزومی							
<۰/۰۰۵	۸۱/۸	۱۸	۷۵/۰	۱۸			بدون ناهنجاری
	۹/۱	۲	۰/۰	۰			۲۱ تریزو می
	۹/۱	۲	۰/۰	۰			کروماتید Cleavage
	۰	۰	۸/۳	۲			آندرودوپلیکاسیون
	۰	۰	۴/۱	۱			آندرودوپلیکاسیون، گپ و فرگمنت آستریک
	۰	۰	۱۲/۵	۳			فرگمنت آستریک و کروموزوم های 45-(x or C)/47

نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متأسفانه اغلب ساکنین در روستای قوبوز به علت مصرف آب آلوده به آرسنیک از آرسنیکوزیس مزمن رنج می‌برند. بر اساس اظهار نظر ساکنین دائمی در این روستا، مراجعته شخصی افراد به پزشکان به خاطر عوارض بهداشتی در طی سالیان گذشته مواجهه با آرسنیک را مشخص نموده که با پیگیری‌های مردم و شکایت آن‌ها از شرکت آب و فاضلاب روستائی، مصرف آب آلوده به آرسنیک متوقف شده و بعداً آنالیز شیمیائی موضوع را تأیید کرده است (۲۳). لازم است موضع درمان این افراد از طریق مراجع مسئول مورد توجه جدی واقع شود. دلیل اصلی این مسمومیت جمعی عدم توجه به آنالیز کامل کیفیت آب در زمان آبرسانی به روستا بوده است. ضروری است تا نسبت به تأمین منبع آب دائمی و سالم برای این روستا اقدام لازم به عمل آید و با توجه به گزارشات موجود در خصوص حضور آرسنیک در محصولات لبنی از جمله شیر (۲۴)، آب آلوده نبایستی به شرب احشام نیز برسد. همچنین بحث پایش سالیانه منابع آب در کلیه روستاهای کشور از طریق ارگان‌های ذیربسط (وزارت نیرو) و با کمک مراکز علمی و تحقیقاتی کشور اهمیت دو چندان می‌یابد.

تشکر و قدردانی

تحقیق حاضر با استفاده از مساعدت مالی پارک علم و فن آوری استان آذربایجان شرقی به انجام رسیده که نویسنده‌گان مقاله بدین وسیله تشکر و قدردانی خود را از این مرکز اعلام می‌دارند. همچنین از مساعدت‌های اجرائی مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به ویژه جناب آقای دکتر سیف فرشاد و آقای مهندس خسرو اکبرپور و سایر همکاران آقایان مهندس پورتقی، مهندس عزتی، مهندس زیادپور و بهورزان روستاهای قوبوز و میان به خاطر زحمتشان در انجام مطالعه اپیدمیولوژیکی و نمونه برداری منابع آب تشکر و قدردانی می‌گردد. آزمون‌های کروموزومی در گروه زیست شناسی جانوری دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز به انجام رسید که بدین وسیله سپاس خود را از زحمات آن عزیزان اعلام می‌داریم.

منابع

1. Tseng WP. Effect and dose response relationship of skin cancer and blackfoot disease with arsenic. Environ Health Perspect 1979; 19: 109-19.
2. World Health Organization (WHO). Fact Sheet no.210. Arsenic in drinking water. Bulletin of the World health

در گروه با مواجهه بالا ($>10/\text{mg/L}$) شیوع کراتوزیس ۷٪ گزارش شد (۲۰). در بنگلادش طی مطالعه‌ای دیگر توسط Tondel در چهار روستا با غلظت‌های آرسنیک آب آشامیدنی متفاوت از $1-20/4 \text{ mg/L}$ مشخص شد که تقریباً یک سوم جمعیت دارای جراحات پوستی از جمله کراتوزیس و پیگمانانتاسیون هستند و در بالاترین غلظت مواجهه ($>1\text{ mg/L}$) میزان زخم‌های پوستی در مردان و زنان به ترتیب ۳۷٪ و ۲۴٪ می‌باشد (۸). نتایج حاصل از مطالعه حاضر از نظر شیوع ضایعات پوستی قابل مقایسه با نتایج مطالعات فوق الذکر است (۳۰/۶٪ هیپرکراتوزیس و ۲۶٪ پیگمانانتاسیون). در مطالعه انجام شده توسط مسافری و همکاران در روستاهای منطقه بیجار استان کردستان که بر روی ۷۵۲ نفر انجام شد شیوع هیپرکراتوزیس و هیپرپیگمانانتاسیون به ترتیب ۶٪ و ۷٪ تعیین گردید که همبستگی قابل توجهی بین هیپرکراتوزیس و هیپر پیگمانانتاسیون وجود داشت ($P<0/01$ ، $OR=0/325$). دلایل پایین بودن میزان شیوع عوارض پوستی در این مطالعه مهاجرت افراد دارای ضایعات پوستی از روستاهای مورد نظر به مناطق غیرآلوده، مرگ و میر تعدادی از مبتلایان در طول ۴ سال بعد از قطع مواجهه و بهبود نسبی ضایعات پوستی خفیف ذکر شده است (۲۱).

طالعه Chen و همکارانش در تایوان در ناحیه اندمیک نشان داده بود که ساکنینی که با آرسنیک مواجهه داشته‌اند نسبت به ساکنین بدون مواجهه، ۱/۵ برابر دارای شیوع فشار خون بالا از نظر سن و جنس بودند (۱۱). در بنگلادش نیز Rahman نشان داد یک رابطه دز پاسخ بین مواجهه با آرسنیک و فشار خون افزایش یافته ($P<0/01$)، وجود دارد. در مطالعه حاضر نیز اختلاف بین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک افراد مواجهه یافته و شاهد دارای اختلاف معنی‌داری بود. در خصوص تغییرات ژنتیکی مجموع شواهد مشخص می‌کند که آرسنیک قادر به آسیب Clastogenic در انواع متفاوتی از سلول‌ها همراه با عوارض مختلفی در افراد مواجهه یافته است (۲۲). مطالعات کروموزومی تحقیق حاضر نیز نشان‌دهنده تغییرات کروموزومی در افراد مواجهه یافته بود که از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد ($P<0/05$). از کاستی‌های تحقیق حاضر می‌توان به ناکافی بودن نمونه‌های آزمایش شده و عدم وجود اطلاعات مربوط به غلظت آرسنیک آب طی سالیان گذشته و میزان تغییرات آن که در برآورد دز مواجهه می‌تواند تأثیرگذار باشد اشاره نمود. همچنین عدم وجود اطلاعات دقیق مربوط به رژیم غذائی و وضعیت تغذیه‌ای افراد (به عنوان عامل مخدوش کننده) به عنوان یک کاستی مطرح می‌باشد.

- منتشر شده.
۱۵. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی. تجدید نظر چهارم، چاپ پنجم. استاندارد ۱۰۵۳ ایران. ۱۳۷۶.
۱۶. World Health Organization (WHO). Guidelines for drinking water quality, 3rd ed., World Health Organization, Geneva, 2004.
۱۷. World Health Organization (WHO). Nitrate and nitrite in drinking water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking water Quality, World Health Organization, Geneva, 2007.
۱۸. Smith AH, Arroyo AP, Mazumder DNG, Kosnett MJ, Hernandez AL, Beeris M et al. Arsenic-Induced skin lesions among Atacameno people in northern Chile despite good nutrition and centuries of exposure. *Environ Health Perspect* 2000; 108 (17): 617.
۱۹. Cebrian ME, Albores A, Aguilar M, & Blakely E. Chronic arsenic poisoning in the North of Mexico", *Human Toxicol* 1983; 2: 121-33.
۲۰. Mazumder GON, Haque R, Ghosh N, De BK, Santra A, Chakraborty D, Smith AH. Arsenic levels in drinking water and the prevalence of skin lesions in West Bengal, India. *Int J Epidemiol* 1998; 27: 871-77.
۲۱. Mosaferi M, Yunesian M, Dastgiri S, Mesdaghinia A, Esmailnasab N. Prevalence of skin lesions and exposure to arsenic in drinking water in Iran. *Science of Total Environment* 2008; 390: 69-76.
۲۲. Abernathy C. Exposure and Health Effects. Office of Water, Office of Science and Technology, Health and Ecological Criteria Division, USEPA, Washington, DC, USA, Revised/Edited by Ann Morgan, 2001, chapter 3 in: United Nations Synthesis Report on Arsenic in Drinking Water.
۲۳. صحبت‌های انجام شده با افراد متاثر از آرسنیک در روستای قوپوز در خصوص تاریخچه ابتلاء به عوارض پوستی حین انجام معابنات پزشکی، اطلاعات منتشر شده.
۲۴. Perez-Carrera A, Fernandez-Cirelli A. Arsenic concentration in water and bovine milk in Cordoba, Argentina, Preliminary results. *Journal of Dairy Research* 2005; 72: 122-24.
- Organization 2001; 78(9): 1096.
3. World Health Organization (WHO). Arsenic and Arsenic Compounds. World Health Organization, Geneva, 2001.
4. Guifan S. Arsenic contamination and arsenicosis in China *Toxicology and Applied Pharmacology* 2004; 198: 268-71.
5. Mosaferi M, Yunesian M, Mesdaghinia A, Nadim A, Nasser S, Mahvi AH. Arsenic occurrence in drinking water of I.R. of Iran: the case of Kurdistan province. In: Ahmed MF, Ali MA, Adeel Z, editors. *Fate of arsenic in the environment: proceedings of the BUET-UNU International Symposium, International Training Network Centre, Bangladesh University of Engineering and Technology, United Nations University, Tokyo, 2003*. Dhaka: International Training Network Centre, Bangladesh University of Engineering and Technology, 2003:1-6.
6. US EPA (U.S. Environmental Protection Agency) IRIS (Integrated risk Information System) on line database maintained in Toxicology Data Network (TOXNET) by the national library of medicine, Bethesda, Maryland, 1997.
7. IARC (International agency for research on cancer) International agency for research on cancer, toxicological abbreviations, arsenic and arsenic compounds, IARC summary & Evaluation. 1987; 23: 100 (suppl. 7).
8. Tondel M, Rahman M, Magnuson A, Chowdhury IA, Faruquee MH, Ahmad SA. The relationship of arsenic levels in drinking water and the prevalence rate of skin lesions in Bangladesh. *Environ. Health Perspect.* 1999; 107: 727-29.
9. Tseng WP. Effects and dose-response relationships of skin cancer and blackfoot disease with arsenic. *Environ. Health Perspect.* 1997; 19: 109-19.
10. Engel RR, Hopenhayn-Rich C, Receveur O, Smith AH. Vascular effects of chronic arsenic exposure: a review. *Epidemiol. Rev.* 1994; 16: 184- 209.
11. Chen CJ, Hsueh YM, Lai MS, Shyu MP, Chen SY, Wu MM, Kuo TL, Tai TY. Increased prevalence of hypertension and long-term arsenic exposure. *Hypertension* 1995; 25: 53- 60.
12. Chen CJ. Blackfoot disease [Letter]. *Lancet* 1990; 336: 442.
13. Bates MN, Smith AH, Hopenhayn-Rich C. Arsenic ingestion and internal cancers: a review. *Am. J. Epidemiol.* 1992; 135: 462- 76.
۱۴. مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی. گروه بهداشت محیط و حرفه ای، اطلاعات