

وضعیت کنونی و روند ۵ ساله شاخص‌های سوء‌غذیه کودکان زیر ۵ سال در ایران

ربابه شیخ‌الاسلام^۱، محسن نقوی^۲، زهرا عبد‌اللهی^۳، میترا زراتی^۴، سانا زاثانی^۵، فرزانه صادقی قطب آبادی^۶، فریبا کلاهدوز^۷، دکتر کورش صمدپور^۸، مینا مینایی^۹، سیمین عربشاهی^{۱۰}

^۱. متخصص اپیدمیولوژی غذیه و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

^۲. متخصص اپیدمیولوژی، دفتر تحقیقات کاربردی، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

^۳. پزشک و کارشناس مرکز توسعه شبکه و ارتقاء مدیریت، معاونت سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

^۴. کارشناس دفتر بهبود غذیه جامعه معاونت سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نویسنده رايط: ربابه شیخ‌الاسلام، آدرس: دوراهی یوسف‌آباد، خ۲، پ۲۱، طبقه ۲، واحد ۶، ساختمان آفاق

تلفن: ۰۸۹۵۹۴۶۹، پست الکترونیک: _shey@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۵/۲۱؛ پذیرش: ۱۳۸۷/۳/۴

مقدمه و اهداف: سوء‌غذیه در کودکان زیر ۵ سال و کمبود ریزمندی‌ها از مشکلات مهم غذیه‌ای هر کشوری محسوب می‌شود.

سوء‌غذیه در این گروه سنی با عوارض متعدد از جمله اختلال رشد جسمی و تکامل مغزی، کاهش بهره هوشی، کاهش قدرت یادگیری و افت تحصیلی و افزایش موارد ابتلاء به بیماری‌ها، پوکی استخوان و در نهایت کاهش توانمندی‌های ذهنی و جسمی کودکان در بزرگسالی همراه است. داشتن اطلاعات کامل و جامع از وضعیت غذیه و میزان شیوع سوء‌غذیه کودکان، هدف این بررسی برای برنامه‌ریزی‌های بعدی در جهت کاهش سوء‌غذیه، بهبود وضعیت غذیه و ارتقای سلامت در کشور است.

روش کار: این مطالعه یک بررسی مقطعی حاصل از داده‌های کودک ۰ تا ۷۲ ماهه ایرانی در ۲۸ استان کشور است. روش نمونه‌گیری در هر استان به صورت خوش‌های با خوش‌های نابرابر از نظر تعداد خانوار و برابر از نظر تعداد کودکان ۰ تا ۷۲ ماهه بوده است. وزن و قد کلیه نمونه‌ها تعیین و پس از ورود اطلاعات به نرم‌افزار آماری EPI6 ویرایش ۰/۶/۰/۴، در هریک از مناطق شهری و روستائی هر استان، شیوع کم‌وزنی و کوتاه‌قدی و لاغری تعیین شد. سپس شیوع موزون شده هر یک از انواع سوء‌غذیه پروتئین-انرژی در هریک از استان‌های کشور و در سطح ملی محاسبه گردید.

نتایج: ۴/۷ درصد از کودکان کل کشور (۰/۹۵CI: ۰/۴/۰/۹) مبتلا به کوتاه‌قدی هستند و شیوع کوتاه‌قدی در کودکان شهری به طور معنی‌داری کمتر از کودکان روستائی است. (به ترتیب ۳/۵-۳/۱ در مقایسه با ۶/۱-۶/۵٪ ۰/۹۵CI: ۰/۹٪). همچنین ۲/۵ درصد از کودکان کل کشور (۰/۴-۰/۱٪ ۰/۹۵CI: ۰/۹٪) مبتلا به کم‌وزنی هستند. شیوع کم‌وزنی در کودکان شهری به طور معنی‌داری کمتر از کودکان روستائی است. علاوه بر این شیوع لاغری نیز در کودکان زیر ۵ سال کشور، (۰/۹٪ ۰/۳-۰/۳٪ ۰/۹٪) برآورد می‌گردد که در مناطق شهری به طور معنی‌داری بیش از مناطق روستائی است. (به ترتیب ۳/۰-۳/۵ در مقایسه با ۰/۳-۰/۴٪ ۰/۹٪)

نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی نشان‌دهنده قرار داشتن کشورمان در زمرة مناطق با شیوع پائین از نظر وضعیت سوء‌غذیه پروتئین-انرژی در کودکان زیر ۵ سال است. گرچه در مقایسه با نتایج مطالعات گذشته، کاهش محسوسی در خصوص کلیه انواع سوء‌غذیه پروتئین-انرژی در تمامی سطوح مشاهده می‌شود، لیکن تفاوت‌های موجود مابین استان‌ها و مناطق مختلف کشور که به نوعی ناشی از تفاوت‌های موجود در سطح توسعه یافشگی این مناطق است نشان‌دهنده لزوم طراحی و اجرای راهکارهای هدفمند است.

واژگان کلیدی: کم‌وزنی، کوتاه‌قدی، لاغری، کودکان، ایران

مقدمه

کودکان زیر ۵ سال بشمار می‌رود.

شواهد زیادی نشان می‌دهند که سوء‌غذیه در دوران جنبینی و

دو

سوء‌غذیه پروتئین-انرژی، یکی از مشکلات غذیه‌ای شایع در

به اهداف میان دهه‌ای (MDG)^۱ با توزین و قدسنجی ۱۱۵۷۱ کودک به دست آمد (۹). در این بررسی، تصویری کلی از شیوع سوءتغذیه در کودکان زیر ۵ سال کشور به دست آمد اما نمونه کافی برای نشان دادن وضعیت سوء تغذیه به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان‌های مختلف کشور وجود نداشت. بنابراین در سال ۱۳۷۷ (۱۰) به منظور ترسیم دقیق‌تر وضعیت اپیدمیولوژیک سوء تغذیه در استان‌های مختلف کشور، اولین مطالعه با نمونه کافی برای براورد شاخص‌های سوءتغذیه کودکان با تفکیک مناطق شهری و روستایی هر استان به نام بررسی وضعیت تغذیه و شاخص‌های تن سنجی کودکان کشور (ANIS1)^۲ انجام شد. این بررسی داده‌های پایه را برای مسئولان بهداشتی جهت برنامه ریزی بهبود رشد و تغذیه کودکان فراهم آورد. دومین بررسی کشوری وضعیت تغذیه و شاخص‌های تن سنجی کودکان در سال ۱۳۸۳ (ANIS ۲) (مطالعه حاضر) با هدف تعیین روند تغییرات شیوع سوءتغذیه در مناطق شهری و روستایی کشور در یک دوره زمانی ده ساله انجام شده است.

روش کار

مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی است که در آن ۳۴۲۰۰ کودک صفر تا ۷۲ ماهه ایرانی در ۲۸ استان کشور مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روش نمونه‌گیری در هر استان به صورت خوشهای با خوشهای نابرابر از نظر تعداد خانوار و برابر از نظر تعداد کودکان صفر تا ۷۲ ماهه بوده است. در هر استان تعداد ۵۰ سرخوشه از جمعیت شهری و ۵۰ سرخوشه از جمعیت روستائی تعیین و در هر خوشه ۱۲ واحد آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. شایان ذکر است که در استان تهران به جهت کثیر جمعیت تحت پوشش، تعداد ۱۰۰ خوشه شهری (شامل ۵۰ خوشه از تهران بزرگ و ۵۰ خوشه از دیگر مناطق شهری آن) و ۵۰ خوشه روستائی بررسی شد. بنابراین در کل کشور ۱۴۰۰ خوشه روستایی و ۱۴۵۰ خوشه شهری بررسی شده است که بدین ترتیب ۱۷۴۰۰ کودک در مناطق شهری و ۱۶۸۰۰ کودک در مناطق روستائی مورد مطالعه قرار گرفتند. چهارچوب حاصل از سرشماری خانوارهای شهری که طی طرح ایمن‌سازی و ریشه کنی فلچ اطفال در سال ۱۳۷۵ بدست آمده بود و برای مطالعه کشوری شاخص‌های سلامت و جمعیت در سال ۱۳۷۹ (۱۱) به هنگام شده بود و به عنوان چهارچوب نمونه‌گیری جمعیت شهری در هر استان مورد استفاده

سال‌های نخست زندگی باعث کندی رشد بدن، کوتاهی قد و واپس‌ماندگی تکامل ذهنی کودکان شده و ابتلا به عفونت‌های مکرر و مقاومت در برابر درمان و کاهش فعالیت فیزیکی را به همراه دارد. در کودکان مبتلا به سوءتغذیه علاوه بر عقب‌ماندگی رشد جسمانی، شیوع اختلالات روانی، عدم پیشرفت تحصیلی و کاهش بازده کاری بسیار رایج است و این کودکان در دوره‌های بعدی زندگی‌نمی‌توانند به توانایی‌های بدنی و ذهنی مناسب سن خود برسند (۲).

در گزارش بهداشت جهان در سال ۲۰۰۵ سوءتغذیه، علت همراه مرگ و میر ناشی از بیماری‌های کودکان از جمله اسهال و عفونت‌های تنفسی و سرخک اعلام شده است؛ بطوری که بیش از ۵۳ درصد از موارد مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال به طور غیرمستقیم با سوءتغذیه همراه بوده است (۳). برآورد بار بیماری‌ها در سال ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که در کل کشورها، حدود ۱۵ میلیون سال عمر یا به علت مرگ زودرس و یا بعلت ناتوانی ناشی از سوء تغذیه پروتئین انرژی به هدر رفته است (۴).

در حال حاضر حدود ۱۶۴ میلیون کودک زیر ۵ سال در دنیا دچار کوتاه‌قدي هستند (از هر ۳ کودک ۱ کودک). پیش‌بینی شده است که شیوع کوتاه‌قدي تغذیه‌ای در کودکان در کشورهای در حال توسعه از ۲۹/۸٪ در سال ۲۰۰۰ به ۱۶/۳٪ در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد (۵). در این دوره زمانی در کشورهای آفریقایی روند کاهش کوتاه‌قدي تغذیه‌ای آهسته‌تر بوده و از ۳۴/۹٪ به ۳۱/۱٪ پیش‌بینی شده است که علت ان افزایش تعداد کودکان از ۴۴ میلیون به ۴۸ میلیون نفر برآورد شده است. در آسیا و آمریکای لاتین ادامه روند کاهشی در تعداد کودکان و شیوع کوتاه‌قدي تغذیه‌ای در همین دوره زمانی انتظار می‌رود (۵) در بین تمام جوامع، کشورهای نواحی جنوبی آسیا بیشترین موفقیت را در کاهش شیوع کوتاه‌قدي تغذیه‌ای در کودکان زیر ۵ سال کسب نموده‌اند. اما با این حال هنوز با توجه به جمعیت این ناحیه تعداد زیادی از کودکان به کوتاه‌قدي دچار هستند (۷،۶). کاهش شیوع کوتاه‌قدي، کم وزنی و لاغری در کشورهای مختلف را می‌توان به بهبود کیفیت آب آشامیدنی، افزایش میزان دسترسی به غذای سالم، امنیت غذایی، افزایش سطح آگاهی و تحصیلات به خصوص در بین زنان و واکسیناسیون به موقع کودکان نسبت داد. با این وجود روند کاهش، بسیار تدریجی بوده و نیاز به طراحی و اجرای مداخلات بیشتری در این زمینه وجود دارد (۸).

در کشور ما برای اولین بار در سال ۱۳۷۴، وضعیت شاخص‌های تن سنجی کودکان در بررسی کشوری ارزشیابی میزان دست‌یابی

شد. با استفاده از نرم افزار ANTRO حد مرز طبیعی برای شاخص‌های کموزنی، کوتاه‌قدی و لاغری هر کودک با استفاده از جامعه مرجع ارائه شده توسط NCHS/WHO/CDC^۳ تعیین شد. به این ترتیب در مناطق شهری و روستائی هر استان شیوع کموزنی و کوتاه‌قدی متوسط و شدید به ترتیب با توجه به درصد کودکانی که میزان وزن و یا قد آنان ۲ انحراف معیار کمتر از وزن و یا قد کودکان جمعیت مرجع با خصوصیات مشابه سن و جنس قرار دارد تعیین شد. همچنین شیوع لاغری متوسط و شدید نیز با توجه به درصد کودکانی که میزان وزن آنان ۲ انحراف معیار کمتر از وزن کودکان جمعیت مرجع با خصوصیات مشابه از نظر قد و EPI6 بروگردانده شد. در نهایت با استفاده از نرم افزار EXCEL شیوع موزون شده شاخص‌های فوق‌الذکر در کودکان کمتر از ۶ سال شهری کشور (با توجه به نسبت جمعیت شهری هر استان به کل جمعیت روستائی کشور)، کودکان کمتر از ۶ سال روستائی کشور (با توجه به نسبت جمعیت روستائی هر استان به کل جمعیت روستائی کشور) و کودکان کمتر از ۶ سال کل کشور (با توجه به نسبت جمعیت هر استان به کل جمعیت کشور) محاسبه شد. جهت مقایسه میزان شیوع هر یک از انواع سوء‌تعذیه بین مناطق شهری و روستائی هر استان و یا گروه‌های جنسی هر استان و یا در سطوح ملی برای هر شاخص و در هر مقطع سنی و جنسی و جغرافیایی، فاصله اطمینان ۹۵٪ برآورد گردید تا مقایسه‌های انجام شده از نظر آماری امکان پذیر باشد و معنادار بودن یا نبودن تفاوت‌هارا را نیز نمایان سازد.

بر اساس تعریف، شاخص‌های سوء‌تعذیه، کوتاه‌قدی تغذیه‌ای، کموزنی و لاغری در سه قالب خفیف (بین یک تا دو انحراف معیار از میانگین)، متوسط (بین دو تا سه انحراف معیار از میانگین) و شدید (پایین‌تر از سه انحراف معیار از میانگین) محاسبه و ارائه شد.

یافته‌ها

در مجموعه داده‌های ۳۴۲۰۰ کودک مورد مطالعه، ۶٪ از داده‌ها برای هریک از شاخص‌ها و در مجموع، در چهارچوبه قابل تصور نمی‌گنجیده‌اند که از مطالعه خارج شدند (این عدد در استان‌های مرکزی و سیستان و بلوچستان با ۱/۵ درصد، بالاترین، و در استان‌های گیلان و آذربایجان شرقی با ۰/۲ درصد، کمترین بوده)

قرار گرفت. سپس با استفاده از ستون جمع تجمعی این فهرست و تقسیم آخرین سطر این جمع به تعداد نمونه، فاصله نمونه محاسبه شده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی یک عدد تصادفی بین صفر تا فاصله نمونه بدست آمد. این عدد شماره خانوار اولین سرخوشه در فهرست شهری استان بود. شماره خانوار سرخوشه سرخوشه‌های بعدی استان نیز با استفاده از شماره خانوار سرخوشه قبلی و فاصله نمونه تعیین شد. بدین ترتیب ۵۰ خوشه شهری در کلیه نقاط شهری هر استان دارای توزیع سهمی بودند. در مناطق روستایی، آخرین سرشماری انجام شده در مناطق تحت پوشش خانه‌های بهداشت و تیمهای سیار (ابتدای سال ۱۳۸۳) به عنوان چهارچوب نمونه‌گیری در این مناطق استفاده شده است. پس از اتصال چهارچوب‌های آماری مناطق روستایی شهرستان‌های مختلف به یکدیگر، چهارچوب آماری منطقه روستایی هر استان بدست آمده و به همان شیوه انتخاب سرخوشه در مناطق شهری جهت یافتن خانوارهای سرخوشه عمل شد. پس از اطلاع‌رسانی به والدین کلیه شرکت‌کنندگان از نظر اهداف و روش انجام مطالعه، از کلیه آنان رضایت شفاهی جهت شرکت در طرح اخذ گردید و پرسشنامه تهیه شده که شامل بخش‌های اطلاعات عمومی (نظیر نام استان، شهرستان، آدرس، جنسیت، تاریخ تولد و ...) و بخش آگاهی و عملکرد مادر در خصوص پایش رشد و چگونگی استفاده از کارت رشد بود، به صورت مصاحبه مستقیم و با رویت کارت رشد کودک تکمیل شد. لازم به ذکر است که روایی و اعتبار این پرسشنامه در مطالعه انجام شده در سال ۱۳۷۷ مورد تأیید قرار گرفته بود(۱۰). علاوه براین وزن و قد تمام کودکان مورد مطالعه، مورد سنجش قرار گرفت. ابزار اندازه‌گیری قد و وزن کودکان شامل ۲ نوع قد سنج مخصوص کودکان زیر و بالای ۲ سال و همچنین ۲ نوع ترازوی مخصوص توزین کودکان زیر و بالای ۲ سال بود که از هر کدام به تعداد گروه‌های پرسشگر خریداری شده بود. تیم پرسشگری در یک کارگاه آموزشی دو روزه در تهران درمورد نحوه اندازه‌گیری قد و وزن بطور عملی آموزش داده شدند.

کلیه اندازه‌گیری‌ها توسط کارشناسان و یا کارداران آموزش دیده بخش بهداشت انجام شد. قبل از اندازه‌گیری وزن کودک با استفاده از وزنهای شاهد استاندارد، ترازوها کالیبره شده و از دقت ترازو اطمینان حاصل شد. قد کودکان زیر ۲ سال بطور خوابیده و قد کودکان بالای ۲ سال بطور ایستاده اندازه‌گیری شد و برای اطمینان از صحت اندازه قد کودکان، میانگین دو بار اندازه‌گیری قد توسط پرسشگر تعیین و ثبت شده است.

ورود داده‌ها با استفاده از نرم افزار EPI ویرایش 6.04b انجام www.SID.ir

نتایج این مطالعه، ۳/۷ درصد از کودکان زیر ۵ سال در کل کشور براساس شاخص وزن برای قد، دچار لاغری متوسط و شدید بودند. میزان شیوع لاغری در مناطق شهری کشور ۴/۱ درصد و در مناطق روستایی کشور ۳/۳ درصد بود. شیوع لاغری در دختران ۳/۹ درصد و در پسران ۳/۵ درصد بود.

درجول شماره ۱ نسبت موزون شده و توزیع شاخص‌های سوء‌غذیه بر حسب استان‌های کشور در سال ۱۳۸۳ برای کودکان زیر شش سال به تفکیک سن نشان داده شده است. در سه نمودار شماره ۱ و ۲ و ۳ نیز شاخص‌های مزبور برای کودکان زیر ۵ سال به تفکیک استان نشان داده شده است.

بحث

در سال ۱۳۷۰ در بررسی سالیانه وضعیت سلامت مادران و کودکان با استفاده از توزین کودکان و نقطه گذاری روی کارت رشد و شمارش نقاط (کودکان) زیر خط صدک سوم، تلاش شد که وضعیت سوء‌غذیه کودکان زیرپنج سال به تفکیک مناطق شهری و روستایی کشور برآورد گردد. نتایج این بررسی نشان داد که ۱۰ درصد از پسران شهری، زیر صدک سوم منحنی وزن برای سن قرار دارند و این نسبت در دختران شهری برابر با ۱۷ درصد است.

در استانهای گیلان و آذربایجان شرقی با ۰/۲ درصد، کمترین بوده است. از کل کودکان مورد مطالعه ۱۹/۴٪ کمتر از یک سال، ۲۱/۲٪ یک تا دو سال، ۲۰/۳٪ دو تا سه سال، ۱۹/۷٪ سه تا چهار سال و ۱۹/۳٪ چهار تا پنج سال سن داشتند. همچنین ۵۱/۵ درصد از کودکان مورد بررسی را پسران و ۴۸/۵ درصد از آنان را دختران تشکیل داده بودند.

بر اساس شاخص قد برای سن، ۴/۷ درصد از کودکان صفر تا ۶۰ ماهه در کل کشور دچار کوتاه‌قدی تغذیه‌ای متوسط و شدید بودند و میزان شیوع در مناطق شهری ۳/۳ درصد و در مناطق روستایی ۸/۶ درصد بود. این بررسی شیوع کوتاه‌قدی تغذیه‌ای را در دختران ۴/۴ درصد و در پسران ۵ درصد نشان داد. به طور کلی شیوع کوتاه‌قدی تغذیه‌ای در کودکان روستایی دو برابر کودکان شهری است. در مقیاس کشوری میزان شیوع کوتاه‌قدی تغذیه‌ای بین دختر و پسر اختلاف معنادار ندارد.

براساس شاخص وزن برای سن، در کل کشور ۵/۲ درصد از کودکان زیر ۵ سال دچار کم‌وزنی متوسط و شدید بودند. میزان شیوع کم‌وزنی در مناطق شهری ۴/۷ درصد و در مناطق روستایی ۶ درصد به دست آمد. هم چنین، در ۵/۵ درصد از دختران و ۵ درصد از پسران، درجات متوسط و شدید کم‌وزنی وجود داشت. طبق


جدول ۱- نسبت موزون شده هریک از شاخص‌های کوتاه‌قدی تغذیه‌ای، کم‌وزنی و لاغری در کودکان زیر ۶ سال ایرانی به تفکیک شهر و روستا در سال ۱۳۸۳

	لاغری						کوتاه‌قدی تغذیه‌ای					
	خفیف	متوسط	شدید	خفیف	متوسط	شدید	خفیف	متوسط	شدید	متوسط	شدید	متوسط
زیریک سال	۱۵.۷۴	۲.۵۴	۰.۳۱	۱۱.۷۴	۲.۲۸	۰.۵۵	۱۰	۱.۹	۰.۸۶	۱.۹	۰.۸۶	۰.۸۶
یک تا دو سال	۲۲.۹۴	۳.۹۷	۰.۲۵	۲۲.۴۷	۳.۸۶	۰.۹۷	۱۶.۳	۲.۴۷	۱	۲.۴۷	۱	۱
دو تا سه سال	۲۰.۹۶	۳.۵۲	۰.۲۹	۲۳.۱۴	۴.۶۸	۰.۵۸	۱۱.۲۷	۲.۱۳	۰.۷۱	۰.۷۱	۰.۷۱	۰.۷۱
سه تا چهار سال	۲۰.۱۹	۲.۲۹	۰.۲۹	۲۵.۶۷	۳.۹۸	۰.۲۹	۱۷.۱۴	۳	۰.۶۵	۰.۶۵	۰.۶۵	۰.۶۵
شهر	۱۹.۵۵	۲.۵۵	۰.۳۴	۲۵.۶۶	۴.۲۷	۰.۳۴	۲۰.۲۵	۳.۲۷	۰.۶۲	۰.۶۲	۰.۶۲	۰.۶۲
پنج تا شش سال	۱۸.۲۸	۲.۰۲	۰.۲۹	۲۳.۲۲	۳	۰.۴۸	۲۰.۳۴	۳.۵۵	۰.۴۸	۰.۴۸	۰.۴۸	۰.۴۸
کل	۱۹.۷	۲.۸۴	۰.۳	۲۲.۰۳	۳.۷	۰.۵۴	۱۵.۸۱	۲.۷۱	۰.۷۳	۰.۷۳	۰.۷۳	۰.۷۳
زیریک سال	۱۴.۹	۲.۰۸	۰.۳	۱۴.۳۸	۲.۰	۰.۴۷	۱۳.۴۳	۲.۴	۰.۸۷	۰.۸۷	۰.۸۷	۰.۸۷
یک تا دو سال	۲۱.۰۳	۳.۰۱	۰.۵۲	۲۷.۵۲	۴.۹۲	۱.۱۶	۲۵.۹۵	۵.۰۷	۱.۹۷	۱.۹۷	۱.۹۷	۱.۹۷
دو تا سه سال	۱۸.۶۹	۳.۱۷	۰.۴۳	۲۷.۸۶	۶.۲۴	۰.۸۳	۱۸.۱۸	۴.۲۸	۱	۴.۲۸	۱	۱
روستا	۱۵.۹۲	۲.۹۱	۰.۲۶	۲۸.۷۵	۶.۱۱	۰.۵۶	۲۷.۴۵	۶.۶۳	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۶
چهار تا پنج سال	۱۶.۷۹	۲.۴۱	۰.۲۲	۳۰.۱	۵.۳۵	۰.۳۷	۲۹.۳۶	۷.۰۹	۱.۴۱	۱.۴۱	۱.۴۱	۱.۴۱
پنج تا شش سال	۱۶.۶۷	۲.۲۴	۰.۲	۲۹.۲	۵.۶۵	۰.۵۳	۳۳.۹۴	۵.۸۵	۱.۲۶	۱.۲۶	۱.۲۶	۱.۲۶
کل	۱۷.۴۱	۲.۶۵	۰.۳۳	۲۶.۱	۵.۰۸	۰.۶۷	۲۴.۳	۵.۱۴	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۳۵


زیر ۵ سال و مقایسه آن با جامعه مرجع انجام شد. این بررسی نشان داد که ۱۵٪ از پسران و ۱۶/۳٪ از دختران زیر ۵ سال براساس شاخص وزن برای سن چهار سوء‌تغذیه متوسط و شدید بودند و شیوع سوء‌تغذیه در کودکان روستایی، ۱۸/۷٪ و در کودکان شهری ۱۳/۳٪ گزارش شد. این بررسی شیوع کوتاه‌قدمی تغذیه‌ای متوسط و شدید را براساس شاخص قد برای سن در پسران، ۱۹/۵٪ و در دختران ۱۸/۴٪ نشان داد. شیوع کوتاه‌قدمی تغذیه‌ای در کودکان روستایی به مراتب بیشتر از کودکان شهری بود (۲۴/۸٪ در مقابل ۱۲/۲٪). براساس شاخص وزن برای قد از پسران و ۱۶/۶٪ از دختران زیر ۵ سال چهار لاغری متوسط

در صدهای فوق برای پسران روسایی برابر ۱۵ و برای دختران روسایی برابر ۲۳ بود (۱۲). در این بررسی صدک سوم دختران به عنوان حداقل وزن استاندارد در نظر گرفته شده بود و پسران هم با همین حداقل مقایسه شده اند. بدیهی است چنانچه صدک سوم پسران مبنای مقایسه برای پسران قرار می‌گرفت اختلاف دختر و پسر کمتر می‌شد. در این بررسی برای اولین بار شیوع سوء تغذیه در سطح کشور مطالعه شده است.


در بررسی کشوری "ارزشیابی میزان دست‌یابی به اهداف میان دهه‌ای" (۹) در پاییز سال ۱۳۷۴، بررسی وضعیت شاخص‌های تن سنجی کودکان با استفاده از توزین و قدسنجی ۱۱۵۷۱ کودک




نمودار ۱- وضعیت کوتاه‌قدهای تغذیه‌ای متوسط و شدید در کودکان زیر ۵ سال به تفکیک استان‌های کشور، سال ۱۳۸۳



نومدار ۲- وضعیت کم وزنی، متوسط و شدید در کودکان زیر ۵ سال به تفکیک استان‌های کشور، سال ۱۳۸۳



نمودار ۳- وضعیت لاغری متوسط و شدید در کودکان زیر ۵ سال به تفکیک استان‌های کشور، سال ۱۳۸۳



نمودار-۴ مقایسه وضعیت لاغری متوسط و شدید در کودکان زیر پنجم سال بر حسب جنس و محل سکونت در سه مطالعه سال ۱۳۷۷، ۱۳۷۴ و ۱۳۸۲

محاسبه) انجام شد (۱۰). نتایج این بررسی نشان داد که کم وزنی متوسط و شدید براساس شاخص وزن برای سن در ۱۱/۹٪ از پسران و ۹/۷٪ از دختران زیر ۵ سال وجود دارد و شیوع کم وزنی در کودکان شهری و روستایی به ترتیب ۹/۶٪ و ۷/۳٪ است. شیوع کوتاه‌قدمی تغذیه‌ای متوسط و شدید در ۸/۱۶٪ از پسران و ۹/۱۳٪ از دختران گزارش شد. هم چنین، شیوع کوتاه‌قدمی در مناطق روستایی تقریباً دو برابر مناطق شهری بود (به ترتیب ۸/۲۱٪ و ۱۱/۵٪ از پسران و ۷/۴٪ از دختران زیر ۵ سال بر اساس شاخص وزن برای قد دچار لاغری متوسط و شدید بودند و

و شدید بودند و شیوع لاغری در کودکان به ترتیب در شهر و روستا ۶٪ و ۷٪ بود.

بررسی کشوری ANIS1) در سال ۱۳۷۷ توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ترسیم دقیق تصویر ایدمیولوژیک سوء تغذیه در مناطق روستایی و شهری استان‌های مختلف کشور با استفاده از روش مطالعه سال ۱۳۷۴ و به تعداد نمونه ۳۴۲۰۰ کودک زیر شش سال (۶۰۰ کودک روستایی و ۶۰۰ کودک شهری و محاسبه شاخص‌های ملی و استانی پس از توزیع جمعیتی در جریان


به ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۷ و ۷ درصد در سال ۱۳۸۳ کاهش یافته است. هم چنین در مناطق شهری شیوع کوتاه قدمی تغذیه‌ای از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۷۷ و حدود ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است. (نمودار۵).

مقایسه روند کم‌وزنی طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ نیز حاکی از بهبود وضعیت تغذیه کودکان زیر ۵ سال است. شیوع کم‌وزنی در مناطق روستایی از ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۶ درصد در سال ۱۳۸۳ کاهش یافته است. در مناطق شهری نیز کم‌وزنی در سال ۱۳۷۴ در ۱۳ درصد از کودکان وجود داشته و طی سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۳ به ترتیب به ۸ و ۵ درصد کاهش یافته است (نمودار۶).


مقایسه روند لاغری در کودکان زیر ۵ سال کشور نیز حاکی از کاهش شیوع لاغری طی سال‌های مطالعه است. به طوری که

این میزان در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۴/۸٪ و ۵/۵٪ بود. نتایج این بررسی به عنوان داده‌های پایه جهت برنامه‌ریزی بهبود رشد و تغذیه کودکان استفاده شد و منجر به طراحی و اجرای مداخلات منطقه‌ای برای بهبود تغذیه و رشد کودکان گردید.

در نمودارهای ۴ و ۵ نتایج سه بررسی کشوری سال ۱۳۷۷، ۱۳۷۴ و ۱۳۸۳ که هر سه در فصل پاییز انجام شده است، از نظر کوتاه‌قدمی تغذیه‌ای، کم‌وزنی و لاغری متوسط و شدید مقایسه شده است که نشان می‌دهد روند سوء‌تغذیه در کودکان زیر ۵ سال ایرانی بویژه طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۷ قبل ملاحظه داشته است. اگر شیوع کوتاه‌قدمی تغذیه‌ای را طی این دوره ده ساله بررسی نماییم، ملاحظه می‌شود که شیوع کوتاه قدمی تغذیه‌ای متوسط و شدید در مناطق روستایی از ۲۵ درصد در سال ۱۳۷۴ متوجه شد و شدید در مناطق شهری از ۱۲٪ در سال ۱۳۷۷ و ۹٪ در سال ۱۳۸۳



نمودار ۵- مقایسه وضعیت کوتاه‌قدمی تغذیه‌ای متوسط و شدید در کودکان زیر پنج سال بر حسب جنس و محل سکونت در سه مطالعه سال ۱۳۷۷، ۱۳۷۴ و ۱۳۸۳



نمودار ۶- مقایسه وضعیت کم‌وزنی متوسط و شدید در کودکان زیر ۵ سال بر حسب جنس و محل سکونت در سه مطالعه سال ۱۳۷۷، ۱۳۷۴ و ۱۳۸۳

مطالعات انجام شده در کشور طی ده سال گذشته حاکی از کاهش شیوع سوءتفذیه در کودکان ایرانی است. در عین حال با توجه به پیامدهای زیانبار بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی سوءتفذیه، گسترش برنامه‌های بهبود تغذیه و ارتقاء رشد کودکان باید همواره در زمرة اولویت‌های برنامه‌های بهداشتی کشور قرار گیرد.

منابع

- Berkman DS, Lescano AG, Gilman RH, Lopez SL, Black MM. Effect of stunting, diarrheal disease, and parasitic infection during infancy on cognition in late childhood: a follow-up study *Lancet* 2002; 59: 564-67.
- Norgan NG. Long-term physiological and economic consequences of growth retardation in children and adolescents *Proc Nutr* 2000; 59:245-56.
- World Health Report: Make every mother and child count. Geneva: World Health Organization, 2005.
- Lopez AD, Mathers CD. The global burden of disease and risk factors. Oxford university press, 2006.
- Onis M, Bllosner M. The World Health Organization Global Database on Child Growth and Malnutrition: methodology and applications. *International Journal of Epidemiology* 2003; 32: 518-26.
- Milman A, Frongillo EA, Onis M. Differential Improvement among Countries in Child Stunting Is Associated with Long-Term Development and Specific Interventions. *Journal of Nutrition* 2005; 135:1415-22.
- Thorbecke E, Charumilind C. Economic inequality and its socioeconomic impact. *World Development* 2002; 30: 1477-95.
- Svedberg P. Declining child malnutrition: a reassessment . *International Journal of Epidemiology* 2006; 35: 1336-46.
- Naghavi M. Multiple Indicator Cluster Survey(MICS) in the Islamic Republic of Iran. Tehran: Ministry of Health and Medical Education , University for Health UNICEF, 1995.
- Sheikholeslam R, Naghavi M. The first national Anthropometric Nutritional Indicators Survey (ANIS) among children under 5 years. Tehran: Ministry of Health and Medical Education, University for Health 1998.
- Naghavi M. Demographic and Health Survey(DHS). Tehran: Ministry of Health and Medical Education, Undersecretary for Health, 2000.
- Malek Afzali H. National Survey on the Health Status of Mothers and Children under 5 in the Islamic Republic of Iran, , Undersecretary for Health, Ministry of Health and Medical Education, 1991.
- Physical Status: The use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO expert committee. World Health Organization. Geneva. 1995.
- Unicef Statistics: Word Wide Prevalence of malnutrition among Children under 5 years. Available at: [<http://www.childinfo.org/areas/malnutrition/>] (Accessed January, 2008).

شیوع لاغری در کودکان روستایی از حدود ۸ درصد در سال ۱۳۷۴ به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۷۷ و به کمتر از ۴ درصد در سال ۱۳۸۳ کاهش یافته است (نمودار ۴).

بر اساس داده‌های موجود در سال ۱۳۷۴ کشور ایران با توجه به جدول طبقه‌بندی سازمان جهانی بهداشت (۱۳) از نظر شاخص کم وزنی دارای شیوع پایین و از نظر شاخص لاغری شیوع متوسط و از نظر شاخص کوتاه‌قدی تغذیه‌ای از شیوع بالا برخوردار بوده است. بر اساس داده‌های سال ۱۳۷۷، وضعیت شیوع کموزنی و لاغری کودکان ایرانی در حد پایین و وضعیت شیوع کوتاه‌قدی از شیوع بالا به شیوع متوسط تغییر یافته است و مطالعه سال ۱۳۸۳ نشان داد که شیوع سوءتفذیه کودکان ایرانی از نظر هر سه شاخص کوتاه‌قدی، کموزنی و لاغری در حد پایین قرار گرفته است.

براساس طبقه‌بندی سازمان جهانی بهداشت، کوتاه‌قدی تغذیه‌ای کمتر از ۲۰٪/ بیانگر شیوع پایین، ۲۰٪/ تا ۴۰٪/ نشان دهنده شیوع متوسط، ۴۰٪/ تا ۶۰٪/ شیوع بالا و بیشتر از ۶۰٪/ بیانگر شیوع خیلی بالا است (۵). اگر نتایج مطالعه حاضر با نتایج بررسی در سایر کشورها که در همین سال انجام شده است مقایسه شود می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کودکان ایرانی از نظر کوتاه‌قدی تغذیه‌ای (۴٪/۷) وضعیتی تقریباً مشابه کودکان آرژانتینی (۴٪/۲)، داشته اند و در مقایسه با کشورهای دیگر از جمله مصر با ۱۷٪/۳، مکزیک با ۱۲٪/۷، مراکش با ۱۸٪/۱، بنگلادش با ۴۳٪/ و هندوستان با ۴۸٪/ شیوع کوتاه‌قدی بسیار کمتر بوده است (۱۴). از نظر شیوع کموزنی، وضعیت کودکان ایرانی در زمان مطالعه (۵٪/۲) تقریباً مشابه کودکان کشور مکزیک (۵٪/۰) بوده است. در همین سال، در مناطق شهری مصر ۶٪/ و در مناطق روستایی ۶٪/ و در مناطق شهری مالزی ۱۶٪/ و در روستایی آن ۴۲٪/ کودکان، در مناطق شهری بنگلادش ۴۸٪/ و در مناطق روستایی آن ۲۲٪/، در مناطق شهری هندوستان ۳۲٪/ و در مناطق روستایی آن ۴۷٪/ از کودکان دچار کموزنی بوده اند (۱۴). شیوع لاغری متوسط و شدید در کودکان ایرانی در این مطالعه ۳٪/ بوده که در مقایسه با کودکان مکزیکی در همین زمان (۱٪/۰) و کودکان آرژانتینی (۱٪/۲) تقریباً دو برابر بیشتر و مشابه کودکان مصری (۳٪/۰) بوده است (۱۴).

نتیجه‌گیری

بطور کلی نتایج این مطالعه و مقایسه یافته‌های آن با سایر