

شیوع مشکلات بینایی در دانش آموزان شهر شیراز سال ۱۳۸۷

عباسعلی یکتا^۱، سیروس دهقانی^۲، هادی استادی مقدم^۱، جواد هرویان^۱، ابراهیم جعفرزاده پور^۳، عباس عظیمی^۱، ریحانه یکتا^۱، علی جواهر فروش زاده^۴، محسن پدرام فر^۵، بیژن رضوان^۶، نیکو کیاست فرد^۷، مهدی خبازخوب^۸

^۱دانشیار بینایی سنجی، گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم پراینسکی و بهداشت مشهد، ایران

^۲ فوق لیسانس بینایی سنجی، بیمارستان شهید دستغیب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

^۳ دانشیار بینایی سنجی، گروه بینایی سنجی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

^۴ پزشک عمومی، بیمارستان امام خمینی فریمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

^۵ پزشک عمومی اهواز، ایران

^۶ کارشناس بهداشت، مرکز بهداشت شهرستان دزفول، ایران

^۷ دندانپزشک، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

^۸ دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، ایران

^۹ کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

نویسنده مسئول: مهدی خبازخوب، آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از ظفر، سر خیابان اسفندیاری، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

نمبر: ۰۲۱-۸۸۶۵۱۵۱۴، پست الکترونیک: khabazkhoob@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸؛ پذیرش: ۱۳۸۸/۱۲/۲۵

مقدمه و اهداف: با توجه به اهمیت بینایی در دانش آموزان و کمبود آمارهای مربوط به مشکلات بینایی این مطالعه با هدف تعیین شیوع عیوب انکساری، آنیزومتروپیا، آمبیلیوپی و استرابیسموس در دانش آموزان شهر شیراز صورت گرفت.

روش کار: این مطالعه مقطعی بوسیله نمونه‌گیری خوشای تصادفی در دانش آموزان شاغل به تحصیل در سال ۱۳۸۶-۸۷ شهر شیراز صورت گرفت. پس از مصاحبه معاینات اندازه‌گیری دید، رفرکشن غیر سیکلوبلژیک (برای دانش آموزان دبیرستان) و سیکلوبلژیک (برای دانش آموزان راهنمایی) و معاینات دید دو چشمی در نمونه‌های مورد مطالعه انجام گرفت.

نتایج: ۲۶۸۳ نفر از ۳۰۶۵ دانش آموز انتخاب شده در مطالعه شرکت کردند (۸۶/۰۶٪-میزان پاسخ). شیوع میوپی و هایپرولوپی در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی به ترتیب ۳/۵۲-۶/۱۹٪ و (۴/۸۵٪) و (۰/۹۵CI: ۳/۵۲-۶/۰۲٪) و (۰/۹۵CI: ۳/۵۲-۶/۰۲٪) داشتند. میوپی و هایپرولوپی در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی با سن رابطه معنی‌داری داشتند. ۰/۲٪ از دانش آموزان آنیزومتروپ و ۰/۲٪ از دانش آموزان آمبیلیوپ بودند. شیوع استрабیسموس ۰/۱۸٪ (۱/۱۵-۲/۵۰٪) بود.

نتیجه‌گیری: شیوع نزدیک بینی در دانش آموزان شهر شیراز نسبت به کشورهای همسایه نسبتاً بالاست. با اینحال دوربینی از مقدار متوسطی برخوردار است. میزان شیوع آمبیلیوپی، آنیزومتروپیا و استрабیسموس در دانش آموزان شهر شیراز تقریباً نزدیک به سایر گزارشات است.

واژگان کلیدی: عیوب انکساری، تنبلي چشم، استрабیسموس، دانش آموزان

مقدمه

دانش آموزان ارائه شده است. مثلاً پروتکل "مطالعه عیوب انکساری کودکان" (Refractive Error Study in Children = RESC) یکی از این پروتکل‌ها است که تا کنون بر اساس آن مطالعات متعددی در دانش آموزان انجام شده است (۶-۱۱). در بیشتر مطالعات انجام شده بر اساس این پروتکل سنین ۷ تا ۱۵ سال بوسیله رفرکشن سیکلوبلژیک بررسی شده‌اند. شیوع نزدیک بینی از ۰/۳٪ در نیال ۳۸/۱ در جنوب چین بر اساس مطالعات این پروتکل گزارش

از مشکلات مهم موجود در دانش آموزان، مشکلات بینایی است. این مشکلات بر یادگیری دانش آموزان تأثیر دارد و در برخی مطالعات به مسائل روانی و اجتماعی حاصل از این گونه مشکلات در دانش آموزان اشاره شده است (۱،۲). عیوب انکساری، آمبیلیوپی و استрабیسموس از مهم‌ترین مشکلات بینایی در دانش آموزان هستند (۳،۴). اهمیت این مشکلات تا جایی است که در برخی گزارشات پروتکل‌های اختصاصی جهت بررسی این مشکلات در

۱ تعداد کل دانشآموزان و تعداد نمونه انتخاب شده در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷ بر حسب سال تحصیلی و جنس نشان داده شده است. در این مطالعه خوشهای مرحله اول مدارس و خوشهای مرحله دوم کلاس‌های مدارس در نظر گرفته شدند. در مرحله اول نمونه‌گیری کل مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان لیست شدند و از بین آن‌ها مدارسی به طور تصادفی انتخاب گردیدند. پس از انتخاب مدارس در مرحله دوم از هر مدرسه با توجه به کل کلاس‌ها تعدادی دانشآموزان هر کلاس مناسب با جمعیت مدرسه مورد معاینه قرار گرفت. به عنوان مثال پس از انتخاب یک مدرسه راهنمایی اگر چند کلاس اول راهنمایی در یک مدرسه بود از هر کلاس تعدادی دانشآموز مناسب با جمعیت در نظر گرفته شده برای آن مدرسه انتخاب می‌شد.

محاسبه حجم نمونه

حجم نمونه در این مطالعه بر اساس شیوع دوربینی و نزدیک بینی و مقادیر آمبیلوپی و استرابیسموس گزارش شده از سایر مطالعات داخلی محاسبه گردید. از آنجائی که شیوع دوربینی نسبت به سایر مقادیر از میزان بالاتری برخوردار بود حجم نمونه بر این اساس محاسبه گردید. در این مطالعه حجم نمونه برای نسبت ۰.۵٪ با خطای ۱٪ و دقت ۱۸۲۵ نفر تعیین شد. پس از اصلاح برای اثر طرح ($Design\ effect=1/5$) و در نظر گرفتن ریزش ۱۰٪ حجم نمونه نهایی ۳۰۰۸ دانشآموز برآورد گردید.

پس از انجام هماهنگی‌های اولیه با آموزش و پرورش شهر شیراز، اطلاعات مربوط به مدارس این شهر اخذ گردید و نمونه‌گیری انجام شد. یک هفته قبل از انجام معاینه، نامه‌ای مشتمل بر تشریح کامل طرح، اهمیت آن و عوارض احتمالی (استفاده از قطره سیکلولپلزیک) و منافع آن بواسطه معلمان برای والدین دانشآموزان ارسال می‌گردید و از آن خواسته می‌شد که در صورت رضایت جهت شرکت فرزندشان در مطالعه، فرم مربوطه را امضا نموده و روز انجام مطالعه این فرم را توسط دانشآموز رائیه نمایند ارائه فرم امضا شده از جمله شروط ورود دانشآموز به مطالعه محسوب می‌گردید. پرسشنامه‌ای مشتمل بر مشخصات فردی دانشآموزان شامل سال تحصیلی، سطح تحصیلات والدین و برخی عوامل اقتصادی، سابقه معاینات چشم پزشکی و سابقه کار نزدیک برای هر دانشآموز قبل از معاینه بوسیله پرسشنامه پر می‌شد. در این پرسشنامه مشخصات فردی شامل سال تحصیلی، سطح سواد پدر و مادر و برخی فاکتورهای اقتصادی ثبت شد. قسمت بعدی این پرسشنامه سابقه معاینات چشم پزشکی و سابقه

شده است (۱۳). شیوع دوربینی از ۱/۱ تا ۱۶/۶٪ در جوامع مختلف متغیر است (۱۰، ۷، ۷). بر اساس این پروتکل در ایران مطالعه‌ای در میان دانشآموزان دزفولی توسط فتوحی و همکاران صورت گرفته است که نزدیک بینی و دوربینی را ۳/۴٪ و ۱۶٪ نشان داده است (۱۰). هاشمی و همکاران نیز در مطالعه بررسی شاخص‌های چشم پزشکی مردم تهران نزدیک بینی و دوربینی (کات پوینت ۵/۰ دیوپتر) را در کودکان زیر ۱۵ سال تهران بر اساس رفرکشن سیکلولپلزیک به ترتیب ۷/۲٪ و ۷۶/۲٪ نشان داده‌اند (۱۳).

گروه بعدی مشکلات بینایی دانشآموزان، آمبیلوپی و استرابیسموس است. این دو مشکل در صورت تشخیص در سال‌های اول عمر، به درمان خوبی پاسخ می‌دهد. گزارشات مختلف نشان داده‌اند که آمبیلوپی و استرابیسموس از علل اصلی اختلال دید و چشمی در کودکان هستند (۱۶، ۵، ۱۴). برای شناسایی این دو مشکل نیز پروتکلهای متعددی تا کنون ارائه شده است (۱۷). آمبیلوپی در مطالعات مبتنی بر جمعیت در سنین دانشآموزی تقریباً ۲٪ گزارش شده است (۲۲-۱۷). شیوع ۰/۰٪ تا ۰/۴٪ استрабیسموس نیز در مطالعات متفاوت نشان داده شده است (۲۴، ۱۷، ۳). نتایج مطالعه در دانشآموزان دزفولی در ایران نشان داد که ۰/۹٪ و ۰/۸٪ از دانشآموزان به ترتیب مبتلا به آمبیلوپی و استрабیسموس هستند (۱۰). با توجه به اهمیت تشخیص زود هنگام عیوب انکساری در دانشآموزان، مطالعات اندکی در این خصوص در کشور ما انجام شده است. از این رو انجام مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه عیوب انکساری و اختلالات دید با عنایت به تأثیر عوامل گوناگون ژنتیکی، جغرافیایی، و سبک زندگی بر شیوع این اختلالات از اولویت‌های نظام سلامت محسوب می‌شود می‌باشد این مطالعه با هدف تعیین شیوع مشکلات بینایی و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانشآموزان شهر شیراز صورت گرفت

روش کار

این مطالعه با هدف تعیین شیوع مشکلات بینایی و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانشآموزان شهر شیراز صورت گرفت.

جمعیت هدف

از میان ۲۵۲۳۳۵ نفر دانشآموز مشغول به تحصیل در سال ۸۷-۸۶ در شهر شیراز، افراد مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری خوشهای تصادفی دو مرحله‌ای مشخص گردیدند. در جدول شماره www.SID.ir

لنزومتری، رتینوسکوپی، ساچکتیو و کاور تست توسط اپتومتریست انجام می‌گرفت. در مرحله پایانی برای تعیین عیوب انکساری در دانشآموزان ابتدایی و راهنمایی اتوریفرکتومتری با چکاندن قطره سیکلولپنتولات ۱درصد (۳ بار به فاصله ۵ دقیقه) و ریفرکشن پس از ۴۵ دقیقه انجام گرفت و برای هر چشم ۵ بار نتیجه اندازه‌گیری و میانگین آن ثبت شد. پس از تمام معاینات دانشآموزانی که حدت بینایی اصلاح شده آن‌ها بدتر یا مساوی ۲۰/۴۰ بود جهت تعیین و یا شناسایی اختلال بینایی به چشم پزشک ارجاع داده می‌شدند.

تعاریف

در این مطالعه برای تعیین عیوب انکساری در دانشآموزان ابتدایی و راهنمایی از رفرکشن سیکلولپلزیک و دانشآموزان دبیرستان رفرکشن غیر سیکلولپلزیک استفاده گردید. جهت بررسی مقایسه صحیح و منطقی با سایر مطالعاتی که پروتکل دانشآموزان میوپی معادل اسفریک مساوی یا کمتر از ۰/۵- دیوپتر در نظر گرفته شد. در دانشآموزان ابتدایی و راهنمایی که از رفرکشن سیکلولپلزیک استفاده شده بود هایپرولیپی معادل اسفریک مساوی و یا بیشتر از +۲ دیوپتر در نظر گرفته شد و در دانشآموزان دبیرستان بر اساس رفرکشن غیرسیکلولپلزیک هایپرولیپی را ۰/۵ دیوپتر یا بیشتر مدنظر قرار گرفت. آنیزومتروپیا اختلاف معادل اسفریک بین دو چشم ۱ دیوپتر یا بیشتر در نظر گرفته شد. معیار آمبیلیپی در این مطالعه حدت بینایی تصحیح شده ۲۰/۳۰ یا کمتر در یک چشم یا اختلاف بیش از دو ردیف حروف چارت بینایی دید تصحیح شده بین دو چشم بدون وجود پاتولوژی بود. همچنین در این مطالعه اختلال بینایی مانند سایر مطالعات دید اصلاح شده مساوی یا بدتر از ۲۰/۴۰ در نظر گرفته شد.

تجزیه و تحلیل آماری

در این مطالعه شیوع میوپی (نژدیکبینی)، هایپرولیپی (دوربینی)، آنیزومتروپی، آمبیلیپی (تبالی چشم) و استرابیسموس (انحراف آشکار) بصورت درصد به همراه ۹۵٪ فاصله اطمینان نشان داده شد. برای محاسبه فواصل اطمینان ۹۵٪ اثر نمونه‌گیری خوش‌های (design effect) در نظر گرفته شد و نتایج تطبیق داده شد. پس از گزارشات توصیفی رابطه نژدیک بینی، دوربینی، آنیزومتروپی، آمبیلیپی و استрабیسموس با متغیرهایی مثل سن و جنس بوسیله رگرسیون لجستیک چند گانه مورد بررسی قرار گرفت. جهت

کار نژدیک در دانش آموزان بود.

معاینات

پس از انجام مصاحبه دانشآموز وارد اطاق معاینه شده و توسط اپراتور مجرب برای وی با اتوریفرکتومتر TOPCON RM8800 (Topcon Corporation, Tokyo, Japan) اتوریفرکشن غیر سیکلولپلزیک (هر چشم ۵ بار) صورت می‌گرفت و نتیجه حاصله در پرونده دانشآموزان ثبت می‌شد. در مرحله بعدی اگر دانشآموز دارای عینک بود ابتدا تیزبینی با عینک قبلی با استفاده از چارت اسنلن با اپتوتاپ E در فاصله ۶ متری ثبت شده سپس با لنزومتر Topcon LM 800 (Topcon Corporation, Tokyo, Japan) لنزومتری شده و قدرت عینک و زمان تجویز نیز یادداشت می‌گردیدند. سپس برای کلیه دانشآموزان تیزبینی اصلاح نشده تست می‌شد. سپس نتیجه اتو ریفارکتومتری با استفاده از HEINE BETA 200 (HEINE Optotechnic Germany) و جعبه لنز MSD (MSD Meniscus Trial Lenses, Italy) چک Refinement می‌شد برای هر دانشآموز در هر مرحله ابتدا چشم راست و سپس چشم چپ تست می‌گردید. در صورتی که حدت بینایی اصلاح نشده فرد از ۲۰/۲۵ کمتر بود برای دانشآموز تست ساچکتیو انجام گرفته و نتیجه ساچکتیو با بهترین دید پس از اصلاح ثبت می‌شد. کاور تست دور و نژدیک در فواصل ۶ متری و ۵۰ سانتی متری صورت می‌گرفت و نوع فوریا (انحراف پنهان) و استрабیسم (انحراف آشکار) مشخص می‌گردیدند. در صورتی که تیزبینی بدون تصحیح در فاصله دور کمتر از ۲۰/۲۵ بود، کاور تست با بهترین تصحیح انجام می‌شد. برای کنترل تطابق و فیکساسیون یک ردیف بالاتر از تیزبینی چشم ضعیف تر به دانشآموز نشان داده شده و پس از اطمینان از فیکساسیون و باز بودن هر دو چشم، ابتدا چشم راست کاور شده تا هر گونه حرکت جبرانی چشم چپ (استрабیسم) دیده شود. سپس کاور از چشم راست برداشته شده و پس از چند ثانیه صبر این مراحل برای چشم دیگر تکرار می‌شد. انواع مختلف استрабیسم (انحراف آشکار) افقی و عمودی در پرونده دانشآموزان درج می‌شد.

برای تشخیص فوریا از روش کاور تست آلترنیت استفاده می‌شد. مراحل مانند بالا بوده با این تفاوت که بلا فاصله پس از برداشتن کاور تست از چشم راست بر روی چشم چپ قرار داده می‌شد. زمانی که اکلودر از یک چشم به چشم دیگر انتقال می‌یافت حرکت چشم uncover شده بررسی می‌گردید و انواع فوریای افق و عمودی ثبت می‌شدند. کلیه مراحل اتوریفرکتومتری، تست تیزبینی،

جدول شماره ۸- مقایسه نتایج بدست آمده از آمبليوپي و استرائيسموس از ساير مطالعات با مطالعه حاضر

نويسنده	حجم نمونه	سن	آمبليوپي	استرائيسموس
(۴۷) Matsuo	۸۶۵۳۱	۶-۱۲	۰/۱۴	۱/۲۸
(۲۴) Chew	۲۹۲۲۷	۷		۴/۲
(۵۵) Matsuo	۸۴۶۱۹	۶-۱۱	۰/۲۰	۰/۹۹
*(۲۲) MePEDSG	۳۰۰۷	۶-۷۲ ماه	۲/۶	۲/۴
*(۲۲) MePEDSG	۳۰۰۷	۶-۷۲ ماه	۱/۵	۲/۵
(۵۶) Chang	۵۲۳۲	۳-۶	۲/۲	
(۴) Lu	۱۰۸۴	۶-۱۴	۱/۰۲	۲/۴۹
(۱۹) Abolfotouh	۹۷۱		۱/۸۵	
(۲۰) Brown	۴۷۲۱	۴۰-۹۲	۳/۰۶	
(۲۳) Drover	۹۴۶	۴/۲	۴/۷	۳/۴
(۵۷) Williams	۷۸۲۵	۷	۳/۶	۲/۳
(۴۳) Rosman	۱۲۲۵۹۶		۰/۳۵	
(۳) Al Faran	۳۵۲۱		۱/۶	۰/۵
(۵۴) Jamali	۸۱۵	۶	۱/۷	۱/۲
(۵) Sapkota	۴۲۸۲		۱/۸	
(۶) Robaei	۱۷۶۵	۵/۵-۸/۴	۱/۸	
(۴۴) Attebo	۳۶۵۴	<۴۹	۳/۲	
Shiraz	۲۶۸۳	۷-۱۷	۲/۳۱	۱/۸۳


*Multi-ethnic Pediatric Eye Disease Study Group.

ميopic نشان نمی‌دهد. با توجه به شباهت نتایج این مطالعه و مطالعه فتوحی و همکاران و اختلاف با سایر مطالعات در خصوص جنس و ميopic می‌توان نتیجه گرفت که بین جنس و برخی عوامل محیطی و نژادی و بروز ميopic امکان تعامل وجود دارد. در خصوص رابطه سن با ميopic یافته ما مويد سایر مطالعات قبلی است (۶,۷,۹). بدین صورت که با افزایش سن ميopic زیاد می‌شود که مهمترین علت آن مواجهه بالا با مطالعه و کار نزدیک با افزایش سن است.

بر اساس یافته‌های ما شیوع هایپرопی مساوی یا بیشتر از ۲ دیوپتر (۴/۶۴٪) بدست آمد، همانطور که در جدول شماره ۶ نشان داده شده است این مقدار از ۰/۸ در هند تا ۱۶/۶ در دزفول گزارش شده است و مقدار گزارش شده در مطالعه ما نسبتاً مقدار متوسطی است. در خصوص رابطه جنس و هایپرپی در این مطالعه مانند دزفول رابطه‌ای یافت نشد با اینحال در مطالعه هند، چین، (۶) و شیلی (۹) نشان داده شد که هایپرپی در دختران بیشتر است. در خصوص رابطه سن و هایپرپی ما نشان دادیم که هایپرپی با افزایش سن کم می‌شود، این یافته قبلاً توسط برخی مطالعات مثل مطالعه مالزی و نپال (۷,۳۲) تایید شده است که علت اصلی آن می‌تواند پیشرفت مایopic با سن باشد.

سیکلوبلژیک که از سایر مطالعات در گروه سنی ۷ تا ۱۵ سال بر اساس پروتکل RESC انجام شده است در جدول شماره ۶ آمده است. شیوع ميopic در دانش آموزان ما ۴/۸۵٪ است، که در مطالعه صورت گرفته در شهر دزفول ۳/۴٪ گزارش شده است. همانطور که جدول شماره ۶ نشان می‌دهد این مقدار در مقایسه با مقدار RESC گزارش شده در سایر مطالعات انجام گرفته با پروتکل متفاوت است و مقدادر آن از ۰/۳٪ در نپال تا ۳/۲۵٪ در مالزی در دانش آموزان بوسیله سیکلوبلژیک گزارش شده است. البته قابل ذکر است که ميopic در کشورهای آسیای شرقی از میزان بالایی برخوردار است و بدون در نظر گرفتن آسیای شرقی‌ها این مقایسه نتایج بدست آمده از شیوع ميopic در این مطالعه و مطالعه فتوحی و همکاران نشان می‌دهد در دانش آموزان کشور ما شیوع ميopic مقدار متوسطی دارد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شیوع ميopic در پسران و دختران بسیار به هم نزدیک است، با اینکه مطالعات متعددی یافته این مطالعه را تأیید می‌کنند (۷,۹,۱۰,۲۵,۲-۲۷) ولی گزارشاتی حاکی از بیشتر بودن میپاتی در دختران وجود دارد (۶,۲۸,۲۸-۳۲).

مطالعه صورت گرفته در همین زمینه در دانش آموزان شهر دزفول (۱۰) همانند این مطالعه، اختلافی را بین دو جنس از نظر



نمودار شماره ۱- شیوع استرایسموس در گروههای سنی

بطوریکه در جمعیت‌های دانشآموزی که هیچ نوع غربالگری انجام نمی‌شود شیوع تنبیلی ۳٪ و این شیوع در جمعیت‌هایی که غربالگری برای سنین ۵ سال صورت می‌گیرد ۲ درصد و اگر غربالگری در سنین زیر ۳ انجام پذیرد شیوع کمتر از ۱٪ خواهد بود (۲۱،۴۲). همانطور که نشان دادیم شایع‌ترین آمبليوپی در دانشآموزان شیراز از نوع آنایزومتروپی است، این یافته تأیید کننده نتایج مطالعات صورت گرفته قبلی است (۱۶،۴۳،۴۴). توجه به این نکته، ضروری است که تشخیص به موقع این نوع آمبليوپی در سنین پایین سبب جلوگیری از پیشرفت آن با تجویز عینک یا لنز تماسی است. Chen و همکاران در مطالعات خود نشان داده‌اند (۴۵) که اگر تجویز عینک برای افراد آمبليوپی آنایزومتروپیک در سنین ۳ تا ۷ سال صورت گیرد حدت بینایی تا ۴ خط می‌تواند بهبود دهد. با توجه به اینکه مشکلات در افراد آمبليوپی استرایسمیک بیشتر مشاهده شده است باید مشکل آن‌ها که می‌تواند جراحی استرایسم باشد در سنین پایین برطرف شود تا از آمبليوپی‌های شدیدی که می‌تواند موجب کاهش دید شود جلوگیری بعمل آورد.

شیوع استرایسم در مطالعه ما از مقدار متوسطی برخوردار بود، همانطور که جدول شماره ۸ این مقدار را از گزارشات مختلف نشان می‌دهد شیوع آن از ۰/۰۶ تا ۰/۰۷٪ متغیر است. اگر چه ما در این مطالعه نشان دادیم که اگزوتروپیا، مشکل ۱/۱۵٪ دانشآموزان است و ۰/۵۶٪ از دانشآموزان ایزوتروپی دارند، ولی در گزارشات مختلف فرق این دو بسیار متنوع گزارش شده است (۳،۴،۱۹،۲۱،۲۳،۴۶). مثلاً در گزارشی chew و همکاران (۲۶) اگزوتروپیا در دانشآموزان ۷ ساله ۱/۲٪ و ایزوتروپیا ۳٪ نشان داده است، Graham (۴۶) و همکاران نیز شیوع ایزوتروپی را در

در دانشآموزان شیراز شیوع آنایزومتروپی ۲/۵۱٪ بود، همانطور که در جدول شماره ۷ نتایج سایر مطالعات را نشان دادیم این مقدار نسبت به برخی مطالعات در حد متوسطی است، فتوحی و همکاران در مطالعه دزفول این مقدار را از مطالعه ما بیشتر نشان داده است (۱۰). از نظر آنایزومتروپی بین دو جنس همانند برخی مطالعات اختلافی پیدا نکردیم (۳۳،۱۰-۳۵)، ولی طی گزارشی از Quek (۳۶) آنایزومتروپی در مؤنث‌ها البته در سنین بالا بیشتر نشان داده شد. رابطه سن با آنایزومتروپی در مطالعات بسیار وابسته به سن افراد مورد بررسی نشان داده شده است. tong (۳۳) در گزارشی از افراد ۷ تا ۹ ساله رابطه‌ای بین سن و آنایزومتروپی یافت نگردیده است، Dobson (۳۷) هم که افراد ۴ تا ۱۳ را بررسی کرده بود این عدم رابطه را نشان داده است. Yamashita (۳۸) در گزارشی طولی نشان داد که آنایزومتروپی از ۶ تا ۱۱ سال اختلاف معنی‌داری ندارد ولی چند مطالعه با دامنه سنی بالا این رابطه را مستقیم نشان داده‌اند (۳۹-۴۱).

شیوع آمبليوپی در مطالعه ما مشابه گزارشات مطالعات دیگر است. همانطور که در جدول شماره ۸ نشان دادیم از ۰/۰۲ تا ۰/۰۵٪ در گروههای سنی مختلف مشاهده شده است. اختلاف‌های موجود می‌تواند بدلیل گروه سنی مورد بررسی، معیار تشخیصی و حتی افراد معاينه کننده باشد. آمبليوپی با هر مقدار در جوامع باید مورد توجه قرار گیرد. توجه به آمبليوپی در سنین پایین مخصوصاً پیش دبستانی موجب می‌شود تا بتوان از نابینایی‌های یک طرفه در سنین بالا جلوگیری بعمل آورد (۱۴،۴۲). طی سال‌های اخیر با توجه به طرح vision 2020 دانشآموزان غالباً قبل از ورود به مدرسه دانش آمزان از نظر آمبليوپی غربال می‌شوند. بررسی نقش غربالگری صحیح بوسیله برخی مطالعات نشان داده شده است www.sjd.ir

- defaulters of preschool vision screening. *Ophthalmic Epidemiol* 2000; 7: 67-71.
- 22- Prevalence of amblyopia and strabismus in African American and Hispanic children ages 6 to 72 months the multi-ethnic pediatric eye disease study. *Ophthalmology* 2008; 115: 1229-36.
 - 23- Drover JR, Kean PG, Courage ML, Adams RJ. Prevalence of amblyopia and other vision disorders in young Newfoundland and Labrador children. *Can J Ophthalmol* 2008; 43: 89-94.
 - 24- Chew E, Remaley NA, Tamboli A, et al. Risk factors for esotropia and exotropia. *Arch Ophthalmol* 1994; 112: 1349-55.
 - 25- Naidoo KS, Raghunandan A, Mashige KP, et al. Refractive error and visual impairment in African children in South Africa. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2003; 44: 3764-70.
 - 26- Murthy GV, Gupta SK, Ellwein LB, et al. Refractive error in children in an urban population in New Delhi. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2002; 43: 623-31.
 - 27- Fan DS, Lam DS, Lam RF, et al. Prevalence, incidence, and progression of myopia of school children in Hong Kong. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2004; 45: 1071-5.
 - 28- Wedner SH, Ross DA, Todd J, et al. Myopia in secondary school students in Mwanza City, Tanzania: the need for a national screening programme. *Br J Ophthalmol* 2002; 86: 1200-06.
 - 29- Mavracanas TA, Mandatos A, Peios D, et al. Prevalence of myopia in a sample of Greek students. *Acta Ophthalmol Scand* 2000; 78: 656-9.
 - 30- Kleinsteine RN, Jones LA, Hullett S, et al. Refractive error and ethnicity in children. *Arch Ophthalmol* 2003; 121: 1141-7.
 - 31- He M, Zeng J, Liu Y, et al. Refractive error and visual impairment in urban children in southern China. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2004; 45: 793-9.
 - 32- Goh PP, Abqariyah Y, Pokharel GP, Ellwein LB. Refractive error and visual impairment in school-age children in Gombak District, Malaysia. *Ophthalmology* 2005; 112: 678-85.
 - 33- Tong L, Saw SM, Chia KS, Tan D. Anisometropia in Singapore school children. *Am J Ophthalmol* 2004; 137: 474-9.
 - 34- Shih YF, Hsiao CH, Wen SH, et al. Prevalence of anisometropia in Taiwanese schoolchildren. *J Formos Med Assoc* 2005; 104: 412-17.
 - 35- Huynh SC, Wang XY, Ip J, et al. Prevalence and associations of anisometropia and aniso-astigmatism in a population based sample of 6 year old children. *Br J Ophthalmol* 2006; 90: 597-601.
 - 36- Quek TP, Chua CG, Chong CS, et al. Prevalence of refractive errors in teenage high school students in Singapore. *Ophthalmic Physiol Opt* 2004; 24: 47-55.
 - 37- Dobson V, Harvey EM, Miller JM, Clifford-Donaldson CE. Anisometropia prevalence in a highly astigmatic school-aged population. *Optom Vis Sci* 2008; 85: 512-19.
 - 38- Yamashita T, Watanabe S, Ohba N. A longitudinal study of cycloplegic refraction in a cohort of 350 Japanese schoolchildren. *Anisometropia*. *Ophthalmic Physiol Opt* 1999; 19: 30-33.
 - 39- Woodruff ME, Samek MJ. A study of the prevalence of spherical equivalent refractive states and anisometropia in Amerind populations in Ontario. *Can J Public Health* 1977; 68: 414-24.
 - 40- Wedale RA. On the age-related prevalence of anisometropia. *Ophthalmic Res* 2002; 34: 389-92.
 - 41- Guzowski M, Fraser-Bell S, Rochtchina E, Wang JJ, Mitchell P. Asymmetric refraction in an older population: the Blue Mountains Eye Study. *Am J Ophthalmol* 2003; 136: 551-3.
 - 42- Williams C, Northstone K, Harrad RA, Sparrow JM, Harvey I. Amblyopia treatment outcomes after screening before or at age 3 years: follow up from randomised trial. *BMJ* 2002; 324: 1549.
 - 43- Rosman M, Wong TY, Koh CL, Tan DT. Prevalence and causes of amblyopia in a population-based study of young adult men in Singapore. *Am J Ophthalmol* 2005; 140: 551-2.
 - 44- Attebo K, Mitchell P, Cumming R, et al. Prevalence and causes of amblyopia in an adult population. *Ophthalmology* 1998; 105: 154-9.
 - 45- Chen PL, Chen JT, Tai MC, et al. Anisotropic amblyopia treated with spectacle correction alone: possible factors predicting success and time to start patching. *Am J Ophthalmol* 2007; 143: 54-60.
 - 46- Graham PA. Epidemiology of strabismus. *Br J Ophthalmol* 1974; 58: 224-31.
 - 47- Matsuo T, Matsuo C. The prevalence of strabismus and amblyopia in Japanese elementary school children. *Ophthalmic Epidemiol* 2005; 12: 31-36.
 - 48- Matsuo T, Matsuo C, Matsuoka H, Kio K. Detection of strabismus and amblyopia in 1.5- and 3-year-old children by a preschool vision-screening program in Japan. *Acta Med Okayama* 2007; 61: 9-16.
 - 49- Greenberg AE, Mohney BG, Diehl NN, Burke JP. Incidence and types of childhood esotropia: a population-based study. *Ophthalmology* 2007; 114: 170-174.
 - 50- Govindan M, Mohney BG, Diehl NN, Burke JP. Incidence and types of childhood exotropia: a population-based study. *Ophthalmology* 2005; 112: 104-8.
 - 51- Ostadi Moghaddam H, Fotouhi A, Khabazkhoob M, Heravian i, Yekta AA. Prevalence and Risk Factors of Refractive Errors among schoolchildren in Mashhad, 2006-2007. *Iranian Journal of Ophthalmology* 2008; 20: 3-9.
 - 52- He MG, Lin Z, Huang J, et al. [Population-based survey of refractive error in school-aged children in Liwan District, Guangzhou]. *Zhonghua Yan Ke Za Zhi* 2008; 44: 491-496.
 - 53- Khandekar RB, bdu-Helmi S. Magnitude and determinants of refractive error in Omani school children. *Saudi Med J* 2004; 25: 1388-93.
 - 54- Jamali P, Fotouhi A, Hashemi H, Younesian M, Jafari A. Refractive errors and amblyopia in children entering school: Shahrood, Iran. *Optom Vis Sci* 2009; 86: 364-9.
 - 55- Matsuo T, Matsuo C. Comparison of prevalence rates of strabismus and amblyopia in Japanese elementary school children between the years 2003 and 2005. *Acta Med Okayama* 2007; 61: 329-34.
 - 56- Chang CH, Tsai RK, Sheu MM. Screening amblyopia of preschool children with uncorrected vision and stereopsis tests in Eastern Taiwan. *Eye (Lond)* 2007; 21: 1482-88.
 - 57- Williams C, Northstone K, Howard M, et al. Prevalence and risk factors for common vision problems in children: data from the ALSPAC study. *Br J Ophthalmol* 2008; 92: 959-64.