



# ارائه یک روش جدید برای آنالیز مقاومت پاسخ بازیهای با مقادیر سود تقریبی

گلاره ویسی<sup>۱</sup>، رجب اصغریان قنادیزدی<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی دکترای کنترل، گروه برق، دانشگاه فردوسی، gveis@gmail.com

<sup>۲</sup> استاد، دانشکده مهندسی، گروه برق، دانشگاه فردوسی، rajaab.asgharian@gmail.com

(تاریخ دریافت مقاله ۱۳۹۱/۳/۷، تاریخ پذیرش مقاله ۱۳۹۱/۶/۱۵)

**چکیده:** معمولاً هنگام استفاده از تئوری بازیها برای حل مسائل تصمیم‌گیری دنیای واقعی، مقادیر سود بازیها با تقریب و عدم قطعیت همراه هستند. اما بررسی مراجع نشان می‌دهد که تا کنون کار چندانی در زمینه آنالیز مقاومت پاسخ بازیهای با سود تقریبی و مشاهده رفتار این پاسخها در حضور عدم قطعیت انجام نشده است. در این مقاله دو معیار ساده برای ارزیابی مقاومت نقاط نش ارائه خواهیم داد. با استفاده از این معیارها، می‌توان رفتار نقاط نش یک بازی در حضور عدم قطعیت را با هم مقایسه کرده و پاسخهای را که مقاوم‌تر هستند، انتخاب کرد. هم‌چنین در این مقاله دو روش جدید برای ارزیابی مقاومت نقاط تعادل همبسته پیشنهاد می‌دهیم. روش اول، یک معیار کمی برای محاسبه میزان مقاومت نقاط همبسته بوده و روش دوم، معیاری برای مقایسه این پاسخها و رتبه‌بندی آنها به شمار می‌رود. به علاوه در این مقاله روشی برای بهبود مقاومت نقاط نش ارائه خواهد شد. روش پیشنهادی، در یک همسایگی حول نقاط نش به دنبال پاسخهای تقریبی با مقاومت بیشتری گردد. هم‌چنین پیشنهاد می‌دهیم که اگر تصمیم‌گیرنده از میزان مقاومت پاسخهای نش یک بازی راضی نباشد، ممکن است بتواند در مجموعه نقاط همبسته، پاسخهای مقاوم‌تر پیدا کند. به کمک چند مثال عددی، کارایی و اعتبار روش‌های پیشنهادی ارزیابی خواهد شد.

**کلمات کلیدی:** تئوری بازیها، نقطه تعادل نش مقاوم، نقطه تعادل همبسته مقاوم، آنالیز مقاومت، عدم قطعیت مقادیر سود بازیها

## A Novel Approach to Robustness Analysis for the Solutions of the Games with Approximate Payoffs

Gelareh Veisi, Rajab Asgharian

**Abstract:** When using game theory for modeling real-world problems, players' payoffs are usually known approximately. Literature reveals that some authors have modeled the approximate payoffs using stochastic or fuzzy variables and some others have used robust optimization techniques to solve these games. Surprisingly little work has been done on robustness analysis of real-world's games solutions.

In this paper, we propose two simple and practical measures to assess robustness degrees of Nash equilibria. These measures quantitatively show how Nash points behave in the presence of uncertainty and they can be used as refinements of Nash equilibrium. Also we propose two novel approaches to assess robustness degrees of correlated equilibria. One approach is a quantitative way to calculate robustness degrees and the other is a comparative measure to rank correlated equilibria in order of their robustness. We suggest that the decision maker may be able to find more robust solutions in the set of non-Nash correlated equilibria. Moreover, we present a method to improve robustness of Nash points. The improvement algorithm searches for more robust solutions in a neighborhood around a Nash point. We validate our methods with some numerical examples. The examples verify the efficiency of the methods.

**Keywords:** game theory, robust Nash point, robust correlated equilibrium, robustness analysis, payoff uncertainty

است.  $X_2^*$  را از مجموعه نقاط نش حذف کند. یعنی  $X_2^*$  نسبت به تغییرات مقادیر سود بازی بسیار حساس می‌باشد. بنابراین در حضور عدم قطعیت، انتخاب  $X_1^*$  بسیار عاقلانه‌تر خواهد بود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این مثال به سادگی می‌توان میزان مقاومت پاسخهای بازی را با یکدیگر مقایسه کرده و تصمیم نهایی را انتخاب نمود. اما آنالیز مقاومت پاسخهای همه بازیها به این سادگی نیست. این مثال از مرجع [۴] گرفته شده است. در مقاله مذکور، نویسنده‌گان نتیجه گرفته‌اند که  $X_1^*$  می‌تواند هر تغییراتی کوچکتر یا مساوی ۱ را در هر دو جهت حول مقادیر سود نامی تحمل کرده و نقطه نش باقی بماند. هم‌چنین، مطابق تعریف این مرجع،  $X_2^*$  یک نقطه تعادل نش مقاوم محسوب نمی‌شود. نویسنده‌گان این مقاله، نقاط تعادل نش مقاوم را به صورت نقاط تعادلی که با تغییر مقادیر سود بازی، ثابت می‌مانند، تعریف می‌کنند. اما با در نظر گرفتن این تعریف، بسیاری از بازیها، نقطه تعادل نش مقاوم ندارند. در چنین شرایطی، به معیاری احتیاج داریم که بتواند مقاومت پاسخهای یک بازی را با یکدیگر مقایسه کرده و از بین نقاط تعادل غیر مقاوم، گزینه‌های قابل اعتمادتر را انتخاب کنند. لذا در این مقاله، معیارهای ساده و کاربردی، برای ارزیابی میزان مقاومت نقاط تعادل نش، بدون پیچیدگی زیاد محاسباتی ارائه خواهد شد. با استفاده از این معیارها می‌توان رفتار نقاط نش یک بازی در حضور عدم قطعیت را با هم مقایسه کرده و پاسخهای را که نسبت به تغییرات مقادیر سود بازی مقاوم‌تر هستند، انتخاب کرد. بنابراین، معیارهای پیشنهادی، راهکاری نیز برای برخورد با مسئله وجود چند نقطه تعادل نش در یک بازی به شمار می‌روند. یعنی به کمک این معیارها، می‌توان یک پاسخ را از بین چند نقطه تعادل نش، انتخاب کرد. هم‌چنین در این مقاله، دو روش جدید برای ارزیابی مقاومت نقاط تعادل همبسته پیشنهاد می‌دهیم. نقاط تعادل همبسته، همان عقلاییت نقاط نش را داشته و حتی ممکن است در بعضی از مسائل با در نظر گرفتن سود بازیکنان، راهکارهای بهتری را ارائه دهند. اما بررسی مراجع نشان می‌دهد که تا کنون توجه کافی به مقاومیت و کاربردهای نقاط همبسته نشده و بهویژه در زمینه مفهوم تعادل همبسته برای بازیهای با مقادیر سود تقریبی، کاری انجام نشده است. در هر یک از معیارها، تعاریف مناسبی را برای نقاط تعادل مقاوم پیشنهاد می‌دهیم. این تعاریف با توجه به نیازهای مسائل دنیا واقعی، ارائه شده و قبلًا در مراجع به آنها پرداخته نشده است. علاوه بر اینها، دو روش نیز برای بهبود مقاومت نقاط نش ارائه خواهد شد. از تمام روشهای پیشنهادی می‌توان به سادگی برای بازیهای با ابعاد بالا نیز استفاده نمود. هم‌چنین از معیارهای ارائه شده در این مقاله می‌توان برای مدل‌های تئوری بازیها در مسائل مختلف دنیا واقعی، استفاده کرد. به کمک چند مثال عددی، کارایی و اعتبار روشهای پیشنهادی، ارزیابی خواهد شد.

## ۱- مقدمه

نظریه بازیها تاکنون برای مدل‌سازی و تصمیم‌گیری در بسیاری از مسائل دنیا واقعی مورد استفاده قرار گرفته است [۳-۱]. اما مشکل اینجاست که در مسائل دنیا واقعی، اغلب به مدل‌های بازیهای با اطلاعات ناقص برخورد می‌کنیم. یعنی بازیهایی که در آنها بازیکنان اطلاعات کاملی راجع به اجزای بازی نداشته و یا اطلاعات بازی بین همه بازیکنان مشترک نمی‌باشد. بازیهای با اطلاعات ناقص، فرض اصلی بازیهای کلاسیک را نقض می‌کنند. در نظریه کلاسیک بازیها، فرض بر آن است که بازیکنان، استراتژیهای آنها و مقادیر سودشان کاملاً معلوم بوده و این اطلاعات، در اختیار همه بازیکنان قرار دارد. به همین دلیل، هنگام استفاده از تئوری بازیها برای مسائل دنیا واقعی، باید راهکار مناسب و متفاوتی را اتخاذ کرد.

یکی از انواع بازیهای با اطلاعات ناقص، بازیهایی هستند که در آنها بازیکنان از مقادیر سود خود و حریفان مطمئن نمی‌باشند. این بازیها را بازیهای با مقادیر سود تقریبی می‌نامیم. در این بازیها، مقادیر سود بازی با تقریب و عدم قطعیت همراه بوده و این اطلاعات، بین همه بازیکنان مشترک است. یعنی بازیکنان، اطلاعات خصوصی راجع به اجزای بازی ندارند. این عدم قطعیت ممکن است به دلایل مختلف مانند عدم وجود اطلاعات کافی یا صحیح و یا گرد کردن مقادیر پارامترها اتفاق یافته. به عنوان مثال، بازی ماتریسی  $2 \times 2$ ، با مقادیر سود مذکور در جدول ۱ را در نظر بگیرید.

جدول ۱: مقادیر نامی ماتریس‌های سود بازی

		بازیکن دوم	
بازیکن اول		$S_{21}$	$S_{22}$
بازیکن اول	$S_{11}$	۲،۲	۰،۰
	$S_{12}$	۰،۰	۰،۰

در جدول فوق،  $S_{ij}$  به استراتژی  $i$  از بازیکن ۱ و  $j$  از شاره می‌کند. هم‌چنین در خانه‌های جدول، عدد اول، سود بازیکن اول و عدد دوم، سود بازیکن دوم می‌باشد. این بازی، دو نقطه تعادل نش خالص دارد:  $X_1^* = [(1, 0), (0, 1)]$  و  $X_2^* = [(0, 1), (1, 0)]$ . حال فرض کنید که مقادیر سود بازی با عدم قطعیت همراه بوده و ممکن است هر مقادیر را در یک بازه حول مقادیر نامی مذکور اختیار کنند. این بازه‌ها در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲: بازه‌های ممکن برای مقادیر سود بازی

		$S_{21}$	$S_{22}$
بازیکن اول		$S_{11}$	$S_{12}$
		[۱۳]، [۱۳]	[-۰۵، ۰۵]
		[-۰۵، ۰۵]	[-۰۵، ۰۵]

با در نظر گرفتن این بازه‌ها، واضح است که  $X_1^*$ ، نقطه تعادل نش تمام تحقیقاتی ممکن بازی محسوب می‌شود. یعنی  $X_1^*$ ، نسبت به تغییرات مقادیر سود بازی مقاوم بوده و در حضور عدم قطعیت نیز خواص خود را حفظ می‌کند. اما برخی تغییرات اندک در مقادیر سود بازی، ممکن

اعتمادتر را انتخاب کند. از طرفی در مسائل دنیای واقعی، ممکن است با نوع دیگری از بازیهای با اطلاعات ناقص مواجه شویم که نمی‌توان آنها را به کمک مدل‌های بازیهای بیزین توصیف کرد. بازیهای با مقادیر سود تقریبی از جمله این بازیها هستند.

در مدل‌های بازیهای با مقادیر سود تقریبی، بازیکنان اطلاعات خصوصی راجع به اجزای بازی نداشته و توزیع احتمالاتی پارامترهای غیر قطعی مسئله را نیز نمی‌دانند. به علاوه در بازیهای با مقادیر سود تقریبی، اغلب احتمال وقوع تمام حالات ممکن یکسان بوده و هیچ کدام به سمت صفر میل نمی‌کند. بررسی مراجع نشان می‌دهد که برای حل بازیهای با مقادیر سود تقریبی، بسیاری از مقالات از روشهای مبتنی بر بهینه‌سازی مقاوم، استفاده کرده‌اند [۱۲-۱۷]. به عنوان مثال، هیاشی<sup>۴</sup> این پیشنهاد را مطرح کرد که هر بازیکن، باید به صورت بدینانه مقادیر ممکن سود خود را در نظر بگیرد [۱۳]. هیاشی، عدم قطعیت سود و استراتژیهای بازیکنان را در نظر گرفته و نقطه تعادل نش بازیهای نامتفاوت دو نفره را با روش مبتنی بر بهینه‌سازی مقاوم و با در نظر گرفتن بدترین حالت، بدست آورد. در سال ۲۰۰۹، همین روش، برای محاسبه نقاط نش بازیهای چند نفره غیرهمکارانه، تعمیم داده شد [۱۴]. در این مقاله نیز عدم قطعیت در مقادیر سود و استراتژیهای بازیکنان لحظه شده بود. در سال ۲۰۰۶، روشی بسیار بدینانه‌تر از روش هیاشی پیشنهاد داده شد [۱۷]. هم‌چنین از روشهای مبتنی بر کنترل مقاوم، برای حل انواعی از بازیها در حضور عدم قطعیت استفاده شده است [۱۸]. برخلاف بازیهای بیزین، در مورد تعریف نقطه نش مقاوم برای بازیهای با مقادیر سود تقریبی، کار قابل توجهی انجام نشده است. در سال ۲۰۰۷، تعریفی برای نقطه تعادل نش مقاوم در بازیهای با مقادیر سود تقریبی ارائه شد. طبق این تعریف، نقاط نش مقاوم، نقاط تعادلی هستند که با تغییر مقادیر سود بازی، ثابت می‌مانند. اما با در نظر گرفتن این تعریف، بسیاری از بازیها نقطه تعادل نش مقاوم نخواهند داشت [۱۹].

به طور خلاصه، مروج مراجع نشان می‌دهد که در زمینه بازیهای با مقادیر سود تقریبی، اصطلاح "نقطه تعادل مقاوم"، اغلب در مواردی استفاده شده که بازیکنان از روشهای بهینه‌سازی مقاوم برای اتخاذ استراتژیهای خود استفاده می‌کنند و به ندرت بحث آنالیز مقاومت پاسخهای این بازیها، مورد توجه قرار گرفته است. روشهای بهینه‌سازی مقاوم، یک راهکار عملی را برای حل بازیهای با مقادیر سود تقریبی ارائه می‌دهند. اما پس از محاسبه پاسخهای یک بازی، به هر روش، من جمله روشهای مبتنی بر بهینه‌سازی مقاوم، این سوال مطرح می‌شود که کدام-یک از پاسخهای بدست آمده، در حضور عدم قطعیت و در مواجهه با تحقیقهای مختلف بازی، این‌تر و مقاوم‌تر بوده و بخش عمده خواص خود را حفظ می‌کنند. این مقاله، پاسخی به همین سوال محسوب می‌شود.

## ۲- مروجی بر کارهای انجام شده

در این بخش مروجی اجمالی بر کارهای انجام گرفته در زمینه بازیهای با اطلاعات ناقص ارائه می‌شود. با بررسی مراجع، انگیزه و جایگاه کار این مقاله نیز مشخص خواهد شد. در سال ۱۹۶۷، هاریزانی<sup>۱</sup> مدلی را برای یک کلاس از بازیهای با اطلاعات ناقص ارائه داد [۷]. در این بازیها که بازیهای بیزین نامیده می‌شوند، بازیکنان اطلاعات کاملی راجع به مقادیر سود و استراتژیهای حریفان خود ندارند. در واقع، هر بازیکن یکسری اطلاعات خصوصی راجع به اجزای بازی دارد. هاریزانی برای بیان این اطلاعات خصوصی، مفهوم " نوع" را برای هر بازیکن مطرح کرد. هر بازیکن، هنگام انتخاب استراتژیش نمی‌داند که با چه " نوعی" از حریفان روبرو خواهد شد، اما اطلاعاتی راجع به توزیع احتمالاتی انواع ممکن بازیکنان در اختیار خواهد داشت [۵، ۶]. کارهای زیادی در زمینه بازیهای بیزین و ارائه مفاهیم پاسخ برای آنها انجام شده است. در چند مقاله به مفهوم نقطه تعادل بازیهای بیزین در صورت عدم وجود توزیع احتمالاتی، پرداخته شده که نقطه تعادل به وقوع پیوسته<sup>۲</sup> یکی از معروف‌ترین آنها به شمار می‌رود [۷]. اما مشکل اینجاست که شرط وجود این تعادل، بسیار قوی بوده و اکثر بازیهای بیزین چنین پاسخی ندارند. علاوه بر اینها، از حدود سال ۱۹۸۰، کارهای متنوعی برای تعریف نقاط تعادل مقاوم در بازیهای بیزین انجام شده است [۸-۱۱]. به عنوان مثال می‌توان به مقاله‌ای در سال ۱۹۸۸، اشاره کرد [۸]. در این مقاله، نویسنده‌گان عدم قطعیت در مقادیر سود بازی، استراتژیهای بازیکنان و یا اطلاعات خصوصی هر بازیکن را در نظر گرفته و تعاریفی را برای نقطه تعادل نش مقاوم، پیشنهاد دادند. در مدل این مقاله، هر تغییری ممکن است در شرایط نامی یک بازی، شامل مقادیر سود و استراتژیهای بازیکنان، اتفاق یافتد، ولی احتمال این تغییرات، بسیار کم بوده و به سمت صفر میل می‌کند [۸]. پس از این مقاله، در سال ۱۹۹۰، مفاهیم دیگری برای مقاومت نقطه تعادل در بازیهای بیزین، مورد بررسی قرار گرفت [۹]. در سال ۱۹۹۷ نیز، کاجی و موریس<sup>۳</sup>، تعریف دیگری را برای نقطه تعادل نش مقاوم در مدل‌های بازی بیزین ارائه دادند [۱۱]. هم‌چنین در سال ۲۰۰۵، رفتار پاسخ بازیهای با اطلاعات کامل، وقتی شرط مشترک بودن همه اطلاعات بازی حذف شود، مورد مطالعه قرار گرفت [۱۱]. به طور خلاصه، مروج مراجع نشان می‌دهد که تا کنون در مورد آنالیز مقاومت نقاط تعادل بازیهای بیزین، کارهای متفاوتی انجام گرفته است. مراجع مختلف، عدم قطعیت را در مقادیر سود بازی، استراتژیهای بازیکنان و یا باورهای مشترک اولیه آنها در نظر گرفته و تعاریفی را برای نقطه تعادل نش مقاوم در حضور این عدم قطعیتها ارائه داده‌اند. اما با در نظر گرفتن این تعاریف، بسیاری از بازیها، نقطه تعادل نش مقاوم ندارند. در این صورت، به معیاری احتیاج داریم که بتواند مقاومت پاسخهای یک بازی را با یکدیگر مقایسه کرده و از بین نقاط تعادل غیر مقاوم، گزینه‌های قابل

<sup>1</sup>. Harasanyi

<sup>2</sup>. Ex- post

<sup>3</sup>. Kaji and Morris

<sup>4</sup>. Hayashi

در سال ۱۹۹۱، مک کلوی<sup>۱</sup>، نشان داد که نقاط تعادل نش یک بازی نرمال، ریشه‌های یک تابع حقیقی به فرم  $R \rightarrow \Sigma \rightarrow v$  هستند که تابع لیپانوف نش نامیده می‌شود<sup>[۱۹]</sup>. این تابع به صورت زیر تعریف می‌شود

: [۲۱-۱۹]

$$v(\sigma) = \sum_{i \in N} \sum_{1 \leq j \leq k_i} g_{ij}(\sigma) \quad (7)$$

که در آن  $(\sigma)_{ij}$  عبارت است از:

$$g_{ij}(\sigma) = \{\max[\pi_i(s_{ij}, \sigma_{-i}) - \pi_i(\sigma), 0]\}^2 \quad (8)$$

مک کلوی نشان داد که تابع لیپانوف نش به ازای همه مقادیر  $\sigma \in \Sigma$ ، پیوسته، مشتق پذیر و بزرگتر یا مساوی صفر است. به علاوه وی ثابت کرد که ریشه‌های این تابع، یعنی مینیمم‌های سراسری آن، نقاط تعادل نش بازی منتظر هستند<sup>[۱۹]</sup>.

### ۱-۳ نقاط تعادل هم‌بسته

نقشه تعادل هم‌بسته، یک توزیع احتمالاتی روی تمام ترکیب‌های ممکن استراتژی‌های خالص بازی بوده و شرط تعادل ضعیف‌تری را نسبت به نش برآورده می‌کند<sup>[۳، ۲۲، ۲۳]</sup>. فرض کنید که  $S$ ، فضای استراتژی  $S$  تعداد اعضای آن باشد. برداری با ابعاد  $D_S = \prod_i k_i$  به فرم

$\mu = (\mu_1, \dots, \mu_{D_S})$ ، اگر در روابط (۹) و (۱۰) صدق کند، یک

توزیع احتمالاتی روی  $S$  محاسبه شده.

$$\mu_l \geq 0, \quad l = 1, \dots, D_S \quad (9)$$

$$\sum_{l=1}^{D_S} \mu_l = 1 \quad (10)$$

در روابط فوق،  $\mu_l$ ، احتمال بازی کردن  $i$  امین ترکیب استراتژی توسط بازیکنان بازی را نشان می‌دهد. یک توزیع احتمالاتی روی فضای استراتژی، مانند  $\mu$ ، نقطه تعادل هم‌بسته محاسبه می‌شود، اگر و فقط اگر برای هر بازیکن  $i \in N$  و هر  $s = (s_i, s_{-i}) \in S$ ، رابطه زیر برقرار باشد<sup>[۲۲-۲۴]</sup>:

(۱۱)

$$\sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \mu(s_i, s_{-i}) \pi_i(s_i, s_{-i}) \geq \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \mu(s_i, s'_{-i}) \pi_i(s'_i, s_{-i}) \quad \text{for all } s'_i \in S_i$$

رابطه (۱۱) را می‌توان به صورت زیر نیز در نظر گرفت:

(۱۲)

$$\sum_{s_{-i} \in S_{-i}} ((\pi_i(s_i, s_{-i}) - \pi_i(s'_i, s_{-i})) \mu(s_i, s_{-i})) \geq 0 \quad \text{for all } s'_i \in S_i$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، شرط فوق باید برای تمام گزینه‌های دیگری که در اختیار بازیکن ۱ ام قرار دارد، یعنی  $s_i'$ ، برقرار باشد. با توجه به محدودیت نامساویهای فوق، در نقطه تعادل هم‌بسته هیچ یک از بازیکنان تمایلی برای تغییر استراتژی خود نخواهد داشت. در نقاط تعادل نش، این احتمالات، حاصل ضرب مقادیر مستقلی برای هر بازیکن بوده و رابطه  $\mu(s_{-i}) \mu(s_i) = \mu(s_i, s_{-i})$  برقرار می‌باشد. به بیان دیگر، نش

### ۳- مبانی تئوری مورد استفاده در مقاله

برای توصیف یک بازی ایستای  $n$  نفره به فرم نرمال باید موارد زیر را مشخص کرد<sup>[۱]</sup>:

الف) مجموعه بازیکنان

$$N = \{1, 2, \dots, n\} \quad (1)$$

ب) مجموعه استراتژیهای خالص برای هر بازیکن

$$S_i = \{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{ik_i}\} \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

که  $S_i$  مجموعه استراتژیهای بازیکن  $i$  ام بوده و  $k_i$  تعداد استراتژیهای خالص این بازیکن را نشان می‌دهد.

ج) سود هریک از بازیکنان به ازای تمام ترکیب‌های ممکن استراتژیهای خالص اتخاذ شده توسط آنها:

$$\pi_i: S \rightarrow R \quad \text{where } S = \prod_{i \in N} S_i \quad i = 1, \dots, n \quad (3)$$

در رابطه فوق،  $S$  مجموعه تمام ترکیب‌های ممکن استراتژی‌های بازیکنان بوده و فضای استراتژی نامیده می‌شود.  $\pi_i$  نیز سود بازیکن  $i$  ام را نشان می‌دهد. برای بازیکن  $i$  ام، مجموعه استراتژیهای مختلط عبارت است از:

$$\Sigma_i = \{\sigma_i = (p_{i1}, \dots, p_{ik_i}): \sum_j p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0\} \quad (4)$$

درایه‌های بردار  $\sigma_i$ ، توابعی حقیقی مقدار روی  $i$  هستند که باید شرایط فوق را برآورده کنند. هم‌چنین  $p_{ij}$  به  $p_i(s_{ij})$  اشاره کرده و احتمال انتخاب استراتژی  $j$  توسط بازیکن  $i$  ام را نشان می‌دهد.

حال فرض کنید که  $\Sigma = \prod_{i \in N} \Sigma_i$  بوده و  $K = \sum_{i \in N} k_i$  در

نظر گرفته شود. المانهای  $\Sigma$ ، ترکیب‌های مختلف استراتژیهای خالص و مختلط همه بازیکنان و به فرم  $(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \sigma$  هستند که  $\sigma_i \in \Sigma_i$  بوده و مطابق رابطه (۴) می‌باشد. بنابراین  $\Sigma$ ، زیرمجموعه‌ای از  $R^K$  خواهد بود. در این حالت پیامد انتظاری بازیکن  $i$  ام، از رابطه زیر بدست می‌آید:

(۵)

$$\pi(\sigma_i, \sigma_{-i}) = \sum_{s_1 \in S_1} \dots \sum_{s_n \in S_n} p_1(s_1) \dots p_n(s_n) \pi_i(s_1, \dots, s_n)$$

طبق تعریف، بردار  $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*) \in \Sigma$  یک نقطه تعادل

نش است، اگر و فقط اگر برای هر بازیکن  $i \in N$  و تمام مقادیر  $\Sigma_i$ ، رابطه (۶) برقرار باشد:

$$\pi_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) \leq \pi_i(\sigma^*) \quad (6)$$

در این رابطه،  $(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)$  نشان‌دهنده موقعیتی است که بازیکن  $i$  ام

استراتژی دلخواه  $\sigma_i$  را بازی کرده و بقیه بازیکنان استراتژیهای مشخص شده در نقطه تعادل نش را بازی می‌کنند. نقطه تعادل نش، یکی از پرکاربردترین مفاهیم پاسخ برای موقعیتهای تصمیم‌گیری تعاملی به شمار می‌رود. در نقطه نش، هیچ از بازیکنان با در نظر گرفتن اینکه سایر حریفان استراتژی‌های نش خود را بازی می‌کنند؛ تمایلی برای تغییر استراتژیهای خود نخواهد داشت.

<sup>1</sup>. Mckelvey

البته اگر تولید نمونه‌ها، به صورت کاملاً تصادفی انجام شود، احتمال اینکه فضای خوبی پوشش داده نشده و نمونه‌ها در خوش‌های متوجه شوند، زیاد خواهد بود [۲۵، ۲۶]. لذا در این مقاله از روش نمونه‌برداری لاتین هایپرکیوب<sup>۱</sup> استفاده خواهیم کرد که تا حدودی این مشکل را برطرف کرده و فضای مسئله را به طور مناسب پوشش می‌دهد. در این روش، بازه تغییرات هر پارامتر غیرقطعی به  $n$  قسمت افزایش شده و از هر قسمت فقط یک نمونه، به طور تصادفی انتخاب می‌گردد. سپس نمونه‌های انتخابی برای هریک از پارامترها، به صورت تصادفی و بدون جایگزینی با هم جوړ شده و یک مجموعه شامل  $n$  نمونه برای مقادیر غیرقطعی تولید می‌گردد [۲۸]. اگر نمونه‌های پارامترهای غیرقطعی در آنالیز مقاومت، با استفاده از روش لاتین هایپرکیوب تولید شوند، جوابهای بدست آمده، قابل اعتمادتر خواهند بود [۲۵، ۲۶]. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هرچه تعداد نمونه‌ها بیشتر باشد، پیچیدگی محاسباتی روش بیشتر شده ولی صحبت نتایج، افزایش خواهد یافت.

#### ۱-۴- معیار اول

ابتدا باید تعریف خود را برای اصطلاح "نش تقریبی" ارائه دهیم: این تعریف بر مبنای تعریف مشابهی برای تقریب نقطه ثابت، ارائه شده است.

**تعریف ۱:** فرض کنید که  $X^* \in \Sigma$ ، یک نقطه تعادل نش خالص با مختلط برای بازی ماتریسی  $G$  باشد. استراتژی خالص یا مختلط  $X' \in \Sigma$ ، یک تقریب  $\epsilon$  قوی برای  $X^*$  نامیده می‌شود اگر و فقط اگر  $\|X^* - X'\| < \epsilon$

**تعریف ۲:** بازی ماتریسی  $G$  با تابع لیپانوف  $R: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$  را در نظر بگیرید. اگر به ازای استراتژی خالص یا مختلط  $X'$  متعلق به  $\Sigma$ ، مقدار تابع لیپانوف کوچکتر از  $\epsilon$  بوده و  $\epsilon$  به اندازه کافی کوچک باشد، آنگاه  $X'$  تزدیک یکی از نقاط نش بازی ماتریس  $X^*$  قرار خواهد داشت. در این حالت  $X'$  یک تقریب  $\epsilon$  ضعیف از  $X^*$  بوده و نقطه نش با تقریب ضعیف نامیده می‌شود.

**تعریف ۳:** فرض کنید که  $X^*$  یک نقطه تعادل نش برای بازی ماتریسی نامی  $G$  باشد.  $X^*$  یک نقطه نش مقاوم نامیده می‌شود، اگر و فقط اگر برای تمام تحقیقات ممکن (محتمل)  $G$ ، نش یا نش با تقریب ضعیف محسوب شود.

در بسیاری از موارد، نقاط نش صدرصد مقاوم نبوده و در تمام حالات ممکن، شرط تعریف ۳ را ارضا نمی‌کنند. بنابراین درجه مقاومت یک پاسخ را می‌توان متناسب با تعداد تحقیقات ممکن بازی که برای آنها شرط تعریف فوق برآورده می‌شود، در نظر گرفت. در صورتی که با در نظر گرفتن این معیار، مقاومت یک پاسخ بیشتر از ۵۰ درصد باشد، آن

یک توزیع احتمالاتی غیرهمبسته روی فضای استراتژی است. در حالیکه نقطه تعادل هم‌بسته این شرط را نداشته و کلی تراست. ثابت شده است که مجموعه نقاط تعادل هم‌بسته بازیهای متنهای، غیرمتنهای بوده و مجموعه نقاط نش را در بر می‌گیرد. یعنی، هر نقطه نش، یک تعادل هم‌بسته نیز محسوب می‌شود [۲۲-۲۴]. رابطه (۱۱) را می‌توان به فرم ماتریسی زیر نیز بیان کرد:

$$A\mu' \geq 0 \quad (13)$$

در رابطه (۱۳) ماتریس محدودیت  $A$  به ابعاد  $N_{con} \times D_s$  است.  $N_{con}$  تعداد محدودیتهای نامساوی بوده و از رابطه (۱۴) بدست می‌آید:

$$N_{con} = \sum_{i=1}^n k_i(k_i - 1) \quad (14)$$

در رابطه (۱۴)،  $k_i$  تعداد استراتژیهای بازیکن  $i$  است. به طور خلاصه، نقاط تعادل هم‌بسته باید محدودیتهای مشخص شده در روابط (۹)، (۱۰) و (۱۳) را ارضا کنند. به همین دلیل، محاسبه آنها حتی برای بازیهای با ابعاد بالا نیز، به سادگی و با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی خطی امکان‌پذیر خواهد بود.

#### ۴- آنالیز مقاومت نقاط تعادل نش

در این بخش، دو معیار کاربردی برای ارزیابی میزان مقاومت نقاط تعادل نش ارائه می‌دهیم. در هریک از دو معیار، با توجه به دغدغه‌های مسائل دنیای واقعی، تعریف خاصی برای "نقطه نش مقاوم" پیشنهاد داده خواهد شد. در معیار اول، منظور از نقاط تعادل نش مقاوم، آن دسته از نقاط تعادلی است که در مواجهه با تغییرات محدود مقادیر سود بازی، نش یا نزدیک باقی مانده و همه یا بخش عمده خواص خود را حفظ می‌کنند. اما در معیار دوم، ما به دنبال پاسخهایی هستیم که در حضور عدم قطعیت، در مجموعه نقاط تعادل هم‌بسته باقی می‌مانند. هر دو معیار، بسیار ساده، منطقی و کاربردی هستند و تصمیم‌گیرنده، براساس شرایط مسئله، ممکن است هریک را انتخاب کند. کار مقاله در این بخش، گامی در جهت ارائه مفهوم "تئوری بازیهای مقاوم" محسوب می‌شود. که منظور از تئوری بازیهای مقاوم، یافتن آن دسته از پاسخهای بازیهای بازی نامی است که در مواجهه با تحقیقات مختلف مقادیر سود بازی، مقاوم تر هستند. فرض می‌کنیم که پارامترهای غیرقطعی ممکن است هر مقداری در یک بازه حول مقادیر نامی خود را اختیار کنند. هم‌چنین در نظر می‌گیریم که هیچ اطلاعی راجع به توزیع احتمالاتی مقادیر غیرقطعی مسئله در دست نمی‌باشد.

در این مقاله برای آنالیز مقاومت، از روش‌های مبتنی بر نمونه‌برداری از پارامترهای غیرقطعی استفاده خواهیم کرد. نمونه‌برداری، یک روش ساده و متداول برای ارزیابی مقاومت به شمار می‌رود [۲۵-۲۷]. این روش، به شرایط خاصی روی مدل مسئله نیاز نداشته و می‌توان برای هر مسئله و با هر ابعادی، بدون پیچیدگی محاسباتی از آن استفاده کرد [۲۷].

<sup>۱</sup>. Latin Hypercube Sampling

$$\text{Robustness'first measure}' = 100 \left( 1 - \frac{n_1}{N} \right) \quad (15)$$

در رابطه (۱۵)،  $n_1$  تعداد تحقیق‌هایی است که مقدار تابع لیپانوف آنها به ازای نقطه نش مورد نظر از ماکریم تغییرات مجاز بیشتر بوده و  $N$  تعداد کل تحقیق‌های در نظر گرفته شده است. با استفاده از این معیار، مقاومت نقاط نش، عددی بین ۰ و ۱۰۰ خواهد بود.

#### ۲-۴ - معیار دوم

ایده دومین معیار پیشنهادی برای ارزیابی مقاومت نقاط تعادل نش، بر مبنای مفهوم تعادل هم‌بسته استوار است. با توجه به اینکه نقاط نش، زیر مجموعه‌ای از نقاط تعادل هم‌بسته هستند، منطقی به نظر می‌رسد که در جستجوی آن دسته از نقاط نشی باشیم که علیرغم تغییرات ماتریس سود بازی، در مجموعه مرجع خود، یعنی مجموعه نقاط هم‌بسته، باقی می‌مانند. یعنی برای این نقاط، عقلایت تعادل هم‌بسته هنگام مواجهه با تحقیق‌های ممکن بازی، حفظ خواهد شد. معیار دوم بر مبنای تعریف زیر استوار است:

**تعریف ۴:** فرض کنید که  $X^*$  یک نقطه تعادل نش برای بازی نامی  $G$  باشد. آنگاه  $X^*$  یک نقطه نش مقاوم نوع ۲، نامیده می‌شود، اگر و فقط اگر  $X^*$ ، یک تعادل هم‌بسته برای تمام تحقیق‌های ممکن  $G$  باشد.

به کمک تعریف فوق، معیار دوم برای ارزیابی مقاومت یک نقطه نش به این صورت پیشنهاد داده می‌شود:

$$\text{Robustness'second measure}' = 100 \frac{n_2}{N} \quad (16)$$

برای محاسبه میزان مقاومت نقاط نش به کمک رابطه فوق، با استفاده از روش نمونه‌برداری لاتین هایپرکیوب،  $N$  تحقق مختلف برای ماتریس سود بازی بدست می‌آید. آنگاه  $n_2$  تعداد تحقیق‌هایی است که  $X^*$  یک نقطه تعادل هم‌بسته برای آنها محسوب می‌شود. باز محاسباتی این روش، از معیار اول بسیار کمتر است. زیرا نقاط تعادل هم‌بسته برخلاف نقاط نش، با مجموعه‌ای از نامساوی‌های ساده خطی مشخص می‌شوند. اما از آنجایی که این معیار، حفظ خواص بیشتری را نسبت به معیار اول در نظر می‌گیرد، مقادیر بدست آمده توسط آن، کمتر از مقادیر بدست آمده با شاخص اول خواهد بود. در واقع درجه مقاومت بدست آمده توسط معیار اول، نوعی تقریب خوش‌بینانه و کران بالا برای مقادیر بدست آمده توسط دومین معیار محسوب می‌شود.

#### ۵- آنالیز مقاومت نقاط تعادل هم‌بسته

در این بخش، دو روش جدید برای ارزیابی میزان مقاومت نقاط تعادل هم‌بسته ارائه خواهد شد. روش اول، یک شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت نقاط هم‌بسته است که ایده آن از دومین معیار پیشنهادی در بخش قبل الهام گرفته شده و روش دوم، یک شاخص ساده برای

پاسخ "تقریبی مقاوم" نامیده می‌شود. لذا با در نظر گرفتن تعاریف فوق، روند ارزیابی اولین شاخص مقاومت پیشنهادی به شرح زیر خواهد بود: گام اول: برای آنالیز مقاومت، ابتدا باید مقادیر تعادل لیپانوف نامی را در همسایگی نقاط نش ارزیابی نمود. بدین منظور، یک همسایگی حول هر یک از نقاط نش در نظر گرفته خواهد شد. ابعاد این همسایگی، ماکریم انحراف مجاز از احتمالات نقطه نش را نشان می‌دهد که بر تصمیم نهایی تاثیری نمی‌گذارد. بنابراین انتخاب آن کاملاً به مسئله بستگی دارد و اینکه تصمیم‌گیرنده با احتمالات مربوط به نش مختلط چگونه برخورد می‌کند. به عنوان مثال اگر برای یک بازی  $2 \times 2$ ، آستانه تحمل برابر  $0.05$  در نظر گرفته شود و  $[0.1, 0.0]$  یک نقطه تعادل نش خالص برای این بازی باشد، یعنی با استراتژیهای مانند  $[0.05, 0.95]$  یا  $[0.95, 0.05]$  یا  $[0.98, 0.02]$  یا  $[0.96, 0.04]$  نیز از دید تصمیم‌گیرنده نهایی مشابه  $X^*$  برخورد شده و این تغییر احتمالات تاثیری در تصمیم نهایی نمی‌گذارد. مسلماً تصمیم‌گیرنده می‌تواند با توجه به شرایط مسئله این آستانه تحمل را تغییر دهد. سپس یک مجموعه از پروفایلهای استراتژی نمونه در هر همسایگی در نظر گرفته می‌شود. به منظور تولید پروفایلهای نمونه، از روش لاتین هایپرکیوب استفاده خواهد شد. با استفاده از این روش، تعدادی استراتژی نمونه در هر همسایگی حول نقاط تعادل نش انتخاب شده و سپس مقدار تابع لیپانوف، به ازای این نمونه‌ها، مقداری نزدیک به صفر خواهد داشت. دلیل این امر آن است که تابع لیپانوف یک تابع پیوسته بوده و فقط در نقاط نش، مقدارش برابر صفر می‌شود [۱۹]. لذا با توجه به اینکه تمام نمونه‌ها از یک همسایگی کوچک حول نقاط نش انتخاب شده اند، مقدار تابع لیپانوف به ازای آنها، نزدیک صفر خواهد بود. بیشترین مقدار تابع لیپانوف به ازای همه استراتژیهای نمونه در هر همسایگی، به عنوان ماکریم تغییرات مجاز تابع لیپانوف حول نقطه نش مربوطه در نظر گرفته خواهد شد. تعداد نمونه‌هایی که در هر همسایگی مورد بررسی قرار می‌گیرند، به صورت مسئله بستگی داشته و باید به دقت تعیین گردد. با افزایش تعداد نمونه‌ها، حجم محاسبات افزایش پیدا می‌کند، اما نتایج بدست آمده به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.

گام دوم: در گام دوم، تحقیقات مختلف ماتریس سود بازی در نظر گرفته می‌شوند. بدین منظور، ابتدا برای پارامترهای غیرقطعی تاثیرگذار روی سود بازی، تعدادی نمونه تولید می‌شود. برای تولید نمونه‌ها، مجدداً می‌توان از روش لاتین هایپرکیوب استفاده کرد. سپس با استفاده از مجموعه نمونه‌های تولید شده برای پارامترهای غیرقطعی تاثیرگذار روی سود بازی،  $N$  تحقق مختلف ممکن برای بازی بدست می‌آید. هر یک از این بازیها، تابع لیپانوف متفاوتی خواهد داشت. برای محاسبه میزان مقاومت یک نقطه نش، باید مقدار تمام این توابع را به ازای آن نقطه تعادل بدست آورد. آنگاه میزان مقاومت نقطه نش مربوطه به کمک رابطه (۱۵) بدست می‌آید.

به کمک رابطه (۱۷)، می‌توان به سادگی میزان تخطی از هریک از محدودیتها را محاسبه کرد. (i)  $V$ ، درایه سطر ۱ام بردار  $V$  بوده و میزان تجاوز از محدودیت ۱ام را نشان می‌دهد. (1)  $b(i,1)$  و (2)  $b(i,2)$  نیز کران بالا و پایین عدد بازه‌ای ۱ام در ماتریس  $b$  هستند. ۴ هم یک عدد بسیار کوچک و مثبت است. با استفاده از رابطه (۱۷)، اگر  $[b(i,1), b(i,2)] > 0$ ، میزان تخطی از محدودیت ۱ام برابر صفر بوده و اگر عدد بازه‌ای مذکور یک عدد منفی باشد، یعنی  $b(i,2) < 0$ ، میزان تجاوز از محدودیت مربوط به آن یک عدد بسیار بزرگ خواهد بود.

از میانگین بردار  $V$  می‌توان برای مقایسه میزان مقاومت نقاط تعادل هم‌بسته در حضور عدم قطعیت استفاده کرد. هرچه میانگین تجاوز از محدودیتها برای یک نقطه تعادل بیشتر باشد، یعنی احتمال برآورده نشدن محدودیتها به‌ازای تحقیقات مختلف، بیشتر بوده و لذا میزان مقاومت آن نقطه تعادل در حضور عدم قطعیت، کمتر خواهد بود. با استفاده از این روش، دیگر نیازی به نمونه‌برداری از پارامترهای غیرقطعی مسئله نخواهیم داشت. مثالهای عددی نشان می‌دهند که نتایج این معیار، با نتایج شاخصهای مبتنی بر نمونه‌برداری منطبق بوده و آنها را تایید می‌کند.

#### ۶- بیبود میزان مقاومت پاسخهای یک بازی

در بعضی از مدل‌های ثوری بازیها، ممکن است تصمیم‌گیرنده از میزان مقاومت نقاط تعادل نش بdest آمده راضی نباشد. در چنین مسائلی، تصمیم‌گیرنده می‌تواند یکی از دو روش ذیل را اتخاذ نماید.

#### ۶-۱- جستجوی پاسخهای مقاوم‌تر در همسایگی نقاط تعادل نش

به عنوان اولین روش، پیشنهاد می‌دهیم که اگر تصمیم‌گیرنده از میزان مقاومت پاسخهای یک بازی، رضایت نداشته باشد، می‌تواند دقت احتمالات نقاط نش را قربانی کرده و پاسخهایی تقریبی با مقاومت بالاتر بدست آورد. برای اینکه مصالحه‌ای بین خواص نقاط تعادل نش و مقاومت آنها در حضور عدم قطعیت برقرار گردد، از یک الگوریتم بهینه‌سازی محدود استفاده خواهد شد. این الگوریتم باید به دنبال پاسخهایی بگردد که بیشترین مقاومت را داشته و در یک همسایگی حول نقاط نش باقی می‌مانند. بعد این همسایگی، ماکریم انحراف مجاز از احتمالات نقطه نش را نشان می‌دهد که بر تصمیم نهایی تاثیری نمی‌گذارد. همان طور که قبلاً نیز به آن اشاره شد، این ابعاد، در هر مسئله و با توجه به شرایط آن توسط تصمیم‌گیرنده تعیین می‌شود.

با توجه به ویژگی‌های توابع پیشنهادی برای سنجش میزان مقاومت نقاط تعادل نش، از الگوریتم ژنتیک برای حل این مسئله بهینه‌سازی مقید استفاده خواهد شد. با استفاده ازتابع جریمه، مسئله بهینه‌سازی مقید را به یک مسئله بدون محدودیت تبدیل می‌کنیم. تابع جریمه، پاسخهایی را که در همسایگی مجاز نقاط نش واقع نیستند، جریمه کرده و برازنده‌گی آنها

مقایسه مقاومت نقاط تعادل هم‌بسته یک بازی بوده و فقط پاسخها را براساس میزان مقاومت‌شان رتبه‌بندی می‌کند.

#### ۶-۲- ارائه یک معیار کمی برای سنجش مقاومت نقاط تعادل هم‌بسته

این معیار، بر مبنای تعریف پیشنهادی زیر برای نقطه هم‌بسته مقاوم بوده و نوعی تعمیم برای تعریف ۴ محسوب می‌شود.

**تعریف ۵:** فرض کنید که  $M$ ، یک نقطه تعادل هم‌بسته برای بازی نامی  $G$  باشد. آنگاه  $M$ ، یک نقطه هم‌بسته مقاوم نامیده می‌شود، اگر و فقط اگر یک تعادل هم‌بسته برای تمام تحقیقات ممکن  $G$  باشد.

با توجه به تعریف فوق، نقاط تعادل هم‌بسته‌ای که در تمام حالات ممکن پارامترهای غیرقطعی مسئله، خواص خود را حفظ می‌کنند، به عنوان پاسخهای مقاوم در نظر گرفته می‌شوند. یعنی نقاط تعادل هم‌بسته مقاوم، به ازای تمام تحقیقات ممکن بازی، محدودیتها نامساوی مربوطه را راضا می‌کنند. با در نظر گرفتن تعریف فوق، می‌توان از رابطه (۱۶) برای محاسبه میزان مقاومت نقاط تعادل هم‌بسته نیز استفاده کرد. در این صورت،  $n_2$  تعداد نمونه‌هایی است که تمام خواص تعادل هم‌بسته برای آنها حفظ می‌شود.

#### ۶-۳- ارائه یک معیار نسبی برای مقایسه مقاومت نقاط تعادل هم‌بسته

در این بخش، یک معیار نسبی برای مقایسه مقاومت نقاط تعادل هم‌بسته ارائه می‌دهیم. در این معیار، در نظر می‌گیریم که یک نقطه تعادل هم‌بسته بازی نامی، تا چه اندازه از محدودیتها نامساوی مربوطه با در نظر گرفتن تحقیقات مختلف بازی تجاوز می‌کند. با کمک این معیار، نقاط تعادل هم‌بسته براساس میزان مقاومت‌شان در حضور عدم قطعیت، رتبه‌بندی خواهد شد. این معیار، پیچیدگی محاسباتی چندانی ندارد و محاسبه آن برای بازیهای با ابعاد بالا نیز به سادگی انجام می‌شود.

همان‌طور که قبلاً نیز به آن اشاره شد، نقاط تعادل هم‌بسته با مجموعه‌ای از نامساوی‌های خطی ماتریسی به فرم  $A\mu' \geq 0$  توصیف می‌شوند. اگر مقادیر سود بازی با عدم قطعیت همراه باشد، درایه‌های ماتریس محدودیت  $A$  نیز اعداد بازه‌ای بوده و ممکن است هر مقداری را در بازه مربوطه اختیار کنند. لذا تحقیقات مختلفی برای ماتریس  $A$  وجود خواهد داشت و یک نقطه تعادل بازی نامی، ممکن است در محدودیت نامساوی مربوط به برخی از این تحقیقاً صدق نکند. در نظر بگیرید که  $A\mu'$  مساوی  $b$  باشد. در این صورت  $b$ ، یک ماتریس با ابعاد  $N_{con} \times 2$  خواهد بود که هر یک از سطرهای آن کرانهای یک عدد بازه‌ای را نشان می‌دهد. لذا پیشنهاد می‌دهیم که میزان تجاوز از هریک از  $N_{con}$  محدودیت نامساوی را می‌توان به کمک رابطه زیر محاسبه کرد:

$$V(i) = \frac{\min(b(i,1), 0)}{\max(\varepsilon, (b(i,2) - b(i,1)))} \quad i = 1, \dots, N_{con} \quad (17)$$

تغییرات مجاز تابع لیپانوف حول پاسخ مربوطه در نظر گرفته می‌شود.  
نتایج جدول ۳، میانگین ۱۰۰ اجرای متوازن برنامه هستند.  
جدول ۳: مکریم تغییرات مجاز تابع لیپانوف حول هریک از نقاط تعادل

نش

نقاط نش	ماکریم تغییرات مجاز تابع لیپانوف حول هر نقطه نش
$X_1^*$	۰.۰۱۵۰
$X_2^*$	۰.۰۱۸۱

هم‌چنین میزان مقاومت هر یک از نقاط نش، با در نظر گرفتن مجموعه‌ای شامل ۳۰۰ تحقق مختلف بازی و با استفاده از هر دو معیار محاسبه شده و در جدول (۴) ارائه شده است. این نتایج نیز میانگین بدست آمده برای ۱۰۰ اجرای متوازن برنامه، با در نظر گرفتن مجموعه نمونه‌های مختلف هستند.

جدول ۴: میزان مقاومت نقاط تعادل نش

نقاط نش	میزان مقاومت (معیار اول)	میزان مقاومت (معیار دوم)	میانگین تجاوز از محدودیتها	رتبه‌بندی نقاط نش
$X_1^*$	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱
$X_2^*$	۴۵	۲۵	-۰.۲۵	۲

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نتایج بدست آمده با نتایج مرجع [۴] مخوانی دارد. البته باید توجه داشت که شاخصهای عددی ارائه شده در این فصل، اطلاعات بیشتری را در اختیار تصمیم‌گیرنده قرار می‌دهند. به کمک این شاخصها می‌توان میزان مقاومت پاسخهای یک بازی را به طور کمی با یکدیگر مقایسه کرد.

در دو ستون آخر جدول نتایج مربوط به معیار نسبی بخش ۲.۵، ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، برای  $X_1^*$ ، میانگین تجاوز از محدودیتها برابر ۰ است و بنابراین کاملاً مقاوم می‌باشد. این نتیجه به خوبی با نتیجه بدست آمده از معیارهای کمی نیز منطبق است. نکته جالب توجه دیگر در مورد نتایج این مثال، آن است که  $X_1^*$ ، یک استراتژی پایدار تکاملی است، در حالیکه  $X_2^*$ ، این ویژگی را ندارد. استراتژیهای پایدار تکاملی، پاسخهای یک بازی تکاملی بوده و زیر مجموعه‌ای از نقاط تعادل نش بازی کلاسیک متناظر یک بازی تکاملی محسوب می‌شوند [۱]. برای اطلاعات بیشتر در مورد تعاریف و مفاهیم استراتژیهای پایدار تکاملی به مراجع [۱] و [۲۹] مراجعه شود.

**مثال ۲.۷** یک بازی  $2 \times 2$  را در نظر بگیرید که ماتریس سود نامی آن در جدول ۵ ارائه شده است:

جدول ۵: مقادیر نامی ماتریسهای سود بازی

بازیکن ۱	بازیکن ۲	
	S <sub>21</sub>	S <sub>22</sub>
S <sub>11</sub>	-۳، -۳	۴، ۰
S <sub>12</sub>	۰، ۴	۲، ۲

این بازی سه نقطه تعادل نش دارد:  $[0.4, 0.6]$ ،  $[0.6, 0.4]$ ،  $[0.4, 0.6]$ ،  $X_1^* = [0.4, 0.6]$ ،  $X_2^* = [0.6, 0.4]$  و  $[0.1, 0.1]$ . مجدداً فرض کنید که مقادیر سود بازی، تقریبی بوده و ممکن است مطابق جدول ۶، هر مقداری

را کاهش می‌دهد. با استفاده از تابع جرمیه، الگوریتم ژنتیک قادر به جستجوی پاسخهای مقاوم‌تر در همسایگی هر یک از نقاط تعادل نش خواهد بود. برای سنجش مقاومت پاسخها می‌توان از هریک از دو معیار پیشنهادی استفاده کرد. اگر در یک همسایگی پاسخی مقاوم‌تر پیدا نشود، تصمیم‌گیرنده می‌تواند ابعاد همسایگی را افزایش داده و به دنبال تقریب‌های ضعیف‌تر اما مقاوم‌تر بگردد. هم‌چنین می‌توان روند بهبود مقاومت نقاط نش را با الگوریتم محاسبه آنها ادغام کرد. به بیان دیگر با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی چنددهفده، محاسبه نقاط تعادل نش، یعنی نقاط بهینه سراسری تابع لیپانوف، و بیشینه کردن مقاومت آنها در حضور عدم قطعیت را به طور همزمان انجام داد.

## ۲-۶- جستجوی پاسخهای مقاوم‌تر در مجموعه نقاط

### تعادل همبسته

در روش دوم، پیشنهاد می‌دهیم که اگر تصمیم‌گیرنده از میزان مقاومت پاسخهای یک بازی، رضایت نداشته باشد، می‌تواند در مجموعه نقاط همبسته غیرنش به دنبال پاسخهای مقاوم‌تری بگردد. مجموعه نقاط تعادل همبسته، یک چند وجهی همبند و محدب بوده و مجموعه نقاط تعادل نش را که ممکن است غیرهمبند و غیر محدب باشد، در بر می‌گیرد. هم‌چنین ثابت شده است که نقاط نش روی مرزهای مجموعه نقاط همبسته قرار دارند [۲۳]. بنابراین ممکن است بتوان در مجموعه نقاط غیرمرزی، پاسخهای مقاوم‌تری را پیدا کرد. در این صورت، توصیه می‌شود که تصمیم‌گیرنده نقاط نش غیر مقاوم را کنار گذاشته و نقاط همبسته غیر نش اما مقاوم را، به عنوان توصیم نهایی انتخاب کند.

## ۷- مثالهای عددی

**مثال ۱.۲**: اکنون به مثال مطرح شده در بخش مقدمه برمی‌گردیم. همان‌طور که اشاره شد، بازی مذکور، دو نقطه تعادل نش دارد. برای محاسبه اولین شاخص مقاومت، آستانه تحمل  $0.05 \pm$  را برای تغییر احتمالات نقاط تعادل نش در نظر می‌گیریم. بنابراین همسایگی مجاز یک استراتژی به فرم  $X_0 = (p, 1-p)$ ، شامل همه استراتژیهایی خواهد بود که به صورت  $X = (p+r_1, 1-p+r_2)$  تعریف می‌شوند. به شرطی که  $r_1$  و  $r_2$  دو عدد رندوم بین  $-0.05$  و  $0.05$  باشند. البته با توجه به اینکه استراتژی هر بازیکن یک توزیع احتمالاتی بوده و باید در رابطه (۱۸) صدق کند، پروفایلهای تولید شده برای هر بازیکن، مطابق رابطه (۱۹)، نرماییه خواهند شد.

$$X = (x_1, x_2) : x_1 + x_2 = 1, x_i \geq 0 \quad \forall i \quad (18)$$

$$X = \frac{|X|}{\sum_{i=1}^2 |x_i|} \quad (19)$$

با استفاده از روش لاتین هایپرکوب، ۲۰۰ استراتژی نمونه در همسایگی مجاز هر پاسخ تولید می‌شود. سپس مقدار تابع لیپانوف به ازای همه این نمونه‌ها ارزیابی شده و بیشترین مقدار آن به عنوان مکریم

برای تایید صحت نتایج بدست آمده، نقاط تعادل نش تمام تحققهای نمونه بازی را به کمک یک الگوریتم ژنتیک مالتی مدار بدست آورده و با نتایج بدست آمده از معیارهای پیشنهادی مقایسه کردیم. مسلماً این کار از نظر محاسباتی مناسب نبوده و نباید به عنوان یک شاخص برای ارزیابی میزان مقاومت نقاط تعادل نش، به کار گرفته شود و در اینجا فقط برای اعتبارسنجی روشهای پیشنهادی از آن استفاده شده است.

### مثال ۳.۷: بازی جوچه

جدول ۹: مقادیر نامی ماتریس‌های سود بازی (بازی جوچه)

بازیکن اول	بازیکن دوم		
	S <sub>21</sub>	S <sub>22</sub>	
	S <sub>11</sub>	۴.۴	۱.۵
	S <sub>12</sub>	۵.۱	۰.۰

این بازی سه نقطه تعادل نش دارد:  $[0.5, 0.5, 0.5]$ ،  $[0.5, 0.5, 0.5]$ ،  $[0.5, 0.5, 0.5]$ . حال فرض کنید که مقادیر سود بازی در بازه‌های مطابق جدول ۱۰، تغییر کنند.

جدول ۱۰: بازه‌های ممکن برای مقادیر سود بازی (بازی جوچه)

	S <sub>21</sub>	S <sub>22</sub>
S <sub>11</sub>	[۲۶] ، [۲۶]	[۰.۵ ، ۱.۵] ، [۲۵۷.۵]
S <sub>12</sub>	[۲۵۷.۵] ، [۰.۵ ، ۱.۵]	[−۰.۵ ، ۰.۵]

جدول ۱۱: میزان مقاومت نقاط تعادل نش (بازی جوچه)

نقاط تعادل نش	میزان مقاومت (معیار اول)	میزان مقاومت (معیار دوم)	میانگین تجاوز از محدودیتها	میانگین تجاوز از محدودیتها	رتبه‌بندی نقاط تعادل نش
X <sub>1</sub> *	۱	۰	−۰.۵	۲	۲
X <sub>2</sub> *	۷۱	۶۹	−۰.۹۷۲	۱	۱
X <sub>3</sub> *	۷۱	۶۹	−۰.۹۷۲	۱	۱

براساس تعریف مرجع [۴]، این بازی هیچ نقطه تعادل نش مقاومی ندارد. نتایج بدست آمده از معیارهای پیشنهادی نیز نشان می‌دهند که میزان مقاومت هیچ یک از پاسخها ۱۰۰ نیست. اما همان‌طور که اشاره شد، با استفاده از معیارهای پیشنهادی، امکان مقایسه مقاومت نقاط نش غیر مقاوم فراهم شده و تصمیم‌گیرنده می‌تواند پاسخی را که قابل اعتمادتر است، انتخاب کند.

اکنون با استفاده از الگوریتم ژنتیک در مجموعه نقاط همبسته غیرنش به دنبال پاسخهای مقاوم‌تری می‌گردیم. نتایج دو مرتبه اجرای الگوریتم، از شرایط اولیه مختلف، در جدول ۱۲ ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دو نقطه تعادل همبسته با میزان مقاومت قابل قبولی بدست آمده است. هر دو پاسخ، از نقطه نش مختلف این بازی، یعنی \*X<sub>1</sub>، مقاوم‌تر هستند. در صورت لزوم، می‌توان الگوریتم را از شرایط اولیه دیگری نیز راهاندازی کرده و گزینه‌های بیشتری را بدست آورد.

در یک بازه حول مقادیر نامی را اختیار کنند. مقادیر آستانه تحمل، تعداد نمونه‌ها و تعداد دفعات اجرای متولی برنامه، مشابه مثال ۱.۷ در نظر گرفته شوند.

جدول ۱۲: بازه‌های ممکن برای مقادیر سود بازی

S <sub>11</sub>	S <sub>21</sub>	S <sub>22</sub>
[−۴.۵ ، −۱.۵]	[−۴.۵ ، −۱.۵]	[۲۶] ، [۰.۵]
[−۰.۵]	[۰.۵]	[۱۳] ، [۱۳]

جدول ۷: ماکریم تغییرات مجاز تابع لیپانوف حول هریک از نقاط تعادل نش

نقاط تعادل نش	ماکریم تغییرات مجاز تابع لیپانوف حول هر نقطه تعادل نش
X <sub>1</sub> *	۰.۳۲۸
X <sub>2</sub> *	۰.۰۲۲۵
X <sub>3</sub> *	۰.۰۲۴۵

جدول ۸: میزان مقاومت نقاط تعادل نش

نقاط تعادل نش	نقاط تعادل نش	میزان مقاومت (معیار اول)	میزان مقاومت (معیار دوم)	میانگین تجاوز از محدودیتها	رتبه‌بندی نقاط تعادل نش
X <sub>1</sub> *	۱۰	۰	−۰.۵	۲	۲
X <sub>2</sub> *	۹۶	۹۴	−۰.۰۴۱۷	۱	۱
X <sub>3</sub> *	۹۶	۹۴	−۰.۰۴۱۷	۱	۱

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مقاومت اولین نقطه تعادل نش با استفاده از معیار اول، ۱۰ درصد ارزیابی شده است. یعنی اگر مقادیر سود بازی در بازه‌های مجازشان تغییر کنند، این تعادل در ۹۰ مورد از ۱۰۰ مورد، خواص خود را کاملاً از دست می‌دهد. بنابراین X<sub>1</sub>\*، یک نقطه نش مقاوم نیست. اما X<sub>2</sub>\* و X<sub>3</sub>، نقاط نش مقاوم هستند. همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم، مقادیر بدست آمده با معیار اول، بزرگ‌تر از مقادیر ارزیابی شده با معیار دوم هستند. در واقع مقاومت محاسبه شده با معیار اول، نوعی تقریب خوش‌بینانه برای مقادیر بدست آمده با دومین شاخص محسوب می‌شود. دلیل این امر نیز آن است که شاخص دوم، شرایط سخت‌تری را برای مقاومت در نظر گرفته و حفظ خواص بیشتری را تضمین می‌کند. باید توجه داشت که با استفاده از شاخصهای مراجعه قبلی، هیچ یک از این سه نقطه تعادل، مقاوم محسوب نمی‌شوند. اما شاخصهای پیشنهادی، امکان مقایسه نقاط نش غیر مقاوم را فراهم می‌آورند. مانند مثال قبل در دو ستون آخر جدول، نتایج مرتبط با معیار نسبی ارائه شده است. همان‌طور که قبل نیز به آن اشاره شد، اگر میانگین تجاوز از محدودیتها برای یک پاسخ بیشتر باشد، میزان مقاومت آن پاسخ در حضور عدم قطعیتها کمتر خواهد بود. لذا X<sub>2</sub>\* و X<sub>3</sub> مقاوم تر بوده و رتبه ۱ را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول ۱۵: میزان مقاومت نقاط تعادل نش

نقاط نش	میزان مقاومت (معیار اول)	میزان مقاومت (معیار دوم)	میانگین تجاوز از محدودیتها	رتبه بندی نقاط نش
$X_1^*$	۱	۰	-۰.۲۹۱۷	۳
$X_2^*$	۰	۰	-۰.۲۹۱۷	۳
$X_3^*$	۰	۰	-۰.۲۹۱۷	۳
$X_4^*$	۰	۰	-۰.۵	۴
$X_5^*$	۵	۴	-۰.۱۶۶۷	۲
$X_6^*$	۵	۴	-۰.۱۶۶۷	۲
$X_7^*$	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱
$X_8^*$	۵	۴	-۰.۱۶۶۷	۲
$X_9^*$	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱
$X_{10}^*$	۵	۴	-۰.۱۶۶۷	۲
$X_{11}^*$	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱
$X_{12}^*$	۵	۴	-۰.۱۶۶۷	۲
$X_{13}^*$	۴	۴	-۰.۱۶۶۷	۲

همان طور که ملاحظه می شود، با وجود افزایش ابعاد بازی، نتایج بدست آمده از هر سه معیار، کاملاً با هم سازگار هستند. البته باید توجه داشت که اگر میانگین تجاوز از محدودیتها، بزرگتر یا مساوی -۰.۲۹۱۷ باشد، میزان مقاومت با دو معیار کمی، برابر با صفر ارزیابی می شود و لذا با در نظر گرفتن این دو معیار، مقاومت نقاط نش  $X_1^*$  تا  $X_3^*$  و  $X_{12}^*$ ، با مقاومت  $X_4^*$ ، تفاوتی ندارد. نتایج این مثال نشان می دهد که شاخصهای پیشنهادی برای بازیهای با ابعاد بالا نیز معتبر هستند. از بین نقاط تعادل نش خالص این بازی،  $X_7^*$ ,  $X_9^*$  و  $X_{12}^*$  که مقاومت از بقیه هستند، پایدار تکاملی نیز بوده و بقیه نقاط نش خالص، ویژگی پایداری تکاملی را ندارند.

**مثال ۵.۷** (جستجوی پاسخهای مقاومت در همسایگی نقاط تعادل نش)

جدول ۱۶: مقادیر نامی ماتریسهای سود بازی

بازیکن اول	بازیکن دوم	
	S <sub>21</sub>	S <sub>22</sub>
S <sub>11</sub>	۲۰	۰۱
S <sub>12</sub>	۰۱	۱۰

این بازی فقط یک نقطه تعادل نش دارد:  $X^* = \left[ \left( \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left( \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right) \right]$  که میزان مقاومت آن با استفاده از شاخص اول، ۱۴٪ است. مسلماً این مقاومت در اغلب مسائل تصمیم گیری قبل اعتماد نخواهد بود. همان طور که اشاره شد، می توان با استفاده از الگوریتم زنیک در همسایگی  $X^*$ ،

جدول ۱۲: میزان مقاومت نقاط تعادل هم بسته غیرنش

نقاط تعادل هم بسته	میزان مقاومت (معیار دوم)	میانگین تجاوز از محدودیتها
CE <sub>1</sub> =[۰.۰۵۰.۵۰]	۵۰	-۰.۱۹۴۴
CE <sub>2</sub> =[۰.۰۲۵۰.۷۵۰]	۵۰	-۰.۱۹۴۴

**مثال ۴.۷** (بازی  $3 \times 3 \times 3$ ): با توجه به اینکه روشهای آنالیز مقاومت ارائه شده در این مقاله برای بازیهای چند نفره هم قابل استفاده هستند، نتایج مربوط به یک مثال از بازیهای سه نفره را نیز ارائه می دهیم. این بازی یکی از مثالهای موجود در نرم افزار گمبیت<sup>۱</sup> است. نرم افزار گمبیت یک کتابخانه شامل ابزارهای آنالیز و حل بازیهای ایستا و پویا بوده و در نوع خود یکی از قوی ترین کارهای ارائه شده به شمار می رود [۳۰]. این بازی سه نفره، سیزده نقطه تعادل نش دارد و یک مثال چالش برانگیز و پیچیده به شمار می رود.

جدول ۱۳: مقادیر نامی ماتریسهای سود بازی

S <sub>31</sub>	S <sub>21</sub>	S <sub>22</sub>	S <sub>23</sub>	S <sub>32</sub>	S <sub>21</sub>	S <sub>22</sub>	S <sub>23</sub>	S <sub>33</sub>	S <sub>21</sub>	S <sub>22</sub>	S <sub>23</sub>
S <sub>11</sub>	۱۱۱	۰۰۰	۰۰۰	S <sub>11</sub>	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	S <sub>11</sub>	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
S <sub>12</sub>	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	S <sub>12</sub>	۰۰۰	۱۱۱	۰۰۰	S <sub>12</sub>	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
S <sub>13</sub>	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	S <sub>13</sub>	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	S <sub>13</sub>	۰۰۰	۰۰۰	۱۱۱

جدول ۱۴: نقاط تعادل نش بازی

نقاط نش	احتمالات مربوط به نقاط تعادل نش بازی
$X_1^*$	[۰.۰۵۰.۵۰.۵]
$X_2^*$	[۰.۰۵۰.۵۰.۰.۰۵۰.۵۰]
$X_3^*$	[۰.۰۵۰.۰.۰۵]
$X_4^*$	[۰.۰۳۳.۰.۰۳۳.۰.۰۳۳]
$X_5^*$	[۰.۰۱۰.۰.۰۱۰]
$X_6^*$	[۰.۰۰۰.۰.۰۰۰.۰]
$X_7^*$	[۰.۰۰۰.۰.۰۰۰.۰]
$X_8^*$	[۰.۰۰۰.۰.۰۰۰.۰]
$X_9^*$	[۰.۰۰۰.۰.۰۰۰.۰]
$X_{10}^*$	[۰.۰۰۰.۰.۰۰۰.۰]
$X_{11}^*$	[۰.۰۰۰.۰.۰۰۰.۰]
$X_{12}^*$	[۰.۰۰۰.۰.۰۰۰.۰]
$X_{13}^*$	[۰.۰۰۰.۰.۰۰۰.۰]

کارهای آینده به مقايسه رفتار بازیهای کلاسیك و تکاملی در حضور عدم قطعیت، خواهیم پرداخت.

ما در این مقاله، مدلهاي بازیهای ایستا را در نظر گرفته و نتایج خود را برای مثالهایی از این بازیها ارائه کردیم. بازیهای ایستا، بازیهایی با حرکت هم زمان بازیکنان هستند. اما در بازیهای پویا (بازیهای فرم گسترده)، بازیکنان در زمانهای مختلف، تصمیمهای خود را اتخاذ می کنند و هر بازیکن، هنگام انتخاب تصمیم خود، حداقل از بخشی از تصمیم گیریهای قبلی مطلع است. هر بازی پویا با یک بازی ایستا متناظر بوده و نقاط تعادل بازی پویا، زیرمجموعه‌ای از نقاط تعادل بازی ایستای متناظر هستند. لذا می توان با معیارهای ارائه شده در این مقاله، مقاومت نقاط تعادل نش فرم ایستای متناظر یک بازی پویا را بدست آورده و برای مقايسه پاسخهای بازی پویا نیز از آنها استفاده کرد. یعنی معیارهای ارائه شده در این مقاله، برای بازیهای پویا هم، قابل تعمیم و استفاده هستند. البته در کارهای آینده می توان بحث آنالیز مقاومت را مستقیماً در روند برگشت به عقب در نظر گرفته و معیارهایی را خاص بازیهای پویا ارائه داد.

هم چنین در کارهای آینده می توان به کمک قضایای ریاضی، مقاومت نقاط تعادل نش و نقاط هم بسته غیرنش را با یکدیگر مقایسه کرد. به علاوه استفاده از معیارهای پیشنهادی برای حل مسائل تصمیم گیری دنیای واقعی، نکته دیگری است که می تواند در کارهای آتی در نظر گرفته شود.

## مراجع

- [1] J. N. Webb, Game theory: Decisions, Interaction and Evolution, Springer, London, 2006.
- [2] E. Rasmusen, Games and Information: An Introduction to Game Theory, Blackwell, 2000.
- [3] N. Nisan, T. Roughgarden, E. Tardos and V. V. Vazirani, editors, Algorithmic Game Theory, Cambridge University Press, 2007.
- [4] A.D. Procaccia and J. S. Rosenschein, " A computational characterization of multiagent games with fallacious rewards", Proceedings of 6<sup>th</sup> International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, USA, pp. 1152-1165, 2007.
- [5] J. Harasanyi, "Games with incomplete information played by 'Bayesian' players: parts I-III", Management Science, vol. 14, no. 3, 1967.
- [6] S. Zamir, "Bayesian Games: Games with incomplete information", Working Paper, 2008.
- [7] J. Cremer and R. McLean, "Optimal selling strategies under uncertainty for a discriminating monopolist when demands are interdependent", Econometrica, vol. 53, no. 2, pp. 345-362, 1985
- [8] D. Fudenberg, D. M. Kreps and D. K. Levine, "On the robustness of equilibrium refinements", Journal of Economic Theory, vol. 44, no. 2, pp. 354-380, 1988.
- [9] E. Dekel and D. Fudenberg, "Rational behavior with payoff uncertainty", Journal of Economic Theory, vol. 52, no. 2, pp. 243-267, 1990.

به دنبال پاسخهای مقاومت تر گشت. با بهره گیری از یک جمعیت پانزده نفره و پس از ۵۶ نسل، پاسخ  $X_{new}$  بدست می آید. فاصله اقلیدسی بین  $X_{new}$  و  $X^*$  برابر  $0.05415 \pm 0.0814$  بوده و اختلاف بین احتمالات این دو استراتژی از آستانه مجاز،  $\pm 0.05$  بیشتر نیست. اما مقاومت  $X_{new}$ ، طبق معیار اول،  $27\%$  است. یعنی با اعمال اندکی تغییرات روی احتمالات نقطه نش، میزان مقاومت آن تاحدود دو برابر بهبود یافته است. باید توجه داشت که  $X^*$ ، تنها نقطه تعادل هم بسته این بازی نیز به شمار می رود. لذا نمی توان در مجموعه نقاط تعادل هم بسته، پاسخ مقاومت را پیدا کرد.

## ۸- نتیجه گیری و پیشنهادات

در این مقاله دو معیار جدید برای ارزیابی مقاومت نقاط تعادل نش در حضور عدم قطعیت ارائه شد. با استفاده از این معیارها، می توان مقاومت نقاط نش را با هم مقایسه کرده و پاسخهای را که نسبت به تغییرات سود بازی مقاومت تر هستند، انتخاب کرد. هم چنین در این مقاله دو روش جدید برای آنالیز مقاومت نقاط تعادل هم بسته ارائه شد. روش اول، یک معیار کمی برای محاسبه مقاومت این نقاط بوده و روش دوم، یک معیار نسبی برای مقایسه آنها براساس رفتارشان در حضور عدم قطعیت به شمار می رود.

نتایج مثالهای عددی، چند نکته جالب را نشان می دهند. اولاً همان طور که در نتایج همه مثالها ملاحظه می شود، نقاط نش خالص در صورت وجود، مقاومت تر از نقاط نش مختلط هستند. در مراجع، همین نتیجه برای مدلهاي بازیهای بیزین، بدست آمده است. بنابراین در مورد بازیهای با مقدادیر سود تقریبی، بهتر است در وهله اول به دنبال پاسخهایی با استراتژی خالص باشیم و اگر چنین پاسخهایی وجود نداشت، جستجو برای پاسخهای مختلط را آغاز کنیم. دو مین نکته ای که در نتایج مثالهای عددی ملاحظه می شود، آن است که در صورت وجود چند نقطه تعادل عددی ملاحظه می شود، آن است که در تعادل هستند، رفتاری نش خالص برای یک بازی، آنهايی که پایدار تکاملی هستند، رفتاری مقاومت تر از بقیه دارند. همان طور که اشاره کردیم، استراتژیهای پایدار تکاملی، پاسخهای بازی تکاملی متناظر یک بازی کلاسیک بوده و زیر مجموعه‌ای از نقاط نش بازی کلاسیک هستند. نتایج مثالهای عددی نشان می دهند که در حضور عدم قطعیت، بهتر است به جای بازیهای کلاسیک، از مدلهاي مبتنی بر بازیهای تکاملی استفاده کنیم، زیرا این مدلها، پاسخهای کلاسیک فرض بر آن است که بازیکنان بسیار منطقی و تئوری بازیهای کلاسیک در حالیکه در محيطی که با عدم قطعیت همراه است، چنین رفتاری غیر منطقی و غیر عاقلانه خواهد بود! در مدلهاي بازیهای تکاملی، بازیکنان با گذشت زمان و با روند مشابه یادگیری تقویتی، یاد می گیرند که چگونه رفتار کنند و بنابراین رفتار آنها در برخورد با مسائل دنیای واقعی، منطقی تر و قابل اعتمادتر خواهد بود. در

- [20] R. Lung and D. Dumitrescu, "An evolutionary model for solving multi-player non-cooperative games", Proceeding of International Conference on Knowledge Engineering, Romania, pp. 209-216, 2007.
- [21] N. G. Pavlidis, K. E. Parsopoulos and M. N. Vrahatis, "Computing Nash equilibria through computational intelligence Methods", Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 175, no. 1, pp. 113-136, 2005.
- [22] C. H. Papadimitriou and T. Roughgarden, "Computing correlated equilibria in multi-player games", Journal of the ACM, vol 55, no. 3, 2008.
- [23] R. Nau, G. S. Canovas and P. Hansen, "On the Geometry of Nash Equilibria and Correlated Equilibria", International Journal of Game Theory, vol. 32, no. 4, pp. 443-453, 2003.
- [24] R. Aumann, "Subjectivity and correlation in randomized strategies", Journal of Mathematical Economics, vol. 1, no. 1, pp. 67-96, 1974.
- [25] J. C. Helton and F. J. Davis, "Latin hypercube sampling and the propagation of uncertainty in analyses of complex systems", Reliability Engineering and System Safety, vol. 81, no. 1, pp. 23-69, 2003.
- [26] J.C. Helton, J. D. Johnson, C. J. Sallaberry and C. B. Storlie, "Survey of sampling-based methods for uncertainty and sensitivity analysis", Reliability Engineering and System Safety, vol. 91, no. 10, pp. 1175-1209, 2006.
- [27] L. Nillson, "Robustness analysis of Fe- models", M.S. Thesis, Department of Mechanical Engineering, Lund University, Sweden, 2006.
- [28] R. L. Iman, J. M. Davenport and D. K. Zeigler, "Latin hypercube sampling (A Program User's Guide)", Technical Report SAND79-1473, Sandia Laboratories, Albuquerque, 1980.
- [29] J. M. Alexander, Evolutionary Game Theory, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003.
- [30] R. D. McKelvey, A. M. McLennan and T. L. Turocy, "Gambit: Software tools for game theory", 2010
- [10] A. Kajii and S. Morris, "The robustness of equilibria to incomplete information", *Econometrica*, vol. 65, no. 6, pp. 1283-1309, 1997.
- [11] S. Morris and T. Ui, "Generalized potentials and robust sets of equilibria", *Journal of Economic Theory*, vol. 124, pp. 45-78, 2005
- [12] S. Hayashi, T. Yamaguchi, N. Yamashita and M. Fukushima "A matrix splitting method for symmetric affine second-order cone complementarity problems", Technical Report 2003-008, Department of Applied Mathematics and Physics, Kyoto University, 2003.
- [13] S. Hayashi, N. Yamashita and M. Fukushima, "Robust Nash Equilibria and second-order complementarity problems", *Journal of Nonlinear and Convex Analysis*, vol. 6, pp. 283-296, 2005.
- [14] R. Nishimura, S. Hayash and M. Fukushima, "Robust Nash equilibria in N-person non-cooperative games: uniqueness and reformulation", *Pacific Journal of Optimization*, vol. 5, pp. 237-259, 2009.
- [15] R. Nishimura, S. Hayashi and M. Fukushima, "Semidefinite complementarity reformulation for robust Nash equilibrium problems with Euclidean uncertainty sets", *Journal of Global Optimization*, pp. 1-14, 2011.
- [16] M. Marinacci, "Ambiguous games", *Games and Economic Behavior*, vol. 31, no. 2, pp. 191-219, 2000.
- [17] M. Aghassi and D. Bertsimas, "Robust game theory", *Mathematical Programming, Series B*, vol. 107, pp. 231-273, 2006.
- [18] M. J. Lizarraga and L. Fridman, "Robust Nash strategies based on integral sliding mode control for a two players uncertain linear affine quadratic game", *International Journal of Innovative Computing, Information and Control*, vol. 5, no. 2, pp. 241-251, 2009.
- [19] R. D. McKelvey, "A Liapunov function for Nash equilibria", Technical Report, California Institute of Technology, California, 1991.