

ارزیابی میزان باقیمانده انواع سموم آفتکش به روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرائمی در برخی از سبزیهای عرضه شده در میدان اصلی میوه و تره بار شهر تهران ۱۳۸۴

زهرا هادیان^۱، محمدحسین عزیزی^۲

۱- نویسنده مسئول: پژوهشیار گروه تحقیقات صنایع غذایی، انتیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پست الکترونیکی: z.hadian@nnftri.ac.ir

۲- دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۵/۷/۱۷

تاریخ دریافت مقاله: ۸۵/۲/۱۱

چکیده

سابقه و هدف: نظر به کاربرد گسترده سموم دفع آفات نباتی در کشاورزی و افزایش نگرانیهای مربوط به مخاطرات بهداشتی ناشی از وجود انواع باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، ارزیابی میزان باقیمانده انواع سموم آفتکش به روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی- جرمی در برخی از سبزیهای عرضه شده در میدان اصلی میوه و تره بار شهر تهران در سال ۱۳۸۴ انجام شد.

مواد و روشها: تحقیق به روش توصیفی بر روی ۳۰ نمونه خیار و گوجه فرنگی، کلم و کاهو به منظور بررسی وجود باقیمانده ۱۱۷ سم از انواع Organophosphorus، Organochlorine، Organonitrogen، Pyrethroids، Strobilurin، Triazine، Dicarboximides و Organochlorine گرفت. پس از استخراج سموم با حلal اتیل استات، تخلیص عصاره بر پایه ستونهای ژل تراوا کروماتوگرافی با کارایی بالا و فاز جامد انجام گرفت. شناسایی و تعیین میزان انواع آفتکشها با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی- اسپکترومتری جرمی مجهر به آشکارساز تله یونی (GC/ITMS) انجام شد.

یافته ها: از ۳۰ نمونه بررسی شده ۵۳/۳۳ درصد دارای انواع باقیمانده سموم از نوع حشره کش بودند. سموم-I Endosulfan، Endosulfan-II Phosalone و Chlorpyrifos، Endosulfan-sulphate در نمونه های خیار و گوجه فرنگی شناسایی شد. میانگین بازیابی سموم با این روش، خوب و در حد >۶۰٪ تعیین شد.

نتیجه گیری: میزان باقیمانده سموم شناسایی شده در نمونه های آلوده، بسیار کمتر از حداقل مجاز توصیه شده توسط FAO/Codex اتحادیه اروپا بود ($P<0.05$). هیچیک از سموم غیرمجاز مانند انواع DDT و HCH در نمونه ها وجود نداشت.

وازگان کلیدی: باقیمانده آفتکش، سبزیها، گازکروماتوگرافی- طیف سنجی جرمی

• مقدمه

متفاوت به ثبت رسیده است (۲). تولید محصولات گلخانه‌ای نیز مستلزم کاربرد سموم دفع آفات نباتی است. بررسیها نشان داده است که این نوع تولید می‌تواند منجر به باقیماندن سموم در مقادیر بالاتر از حد قانونی قابل قبول توصیه شده (MRL_S)^۱ توسط FAO /Codex و اتحادیه اروپا شود. میزان مصرف سموم تحت شرایط مختلف کشاورزی، آب و هوایی در هر کشور و بین نواحی مختلف یک کشور متفاوت است (۳).

باقیمانده ترکیبات شیمیایی موجود در مواد غذایی، طیف وسیعی را در بر می‌گیرند که عبارتند از: سموم طبیعی، مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، داروهای دامی، آلاندنه های صنعتی- زیستی و مواد شیمیایی حاصل از فراوری مواد غذایی و بسته بندی. ضایعات محصولات کشاورزی در برخی کشورها در مراحل قبل و بعد از برداشت در صورت عدم مصرف آفتکشها تا حدود ۴۶ درصد برآورد شده است (۱). در کشور ما از حدود ۸۰۰ آفتکش مورد مصرف در دنیا ۲۱۱ نوع ترکیب شیمیایی با فرمولاسیون های مختلف و کاربردهای

^۱ - MRLs: Maximum Residue Limits

• مواد و روشها

تحقیق حاضر به روش توصیفی روی ۳۰ نمونه انواع سبزیها (خیار، گوجه فرنگی، کلم و کاهو) که از مناطق مختلف کشور جمع‌آوری و در میدان اصلی میوه و تره بار شهر تهران عرضه شد انجام گرفت.

نمونه‌برداری طبق روش بین‌المللی توصیه شده Alimentarius 2000/1/24 (Codex) انجام شد (۲۶). نمونه‌های اولیه از هر بهر در صورت متوسط بودن اندازه محصول (مانند خیار و گوجه فرنگی) ۵ تا ۱۰ واحد (از هر بهر ۵۰-۵۰۰ کیلوگرم و وزن هر واحد ۱ کیلوگرم) را در یک کیسه نایلون قرار داده شد. در مورد نمونه‌های بزرگ و سبزیهای برگدار (کلم و کاهو) هر نمونه اولیه شامل ۴ واحد محصول (از هر بهر ۵۰-۵۰۰ کیلوگرمی یا > ۵۰۰ کیلوگرمی) بود که پس از قرار دادن در کیسه‌های نایلونی همراه سایر نمونه‌ها جهت آماده‌سازی اولیه به سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران منتقل شد.

آماده‌سازی اولیه نمونه‌ها با سایز بزرگ (کاهو و کلم) به این صورت بود که از هر واحد محصول کامل در نمونه اولیه به میزان نیم کیلو گرم برش داده می‌شد. به طوری که وزن نهایی نمونه آزمایشگاهی ۲ کیلوگرم می‌شد. پس از این مرحله، نمونه‌ها در کیسه‌های نایلونی قرار داده می‌شدند. (کد_۱ FCUKH_۵ تا FCUPD_۵ تا FCUPD_۱) نمونه خیار تازه خرم آباد، کد_۱ FTGH_۱ تا FTGH_۵ مربوط به پنج نمونه خیار تازه پل دختر، کد_۱ FTV_۱ تا FTV_۵ مربوط به پنج نمونه گوجه فرنگی تازه قزوین، کد FCAKA_۱ تا FCAKA_۵ مربوط به پنج نمونه کلم تازه کرج، کد_۱ FLKA_۱ تا FLKA_۵ مربوط به پنج نمونه کاهو تازه کرج می‌باشد). حدود ۳ ساعت پس از نمونه‌برداری، نمونه‌ها به سازمان سردخانه شهرداری تهران منتقل شده و به مدت ۱۲ ساعت در تونل انجماد با برودت 30°C -قرار می‌گرفتند. سپس میوه‌ها و سبزیهای منجمد شده در ظروف پلی اتیلنی در سردخانه با برودت 18°C تا زمان ارسال به آزمایشگاه CSL نگهداری شدند.

بیش از ۸۰ درصد باقیمانده آفت‌کشها در انسان و بویژه در کودکان، مخاطرات جدی در بر دارد (۴، ۵). همچنین تقریباً ۲۰ درصد از سموم دفع آفات نباتی ممکن است ایجاد سلطان کنند. کنترل باقیمانده سموم در مواد غذایی به دلایل پیامدهای بهداشتی و اقتصادی ضرورت دارد، به همین دلیل، برنامه‌های پایش وجود باقیمانده سموم در مواد غذایی در راستای اطمینان از حداکثر مجاز باقیمانده سموم و میزان دریافت از طریق رژیم غذایی در بسیاری از کشورها به طور مستمر انجام می‌شود (۶، ۷). سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۴ کلیه سموم دفع آفات نباتی را بر اساس ترکیبات سمی فعال مخاطره آمیز و LD₅₀ در ۴ رده شدید، زیاد، متوسط و جزئی طبقه بندی کرد (۸).

در حال حاضر، محققان برای تعیین باقیمانده آفت‌کشها در محصولات کشاورزی روش‌های متعددی را به کار می‌برند. تشخیص و تعیین مقدار سموم متعدد با انواع روش‌های کروماتوگرافی گازی با آشکارسازهای NPD، ECD و FPD (۹-۱۸)، اسپکترومتری جرمی ساده یا متوالی با آشکارسازهای یونش الکترونی و شیمیایی، روش پیگیری گزینش متوالی (GC/MS/MS)، کروماتوگرافی مایع با اسکارساز اسپکترومتری جرمی با تمرکز دوگانه (LC/Tandem/MS/MS) انجام شده است (۱۹-۲۵).

با نگرشی بر مصرف گسترده انواع سموم دفع آفات نباتی و نگرانی‌های بهداشتی باقیمانده این سموم بر سلامت مصرف کننده، چنین استنباط می‌شود که کنترل میزان آفت‌کشها در محصولات کشاورزی، امری ضروری است، در این راستا به ارزیابی میزان باقیمانده انواع سموم آفت‌کش در برخی از سبزیهای عرضه شده در میدان اصلی میوه و تره بار شهر تهران پرداخته شد. این تحقیق برای اولین بار توسط انتستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور با همکاری آزمایشگاه CSL انگلستان در سال ۱۳۸۴ انجام گرفت.

مواد شیمیایی و حلال‌ها (Fisher Scientific و UK HPLC Grade). استانداردهای Triazine، Organonitrogen، Organophosphorus، Pyrethrroids، Strobilurin و Organochlorine، Dicarboximides، (Thames Restek، UK) که در جدول ۱ آورده شده‌اند.

مواد شیمیایی به کار رفته در این آزمایشها عبارت بودند از: کلرور سدیم، سولفات سدیم، بی‌کربنات سدیم، دی‌پتاسیم‌هیدروژن فسفات، دی‌هیدروژن پتاسیم‌فسفات، استن، سیکلوهگزان، n-هگزان و اتیل استات.

جدول ۱- انواع آفت‌کشهای بررسی شده در برخی از سبزیجاهای عرضه شده در

میدان اصلی میوه و ترهبار شهر تهران سال ۱۳۸۴

ردیف	نوع آفت‌کش	ردیف	نوع آفت‌کش	ردیف	نوع آفت‌کش
۱	2-phenylphenol	۴۰	Ethofumesate	۷۹	Pentachlorothioanisole
۲	DDD-pp	۴۱	Ethoprophos	۸۰	Penconazole
۳	DDE-pp	۴۲	Ethoxyquin	۸۱	Pendimethalin
۴	DDT-op	۴۳	Etridiazole	۸۲	Permethrin
۵	DDT-pp	۴۴	Etrimesfos	۸۳	phenthroate
۶	HCH-gamma	۴۵	Fenarimol	۸۴	Phosalone
۷	Atrazine	۴۶	Fenitrothion	۸۵	Phosmet
۸	Azinphos- methyl	۴۷	Fenpropothrin	۸۶	Phosphamidon
۹	Azoxystrobin	۴۸	Fenvalerate	۸۷	Pirimicarb
۱۰	Amitraz	۴۹	Flucythrinate	۸۸	Pirimiphos-methyl
۱۱	Bendiocarb	۵۰	Flurochloridone	۸۹	Pirimiphos- ethyl
۱۲	Bifenthrin	۵۱	Fusilazole	۹۰	Prochloraz
۱۳	Biphenyl	۵۲	Fonofos	۹۱	Procymidone
۱۴	Bromopropylate	۵۳	Furalaxyd	۹۲	Profenos
۱۵	Bupirimate	۵۴	Heptenophos	۹۳	Prometryn
۱۶	Buprofezin	۵۵	Hexachlorobenzene	۹۴	Propargite
۱۷	Captan	۵۶	Imazalil	۹۵	Propham
۱۸	Carbaryl	۵۷	Iprodione	۹۶	Propoxur
۱۹	Chlorfenvinphos	۵۸	Isofenphos	۹۷	Propyzamide
۲۰	Chlorpyrifos-methyl	۵۹	Kresoxim-methyl	۹۸	Prothifos
۲۱	Chlozolinate	۶۰	Malaoxon	۹۹	Propanil
۲۲	Cypermethrin	۶۱	Malathion	۱۰۰	Prothifos
۲۳	Cyfluthrin	۶۲	Mecarbam	۱۰۱	Propiconazol
۲۴	Cyhalothrin-lambda	۶۳	Mephosfolan	۱۰۲	Pyrazophos
۲۵	Cypermethrin	۶۴	Methacrifos	۱۰۳	Pyridaphenthion
۲۶	Chlorothalonil	۶۵	Metoxuron	۱۰۴	Pyrimethanil
۲۷	Deltamethrin	۶۶	Metribuzin	۱۰۵	Quinalphos
۲۸	Dichlorvos	۶۷	Metalaxyl	۱۰۶	Quintozone
۲۹	Dicloran	۶۸	Myclobutanil	۱۰۷	Quinomethionate
۳۰	Dicofol	۶۹	Methidathion	۱۰۸	Simazine
۳۱	Dimethoate	۷۰	Methiocarb	۱۰۹	Tebuconazole
۳۲	Diphenylamine	۷۱	Napropamide	۱۱۰	Tecnazene
۳۳	Diazinon	۷۲	Nitrothal -isopropyl	۱۱۱	Tetrachlorvinphos
۳۴	Dichlofluanid	۷۳	Ofurace	۱۱۲	Tolclofos-methyl
۳۵	Diazinon	۷۴	Oxadixyl	۱۱۳	Tetradifon
۳۶	Endosulfan (I)	۷۵	Paclobutrazol	۱۱۴	Trifluralin
۳۷	Endosulfan (II)	۷۶	Parathion-ethyl	۱۱۵	Tolyfluanid
۳۸	Endosulfan- sulphate	۷۷	Parathion-methyl	۱۱۶	Triazophos
۳۹	Ethion	۷۸	Pentachloroanaline	۱۱۷	Vinclozolin

مخلوط کردن ۳۰ گرم از هر یک از نمونه‌ها همراه ۵ گرم

بی‌کربنات سدیم، ۴۰ گرم سولفات سدیم بدون آب و ۳۰۰

میلی لیتر حلal اتیل استات به وسیله سانتیریفوژ آماده

شد. عصاره استخراجی پس از صاف شدن، تحت خلاء

آتالیز

آزمایشها بر اساس دستورالعمل کمیته اقتصادی اروپا

(91/414EEC) که توسط کشور انگلستان در سال ۲۰۰۳

تمکیل شد، انجام گرفت (۲۷). نمونه‌های هموژن با


شناسایی و تعیین مقدار سموم به تفکیک اجزا بر اساس m/e مختلف صورت گرفت. به این ترتیب که با ورود مقدار کمی نمونه تبخیر شده به منبع یونی، در آشکارساز تله یونی (Ion Trap Detector) عمل یونیزاسیون و تجزیه یون‌ها به کمک الکتروودها انجام شد. هر یک از سموم در تله یونی به نسبت m/e در میدان آهن ریایی از یکدیگر جدا و اندازه‌گیری شدند.

مطالعه بازیابی سموم با افزودن ۱۰۰ میکرولیتر از استاندارد سموم مورد بررسی به نمونه‌های کاهو، کلم، گوجه فرنگی و خیار که در تولید آنها هیچ نوع سمی به کار نرفته بود، با ۵ تکرار و یک غلظت 0.5 mgkg^{-1} انجام شد (spiking). نمونه پس از تبخیر حلال با جریان هوا، نمونه مخلوط و هموژن شد و برای بازیابی باقیمانده سموم در نمونه‌های سبزی مراحل استخراج و آتالیز انجام شد.

۰ یافته‌ها

تحقیق بر روی ۳۰ نمونه انواع سبزی (۱۰ نمونه خیار، ۱۰ نمونه گوجه فرنگی، ۵ نمونه کلم و ۵ نمونه کاهو) انجام شد. از این تعداد ۱۶ نمونه دارای باقیمانده برخی از آفتکشها بودند.

شکل ۱ میزان باقیمانده سم Chlorpyrifos در نمونه‌های خیار (منطقه خرم آباد) را نشان می‌دهد. میانگین باقیمانده سم Chlorpyrifos با میزان MRLs کشورهای اروپایی، با توجه به آزمون مقایسه دوتایی، دارای اختلاف آماری معنی‌داری بود ($P < 0.01$).



شکل ۱- میزان باقیمانده آفتکش

در نمونه‌های خیار تازه (خرم آباد)

خشک شد. با توجه به نوع ماتریکس، تخلیص عصاره بر پایه ستونهای ژل تراوا کروماتوگرافی با کارایی بالا^۱ و فاز جامد^۲ انجام گرفت. تخلیص نمونه‌های کلم و کاهو با ستونهای (60×21.2 mm i.d) Envirosep-ABC انجام شد.

برای تخلیص نمونه‌های خیار و گوجه فرنگی از ENVI-Carb graphitised carbon black (supelco PA, USA) کارتریج های Bellefonte (Directive 91/414EEC) استفاده شد. در تکنیک HPGPC سرعت فاز متحرک سیکلوهگزان اتیل استات (1:1) ۵ میلی لیتر در دقیقه بود و زمان عبور نمونه در ستون ۱۶ دقیقه به طول انجامید. ۱۴ میلی لیتر از نمونه، حاوی سم خارج شده از ستون به وسیله تبخیر کننده چرخان تحت خلاء خشک شد. باقیمانده حلال با جریان گاز ازت حذف شد. نمونه جمع‌آوری شده قبل از تزریق به دستگاه در تولوئن حل شد. نمونه شاهد (۵ گرم نمونه استاندارد، ۲ میلی لیتر اتیل استات و ۱۰۰ میکرولیتر مخلوط سم) درسه تکرار بدون انجام این مرحله برای تزریق آماده شدند.

در تکنیک SPE ۱۰ ml از عصاره را پس از عبور مستقیم از ستون در اتیل استات، جمع‌آوری کرده و به منظور رسوب پروتئین و سایر مواد جامد، پس از صاف کردن pH آن تنظیم شد. محلول حاصل از شستشو در ۱ml مجاورت گاز ازت در حرارت 40°C تا حجم کمتر از ۱ml تبخیر شد و پس از حل شدن در ۱۰ ml استن تا حجم کمتر از ۱ml دوباره تبخیر شد.

شناسایی و اندازه‌گیری باقیمانده سموم نمونه‌ها به وسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی (varian 3800) و اسپکترومتری جرمی (varian 2200) مجهز به تله یونی با ۳ تکرار انجام گرفت.


یک میکرولیتر از نمونه به ستون DB5-MS (25m×0.25mm×0.25μm) در دمای 250°C تزریق شد. از هلیوم (۹۹/۹۹٪) به عنوان گاز حامل استفاده شد؛ سرعت آن معادل ۱ میلی لیتر در دقیقه بود. برنامه ریزی دمایی قسمت گرم کننده ۳۴ دقیقه به طول انجامید و

¹- High Performance Gel Permeation Chromatography

²- Solid Phase Extraction

مقایسه دوتایی میانگین‌های باقیمانده سموم این نمونه‌ها با میزان MRL_S کدکس و اتحادیه اروپا نشان داد که در سطح کمتر از ۱٪ دارای اختلاف آماری معنی‌داری بودند.


شکل ۲ میزان هر یک از سموم Endosulfan-II، Endosulfan-I و Endosulfan-sulphate را در نمونه‌های خیار (منطقه پل دختر) نشان می‌دهد. نتایج آزمون



شکل ۲- میزان باقیمانده انواع آفتکش Endosulfan در نمونه‌های خیار تازه (پل دختر)

شکل ۴ مربوط به باقیمانده سم Fenvalerate در گوجه فرنگی (منطقه ورامین) است. مقایسه میزان باقیمانده سم Fenvalerate در گوجه فرنگی مزرعه ورامین (بدون انجام آزمون آماری) حاکی از وجود اختلاف آماری معنی‌دار بود.

شکل ۳ میزان باقیمانده سم Phosalone را در نمونه گوجه فرنگی (منطقه قزوین) نشان می‌دهد. نتایج آزمون مقایسه دوتایی میانگین باقیمانده سم آفتکش Phosalone با میزان MRL_S اتحادیه اروپا از لحاظ آماری معنی‌دار بود ($P<0.01$).



شکل ۴- میزان باقیمانده آفتکش Fenvalerate در نمونه‌های گوجه فرنگی تازه (ورامین)

شکل ۳- میزان باقیمانده آفتکش Phosalone در نمونه‌های گوجه فرنگی تازه (قزوین)

میانگین بازیابی، تکرار پذیری انحراف معیار نسبی، آماره t Codex MRLs و حد پایین و بالای اطمینان است.

جدول ۲- میانگین بازیابی و تکرار پذیری انحراف معیار نسبی باقیمانده آفتکشهای شناسایی شده به روش GC/Mass در نمونه‌های سبزی (سال ۱۳۸۴)

R.S.D. _R	میانگین بازیابی	R.S.D. ¹ _R	میانگین بازیابی	نمونه سم	
				خیار	خیار
۱۱/۴۵	۱۰۵/۳۳	۷/۷۵	۹۱/۳۳		Chlorpyrifos
۵/۴۶	۸۷/۰۰	۱۴/۰۰	۱۰۸/۳۳		Endosulfan-I
۱۱/۹۹	۹۸/۰۰	۴/۴۵	۱۰۴/۰۰		Endosulfan-II
۲۱/۴۷	۸۷/۰۰	۱۷/۸۸	۸۳/۰۰		Endosulfan-sulphate
۳/۴۹	۱۱۵/۶۷	۱۴/۵۵	۱۰۷/۰۰		Fenvalerate
۴/۰۲	۱۰۷/۳۳	۶/۲۲	۶۱/۶۷		Phosalone

۱. تکرار پذیری انحراف معیار نسبی

جدول ۳- مقایسه شاخص‌های آماری مربوط به باقیمانده آفتکشهای شناسایی شده به روش GC/Mass در نمونه‌های سبزی (سال ۱۳۸۴)

محصول	خیار (پل‌دختر)	خیار (پل‌دختر)	خیار (پل‌دختر)	خیار (پل‌دختر)	خیار (پل‌دختر)	گوجه‌فرنگی (ورامین)	گوجه‌فرنگی (قزوین)
باقیمانده سم							
Min(Mg/kg)	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۵	۰/۰۷
Max(Mg/kg)	۰/۰۵	۰/۰۴	۰/۰۵	۰/۰۴	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۷
Mean $\pm S_{\bar{X}}$ (Mg/kg)	۰/۰۴۵ $\pm 0/0837$	۰/۰۲۸ $\pm 0/0374$	۰/۰۴ $\pm 0/0316$	۰/۰۳ $\pm 0/0447$	۰/۰۳۲ $\pm 0/049$	-	-
حد پایین اطمینان	۰/۰۱۶۷	۰/۰۱۷۶	۰/۰۳۱۲	۰/۰۱۷۶	۰/۰۱۸۴	-	-
حد بالای اطمینان	۰/۰۶۳۲	۰/۰۳۸۴	۰/۰۴۴۸	۰/۰۴۲۴	۰/۰۴۵۶	-	-
آماره t CODEX MRLs	-	-	-۱۴۵/۴۶۵***	-۱۰۵/۰۹۵***	-۹۵/۵۳***	-	-
MRLs EU t MRLs	-۹۴/۰***	-۵/۸۸***	-۳/۱۶۲*	-۴/۴۷۲*	-۳/۶۷*	-	-
MRLs CODEX(Mg/kg)	۱	۱	۰/۵	۰/۵***	۰/۵***	۱	۱
MRLs EU(Mg/kg)	۰/۰۲	-	-	۰/۵***	۰/۵***	۰/۰۲	-

*- وقی که $S_{\bar{X}}$ صفر باشد، حداقل مقدار برای کمیت مورد نظر، معنی دار است.

**- وقی که $S_{\bar{X}}$ صفر باشد، حدوداً تماد برای میانگین می باشدو یک مقدار است.

***- حد تعیین شده برای مجموع اندوسلوفان است.

(۲۰۰۲) در اسپانیا و Safí (۲۰۰۲) در فلسطین نمایانگر ارتباط بین تغییرات میزان باقیمانده سم با زمان سمپاشی، میزان و نحوه کاربرد سم، نوع محصول، فصل و فاصله زمانی بین زمان برداشت تا سم پاشی است. مقایسه انواع سموم شناسایی شده در نمونه‌های این تحقیق با راهنمای طبقه بندی توصیه شده WHO (۲۰۰۴) مربوط به مخاطرات آفت‌کشها نشان می‌دهد که همه آنها در رده II (Moderately hazardous) قرار داشتند. به عبارت دیگر LD₅₀ تعیین شده این رده ۵۰-۲۰۰۰ mgkg⁻¹ BW و جذب پوستی آن معادل ۴۰۰۰ mgkg⁻¹ BW است. شایان ذکر است که WHO دوز خوراکی سموم به شکل جامد و مایع در حد ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم را به عنوان نقطه بی اهمیت در ایجاد مخاطره حاد بهداشتی اعلام کرده است.

در مجموع، با توجه به نتایج آزمون آماری T-test وجود اختلاف آماری معنی‌دار در سطح کمتر از ۵ درصد میان شاخصهای مربوط به مقادیر سموم آفت‌کشها شناسایی شده در نمونه‌های مورد بررسی در مقایسه با میزان MRLs FAO/Codex و اتحادیه اروپا و از طرف دیگر مقایسه این باقیمانده‌ها با مقادیر توصیه شده توسط WHO، چنین استنباط می‌شود که میزان سموم موجود در این سبزیها سلامت مصرف کننده را تهدید نمی‌کند.

سپاسگزاری

از مسئولان محترم انتستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور جهت حمایت‌های مالی و همکاری آزمایشگاههای خاتم و CSL در انجام این تحقیق تشکر و قدردانی می‌شود.

منابع

1. Helperich, W., winter, C. 2001. Food Toxicology. USA. CRC. P:163-185.
2. فهرست سموم مجاز کشور. سازمان حفظ نباتات. ۱۳۷۸.
3. Hernandez-Torres, ME., Egea-Gonzalez, F.J., Castro-Cana, M.L. Residue of methamidofos malathion and methiocarb in greenhouse crops J. of Agricultural & Food Chemistry. 2002; 50(5) 1172-1177.

• بحث

ارزیابی باقیمانده ۱۱۷ نوع سم در ۳۰ نمونه به روش GC/ITMS نشان داد که ۵۳/۳۳ درصد نمونه‌ها، دارای باقیمانده سوم انواع حشره‌کش بودند و ۴۶/۶۷ درصد آنها آلودگی نداشتند. این نتایج با میزان اعلام شده توسط برنامه‌های پایش کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ و Dogheim (۲۰۰۱) مطابقت دارد و با یافته‌های DDT (۲۰۰۱) که هیچیک از سموم غیرمجاز مانند انواع HCH-۷ در نمونه‌های بررسی شده او وجود نداشت، شباهت دارد.

یکی از معیارهای مهم انتخاب یک روش تجزیه‌ای مناسب میانگین بازیابی و تکرارپذیری انحراف معیار نسبی است. میانگین بازیابی سموم Endosulfan-II، Endosulfan-I، Fenvalerate، Endosulfan-sulphate Phosalone و Chlorpyrifos در نمونه‌های خیار به ترتیب ۱۰۴، ۸۳، ۱۰۷، ۱۰۸/۳۳، ۹۱/۳۳ و ۶۱/۶۷ تعیین شد. در نمونه‌های گوجه فرنگی میانگین بازیابی Chlorpyrifos، Fenvalerate، Endosulfan-II، Pphosalone و Endosulfan-I، Endosulfan-sulphate شناسایی شده به ترتیب ۱۱۵/۶۷، ۱۱۵/۶۷، ۸۷، ۸۷، ۱۰۷/۳۳، ۹۸ شد که با حد بازیابی تعیین شده ۶۰-۱۴۰ درصد اتحادیه اروپا (۲۸) مطابقت می‌کند.

تکرارپذیری انحراف معیار نسبی در محصولات خیار و گوجه فرنگی در محدوده ۴/۴۵-۱۷/۸۸ درصد و ۳/۴۹-۲۱/۴۷ بود و با تکرارپذیری انحراف معیار نسبی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا (۲۰٪) به عنوان یکی از معیارهای روش‌های تجزیه آزمایشگاهی مناسب، همسویی دارد. حد تشخیص روش در این بررسی برای ۱۰/۲ درصد سموم $\leq 0/01\text{ mgkg}^{-1}$ ، برای ۸۷/۳ درصد سموم $\leq 0/02\text{ mgkg}^{-1}$ و برای ۲/۵ درصد سموم $\leq 0/05\text{ mgkg}^{-1}$ بود.

نمونه‌های کاهو و کلم، فاقد باقیمانده سموم بودند. نتایج تحقیقات Hill (۲۰۰۳) در انگلستان، Torrese www.SID.ir

4.
8. [www.SID.ir](http:// WHO Recommended Classification of Pesticide by Hazard 2004.
9. O'keefe, M. Residue analysis in food principles and application. The Netherlands Harwood academic. 2000; P:229. 9.
10. Motohashi, N., Nagashima, H., Parkanyi C., Subrahmanyam, B., Zhang, G. W. Official multiresidue methods of pesticide analysis in vegetables, fruits and soil. J. Chromatography A. 1996; 754 : 333-346.
11. Gelsomino, A., B.Petrovicova, B., Tiburini, S., Magnani, E., Felici , M. Multiresidue analysis of pesticides in fruits and vegetables by gel permeation chromatography followed by gas chromatography with electron-capture and mass spectrometric detection. J.Chromatography A 1997; 782:105-122.
12. Torres, C.M., Pico, Y., Manes, J. Comparison of octadecylsilica and graphitized carbon black as materials for solid-phase extraction of fungicide and insecticide residues from fruits and vegetables. J. Chromatography A. 1997. 778: 127-137.
13. Hernandez-Torres, ME., Egea-Gonzalez, F.J., Castro-Cana, M.L. Residue of methamidofos malathion and methiocarb in greenhouse crops J. of Agricultural & Food Chemistry . 2002 ; 50(5) 1172-1177.
14. Lehotay, S.J., Valverde- Garcia, A. Evaluation of different solid- phase traps for automated collection and clean- up in the analysis of multiple pesticides in fruits and vegetables after supercritical fluid extraction. J. of Chromatography A. 1997; 765: 69- 84.
15. Dogheim, S.M., Gad Alla, S.A., EL-Marsafy, A.M. Monitoring of pesticide residues in Egyptian fruits and vegetables during 1996. Journal of AOAC International. 2001; 84 :519- 531.
16. Hill, ARC, Reynolds, SL. Unit-to-Unit Variability of Pesticide residues in fruit and Vegetables. Food Additive & Contaminants. 2002 ; 19(8):733-747.
17. Akiyama, Y., yoshioka, N., Tsuji, M. pesticide residue in agricultural products monitored in Hyogo Prefecture Japan FYs 1995-1999. J. of AOAC International. 2002 ; 85(3):692-703.
18. Fytianos, K., Raikos, N., Theodoridis, G., Z., Velinova, Tsoukali, H. Solid phase microextraction applied to the analysis of organophosphorus insecticides in fruits. Chemosphere.2006.In press.
19. Sojo, L.E., Brocke, A., Fillion, J., Price S.M. 1997. Application of activated carbon membranes for on- line clean up of vegetable and fruit extracts in the determination of pesticide multiresidues by gas chromatography with mass selective detection.
20. Niessner, G., Buchberger, W., Eckerstorfer, R. Multiresidue screening methods for the determination of pesticides in plant materials. J. chromatography A.1999; 846:341-348.
21. Schenck, F.J., Lehotay, s.j. Dose further clean-up reduce the matrix enhancement effect in gas chromatography analysis of pesticide residues in food? J.Chromatography A, 2000; 868:51-61.
22. Fillion, J., Sauve, F., Selwyn, J. Multiresidue method for the determination of residues of 251 pesticide in fruits and vegetables by gas chromatography/mass spectrometry and liquid chromatography/ fluorescence detection. Journal of AOAC International.2000; 83(3):698-713.
23. Pang, G.F., Can, Y.Z., Fan, C.L., Zhang, J.J., Li, X.M., Mu, J., Wang, D.N., Liu, S.M., Song, W.B., Li,H.P., Wong, S.S., Kubinec, R., Tekel, J., Tahoma, S. Interlaboratory study of identification and quantification of multiresidue pyrethroids in agricultural products by gas chromatography-mass spectrometry. J. Chromatography A. 2000; 882: 231-238.
24. Rosenblum, L., ttieder, T., Morgan, J. Determination of Pesticides in Composite Dietary samples by Gas chromatography/Mass spectrometry in the selected ion monitoring mode by using a temperature-programmable large volume injector with preseparation column. J.AOAC Interenational. .2001; 84 (3): 891- 900.
25. Ueno, E.,Oshim. Chun O.K., Kang H.G., Kim, M.H. Multiresidue method for the determination of pesticides in Korean domestic crops by gos chromatography/Mass selective detection. J.AOAC Interenational. 2003; 86 (4). 823- 831.
26. The Plant Protection Products Directive (91/414/EEC): European Commission implemented in the UK .2003.
27. Codex Alimentarius. Pesticide residues in food methods of analysis and sampling . 2000.24: part1.
28. Stajnbaher, D., Zupancic,-Kralj L. 2000 . Multiresidue method for determination of 90 pesticides in fresh fruits and vegetables using solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectromctry. J. Chromatography A.;1015 : 185-198

</div>
<div data-bbox=)