

مقایسه روش‌های مختلف تعیین سوء تغذیه انرژی- پروتئین با روش ارزیابی جامع ذهنی در بیماران همودیالیزی

هادی طیبی^۱، عاطفه اصحابی^۲، بهناز نوذری^۳، میترا مهدوی مزده^۴، مهدی هدایتی^۵، مرتضی عبداللهی^۶

- ۱- نویسنده مسئول: استادیار گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پست الکترونیکی: hadtabibi@yahoo.com
- ۲- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- ۳- پزشک عمومی، بیمارستان امام خمینی (ره)
- ۴- دانشیار گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۵- استادیار مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- ۶- استادیار پژوهشی، گروه تحقیقات تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ دریافت: ۸۹/۱/۱۴

تاریخ پذیرش: ۸۹/۴/۳۰

چکیده

سابقه و هدف: سوء تغذیه انرژی- پروتئین در بیماران همودیالیزی شایع است. تاکنون مطالعه‌ای در زمینه مقایسه روش‌های مختلف تعیین سوء تغذیه انرژی - پروتئین شامل SGa، DMS، MIS و BMI در بیماران همودیالیزی صورت نگرفته است. بنابراین مطالعه حاضر به منظور تعیین حساسیت، ویژگی، درستی، ارزش اخباری مثبت و منفی و نسبت درست‌نمایی مثبت و منفی روش‌های DMS، MIS و BMI در مقایسه با روش SGa که متداول‌ترین روش تعیین سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی است صورت گرفت.

افراد و روش‌ها: در این مطالعه از ۲۳۰۲ بیمار همودیالیزی بزرگسال واجد شرایط در کلیه بیمارستان‌های تهران، ۲۹۱ بیمار به‌طور تصادفی با استفاده از نمونه‌گیری نظام‌مند انتخاب شدند. وضعیت تغذیه‌ای بیماران همودیالیزی از طریق تکمیل فرم‌های SGa، DMS، MIS و تعیین BMI مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بعد از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتایی، ۴ میلی‌لیتر خون از بیماران قبل از دیالیز گرفته شد و غلظت اوره، کراتینین، آلبومین و TIBC سرم اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: در این مطالعه شیوع سوء تغذیه انرژی- پروتئین خفیف تا متوسط در بیماران همودیالیزی شهر تهران بر مبنای روش‌های SGa، DMS، MIS و BMI به ترتیب ۶۰/۵٪، ۶۱/۵٪، ۵۴٪ و ۱۶/۵٪ بود. شیوع سوء تغذیه انرژی- پروتئین شدید در این بیماران بر مبنای روش‌های SGa، DMS، MIS و BMI به ترتیب ۱٪، ۱/۵٪، ۱٪ و ۱٪ بود. حساسیت، ویژگی، درستی، سطح زیر منحنی ROC، ارزش اخباری مثبت و منفی و نسبت درست‌نمایی مثبت و منفی در مورد روش DMS در مقایسه با روش SGa، به ترتیب معادل ۹۴٪، ۸۸٪، ۹۲٪، ۰/۹۷، ۰/۹۳، ۰/۹۲، ۷/۸ و ۰/۰۷، در مورد روش MIS در مقایسه با روش SGa، به ترتیب معادل ۸۷٪، ۹۶٪، ۹۱٪، ۰/۹۷، ۰/۸۳، ۲۲ و ۰/۱۳ و در مورد شاخص BMI در مقایسه با روش SGa، به ترتیب معادل ۲۳٪، ۹۱٪، ۵۰٪، ۰/۶۴، ۸۰٪، ۴۳٪، ۲/۵ و ۰/۸۵ بودند.

نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد که روش‌های DMS و MIS، از نظر تشخیص سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی، تقریباً مشابه با روش SGa هستند، در حالی که BMI شاخص مناسبی در این زمینه نیست. همچنین به نظر می‌رسد که روش DMS در ارزیابی‌های معمول بیمارستانی جایگزین مناسب‌تری برای SGa است.

واژگان کلیدی: سوء تغذیه انرژی- پروتئین، همودیالیز، ارزیابی جامع ذهنی، امتیاز دیالیز- سوء تغذیه، امتیاز سوء تغذیه- التهاب

• مقدمه

کاتابولیسم به دلیل افزایش تولید سیتوکین‌های التهابی به راحتی می‌تواند سبب وضعیت نامطلوب تغذیه‌ای شوند (۱-۳). به همین دلیل سوء تغذیه انرژی- پروتئین در بیماران

در بیماران همودیالیزی محدودیت در دریافت برخی از گروه‌های غذایی، بی‌اشتهایی، از دست رفتن مواد مغذی محلول در آب در طی همودیالیز و همچنین بالا بودن میزان

همودیالیزی واجد شرایط برای این مطالعه، با استفاده از نمونه‌گیری نظام‌مند و به‌طور تصادفی ۳۲۸ بیمار همودیالیزی انتخاب شدند. تعداد نمونه لازم برای این مطالعه حدود ۲۹۲ بیمار تعیین شد اما حجم نمونه حدود ۱۲٪ بیشتر در نظر گرفته شد و این امر به دلیل احتمال عدم تمایل برخی از بیماران جهت شرکت در این مطالعه بود. در این تحقیق ابتدا از بیماران همودیالیزی رضایت‌نامه آگاهانه کتبی اخذ شد و سپس بعد از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتایی، حدود ۴ میلی‌لیتر خون قبل از اتصال به دستگاه دیالیز گرفته شد و اطلاعات عمومی در مورد هر بیمار در برگه جمع‌آوری داده‌ها ثبت شد. بعد از اتمام جلسه دیالیز، قد بیماران و وزن خشک بیماران (وزن بعد از دیالیز) مطابق با روش‌های استاندارد تعیین شد و BMI بیماران محاسبه گردید. در این مطالعه جهت تعیین سوء‌تغذیه انرژی - پروتئین علاوه بر محاسبه BMI، برای بیماران همودیالیزی فرم‌های SGA، DMS و MIS تکمیل شد. فرم SGA شامل دو بخش سابقه پزشکی و معاینه فیزیکی است. بخش اول این فرم که در زمینه سابقه پزشکی بیمار است ۵ جزء دارد که شامل تغییرات وزن، دریافت رژیم غذایی، علائم گوارشی، ظرفیت عملی بیمار (functional capacity)، وجود بیماری‌های زمینه‌ای هیپرکاتابولیک (از قبیل صدمات جسمی، سوختگی، بیماری‌های التهابی، عفونت و تومورهای بدخیم) است (۹). بخش دوم فرم SGA، که در زمینه معاینه فیزیکی است، ۳ جزء دارد که شامل تحلیل چربی زیر پوستی، تحلیل عضلانی، حضور ادم و یا آسیت است (۱۰)، (۹). در صورتی که هر یک از اجزای نامبرده طبیعی باشند، به آن جزء امتیاز A، در صورتی که به‌طور خفیف تا متوسط تحت تأثیر قرار گرفته باشند، امتیاز B و در صورتی که به‌طور شدید تحت تأثیر قرار گرفته باشند، امتیاز C تعلق می‌گیرد (۱۳، ۱۴). در امتیازدهی نهایی فرم SGA، در صورتی که بیشتر اجزاء، امتیاز A گرفته باشند، فرد دارای وضعیت تغذیه‌ای طبیعی و اگر بیشتر اجزاء امتیاز B گرفته باشند، فرد دارای سوء‌تغذیه خفیف تا متوسط و در صورتی که بیشتر اجزاء امتیاز C گرفته باشند، فرد دارای سوء‌تغذیه شدید است (۱۵). فرم DMS که دارای ۷ جزء است دارای همان اجزاء فرم SGA است، به استثنای اینکه در فرم DMS جزء مربوط به وجود ادم یا آسیت حذف شده است. همچنین همان‌طور که قبلاً بیان شد، در فرم SGA امتیازدهی به صورت A، B یا C است، در صورتی که در فرم DMS هر یک از اجزای آن

همودیالیزی شایع است (۲، ۱). مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، شیوع سوء‌تغذیه انرژی - پروتئین را در بیماران همودیالیزی از ۱۶٪ تا حدود ۹۰٪ گزارش کرده اند (۴-۱). سوء‌تغذیه در بیماران همودیالیزی سبب کاهش کیفیت زندگی، افزایش ابتلا به بیماری‌ها و همچنین افزایش مرگ و میر می‌شود (۸-۵، ۲).

روش‌های مختلفی جهت تعیین سوء‌تغذیه در بیماران همودیالیزی وجود دارد (۹). متداول‌ترین روش در این زمینه روش ارزیابی جامع ذهنی Subjective Global Assessment (SGA) است که یک روش کلینیکی معتبر (valid) و پایا (reliable) جهت ارزیابی وضعیت تغذیه و تعیین سوء‌تغذیه در بیماران همودیالیزی است اما این روش، یک روش نیمه کمی است (۱۰، ۹). با ایجاد تغییراتی بر روی SGA، دو روش امتیاز دیالیز - سوء‌تغذیه (Dialysis Malnutrition Score (DMS) و سوء‌تغذیه - التهاب (Malnutrition Inflammation Score (MIS) ایجاد شده است که این روش‌ها کاملاً کمی هستند (۱۲-۱۰) اما تاکنون مطالعه‌ای جهت مقایسه این دو روش با SGA، در زمینه تعیین شیوع سوء‌تغذیه انرژی - پروتئین صورت نگرفته است. از سوی دیگر در افراد سالم و بسیاری از بیماران غیر کلیوی از شاخص نمایه توده بدنی (Body Mass Index (BMI) برای تعیین وضعیت تغذیه‌ای استفاده می‌شود. شاخص BMI نیز تاکنون از نظر تعیین سوء‌تغذیه انرژی - پروتئین در بیماران همودیالیزی، با روش SGA مورد مقایسه قرار نگرفته است. به همین دلیل در این مطالعه حساسیت، ویژگی، درستی، ارزش اخباری مثبت و منفی و نسبت درست‌نمایی مثبت و منفی روش‌های DMS، MIS و BMI نسبت به SGA در تشخیص سوء‌تغذیه انرژی - پروتئین در بیماران همودیالیزی تعیین می‌گردد تا مشخص شود کدام یک از این روش‌ها می‌توانند به‌عنوان جایگزینی برای روش SGA در تعیین سوء‌تغذیه انرژی - پروتئین در بیماران همودیالیزی به کار گرفته شود.

• افراد و روش‌ها

در این مطالعه مقطعی ابتدا از روی فهرست بیماران همودیالیزی تحت پوشش ۵۰ مرکز دیالیز شهر تهران، فهرست بیماران با سن ۱۸ سال یا بیشتر که حداقل شش ماه تحت همودیالیز قرار داشته‌اند و مبتلا به هیپاتیت B و یا ایدز نبوده‌اند تهیه شد. سپس از میان ۲۳۰۲ بیمار

اندازه‌گیری غلظت اوره سرم با روش فتومتری با استفاده از کیت‌های شرکت پارس آزمون، غلظت کراتینین سرم با روش رنگ‌سنجی با استفاده از کیت‌های شرکت پارس آزمون، غلظت آلبومین سرم با روش برم کرزول گرین (Bromocresol Green) و با استفاده از کیت‌های شرکت پارس آزمون و غلظت سرمی ظرفیت تام باندکنندگی آهن با روش رنگ‌سنجی و با استفاده از کیت‌های شرکت زیست‌شیمی اندازه‌گیری شدند. میزان ضریب تغییرات درون‌آزمونی (intra-assay) در مورد اندازه‌گیری غلظت اوره، کراتینین، آلبومین و TIBC سرم، به ترتیب برابر با ۲/۷٪، ۲/۴٪، ۲/۸٪ و ۲٪ بود. در این پژوهش اندازه‌گیری غلظت آلبومین و TIBC سرم جهت تکمیل فرم MIS صورت گرفت. در این مطالعه تعیین حساسیت، ویژگی، درستی، ارزش اخباری مثبت و منفی و درست‌نمایی مثبت و منفی روش‌های DMS، MIS و BMI نسبت به SGA در تشخیص سوءتغذیه انرژی - پروتئین با استفاده از فرمول‌های مربوط صورت گرفت (۱۸، ۱۷). تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و رسم منحنی‌های ROC (Receiver Operating Characteristic) توسط نرم‌افزار SPSS 11.5 انجام شد. جهت تعیین همبستگی روش‌های DMS، MIS و BMI (بعد از دسته‌بندی افراد بر مبنای آنها به سه گروه دارای وضعیت تغذیه‌ای نرمال، سوءتغذیه خفیف تا متوسط و سوءتغذیه شدید) با روش SGA از ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman's correlation coefficient) استفاده شد.

• یافته‌ها

از مجموع ۳۲۸ بیمار همودیالیزی انتخاب شده، ۲۹۱ بیمار همودیالیزی با این مطالعه همکاری کردند که ۵۶٪ آنها مرد و ۴۴٪ زن بودند. از نظر سنی ۵۰/۵٪ بیماران را افراد بالای ۶۰ سال، ۳۴٪ را افراد ۶۰-۴۱ ساله و ۱۵/۵٪ را بیماران ۴۰-۱۸ ساله تشکیل می‌دادند. از مجموع بیماران، ۸۹٪ آنها در هفته سه بار و ۱۱٪ در هفته ۲ بار به مدت چهار ساعت تحت عمل همودیالیز قرار می‌گرفتند. در بیماران همودیالیزی مورد مطالعه میانگین و انحراف معیار غلظت کراتینین و اوره سرم آنها به ترتیب 9 ± 3 و 123 ± 29 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود و صافی‌های مورد استفاده جهت همودیالیز کلیه بیماران مورد مطالعه از جنس پلی‌سولفان (polysulfone) بود.

می‌توانند از ۱ تا ۵ امتیاز بگیرند. در صورتی که هر یک از اجزاء کاملاً طبیعی باشند امتیاز ۱ و اگر شدیدترین حالت نامطلوب را داشته باشند امتیاز ۵ می‌گیرند. بنابراین امتیاز DMS کسب‌شده توسط هر فرد همودیالیزی می‌تواند بین ۷ تا ۳۵ باشد (۱۱). در این مطالعه، در صورتی که امتیاز DMS برابر با ۱۳-۷ بود، وضعیت تغذیه‌ای بیمار طبیعی در نظر گرفته می‌شد، اگر امتیاز بین ۲۳-۱۴ بود، بیمار مبتلا به سوءتغذیه خفیف تا متوسط و در صورتی که امتیاز بین ۳۵-۲۴ بود، بیمار مبتلا به سوءتغذیه شدید در نظر گرفته می‌شد.

فرم MIS که دارای ۱۰ جزء است، علاوه بر ۷ جزء موجود در فرم DMS، دارای سه جزء دیگر شامل BMI، غلظت آلبومین و ظرفیت تام باندکنندگی آهن (Total Iron Binding Capacity (TIBC) سرم نیز هست. همچنین در فرم MIS هر یک از اجزاء می‌توانند از صفر تا ۳ امتیاز بگیرند. در صورتی که هر یک از اجزاء کاملاً طبیعی باشند، امتیاز صفر و اگر شدیدترین حالت نامطلوب را داشته باشند، امتیاز ۳ می‌گیرند. بنابراین امتیاز MIS کسب‌شده توسط هر فرد همودیالیزی می‌تواند بین صفر تا ۳۰ باشد (۱۲). در این مطالعه در صورتی که امتیاز MIS برابر با ۷-۰ بود، وضعیت تغذیه‌ای بیمار طبیعی در نظر گرفته می‌شد، اگر امتیاز بین ۱۸-۸ بود، بیمار مبتلا به سوءتغذیه خفیف تا متوسط و در صورتی که امتیاز بین ۳۰-۱۹ بود، بیمار مبتلا به سوءتغذیه شدید در نظر گرفته می‌شد.

در شروع این مطالعه فرم‌های SGA، DMS و MIS در مورد ۱۶ بیمار همودیالیزی توسط یک پزشک عمومی آموزش‌دیده دو بار با فاصله یک هفته تکمیل شد (۱۶). سپس ضریب همبستگی میان دو بار تکمیل هر یک از این فرم‌ها محاسبه شد. ضرایب همبستگی در مورد شاخص‌های SGA، DMS و MIS، به ترتیب معادل با ۰/۷۱، ۰/۸۰ و ۰/۸۷ بودند و از نظر آماری نیز کلیه این ضرایب معنی‌دار بودند ($P < 0/01$). این ضرایب همبستگی نشان‌دهنده آن بودند که تکمیل فرم‌های SGA، DMS و MIS توسط پزشک مربوط به‌طور قابل اطمینان صورت می‌گیرد.

در این مطالعه نمونه‌های خون گرفته‌شده از بیماران، به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۲۵۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. سپس سرم‌های جدا شده تا زمان انجام آزمایشات بیوشیمیایی در فریزر 70°C نگهداری شدند. در این مطالعه

همبستگی شاخص‌های DMS، MIS و BMI با شاخص SGA، به ترتیب معادل با ۰/۸۴، ۰/۸۳ و ۰/۲۱ بودند. تفاوت کلیه ضرایب همبستگی فوق‌الذکر با صفر از نظر آماری معنی‌دار بود ($P < 0/01$ ، جدول ۲).

حساسیت، ویژگی، درستی، ارزش اخباری مثبت و منفی، نسبت درست‌نمایی مثبت و منفی، و سطح زیر منحنی ROC در مورد شاخص DMS در مقایسه با شاخص SGA، به ترتیب معادل با ۰/۹۴، ۰/۸۸، ۰/۹۲، ۰/۹۳، ۰/۹۲، ۰/۷۸، ۰/۰۷ و ۰/۹۷ (جدول ۳، شکل ۱)، در مورد شاخص MIS در مقایسه با شاخص SGA به ترتیب معادل با ۰/۸۷، ۰/۸۳، ۰/۹۱، ۰/۹۶، ۰/۹۱، ۰/۸۳، ۰/۲۲ و ۰/۱۳ (جدول ۴، شکل ۲) و در مورد شاخص BMI در مقایسه با شاخص SGA، به ترتیب معادل با ۰/۲۳، ۰/۹۱، ۰/۵۰، ۰/۸۰، ۰/۴۳، ۰/۲۵، ۰/۸۵ و ۰/۶۴ بودند (جدول ۵، شکل ۳).

در این مطالعه شیوع سوءتغذیه انرژی- پروتئین خفیف تا متوسط در بیماران همودیالیزی شهر تهران بر مبنای شاخص SGA (که متداول‌ترین شاخص برای تعیین سوءتغذیه در بیماران همودیالیزی است) معادل با ۰/۶۰/۵، بر مبنای شاخص DMS معادل با ۰/۶۱/۵، بر مبنای شاخص MIS معادل با ۰/۵۴ و بر مبنای شاخص BMI معادل با ۰/۱۶/۵ بود (جدول ۱).

شیوع سوءتغذیه انرژی- پروتئین شدید در بیماران همودیالیزی شهر تهران بر مبنای شاخص SGA معادل با ۰/۱، بر مبنای شاخص DMS معادل با ۰/۱/۵، بر مبنای شاخص MIS معادل با ۰/۱ و بر مبنای شاخص BMI معادل با ۰/۱/۵ بود (جدول ۱).

این پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی از نظر تشخیص سوءتغذیه در بیماران همودیالیزی بین شاخص‌های DMS و MIS با شاخص SGA وجود دارد. ضرایب

جدول ۱- شیوع سوءتغذیه انرژی- پروتئین بر مبنای شاخص‌های SGA، DMS، MIS و BMI در بیماران مورد مطالعه


شاخص	طبقه بندی	فراوانی مطلق	فراوانی نسبی
SGA	طبیعی	۱۱۲	۰/۳۸/۵
	سوءتغذیه خفیف و متوسط	۱۷۵	۰/۶۰/۵
	سوءتغذیه شدید	۳	۰/۱
	جمع	۲۹۰	۰/۱۰۰
DMS	طبیعی	۱۰۸	۰/۳۷
	سوءتغذیه خفیف و متوسط	۱۷۸	۰/۶۱/۵
	سوءتغذیه شدید	۴	۰/۱/۵
	جمع	۲۹۰	۰/۱۰۰
MIS	طبیعی	۱۳۰	۰/۴۵
	سوءتغذیه خفیف و متوسط	۱۵۷	۰/۵۴
	سوءتغذیه شدید	۳	۰/۱
	جمع	۲۹۰	۰/۱۰۰
BMI	طبیعی	۲۳۹	۰/۸۲
	سوءتغذیه خفیف و متوسط	۴۸	۰/۱۶/۵
	سوءتغذیه شدید	۴	۰/۱/۵
	جمع	۲۹۱	۰/۱۰۰

جدول ۲- همبستگی شاخص‌های DMS، MIS و BMI با شاخص SGA در بیماران همودیالیزی مورد مطالعه


شاخص‌ها	SGA	DMS	MSI	BMI
SGA	—	$r = 0/84$ $P < 0/01$	$r = 0/83$ $P < 0/01$	$r = 0/21$ $P < 0/01$
DMS	$r = 0/84$ $P < 0/01$	—	$r = 0/83$ $P < 0/01$	$r = 0/24$ $P < 0/01$
MSI	$r = 0/83$ $P < 0/01$	$r = 0/83$ $P < 0/01$	—	$r = 0/30$ $P < 0/01$
BMI	$r = 0/21$ $P < 0/01$	$r = 0/24$ $P < 0/01$	$r = 0/30$ $P < 0/01$	—

جدول ۳- حساسیت، ویژگی، درستی، ارزش اخباری مثبت و منفی، نسبت درست نمایی مثبت و منفی شاخص DMS نسبت به شاخص SGA در بیماران همودیالیزی مورد مطالعه


شاخص ها	وضعیت تغذیه بر مبنای SGA		
	دارای سوء تغذیه	فاقد سوء تغذیه	جمع
وضعیت تغذیه بر مبنای DMS	دارای سوء تغذیه	فاقد سوء تغذیه	جمع
	۱۶۹	۱۳	۱۸۲
	۹	۹۹	۱۰۸
	۱۷۸	۱۱۲	۲۹۰
حساسیت شاخص DMS نسبت به شاخص SGA	$(169 \div 178) * 100 = 94.9\%$		
ویژگی شاخص DMS نسبت به شاخص SGA	$(99 \div 112) * 100 = 88.4\%$		
درستی شاخص DMS نسبت به شاخص SGA	$[(169 \div 99) \div 290] * 100 = 92.1\%$		
ارزش اخباری مثبت شاخص DMS	$(169 \div 182) * 100 = 93.0\%$		
ارزش اخباری منفی شاخص DMS	$(99 \div 108) * 100 = 91.7\%$		
نسبت درست نمایی مثبت شاخص DMS	$[0.94 \div (1 - 0.88)] = 7.8$		
نسبت درست نمایی منفی شاخص DMS	$[(1 - 0.94) \div 0.88] = 0.7$		



شکل ۲- منحنی ROC در مورد مقایسه شاخص MIS با شاخص SGA



شکل ۱- منحنی ROC در مورد مقایسه شاخص DMS با شاخص SGA



شکل ۳- منحنی ROC در مورد مقایسه شاخص BMI با شاخص SGA

جدول ۴- حساسیت، ویژگی، درستی، ارزش اخباری مثبت و منفی، نسبت درست‌نمایی مثبت و منفی شاخص MIS نسبت به شاخص SGA در بیماران همودیالیزی مورد مطالعه

وضعیت تغذیه بر مبنای SGA			شاخص‌ها	
جمع	فاقد سوء تغذیه	دارای سوء تغذیه		
۱۶۰	۴	۱۵۶	دارای سوء تغذیه	وضعیت تغذیه بر مبنای MIS
۱۳۰	۱۰۸	۲۲	فاقد سوء تغذیه	
۲۹۰	۱۱۲	۱۷۸	جمع	
			حساسیت شاخص MIS نسبت به شاخص SGA	
			ویژگی شاخص MIS نسبت به شاخص SGA	
			درستی شاخص MIS نسبت به شاخص SGA	
			ارزش اخباری مثبت شاخص MIS	
			ارزش اخباری منفی شاخص MIS	
			نسبت درست‌نمایی مثبت شاخص MIS	
			نسبت درست‌نمایی منفی شاخص MIS	

جدول ۵- حساسیت، ویژگی، درستی، ارزش اخباری مثبت و منفی، نسبت درست‌نمایی مثبت و منفی شاخص BMI نسبت به شاخص SGA در بیماران همودیالیزی مورد مطالعه

وضعیت تغذیه بر مبنای SGA			شاخص‌ها	
جمع	فاقد سوء تغذیه	دارای سوء تغذیه		
۵۲	۱۰	۴۲	دارای سوء تغذیه	وضعیت تغذیه بر مبنای BMI
۲۳۸	۱۰۲	۱۳۶	فاقد سوء تغذیه	
۲۹۰	۱۱۲	۱۷۸	جمع	
			حساسیت شاخص BMI نسبت به شاخص SGA	
			ویژگی شاخص BMI نسبت به شاخص SGA	
			درستی شاخص BMI نسبت به شاخص SGA	
			ارزش اخباری مثبت شاخص BMI	
			ارزش اخباری منفی شاخص BMI	
			نسبت درست‌نمایی مثبت شاخص BMI	
			نسبت درست‌نمایی منفی شاخص BMI	

• بحث

همودیالیزی شهر تهران دارای سوء تغذیه انرژی- پروتئین خفیف و متوسط بودند و ۱/۵٪ نیز سوء تغذیه شدید داشتند. افشار و همکاران با بررسی وضعیت تغذیه بیماران همودیالیزی بیمارستان مصطفی خمینی شهر تهران نشان دادند که بر مبنای شاخص DMS، ۳۵/۱٪ بیماران همودیالیزی دارای سوء تغذیه خفیف تا متوسط و ۵/۶٪ بیماران دارای سوء تغذیه شدید هستند. در مطالعه افشار و همکاران، بیماران همودیالیزی از نظر امتیاز DMS به سه گروه با امتیاز ۷-۱۰ (دارای وضعیت تغذیه‌ای طبیعی)، ۱۱-۲۲ (دارای سوء تغذیه خفیف تا متوسط) و ۲۳-۳۵ (دارای سوء تغذیه شدید) تقسیم شده بودند (۲۲).

رازقی و همکاران با تحقیق بر روی بیماران همودیالیزی بیمارستان‌های سینا و امیر/علم شهر تهران در سال ۱۳۸۵ نشان دادند که بر مبنای شاخص DMS، ۵۱/۶٪ بیماران

در مطالعه حاضر بر مبنای شاخص SGA که متداول‌ترین و پذیرفته‌شده‌ترین شاخص جهت ارزیابی سوء تغذیه انرژی- پروتئین در بیماران همودیالیزی است (۱۶، ۱۵)، حدود ۶۰/۵٪ بیماران همودیالیزی شهر تهران دارای سوء تغذیه انرژی- پروتئین خفیف و متوسط بودند و ۱٪ نیز سوء تغذیه شدید داشتند. یافته‌های مطالعه حاضر در موافقت با مطالعات انجام‌شده در سایر کشورها است که آنها نیز شیوع بالای سوء تغذیه را بر مبنای شاخص SGA گزارش نموده‌اند (۲۱-۱۹، ۳).

در مطالعه حاضر بیماران همودیالیزی از نظر امتیاز DMS به سه گروه با امتیاز ۷-۱۳ (دارای وضعیت تغذیه‌ای طبیعی)، ۱۴-۲۳ (دارای سوء تغذیه خفیف تا متوسط) و ۲۴-۳۵ (دارای سوء تغذیه شدید) تقسیم شدند. بر مبنای این تقسیم‌بندی در شاخص DMS، حدود ۶۱/۵٪ بیماران

شیوع سوء تغذیه شدید در بیماران همودیالیزی بر مبنای شاخص BMI، حدود ۱/۵٪ بود و بر مبنای شاخص SGA حدود ۱٪ بود که این امر نشان دهنده آن است که تعیین شیوع سوء تغذیه شدید به وسیله هر دو شاخص تقریباً به طور یکسان صورت می‌گیرد و به طور کلی بین شاخص BMI و شاخص‌های SGA، DMS و MIS، از نظر تعیین سوء تغذیه شدید تفاوت چندانی وجود ندارد. همچنین مطالعه حاضر نشان داد که همبستگی شاخص BMI با شاخص SGA، بر مبنای ضریب همبستگی اسپیرمن، معادل ۰/۲۱ است و حساسیت، ویژگی، درستی، ارزش اخباری مثبت و منفی، نسبت درست‌نمایی مثبت و منفی، و سطح زیر منحنی ROC در مورد شاخص BMI به منظور تعیین سوء تغذیه نسبت به شاخص SGA، به ترتیب معادل ۰/۲۳، ۰/۹۱، ۰/۵۰، ۰/۸۰، ۰/۴۳، ۲/۵، ۰/۸۵ و ۰/۶۴ بودند. با توجه به پایین بودن حساسیت، درستی و سطح زیر منحنی ROC در مورد شاخص BMI در مقایسه با شاخص SGA و همبستگی ضعیف شاخص BMI با شاخص SGA، می‌توان نتیجه گرفت که BMI شاخص خوبی برای تعیین سوء تغذیه خفیف تا متوسط در بیماران همودیالیزی نمی‌باشد.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که شاخص‌های DMS و MIS، از نظر تشخیص سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی تقریباً مشابه با شاخص SGA هستند، در حالی که BMI شاخص خوبی برای تشخیص سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی نیست. همچنین به نظر می‌رسد که شاخص DMS در کارهای معمول بیمارستانی جایگزین مناسب‌تری برای SGA می‌باشد.

سپاسگزاری

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد. بدینوسیله از ریاست، معاونت پژوهشی و مدیر محترم پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، به دلیل حمایت‌های مالی از این تحقیق، کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی، پزشکان، پرستاران و سایر پرسنل مراکز همودیالیز شهر تهران، مسئولان و کارشناسان آزمایشگاه تحقیقات پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کارشناسان آزمایشگاه تحقیقات انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور به ویژه آقای علی کلایی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند، کمال تشکر را داریم.

بنابراین شاخص MIS همانند شاخص SGA، به خوبی می‌تواند جهت تعیین سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی به کار رود.

با توجه به اینکه سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی سبب کاهش کیفیت زندگی، افزایش ابتلا به بیماری‌های مختلف و افزایش مرگ و میر می‌شود (۵)، لذا تشخیص بیماران همودیالیزی مبتلا به سوء تغذیه دارای اهمیت زیادی است و شاخصی که حساسیت بیشتری در تعیین سوء تغذیه داشته باشد، شاخص بهتری است. اگر چه درستی هر دو شاخص DMS و MIS، نسبت به شاخص SGA تقریباً برابر هستند و میزان همبستگی آنها با شاخص SGA نیز مشابه است، اما چون حساسیت شاخص DMS از شاخص MIS جهت تعیین سوء تغذیه بیشتر است لذا به نظر می‌رسد شاخص DMS در کارهای معمول بیمارستانی به منظور تعیین سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی بهتر از شاخص MIS است.

در کارهای تحقیقاتی که لازم است بر روی بیماران همودیالیزی که واقعاً مبتلا به سوء تغذیه هستند صورت گیرد، به نظر می‌رسد شاخص MIS نسبت به DMS ارجحیت دارد، چرا که شاخص MIS دارای ارزش اخباری مثبت و درست‌نمایی مثبت بالاتری نسبت به شاخص DMS است و این امر سبب می‌شود که شاخص MIS به طور سخت‌گیرانه در زمینه تشخیص بیماران همودیالیزی عمل نماید و در نتیجه ممکن است برخی از بیماران مبتلا به سوء تغذیه که در محدوده مرزی قرار دارند، در گروه بیماران مبتلا به سوء تغذیه قرار نگیرند. شاخص MIS اگرچه از معیارهای عینی‌تری همچون BMI، غلظت آلبومین و TIBC سرم استفاده می‌کند و رابطه قوی‌تری نسبت به شاخص SGA و DMS با خطر مرگ و میر دارد (۲۵) اما در کارهای معمول بیمارستانی، شاخص‌های SGA و DMS نسبت به شاخص MIS ارجحیت دارند. لازم به ذکر است که این ارجحیت در رابطه با تعیین سوء تغذیه خفیف تا متوسط است چرا که هر سه شاخص SGA، DMS و MIS تقریباً به طور یکسان در زمینه تعیین سوء تغذیه شدید عمل می‌کنند.

در افراد سالم و بسیاری از بیماران غیر کلیوی، جهت تعیین وضعیت تغذیه‌ای از شاخص BMI استفاده می‌شود. در این مطالعه شیوع سوء تغذیه خفیف تا متوسط بر مبنای شاخص BMI (۱۲)، حدود ۱۶/۵٪ بود که به مراتب کمتر از شیوع سوء تغذیه خفیف تا متوسط بر مبنای شاخص SGA است که برابر با ۶۰/۵٪ می‌باشد و این مطلب نشانگر آن است که استفاده از شاخص BMI جهت تعیین سوء تغذیه خفیف تا متوسط در بیماران همودیالیزی مطلوب نیست.

• References

1. Mehrotra R, Kopple JD. Causes of protein-energy malnutrition in chronic renal failure. In: Kopple JD, Massry SG (eds). *Kopple and Massry's Nutritional Management of Renal Disease*. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004: 168-182.
2. Kopple JD. McCollum Award, 1996: protein-energy malnutrition in maintenance dialysis patients. *Am J Clin Nutr* 1997; 65: 1544-1557.
3. Morais AAC, Silva MAT, Faintuch J, Vidigal EJ, Costa RA, Lyrio DC, Trindade CR, Pitanga KK. Correlation of Nutritional status and food intake in hemodialysis patients. *Clinics* 2005; 60: 185- 192.
4. Aparicio M, Cano N, Chauveau P, Azar R, Canaud B, Flory A, Laville M, Leverve X. Nutritional status of haemodialysis patients: a French national cooperative study. *Nephrol Dial Transplant* 1999; 14: 1679-1686.
5. Kalantar-Zadeh K, Kopple JD. Malnutrition as a risk factor of morbidity and mortality in patients undergoing maintenance dialysis. In: Kopple JD, Massry SG (eds). *Kopple and Massry's Nutritional Management of Renal Disease*. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004: 183-198.
6. Kalantar-Zadeh K, Kopple JD. Relative contributions of nutrition and inflammation to clinical outcome in dialysis patients. *Am J Kidney Dis* 2001; 38: 1343-1350.
7. Stenvinkel P, Yeun JY. Role of inflammation in malnutrition and atherosclerosis in chronic renal failure. In: Kopple JD, Massry SG (eds). *Kopple and Massry's Nutritional Management of Renal Disease*. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004: 199-212.
8. Stenvinkel P, Heimbürger O, Lindholm B, Kaysen GA, Bergstrom J. Are there two types of malnutrition in chronic renal failure? Evidence for relationships between malnutrition, inflammation and atherosclerosis (MIA syndrome). *Nephrol Dial Transplant* 2000; 15: 953-960.
9. Pupim LB, Ikizler TA. Assessment and monitoring of uremic malnutrition. *J Ren Nutr* 2004; 14: 6-19.
10. Steiber AL, Kalantar-Zadeh K, Secker D, McCarthy M, Sehgal A, McCann L. Subjective global assessment in chronic kidney disease: a review. *J Ren Nutr* 2004; 14: 199-200.
11. Kalantar-Zadeh K, Kleiner M, Dunne E, Lee GH, Luft FC. A modified quantitative subjective global assessment of nutrition for dialysis patients. *Nephrol Dial Transplant* 1999; 14: 1732-1738.
12. Kalantar-Zadeh K, Kopple JD, Michael H, Humphreys MH, Block G. Comparing outcome predictability of markers of malnutrition-inflammation complex syndrome in haemodialysis patients. *Nephrol Dial Transplant* 2004; 19: 1507-1519.
13. Sacks GS, Dearman K, Replogle WH, Cora VL, Meeks M, Canada T. Use of subjective global assessment to identify nutrition-associated complications and death in geriatric long-term care facility residents. *J Am Coll Nutr* 2000; 19: 570-577.
14. McCann L. *Pocket Guide to Nutrition Assessment of the Patient with Chronic Kidney Disease*. 3rd ed. New York: National Kidney Foundation, 2005: 1-34 – 1-40.
15. Burleigh KS. Associations among plasma homocysteine, amino acids and nutritional status in hemodialysis patients [dissertation]. Toronto: University of Toronto, 2001.
16. Kalantar-Zadeh K, Rodriguez RA, Humphreys MH. Association between serum ferritin and measures of inflammation, nutrition and iron in haemodialysis patients. *Nephrol Dial Transplant* 2004; 19: 141-149.
17. Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. *Basic Epidemiology*. Geneva: World Health Organization; 1993: 95.
18. Yamada K, Furuya R, Takita T, Maruyama Y, Yamaguchi Y, Ohkawa S, Kumagai H. Simplified nutritional screening tools for patients on maintenance hemodialysis. *Am J Clin Nutr* 2008; 87: 106-113.
19. Tayyem RF, Mrayyan MT, Heath DD, Bawadi HA. Assessment of nutritional status among ESRD patients in Jordanian hospitals. *J Ren Nutr* 2008; 18: 281-287.
20. Tapiawala S, Vora H, Patel Z, Badve S, Shah B. Subjective global assessment of nutritional status of patients with chronic renal insufficiency and end stage renal disease on dialysis. *J Assoc Physician India* 2006; 54: 923-926.
21. Qureshi AR, Alvestrand A, Danielsson A, Divino-Filho JC, Gutierrez A, Lindholm B, Bergstrom J. Factors predicting malnutrition in hemodialysis patients: A cross-sectional study. *Kidney Int* 1998; 53: 773-782.
22. Afshar R, Sanavi S, Izadi-Khah A. Assessment of nutritional status in patients undergoing maintenance hemodialysis: A single-center study from Iran. *Saudi J Kidney Dis Transplant* 2007; 18: 397-404.
23. Razeghi S. Prevalence of malnutrition and its related factors in patients with chronic renal disease undergoing hemodialysis at Sina and Amir Alam Hospitals [dissertation]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences. School of Public Health; 2006 [in Persian].
24. Prasad N, Gupta A, Sinha A, Sharma RK, Kumar A, Kumar R. Changes in nutritional status on follow-up of an incident cohort of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. *J Ren Nutr* 2008; 18: 195-201.
25. Kalantar-Zadeh K, Kopple JD, Block G, Humphreys MH. A malnutrition- inflammation score is correlated with morbidity and mortality in maintenance hemodialysis patients. *Am J Kidney Dis* 2001; 38: 1251-1263.

Comparison of various methods for determination of protein-energy malnutrition with subjective global assessment in hemodialysis patients

Tabibi H^{*1}, As'habi A², Nozari B³, Mahdavi-Mazdeh M⁴, Hedayati M⁵, Abdollahi M⁶

1- *Corresponding author: Assistant prof, Dept. of Clinical Nutrition & Dietetics, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: hadtabibi@yahoo.com

2-M.Sc. in Nutrition, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3- General Physician, Imam-Khomeini Hospital, Tehran, Iran.

4-Associate Prof, Dept. of Nephrology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5- Assistant Prof, Prevention and Treatment of Obesity Research Center, Research Institute For Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

6- Assistant prof (in research), Dept. of Nutrition Research, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Received 3 Apr, 2010

Accepted 21 Jul, 2010

Background and Objectives: Protein-energy malnutrition (PEM) is prevalent among hemodialysis patients. So far, no study has compared various methods for determination of PEM, including subjective global assessment (SGA), dialysis malnutrition score (DMS), malnutrition inflammation score (MIS), and body mass index (BMI), in hemodialysis patients. The present study was designed to determine sensitivity, specificity, accuracy, positive and negative predictive values, as well as positive and negative likelihood ratios of DMS, MIS and BMI in comparison with SGA as the most common method for determination of PEM in hemodialysis patients.

Subject and Methods: A total of 291 hemodialysis patients were randomly selected by systematic sampling from among 2302 eligible adult hemodialysis patients in Tehran hospitals. The nutritional status of the patients was assessed by completing SGA, DMS and MIS forms and determining BMI. In addition, after a 12- to 14-hour fast, 4-mL blood samples were obtained from each patient before dialysis for measurement of serum urea, creatinine, albumin and total iron binding capacity.

Results: Based on SGA, DMS, MIS, and BMI, the prevalence of mild-to-moderate PEM in Tehrani hemodialysis patients was, respectively, 60.5%, 61.5%, 54%, and 16.5%, and that of severe PEM 1%, 1.5%, 1%, and 1%. In comparison with SGA, the sensitivity, specificity, accuracy, area under the receiver operating characteristic (ROC) curve, positive and negative predictive values, and positive and negative likelihood ratios were, respectively, 94%, 88%, 92%, 97%, 93%, 92%, 7.8, and 0.07 for DMS; 87%, 96%, 91%, 97%, 97%, 83%, 22.0, and 0.13 for MIS; and 23%, 91%, 50%, 64%, 80%, 43%, 2.5, and 0.85 for BMI.

Conclusion: The results of the present study indicate that the DMS and MIS are almost similar to SGA, in identifying malnutrition in hemodialysis patients, while BMI is not an appropriate index in this regard. In addition, it appears that the DMS is a more appropriate alternative method for SGA in routine hospital assessments.

Keywords: Protein-energy malnutrition, Hemodialysis, Subjective global assessment, Dialysis malnutrition score, Malnutrition inflammation score