

تأثیر یک برنامه تمرین هوازی منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده

بر کاهش وزن مردان چاق

اصغر توفیقی^۱، یوسف غفاری^۲، نسرین افسریگی^۳

۱- استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ایران

۲- نویسنده مسئول: کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ایران، پست الکترونیکی: ghaffari_y@yahoo.com

۳- کارشناس تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش شهرستان شبستر، ایران

تاریخ پذیرش: ۹۳/۲/۲۵

تاریخ دریافت: ۹۲/۱۱/۲

چکیده

سابقه و هدف: با تغییر الکتوی مصرف مواد غذایی و زندگی ماشینی، اضافه وزن و چاقی رو به افزایش بوده، لذا شیوع بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ زود رسانی از آن بیشتر شده است. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر رژیم غذایی کنترل شده و فعالیت ورزشی هوازی بر کاهش وزن مردان چاق بود.

مواد و روش‌ها: ۴۰ مرد چاق به صورت تصادفی به چهار گروه تمرین (۱۰نفر)، تمرین به همراه رژیم غذایی (۱۰نفر) و شاهد (۱۰نفر) تقسیم شدند. اندازه‌های قد، وزن، ضخامت چربی زیر پوستی همه آزمودنی‌ها قبل از شرکت در فعالیت ورزشی و رژیم غذایی کنترل شده اندازه‌گیری شد. سپس فعالیت ورزشی و برنامه‌ی غذایی کنترل شده به مدت هشت هفته اجرا گردید. پس از هفته چهارم و پس از هشت هفته فعالیت ورزشی و کنترل برنامه غذایی، دوباره اندازه‌های وزن و ضخامت چربی زیر پوستی همه آزمودنی‌ها اندازه‌گیری شد. جهت کنترل برنامه غذایی آزمودنی‌ها از نرم‌افزار (Food processor) استفاده شد. برای تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون (Repeated measures ANOVA) استفاده گردید. سطح معنی‌داری در تمامی آزمون‌ها $p < 0.05$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: ۸ هفته فعالیت ورزشی منظم و مداخله در رژیم غذایی، باعث کاهش معنی‌دار مقادیر وزن و درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه‌های مختلف پژوهش گردید ($P < 0.05$). به طوری که گروه تمرینات ورزشی به همراه رژیم غذایی کنترل شده با ۴ درصد کاهش در وزن بیشترین تأثیر را نسبت به گروه‌های دیگر داشته است.

نتیجه‌گیری: در مجموع بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان برنامه‌های ورزشی منظم با شدت معین با رعایت احتیاط، به همراه مصرف مواد لبیک کم چرب را جهت کنترل و کاهش وزن افراد چاق جامعه ($BMI > 30$)، که دارای جمعیتی رو به افزایش هستند، به مراکز بهداشت و سلامت جامعه توصیه کرد.

وازگان کلیدی: تمرینات هوازی، تغذیه، کاهش وزن، مردان چاق

۴ مقدمه

بزرگسال چاق و یا دارای اضافه وزن (نمایه توده بدنی بالاتر از ۲۷ کیلوگرم بر متر مربع) وجود دارد (۱). سند روم متabolیک مجموعه‌ای از عوامل خطر متabolیکی و عروقی است که در برگیرنده هیپوگلیسمی، دیس لیپیدی، فشارخون بالا و چاقی شکمی می‌باشد. چاقی مرکزی (central adiposity) و مقاومت به انسولین دو جزء کلیدی سندروم متabolیک هستند که با افزایش سن و روش زندگی

در سال‌های اخیر، تغییرات در شیوه زندگی باعث شده تا جوامع مختلف با طیف جدیدی از اختلالات تغذیه‌ای یعنی اضافه وزن و چاقی مواجه شوند طوری که چاقی به عنوان یک مشکل جدی سلامتی مطرح گردیده است. با پیشرفت تکنولوژی در قرن حاضر و گسترش فقر حرکتی، چاقی فرآیند شده و سن چاقی کاهش یافته است. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است در دنیا بیش از یک میلیارد

انجام شده در مورد نقش نوع تغذیه (با کالری یکسان) بر تغییرات وزن بسیار اندک است. ما در پژوهش حاضر سعی کردیم با استفاده از نرم‌افزار Food processor و پرسشنامه یادآمد 24 ساعته رژیم غذایی، انرژی مصرفی و انرژی همه فعالیت‌های آزمودنی‌ها را محاسبه کرده تا این طریق بتوانیم به دقت و اعتبار نتایج این گونه تحقیقات بیفزاییم. لذا این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این سوال بود که نوع تغذیه (صرف مواد لبنی کم چرب) همراه با انجام فعالیت ورزشی منظم چه تأثیری در تغییرات وزن افراد چاق ایجاد می‌کند.

به هر حال در مورد تجویز موثرترین برنامه مداخله ای (تغییر روش زندگی) و سازوکارهای آنها در کاهش وزن نتایج روشن نیست لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته فعالیت ورزشی منتخب همراه با مداخله در رژیم غذایی با هدف بهبود در کیفیت مواد غذایی - بدون کاهش کالری آن- برترکیب بدنی افراد چاق بود. شاخص‌های مورد سنجش در این پژوهش وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی زیر پوستی افراد شرکت کننده بود که بر روی 40 نفر مرد چاق ($BMI > 30$) در شهرستان شبستر در سال 1392 انجام گرفت.

• مواد و روش‌ها

در تحقیق حاضر محقق بر آن است با بررسی اثر سه روش تمرین هوایی منتخب، کنترل رژیم غذایی و ترکیبی از آن‌ها بر تغییرات وزن مردان چاق بپردازد. این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده که به صورت میدانی و آزمایشگاهی انجام گرفت. و به لحاظ استفاده از نتایج به دست آمده کاربردی می‌باشد.

جامعه اماری این پژوهش را مردان چاق سالم در استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند بر اساس فرا خوان اولیه تعداد 57 مرد چاق غیر ورزشکار کم تحرک مراجعه کننده به باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی داوطلب شرکت در پژوهش حاضر شدند. سپس از بین آزمودنی‌ها بر اساس تکمیل و ارزیابی پرسشنامه تدرستی، پرسشنامه تعیین سطح فعالیت بدنی، 40 نفر با $BMI > 30$ انتخاب شدند که به صورت تصادفی به چهار گروه: تمرین هوایی منتخب (10 نفر)، رژیم غذایی کنترل شده (10 نفر) و تمرین هوایی منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده (10 نفر) و گروه شاهد (10 نفر) تقسیم شدند. به منظور حذف موارد مشکوک (بیماری و...) و برقراری تعادل کالریکی بین

ناسالم (رژیم غذایی بد و پر کالری و عدم فعالیت بدنی) شیوع آنها بالا می‌رود (1).

چاقی با عوارض جسمانی زیادی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، پرفشارخونی، افزایش کلسترول و تری گلیسیرید خون، آرتیت، آسم و انواع مشخصی از سرطان مرتبط است (1). چاقی یکی از مهم‌ترین عوامل خطرزای متعددی است که در نهایت منجر به اختلالات لیپیدی می‌شود (2). انجمن قلب آمریکا در سال 2008 حدود 43 درصد علت مرگ و میر افراد را ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی گزارش کرده است (2). به نظر می‌رسد تمرین و فعالیت بدنی منظم همراه با تغذیه صحیح، می‌تواند این عوامل خطرزا را تغییر نماید (3).

تغذیه صحیح به عنوان یکی از مهم‌ترین تعیین کننده‌های بروز بیماری و سلامت در طول دوران زندگی مطرح بوده است. شیوع چاقی و به دنبال آن بیماری‌های متابولیک مربوط به چاقی در دو دهه گذشته رشد فزاینده ای داشته و ابتلا به چاقی به حد پاندمیک در جهان رسیده است. ابتلا به چاقی و مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای آسیایی بیشتر از سایر کشورها است (4) ایران نیز همانند بسیاری از کشورها در حال گذر تغذیه‌ای از لاغری ناشی از سوء تغذیه به سوی چاقی ناشی از تغذیه نامناسب پیش می‌رود. بررسی‌های ملی انجام شده در استان‌های مختلف کشور نشان داده است که در 34 درصد از زنان و 10 درصد از مردان و بیش از 28 درصد از ساکنان شهرها و 23 درصد از روستائیان، چاقی شکمی وجود دارد. شیوع چاقی و اضافه وزن به میزان هشدار دهنده‌ای در ایران رو به افزایش است که به واسطه توسعه شهر نشینی، تغییر در شیوه زندگی، الگوهای مصرف غذایی و کاهش فعالیت بدنی پدیدار گشته است (5).

پژوهش‌های زیادی در مورد روش‌های درمان چاقی انجام گرفته است. اگرچه اکثر متخصصان تربیت بدنی و علوم پزشکی در مورد روش کنترل رژیم غذایی همراه با فعالیت بدنی به عنوان اصولی ترین و علمی‌ترین روش کاهش وزن اتفاق نظر دارند، اما با توجه به نتایج تحقیقات انجام یافته، به نظر می‌رسد که هنوز توافق کلی در مورد میزان نقش تمرین و رژیم غذایی بر کاهش وزن وجود ندارد (5-7). احتمالاً عدم همخوانی نتایج تحقیقات انجام شده مربوط به نوع، شدت و مدت تمرین و از همه مهمتر، عدم کنترل مواد غذایی مصرفی و نوع تغذیه باشد از طرف دیگر تحقیقات

برای اندازه‌گیری قد (سانتی متر / توسط دستگاه دیجیتالی Seca ساخت آلمان با دقت ۰/۱ سانتی متر)، وزن (با دستگاه ترازوی دیجیتالی Seca با دقت ۰/۱ کیلوگرم) و ضربان قلب (ضربه در دقیقه) توسط ضربان سنج پولار (Polar) ساخت کشور فنلاند استفاده شد.

برای اندازه‌گیری ضخامت چربی زیر پوستی از کالاییر لا فایت (Lafayet) و جهت محاسبه درصد چربی بدن از فرمول هفت نقطه‌ای جکسون پولاک (سینه، شکم، ران، سه سر، تحت کتفی، تاج خاصره وزیر بغل)، توسط نرم افزار محاسبه گر درصد چربی بدن (Body Fat Calculabor) که ساخت شرکت Linear Software آمریکا می‌باشد استفاده شد.

بعد از جمع‌آوری پرسشنامه‌ی یادآمد ۲۴ ساعته رژیم غذایی و پرسشنامه تعیین سطح فعالیت بدنی تمام آزمودنی‌های هر چهار گروه حداقل به مدت یک هفته، جهت کسب اطلاع نسبی از میزان انرژی مصرفی افراد، برنامه غذایی آن‌ها توسط نرم افزار تجزیه و تحلیل شد و سپس بین میزان انرژی مصرفی و انرژی BMR (Basal Metabolic Rate) افراد همه گروه‌ها، تعادل کالریکی برقرار گردید. بدین معنی که میزان انرژی مصرفی اضافه هریک از افراد با توجه به BMR آن‌ها، با کاهش کمیت بعضی از مواد غذایی مصرفی آن‌ها به حداقل رسانده شد.

لازم به ذکر است که تمام آزمودنی‌های هر چهار گروه پژوهش حاضر در طول ۸ هفته پرتوکل، تا حد امکان در تعادل کالریکی بودند. بدین منظور همه آزمودنی‌ها در طول پژوهش، هر هفته در سه روز غیر متوالی، پرسشنامه یادآمد ۲۴ ساعته رژیم غذایی را پر کردند.

انرژی مصرفی و انرژی مورد نیاز متابولیسم پایه آزمودنی‌ها، پرسشنامه‌های تعیین سلامتی و یادآمد ۲۴ ساعته رژیم غذایی (8) در بین آزمودنی‌ها توزیع گردید. جهت کسب اطلاع نسبی از میزان انرژی مصرفی و تعیین سطح فعالیت بدنی افراد شرکت کننده، از آن‌ها خواسته شد به مدت یک هفته هر روز پرسشنامه یادآمد ۲۴ ساعته رژیم غذایی را پر کنند. لازم به ذکر است که قبل از توزیع پرسشنامه‌ها یک جلسه توجیهی در مورد نحوه پرکردن این پرسشنامه و تعریف واحدهای مواد غذایی مصرفی تشکیل گردید. پس از جمع‌آوری و بررسی دقیق پرسشنامه‌های تکمیل شده، موارد مشکوک (بیماری و ...) حذف شدند و نمونه آماری را ۴۰ نفر مرد چاق سالم که تقریباً افراد غیر فعلی بودند از بین واجدین شرایط به صورت تصادفی انتخاب شدند.

قبل از انجام مداخلات، به منظور همگنسازی، چهار گروه بر اساس سن، قد، وزن، شاخص توده بدنی (BMI)، درصد چربی بدن BFP (Body Fat percent) مقایسه شدند که به لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین آنها وجود نداشت (جدول ۱).

اطلاعات مربوط به مواد غذایی مصرف شده بوسیله پرسشنامه‌های یادآمد ۲۴ ساعته رژیم غذایی جمع‌آوری شده و سپس جهت محاسبه مقدار انرژی مصرفی از نرم افزار Food Processor (2011) استفاده شده است. شرکت تولیدکننده این نرم افزار با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره ثبت ۳۹۱۸۹۶ در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۱ رسمیت یافته و این نرم افزار با نام Diet Sadaf با IP: 64/130/209/51 در کشور استرالیا نیز به ثبت رسیده است.

جدول ۱. نتایج آزمون همگنی شاخص‌های مورد مطالعه در بین گروه‌های مورد مطالعه

متغیر	گروه	تمرین	رژیم	تمرین و رژیم	کنترل	سطح معنی‌داری
وزن (کیلوگرم)		*93/05±9/6	93±4/75	93/4±11/55	93/4±10/91	0/947
BMI		32/19±3/26	32/17±1/06	32/18±2/98	32/16±3/51	0/956
(کیلوگرم بر مترمربع)		32/8±1/49	32/34±0/92	32/43±2/87	32/4±2/84	0/874
(درصد)						
BFP						

* مقادیر به شکل انحراف معیار ± میانگین بیان شده است

(برحسب کیلوگرم) بر مجدور قد (برحسب مترمربع) به دست می آید (9).

در صد چربی بدن به عنوان دومین شاخص اضافه وزن با استفاده از فرمول هفت نقطه ای Jackson/pollock (سینه، شکم، ران، سه سر، تحت کتفی، تاج خاصره و زیر بغل) توسط نرم افزار Body fat calculator محاسبه گردید (9). (8).

پس از جمع آوری داده‌ها، ابتدا کلیه داده‌ها کدبندی و وارد نرم افزار 16 SPSS گردید سپس توسط آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، طبیعی بودن توزیع داده‌ها در هر

یک از سطوح عامل مورد برسی قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح توصیفی از شاخص هایی نظری میانگین، انحراف معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی با فرض نرمال بودن توزیع داده‌ها، جهت آزمون فرضیه‌ها و بخصوص مقایسه تغییرات وزن بدن، در صد چربی در بین گروه‌های مختلف، به دلیل اینکه طرح تحقیق حاوی فاکتورهای درون موردي (با اندازه‌های تکراری) بود، از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه‌های تکراری (Repeated measures ANOVA) و برای مقایسه بین گروهی در مراحل مختلف پژوهش از آزمون آنوا استفاده شده و در صورت مشاهده نتایج معنی دار از آزمون تعییبی بونفرونی استفاده شده است. حداقل سطح معنی داری در آزمون فرض‌های مربوطه 0/05 و توان آماری مورد پذیرش 0/80 در نظر گرفته شد.

• یافته‌ها

نتایج آزمون Repeated measures ANOVA برای مقایسه‌ی درون گروهی متغیرها در مراحل مختلف تمرین و رژیم در گروه‌های مختلف تجربی در جدول 2 ارائه شده است.

بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، فعالیت ورزشی هوایی، مداخله در رژیم غذایی و ترکیبی از آن دو، بر مقادیر وزن، BMI ، BFP در گروه‌های مختلف (تمرین، رژیم غذایی و تمرین به همراه رژیم غذایی) نسبت به گروه شاهد، تأثیر معنی داری داشت؛ به طوری که مقادیر وزن، BMI ، BFP هفته چهارم و هفته‌ی هشتم پس از مداخله ورزشی و رژیم غذایی، کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشت ($P<0/05$) . بر این اساس، گروه تمرین هوایی همراه با رژیم غذایی کنترل شده بیشترین اثر کاهش در وزن، BMI و BFP را داشته است پس از آن گروه تمرین هوایی بیشترین

در برنامه غذایی افرادی که در گروه "کنترل رژیم غذایی" قرار گرفتند مداخله شد بدین منظور حدود 500 کیلو کالری از کمیت مواد غذایی مصرفی این افراد (ترجیحاً چربی‌های اشباع شده، نان و برنج) کاسته شده و به جای آن معادل همان مقدار کالری (500 کیلو کالری) دسر ماست-خیار در دو میان و عده جایگزین شد که در ترکیب آن از ماست کم چرب (400 گرم)، کشمش طلایی بدون دانه (20 گرم)، مغز گردو (20 گرم)، خیار (100 گرم)، گوجه فرنگی (140 گرم)، نعناع و شوید خشک شده (از هر کدام 10 گرم) استفاده شده است که در مجموع انرژی کل این دسر 500 کیلو کالری و مقدار کلسیم آن حدود 720 میلی گرم توسط نرم افزار مربوطه محاسبه شده که افراد گروه، نصف این دسر را در دو میان و عده هر روز در مدت 8 هفته مصرف کردند.

لازم به توضیح است که منظور از مداخله در برنامه غذایی، بهبود کیفیت تغذیه است بدون این که این مداخله موجب سوء تغذیه افراد شود از آنجا که کاهش مصرف نان، برنج و چربی‌های اشباع شده نه تنها تأثیر چندانی در کاهش ویتامین‌ها و سایر املاح مورد نیاز افراد ندارد بلکه از طرف دیگر جایگزینی دسر ماست - خیار به جای مواد ذکر شده، به بهبود کیفیت غذایی افراد کمک می‌کند (5,6).

برنامه تمرینی گروه "تمرین" به مدت 8 هفته (هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 60-70 دقیقه) از تمرینات ساده به مشکل با شدت 65-75 درصد حداکثر ضربان قلب برای افراد چاق، اجرا شد. هر جلسه تمرین، شامل 5 دقیقه برنامه کششی، 10 دقیقه برنامه گرم کردن پویا، 40-45 دقیقه تمرینات اصلی شامل، دویدن، تمرینات متنوع تناوبی و تمرینات ایستگاهی و در نهایت 5 دقیقه برنامه سرد کردن و بازگشت به حالت اولیه در نظر گرفته شد.

در این پژوهش، در هر مرحله از برنامه تمرین، شدت تمرینات از طریق تعیین اولیه حداکثر ضربان قلب برای افراد چاق، با توجه به روابط کارونی برای هر کدام از آزمودنی‌ها برابر 65-75 درصد محاسبه گردید (7,8).

آزمودنی‌های گروه "تمرین منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده"، هم تمرینات ذکر شده را در طول پژوهش انجام دادند و هم اینکه با جایگزین کردن دسر ماست-خیار در برنامه غذایی آنها مداخله شد.

شاخص توده بدنی به عنوان شاخص اضافه وزن به وسیله اندازه‌گیری وزن و قد تمام آزمودنی‌ها در ابتداء، پایان هفته چهارم و بعد از 8 هفته محاسبه گردید که از تقسیم وزن

(جدول 3). طبق نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی، در مقایسه بین دو به دوی گروه‌ها، اختلاف معنی‌داری در کاهش وزن، BMI، BFP بین تمام گروه‌ها مشاهده شد.

مقایسه تغییرات بین گروهی درصد چربی بدن (نمودار 1) نشان می‌دهد که بیشترین تغییرات ایجاد شده مربوط به گروهی بوده که تمرين هوازی را به همراه رژیم غذایی کنترل شده انجام داده‌اند.

کاهش و در نهایت گروه رژیم غذایی کنترل شده کمترین کاهش را نسبت به دو گروه دیگر در متغیرهای ذکر شده داشته است.

بر اساس نتایج آزمون ANOVA، بین تأثیرات سه روش: "تمرين هوازی"، "رژیم غذایی کنترل شده" و "تمرين هوازی به همراه رژیم غذایی کنترل شده" برمیانگین تغییرات وزن، BMI، BFP، اختلاف معنی‌داری وجود داشت

جدول 2. مقایسه میانگین شاخص‌های مورد مطالعه در مراحل مختلف اندازه‌گیری با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه‌گیری‌های تکراری


سطح معنی‌داری	انحراف معیار+میانگین			گروه‌ها	متغیرها
	پس آزمون	میان آزمون	پیش آزمون		
0/947	93/44±10/88	93/31±10/91	93/4±10/91	کنترل	
0/000	91/04±9/58	92/35±9/28	93/05±9/6		وزن
0/000	91/81±5/05	92/15±4/79	93±4/75		رژیم (کیلوگرم)
0/000	89/32±11/11	91/88±11/34	93/45±11/55		تمرين و رژیم
0/956	32/17±3/51	32/15±3/51	32/16±3/51	کنترل	
0/000	31/50±3/34	31/92±3/22	32/19±3/26	تمرين	BMI
0/002	31/76±1/02	31/88±0/95	32/17±0/94	رژیم	(کیلوگرم برمترمربع)
0/000	30/90±3/28	31/79±3/37	32/18±3/42	تمرين و رژیم	
0/874	32/41±2/84	32/39±2/84	32/41±2/84	کنترل	
0/000	29/44±2/65	31/27±2/66	32/80±3/31	تمرين	BFP
0/000	30/74±0/91	31/16±0/92	32/34±0/92	رژیم	(درصد)
0/000	27/4±4/9	30/5±3/77	32/43±2/87	تمرين و رژیم	

توضیح اینکه سطح معنی‌داری ارائه شده در جدول، مربوط به مقایسه پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد ($P < 0/05$).

جدول 3. مقایسه میانگین تغییرات بین گروهی شاخص‌های مورد مطالعه بین گروه‌های مختلف پژوهش (آزمون ANOVA)

متغیر	گروه	تمرين	رژیم	تمرين و رژیم	ضریب F	سطح معنی‌داری
وزن (کیلوگرم)					95/275	0/000
BMI (کیلوگرم برمترمربع)					14/605	0/000
(درصد) BFP					34/104	0/000

توضیح اینکه علامت منفی (-) نشانگر کاهش و علامت مثبت (+) نشانگر افزایش متغیر است.



نمودار 1. مقایسه تغییرات بین گروه‌های درصد چربی بدن (BFP)

• بحث

کاهش دریافت چربی بدن و یک کیلوگرم افزایش توده عضلانی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد در افراد دارای اضافه وزن استفاده از برنامه‌ی تمرینی مناسب در طولانی مدت در کاهش وزن، مناسب تر از برنامه‌هایی است که تنها به رژیم غذایی تکیه دارند. در مطالعه Carrow و Summerbell (1995)، توصیه تمرینات مداوم ورزشی بدون محدودیت در رژیم، به مردان با میانگین BMI 25 تا 30 موجب 3 کیلوگرم کاهش وزن بعد از 30 هفته شد (14)؛ در حالی که ترکیب رژیم غذایی و ورزش در این مطالعه، مقدار وزن را 4/5 کیلوگرم کاهش داد. اهمیت و نقش فعالیت بدنی در کنترل وزن در این است که سطح مناسبی از فعالیت بدنی برای جلوگیری از چاقی تعیین می‌شود. بنابراین استفاده از روش علمی و مناسب جهت تسهیل سازگاری و حفظ مقدار مناسب فعالیت بدنی در کنترل وزن مهم و اساسی است. از طرف دیگر نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهشی که Jakicic (2005) و Grant و همکاران (1992) انجام داده همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد که علت آن مربوط به مدت و شدت انجام تمرینات ورزشی می‌باشد. Jakicic در تحقیقات خود بر این موضوع اشاره دارد که هر چند 30 دقیقه فعالیت بدنی روزانه با شدت متوسط برای سلامتی افراد فواید زیادی دارد، اما این مقدار فعالیت جهت کنترل و کاهش وزن کافی نیست (15, 16).

نتایج پژوهش حاضر نشان داد، رژیم غذایی کنترل شده (جایگزینی دسر ماست - خیار به جای چربی‌های اشباع

این مطالعه با هدف بررسی اثر سه روش: "تمرین منتخب"، "رژیم غذایی کنترل شده" و "تمرین منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده" بر میزان تغییرات وزن، BMI، در مردان چاق انجام شد. گزارش‌های پیشین نشان داد که عدم تحرک و رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش معنی‌داری در وزن و عوامل خطرزای قلبی عروقی می‌شود (4). در این قسمت، به بررسی تأثیر یکایک سه روش: "تمرین منتخب هوایی"، "رژیم غذایی کنترل شده" و "تمرین هوایی منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده" بر معیارهای کاهش وزن پرداخته می‌شود.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد، فعالیت ورزشی هوایی، باعث کاهش معنی‌دار مقدار وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی زیر پوست افراد چاق بعد از هفته چهارم فعالیت ورزشی و پس از آخرین جلسه تمرین هفتم نسبت به قبل از شروع فعالیت ورزشی شد. یافته‌های پژوهش حاضر با یافته‌های زیبا رحیمیان مشهد و همکاران، کاظمی (6)، دهقان‌پور (10)، Gokee-LaRose (11)، Wing RR (12) و Yongtang (13) مبنی بر کاهش وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن متعاقب فعالیت ورزشی هوایی همسو بود. بسیاری از مطالعات جامعه نگر ارتباط مثبتی بین فعالیت فیزیکی یا رژیم به تنهایی و کاهش وزن نشان می‌دهند. Vilmorey (1994) با مسح 53 مطالعه بیان داشت که ورزش در مدت شش ماه موجب 1/6 کیلوگرم کاهش در کل توده بدنی می‌شود که این کاهش در نتیجه 2/6 کیلوگرم

این گروه گردید. به نظر می‌رسد کلسیم رژیم غذایی نقش محوری در تنظیم متابولیسم انرژی و خطر چاقی داشته باشد. در طول دوره‌ای که انرژی دریافتی زیاد باشد، رژیم‌های غذایی پرکلسیم از تجمع چربی بدن جلوگیری می‌نمایند. کلسیم در رژیم‌های محدود از انرژی، در تجزیه چربی‌های بدن دخالت داشته و به این ترتیب نقش مهمی در کاهش چربی بدن و کنترل وزن دارد. در این میان کلسیم موجود در لبینیات اثرات بیشتری در جلوگیری از تجمع چربی بدن و افزایش وزن در مقایسه با کلسیم دارویی دارد (21).

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پروتئین‌های حیوانی در مقایسه با کربوهیدرات و پروتئین‌های گیاهی، مصرف انرژی 24 ساعته را 2-3 درصد بیشتر افزایش می‌دهند (22). بنابراین ممکن است یکی دیگر از دلایل کاهش وزن در گروه "رژیم غذایی" مصرف پروتئین‌های حیوانی (روزانه حدود 30 گرم پروتئین ماست) باشد که موجب کاهش وزن معنی دار در این گروه شده است. تحقیقات چند ساله اخیر نیز نقش مصرف لبینیات را با کاهش چربی بدن در کودکان، جوانان و سالمندان به اثبات رسانده است (23، 24) این نتایج توسط بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیک نیز نشان داده شده است (25، 26). در میان مواد غذایی، لبینیات (خصوصاً ماست) از منابع کلسیم و پروتئین حیوانی است که تقریباً معادل مکمل‌های دارویی حاوی این مواد می‌باشد.

بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، روش "تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی کنترل شده" بیشترین اثر کاهش در وزن (4/13 کیلوگرم)، (1/28 BMI) را داشته است. از شواهد چنین بر می‌آید که افزایش فعالیت بدنی با شدت متوسط و اصلاح رژیم غذایی نقش کلیدی در کاهش وزن و به تبع آن مدیریت کارا بر بیماری‌های وابسته به چاقی دارد. در تأیید این یافته، نتایج تحقیقات Stevens (2001)، میرمیران (2006) و Burke V (2007) با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد (27-29).

از طرف دیگر رژیمی که از نظر فیبر فقیر باشد مدت زمان زیادتری در روده باقی می‌ماند و آنزیم‌ها بیشتر روی آن اثر کرده و در نهایت جذب چربی بالا می‌رود. مصرف فیبرهای نامحلول، سبزی‌ها و میوه مقدار چربی و حجم مدفعه را بالا برده و دفع زیادتر فیبر باعث دفع زیادتر چربی می‌شود. مصرف فیبر گیاهی تغییراتی در میزان جذب چربی

شده، نان، برنج)، باعث کاهش معنی دار مقادیر وزن، شاخص توده بدنی و چربی زیر پوست افراد چاق بعد از هفته چهارم فعالیت ورزشی و 48 ساعت پس از پایان فعالیت ورزشی نسبت به قبل از شروع فعالیت ورزشی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف ماست با شاخص نمایه توده بدن (BMI) نیز در ارتباط است (17). در یک بررسی در تهران توسط دکتر میرمیران و همکاران (223 مرد و 239 زن سالم)، نشان داد که شاخص BMI در زنان و مردانی که لبینیات کمتر مصرف می‌کردند بالاتر بوده است (17). تحقیقات Zemel و همکارانش در دانشگاه تنفسی اثرات مصرف مواد لبینی در ترکیب بدن افراد چاق را مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه 34 فرد چاق انتخاب و برای آنان رژیم کم کلسیم یا رژیم‌های که حاوی لبینیات کمی بود (کمتر از یک سروینگ در روز) و رژیم‌های حاوی لبینیات زیاد (سه سروینگ در روز یا 1200 میلی گرم کلسیم در روز) بدون تغییر در سایر مواد مغذی برای مدت 24 هفته تجویز گردید (13)، همچنین در یک بررسی دیگر 29 فرد چاق نیز به دو گروه تقسیم و برای گروه اول رژیم 500- کالری کم لبینیات (کمتر از یک سروینگ در روز) و گروه دوم نیز رژیم 500- کالری و حاوی لبینیات زیاد (سه سروینگ در روز یا 1200 میلی گرم کلسیم در روز) تجویز کرد. نتایج تجربه اول نشان داد که گروهی که لبینیات بیشتری مصرف کردند 2/16 کیلوگرم چربی بیشتری از دست دادند که این تغییر در گروهی که لبینیات کمتری دریافت کرده بودند مشاهده نگردید. در تجربه دوم هر دو گروه کاهش وزن را نشان دادند اما کاهش وزن در گروهی که لبینیات بیشتری مصرف کرده بودند دو برابر گروه دیگر بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که رژیم‌های غذایی با کالری یکسان، اما متفاوت از نظر لبینیات (کلسیم) می‌تواند اثرات کاهش وزنی متفاوتی را نشان دهد (18). بررسی‌های دیگر نشان می‌دهد که فقط با افزایش کلسیم رژیم غذایی در افراد چاق به مدت یکسال قادر خواهیم بود که در حدود 5 کیلوگرم از وزن بدن آنان را کاهش دهیم (19). مطالعات دیگر نیز مصرف طولانی مدت رژیم‌های حاوی کلسیم زیاد را در کاهش وزن و توده چربی به اثبات رسانده است (20). نتایج پژوهش حاضر نیز صحت این یافته‌ها را تأیید می‌کند؛ به طوری که مداخله در رژیم غذایی (جایگزینی دسر ماست - خیار) در گروه "رژیم غذایی" - با حفظ تعادل کالریکی - موجب کاهش معنی دار وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی زیر پوستی آزمودنی‌های

فعالیت‌های ورزشی هوایی و کنترل رژیم غذایی متعادل، دو عامل مکمل هم هستند که بدون در نظر گرفتن یکی از این دو عامل، تحقق اهداف کاهش وزن و تضمین سلامتی سیستم قلبی عروقی با مشکل مواجه می‌شود.

این نتایج نشان می‌دهد که با تعدیل روش زندگی از طریق بهبود کیفیت تغذیه و کنترل آن و با جایگزین کردن چربی‌های اشباع نشده بجای چربی‌های اشباع، مصرف مواد لبنی کم چرب و سبزیجات در رژیم غذایی و با انجام فعالیت‌های هوایی منظم می‌توان وزن را به حالت متعادلی رساند. در کل این تحقیق می‌تواند برنامه‌های ورزشی منظم باشد معین با رعایت احتیاط، به همراه راهنمایی‌های تغذیه‌ای مناسب برای این قشر از افراد جامعه که دارای جمعیتی رو به افزایش هستند به مراکز بهداشت و سلامت جامعه توصیه کند.

سپاسگزاری: با سپاسگزاری فراوان از خداوند متعال و با تشکر از همکاری صمیمانه آزمودنی‌های مورد مطالعه و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شبستر و همکاران گرامی که بدون کمک آنها این پژوهش هرگز به سرانجام نمی‌رسید.

غذا و انرژی تام، اسیدهای چرب اشباع نشده ایجاد می‌کند که نهایتاً منجر به کاهش سطح کلسترول و دیگر چربی‌های خون می‌شود (30).

با توجه به اینکه در ترکیبات دسر ماست-خیار از سبزیجات، خیار و پودر گردو استفاده شده است لذا با توجه به اهمیت سبزیجات، فیبرها و اسیدهای چرب اشباع نشده در رژیم غذایی آزمودنی‌های گروه "رژیم غذایی کنترل شده" احتمال می‌رود تغییرات ایجاد شده در وزن و درصد چربی بدن این گروه، ناشی از مصرف دسر ماست-خیار باشد. اگرچه مطالعات اپیدمیولوژیک و بالینی، استفاده از رژیم‌های غذایی متعادل کم کالری و افزایش فعالیت فیزیکی بدن را در کنترل چاقی پیشنهاد می‌کنند (31). ولی کاهش وزن ناشی از رژیم غذایی کم کالری ممکن است باعث افزایش ریسک‌های سلامتی مرتبط با چاقی شود (سوء تغذیه)، به طوری که محدودیت کالری دریافتی به ویژه در افراد میانسال و مسن با تحلیل توده عضله اسکلتی همراه است. از این رو جهت جلوگیری از تحلیل توده‌ی عضلانی، افزایش فعالیت بدنی به همراه کنترل رژیم غذایی (کیفیت بخشی برنامه غذایی بدون کم کردن انرژی آن) یکی از اصول مهم برای دستیابی به اهداف کاهش وزن می‌باشد (32). به عبارت دیگر، جهت کاهش وزن و کنترل آن، انجام

• References

- Bouchard C, Jean D.P. Physical activity and health: hypertensive, metabolic, and atheroschorotic diseases. Research Quarterly for Exercise and Sport. 1995; 66: 268-75.
- Burke V,Beilin LJ,Cutt HE, Mansour J, Williams A, Mori TA. A lifestyle program for treated hypertensives improved health-related behaviors and cardiovascular risk factors, a randomized controlled trial. J Clin Epidmiol 2007;60:133-41.
- Carrow J.E, and Summerbell C.D. Meta – analysis:effect of exercise, wth or without dieting of the body composition of over weight subjects. European J. clin. Nutr.1995;49: 1- 10.
- Carruth BR, and Skinner JD. The role of dietarycalcium and other nutrieents in moderating, body fat in preschool children . Int J Obes Relat Metab Disord 2001; 25:559-66.
- Dehghanpor M, Rahimi A. The effects of isotonic exercising method on under-skin fat ratein non-athlete boy students of Islamic Azad University of Shabestar (Persian). Iranian Journal of War and Public Health 2010;2(6):46-9.
- Garouni M. Clinical evaluation of the effects of plant fiber reduction on blood lipids.PHD thesis, Tehran:Medical Sciences University;1994.[in persian]
- Gokee-LaRose J,Gorin AA, Raynor HA, Laska MN, Jeffery RW,Levy RL,et al.Are standard behavioral weight loss programs effective for young adults?Int J Obes (Lond).2009;33(12):1374-80
- Greenberg AS, Obin MS. Obesity and the role of adipose tissue in inflammation and metabolism. The American journal of clinical nutrition. 2006;83(2):461S.
- Hosseini Esfahani F, Mirmiran P, Djazayeri SA, Mehrabi Y, Azizi F . Change in food patterns and its relation to alterations in central adiposity in tehranian of district 13 adults (Persian). Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism 2008;10(4):299-312.
- Jakicic, J.M. Exercise in the Treatment of Obesity". Endocrinol Metab Clin North Am.2003; 32(4):967-80.
- Jakicic, J.M., & D.O. Amy. Physical Activity Consideration for the Treatment and Prevention www.SID.ir

- ofObesity. *The American Journal of Clinical Nutrition*.2005
12. Jaqumain M, Doucet E, Despres J-P, Bouchard C, and Tremblay A. Calcium intake , body composition, and lipoprotein-lipid concentrations in adults. *Am J Clin Nutr* 2003;77:1448-52.
 13. Jin Y, Zhang F, Yang S, Kong Y, Xiao F, Hou Y, et al. Combined effects of HLA-Cw6, body mass index and waist-hip ratio on psoriasis vulgaris in Chinese Han population. *J Dermatol Sci* 2008;52(2):123-9.
 14. Jolly K, Daley A, Adab P, Lewis A, Denley J, Beach J, Aveyard P. A randomised controlled trial to compare a range of commercial or primary care led weight reduction programmes with a minimal intervention control for weight loss in obesity: the Lighten Up trial. *BMC Public Health*.2010 27;10:439.
 15. Kazemi F, Mazloom Z. [Comparison of the effects of two diets (low-glycemic index and low-fat.on weight loss, body mass index, glucose and insulin levels in the obese women (Persian)]. *Journal of Birjand University of Medical Sciences* 2009;1(16):8-15.
 16. Klipstein-Grobusch K, den Breeijen JH, Goldbohm RA, et al.Dietary assessment in the elderly: Validation of a semiquantitative food frequency questionnaire. *Eur J Clin Nutr* 1998; 52(8): 588-96.
 17. Kong AP, Chan RS, Nelson EA, Chan JC. Role of low-glycemic index diet in management of childhood obesity. *Obes Rev* 2011;12(7):492-8.
 18. Laura L.Fitness and Exercise SOURCEBOOK.4th ed.St. United States: Peter E; 2011.
 19. Lin YC, Lyle RM, McCabe LD, McCabe GP, Weaver CM, Teegarden D. Dairy calcium is related to changes in body composition during a two-year exercise intervention in young women. *J Am Coll Nutr* 2000;19 :754-60.
 20. Loos RJ, Rankinen T, Leon AS, Skinner JS, Wilmore JH, Rao Dct et al. Calcium intake and body composition in the heritage family study. *Obes Res* 2003; 11:A145.
 21. Mathieu P, Poirier P, Pibarot P, Lemieux I, Després JP. Visceral obesity: the link among inflammation, hypertension, and cardiovascular disease. *Hypertension*. 2009;53(4):577-84.
 22. Mazzeo RS.P, Cavanaghm W.J, Evans M, Fiatarone J, Hagberg E, McAuley and Startzell j. Exercise and physical activity for older adults. *Medicine and Science in Sports and Exercise*.1998; 30:54-65.
 23. Mirmiran P, Azadbakht L, Padyab M, Esmaillzadeh A, Azizi F. Beneficial effects of a DASH(Dietary Approaches to Stop Hyper-tension) eating plan on features of the metabolic syndrome.*Iranian Journal Endocrinology and Metabolism* 2006;8:127-38.
 24. Mirmiran P, Esmaillzadeh A and Azizi F. Dairy consumption and body mass index: an inverse relationship. *International Journal of Obesity* 2005;29: 115 – 21 .
 25. Per B Mikkelsen Soren Toubro and Arne Astrup. Effect of fat – reduced diets on 24-h energy expenditure: comparisons between animal protein, vegetable protein, and carbohydrate. *American Journal of Clinical Nutrition* 2000; 72(5):1135-41.
 26. Stevens VJ, Obarzanek E, Cook NR, Lee IM, Appel LJ, Smith West D, et al. Long-term weight loss and changes in blood pressure: results of the Trials of Hypertension Prevention, phase II. *Ann Intern Med* 2001; 134:1-11.
 27. Stewart KJ, Bacher AC, Turner K, Lim JG, Hees PS ,Shapiro EP, et al. Exercise and risk factors associated with metabolic syndrome in older adults. *American journal of preventive medicine*. 2005;28(1):9-18.
 28. Sylvia R, KarasuT,M.D.T. Byram karasu, M.D. *The Gravity of weight* .St.United States: American psychiatric publishing Inc.2010.
 29. Teegarden D. The influence of dairy product consumption on body composition. *J Nutr* 2005; 135(12):2749-52.
 30. Wilund KR. Is the anti-inflammatory effect of regular exercise responsible for reduced cardiovascular disease? *Clin Sci (Lond)*. 2007;112(11):543-55.
 31. Wing RR, West DS, Grady D, Creasman JM, Richter HE, Myers D, et al. Effect of weight loss on urinary incontinence in overweight and obese women: results at 12 and 18 months. *J Urol* 2010;184(3):1005-10.
 32. Zemel MB, Shi H, Greer B Dirienzo D, and Zemel PC. Regulation of adiposity by dietary calcium. *FASEB J* 2000; 14(9): 1132-8.
 33. Zemel MB, Thompson W, Milstead A, Morris K, and Campbell P. Calcium and dairy acceleration of weight and fat loss during energy restriction in obese adults. *Obes Res* 2005; 13(1):191.
 34. Zemel MB.The role of dairy foods in weight management.*J Am Coll Nutr* 2005;24(Suppl):537S – 46S.

The effects of a selected aerobic exercise along with a controlled diet on weight loss in obese men

Tofighi A¹, Ghaffari Y^{*2}, Afsarbegi N³

1- Assistant Prof, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Urmia University, Urmia, Iran

2- *Corresponding author: Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Urmia University, Urmia, Iran,
Email: ghaffari_y@yahoo.com

3- Bachelor of Physical Education , Department of Shabestar Education, Shabestar, Iran

Received 22 Jan, 2014

Accepted 15 Jun, 2014

Background and objective: Overweight and obesity is increasing because of changing food consumption patterns as well as our industrial life. Because of this, the prevalence of cardiovascular diseases and premature death have increased. The main goal of this study is to determine the effect of controlled diet as well as aerobic exercise on weight loss in fat men.

Materials and methods: In this study 40 fat men were randomly selected and then divided into four groups of ten men. 1. Ten men along with exercise . 2. Ten men along with controlled diet. 3. Ten men along with exercise as well as controlled diet. 4. Ten men along with controls. Their height, weight and thickness of subcutaneous fat were measured before starting the exercise and diet intervention. The researcher did the exercise and controlled diet for eight weeks. After four weeks and at the end of the eight weeks of training and diet intervention their weight and thickness of subcutaneous fat were measured. Software of food processor was used to control the subjects dietary intake. In order to analysis the data, the researcher used analysis of variance by repeated measures (ANOVA). In all tests the significance level was considered as $p < 0.05$.

Results: The results showed that eight weeks of aerobic exercise and controlled diet significantly decreased the levels of weight and body fat percentage in different groups. ($p < 0.05$). So that aerobic exercise along with controlled diet group with four percent reduction in weight had the greatest effect compared to the other groups.

Conclusion: In conclusion, based on the findings of this study, we can recommended exercise programs with caution and certain intensity along with low fat dairy foods to weight loss in obese men ($BMI > 30$) to community health centers.

Keywords: Aerobic training, Nutrition, Weight loss, Obese men