

ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و خطر بیماری‌های قلبی عروقی در بین بیماران

نفروپاتی دیابتی

مائده مرادی^۱، فهیمه حقیقت دوست^۱، لیلا آزادبخت^{۱,۲,۳}

۱- مرکز تحقیقات امنیت غذایی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

۲- مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۳- نویسنده مسئول: استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. پست الکترونیکی: azadbakht@hlth.mui.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۹۵/۴/۲

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۰/۱۷

چکیده

سابقه و هدف: ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و خطر بیماری‌های قلبی عروقی در بین بیماران نفروپاتی دیابتی هنوز مورد ارزیابی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی بر اساس PRAL (potential renal acid load) و امتیاز نسبت پروتئین به پتاسیم (Pro:K) و خطر بیماری‌های قلبی عروقی در بین بیماران نفروپاتی دیابتی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: 547 بیمار نفروپاتی دیابتی در مطالعه مقطعی حاضر شرکت کردند. در این مطالعه شاخص‌های PRAL و Pro:K بررسی شدند. از پرسشنامه‌ی بسامد مصرف غذایی اعتبارسنجی شده به منظور ارزیابی دریافت‌های غذایی استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی سایر مقادیر تن‌سنجی و بیوشیمیابی از روش‌های استاندارد استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهند که گروه با PRAL پایین هموگلوبین گلیکوزیله $5/7 \pm 0/5\%$ در مقابل $7/8 \pm 0/01$ [p=0/01] تری اسایل گلیسرول $246/9 \pm 2/3\text{mg/dl}$ در مقابل $257/4 \pm 2/3$ [p=0/006] و فشار سیستولی $103/6 \pm 0/7\text{mmHg}$ در مقابل $106/1 \pm 0/7$ [p=0/03]. کراتینین و قند خون ناشتاً کمتری نسبت به گروه PRAL بالاتر داشتند. Pro:k با هموگلوبین گلیکوزیله ارتباط مستقیم $5/8 \pm 0/5\%$ در مقابل $7/6 \pm 0/03$ [p=0/03] اما با لیپوپروتئین با چگالی پایین و دور کمر ارتباط معکوس داشت.

نتیجه گیری: هر دوی PRAL و Pro:k با هموگلوبین گلیکوزیله در بین بیماران دیابتی ارتباط مستقیم داشتند اما نماگرهای بیوشیمیابی و کلیوی به وضعیت PRAL و Pro:k بستگی دارند.

وازگان کلیدی: بار اسیدی رژیم غذایی، بیماری‌های قلبی-عروقی، نفروپاتی دیابتی

۱ مقدمه

با ارائه الگوهای غذایی بهبوددهنده حساسیت انسولینی می‌توان شروع نفروپاتی را در بیماران دیابتی به تعویق انداخت. به علاوه، مطالعات پیشین نشان می‌دهند که افزایش اندکی در اسیدوز متابولیکی منجر به افزایش مقاومت انسولینی می‌شود (۷). بنابراین کاهش بار اسیدی رژیم غذایی ممکن است راه حل مناسبی در جهت بهبود سلامت در بیماران دیابتی باشد. به علاوه، چندین مطالعه مشاهده‌ای و مطالعات طولی (اکولوژیک) ارتباط مثبتی بین بار اسیدی رژیم غذایی و افزایش خطر بیماری‌های مزمن از جمله دیابت، مقاومت انسولینی، کبد چرب غیرالکلی و عوامل کاردیومتابولیک،

نفروپاتی دیابتی یکی از عوارض شایع در میان بیماران دیابتی با قند خون کنترل نشده می‌باشد (۱). نتایج حاصل از یک مطالعه مرووری نشان داد که بروز این بیماری در بزرگسالان ایرانی بین ۷ تا ۲۶ درصد است (۲). بیماری‌های دیابت و نفروپاتی دیابتی هردو عوامل خطر مستقل برای بیماری‌های قلبی عروقی هستند (۳). عوامل رژیمی و وراثتی (۴)، تعیین کننده کنترل گلایسمی ضعیف، مقاومت انسولینی و هموگلوبین گلیکوزیله افزایش یافته (۶) می‌باشند، که این موارد به خودی خود تعیین کننده‌های اولیه میکروآلبومنوری، به عنوان وضعیتی از پیشرفت بیماری کلیه، می‌باشند.

بار اسیدی رژیم غذایی بر عوامل بیماری قلبی عروقی، پروتئین حساس C-reactive (hs-CRP) و نماگرهای مرتبط با کلیه در بیماران نفروپاتی دیابتی می‌باشد.

• مواد و روش‌ها

در مطالعه مقطعی حاضر 547 بیمار نفروپاتی دیابتی از بیماران مراجعه کننده به بخش نفرولوژی بیمارستان الزهرا و یک کلینیک تغذیه واقع در اصفهان از تیرماه 1389 تا فروردین 1392 وارد مطالعه شدند. توسط یک متخصص نفرولوژیست ابتلا به دیابت نفروپاتی تأیید می‌شد. حجم نمونه بر اساس قندخون ناشتا به عنوان متغیر مستقل تخمین زده شد. با استفاده از فرمول $S_2/d = \frac{24/4}{(Z - 0.4)^2}$ و $N = 2/(\beta^2)$ حجم نمونه $\beta = 0/8$, $d = 2/5$, $Z = 0/05$ نفر در نظر گرفته شد (8). این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأیید شد. تمام شرکت‌کنندگان رضایت کتبی خود را مبنی بر شرکت در این مطالعه اعلام کردند. بیماری نفروپاتی دیابتی توسط یک متخصص نفرولوژی تأیید شد. در تمامی شرکت‌کنندگان دفع پروتئین ادراری بین 300 تا 1000 میلی‌گرم در روز، کراتینین سرم بین 1 تا 2/5 میلی‌گرم بر دسی لیتر و اوره نیتروژن خون بین 20 تا 40 میلی‌گرم بر دسی لیتر بود. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: 1- یکی از دو سطح اول و دوم بیماری نفروپاتی، 2- قندخون ناشتای بالای 126 میلی‌گرم بر دسی لیتر، 3- مصرف داروهای هیپو‌گلایسمی یا انسولین، 4- پروتئین اوری بالای 300 میلی‌گرم در روز. شرکت‌کنندگانی که از رژیم غذایی خاصی پیروی می‌کردند، تغییری در داروهای مصرفی آنها ایجاد نمی‌شد و یا انرژی روزانه دریافتی آنها کمتر از 800 کیلوکالری یا بیشتر از 4200 کیلوکالری بود، از مطالعه خارج شدند (21).

ارزیابی رژیم غذایی: دریافت غذایی با استفاده از پرسشنامه‌ی سامدمصرف غذایی نیمه کمی 168 آیتمی ارزیابی شد (22). تمامی پرسشنامه‌ها به صورت رو در رو توسط مصاحبه‌گر رژیم‌شناس پر شدند. در نهایت سهم هریک از غذاها با مقیاس‌های خانگی به گرم تبدیل شدند (23). از برنامه‌ی nutritionist-IV به منظور تخمین دریافت انرژی و مواد مغذی استفاده شد.

محاسبه بار اسیدی رژیم غذایی: PRAL بر اساس دریافت چند ماده‌ی مغذی محاسبه شد (15, 16):

$$\text{PRAL (mEq/d)} = (\text{protein [g/d]} \times 0.49) - (\text{P [mg/d]} \times 0.37) - (\text{K [mg/d]} \times 0.021) - (\text{Ca [mg/d]} \times 0.013) - (\text{mg [mg/d]} \times 0.026)$$

یافتند (11-18). اما این ارتباط در رابطه با بیماری فشارخون یافت نشد (12).

اهمیت بار اسیدی رژیم غذایی در بیماران کلیوی نه تنها از نظر نقش مهم و فعال کلیه در هموستاز اسید- باز است، بلکه به دلیل کاهش ظرفیت دفع اسید توسط کلیه‌ها در این شرایط است که می‌تواند سبب تشید اسیدوز متابولیک شود (13). به علاوه، رژیم‌های القاکنده اسید، مسمومیت توبولی کلیه را با افزایش تولید آمونیم به منظور دفع H^+ و فعال کردن سیستم آنزیوتانسین افزایش می‌دهند (14) که این افزایش با اختلال در عملکرد کلیه همراه است. بنابراین مصرف غذاهای غنی از آلکالین ممکن است با بهبود پروفایل متابولیکی در بیماران کلیوی باشد (13).

در مطالعات اپیدمیولوژیک، بار اسیدی رژیم غذایی با دو روش تخمین زده شده است. پتانسیل بار اسیدی کلیوی (potential renal acid load) PRAL (NEAT) می‌باشد که شامل کل پروتئین خالص داخلی اسید (NEAT) می‌شود (15). دومین روش تولید هضم شده و پتانسیم می‌شود (16). ارتباط معنی‌داری بین دفع ادراری اسید 24 ساعته (NAET) و PRAL در بیماران پیوند کلیه ثابت شده است (17). در نتیجه هر دو روش می‌توانند شاخص‌های مناسبی از وضعیت بار اسیدی رژیم غذایی در بیماران نفروپاتی دیابتی باشند.

بیشتر مطالعاتی که ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و خطر بیماری‌های قلبی عروقی را ارزیابی کرده‌اند بر روی افراد سالم و جوان انجام شده است. تنها در یک مطالعه شرکت‌کنندگان عمل پیوند کلیه انجام داده بودند. به علاوه، دریافت میوه، سبزی، شیر و فراورده‌های گوشتی در بسیاری از ایرانیان کمتر از میزان توصیه شده است. با این وجود مصرف نوشیدنی‌های غیرالکلی در بین ایرانیان رو به افزایش است (18). ایرانیان نیاز روزانه خود به انرژی را از طریق کربوهیدرات‌های ساده و تصفیه شده تأمین می‌کنند، این در حالی است که تنها 22 درصد انرژی از چربی تأمین می‌شود (20). با توجه به مصرف پایین میوه و سبزی و لبنتی در بین خانواده‌های ایرانی و همچنین مصرف بالای مواد غذایی بر پایه‌ی غلات و گوشت، این نوع الگوی غذایی می‌تواند با افزایش بار اسیدی رژیم غذایی آنها و در نتیجه تشید احتلالات متابولیکی همراه باشد. این موضوع در بیماران کلیوی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که بیماران کلیوی در مصرف مواد غذایی که PH قلیایی دارند محدودیت دارند. بنابراین، هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین ارتباط بین دو نماگر

latex-enhanced immunoturbidimetric assay شد.

آنالیزهای آماری: به منظور پرهیز از طبقه‌بندی نادرست، PRAL با تعديل انرژی محاسبه شد و بنابراین، شرکت کنندگان بر اساس امتیاز میانه به دو گروه بار اسیدی بالای رژیم غذایی و بار پایین اسیدی رژیم غذایی تقسیم شدند. خصوصیات اولیه شرکت کنندگان به صورت میانگین و درصد گزارش شد و با آزمون t مستقل یا آزمون‌های کای دوی و پیرسون بین میانه PRAL به ترتیب برای متغیرهای کمی و رتبه‌ای مقایسه شدند. دریافت غذایی برای سن، جنس و انرژی دریافتی تعديل شدند. عوامل خطرهای بیماری‌های قلبی عروقی شامل (hs-,HbA1C,FBS,LDL-C,TG,TC) و نماگرهای مرتبط با کلیه (کراتینین و WC) و BMI,CRP (BUN) به مدل‌های مختلف ارائه شدند. در مدل 1 برای سن، جنس، انرژی دریافتی، فعالیت فیزیکی، روش درمان فشارخون، لیپوپروتئین سرم، سطوح گلوکز، مولتی ویتامین‌ها و مواد معدنی و هورمون‌ها با استفاده از آزمون ANCOVA 2 (analysis of covariance) تعديل صورت گرفت. در مدل 2 کنترل آماری بیشتری در رابطه با دریافت‌های غذایی شرکت کنندگان (شامل پروتئین، کلسترول، فیبر، غلات کامل و تصفیه شده، لبنتیات، گوشت، دانه‌ها و مغزها و میوه‌ها و سبزیجات) انجام گرفت. همچنین برای عوامل مخدوشگری همچون BMI در مدل نهایی تعديل صورت گرفت. در مدل‌های تعديل شده، به منظور تعیین اهمیت آماری از آنالیز مدل خطی کواریانس استفاده شد.

• یافته‌ها

امتیازهای میانه PRAL و نسبت پروتئین به پتاسیم که انرژی برای آن‌ها تعديل شده بود به ترتیب 0/32 و 0/028-0/028 بودند. میانگین BMI و سن به ترتیب 24 کیلوگرم بر مترمربع و 66/8 سال بود (جدول 1). میانگین \pm SD طول مدت دیابت و شروع نفوropاتی دیابتی به ترتیب $11/3 \pm 2/3$ سال و $3 \pm 1/3$ سال بود. تمامی شرکت کنندگان در مرحله دوم بیماری نفوropاتی دیابتی بودند به جز 6 شرکت کنندگان که در مرحله اول بودند. تمامی شرکت کنندگان متأهل و غیر سیگاری بودند. میانگین دریافت‌های غذایی در جدول 2 گزارش شده است. مصرف پروتئین، گوشت و جایگزین‌های گوشت در افرادی که PRAL و Pro:K بیالتری داشتند، بیشتر بود. همچنین مصرف پتاسیم و میوه‌ها و سبزی‌ها در مقایسه با گروهی که Pro:K و PRAL پایین‌تری داشتند، کمتر بود. دریافت انرژی و سدیم بین میانه‌های بالا و پایین هردو امتیاز تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشت.

همچنین نسبت پروتئین به عنوان امتیاز دیگری برای بار اسیدی رژیم غذایی محاسبه گردید. PRAL و نسبت پروتئین به پتاسیم برای انرژی دریافتی کل تعديل شدند. میانه‌های امتیازهای بار اسیدی وابسته به رژیم در آنالیزهای آماری استفاده شدند.

ارزیابی‌های تن‌سنجه: اندازه‌گیری قد شرکت کنندگان به حالت ایستاده و استاندارد و بدون کفش و با دقت 0/5 سانتی‌متر انجام گرفت. اندازه‌ی وزن شرکت کنندگان با ترازوی دیجیتال و با کمترین پوشش انجام شد. وزن‌ها با دقت 100 گرم ثبت شدند. اندازه‌گیری دور کمر با استفاده از متر نواری بدون تحمل فشار بر سطح بدن و با لباس سبک انجام شد بهصورتی که باریک‌ترین ناحیه بین پایین‌ترین دنده و استخوان خاصره با دقت 0/5 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد.

ارزیابی سایر متغیرها: میانگین 2 اندازه‌گیری فشارخون با استفاده از دستگاه فشار خون جیوه ای استاندارد در آنالیزهای آماری استفاده شد. میزان فعالیت فیزیکی افراد شرکت کننده در مطالعه با 3 ثبت جداگانه 1 روزه فعالیت فیزیکی با معادل‌های متابولیکی به صورت h/wk (ساعت در هفته) محاسبه شد. بدین منظور از ضرایب فعالیت منتشر شده در فرم مختصر شده برای فعالیت بدنی استفاده گردید (24). وضعیت اقتصادی اجتماعی با استفاده از پرسشنامه‌ی فارسی اعتبارسنجی شده ارزیابی شد. این پرسشنامه شامل سؤالاتی از قبیل درآمد خانواده، سطح تحصیلات، شغل، بعد خانوار، مالکیت منزل و اتومبیل، تعداد اتاق‌های خانه و تعداد مسافرت‌های داخلی و خارجی بود. شرکت کنندگان از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی به 3 گروه تقسیم شدند: ضعیف (امتیاز زیر 33 درصد)، متوسط (امتیاز بین 33 تا 66 درصد) و قوی (امتیاز بالای 66 درصد) (25).

ارزیابی بیوشیمیابی: شاخص‌های بیوشیمیابی در روز دوم و سی ام به صورت جداگانه اندازه‌گیری شدند. نمونه خون وریدی در شرایط ناشتا از شرکت کنندگان گرفته شد. تمام آنالیزهای بیوشیمیابی در طول 48 ساعت بعد از جمع شدن نمونه خون‌ها به منظور جلوگیری از انعقاد خون کامل شدند. قند خون ناشتا و پروفایل لیپیدی شامل (total cholesterol (TC)، triglyceride (TG)، low energy density LDL از معرفه‌های آنژیمی اندازه‌گیری شدند (پارس آزمون، تهران، ایران). غلظت هموگلوبین گلیکوزیله از تمام نمونه‌های خونی با استفاده از معرف و با دستگاه آنالیز DS5 مشخص شد. کراتینین سرم و BUN نیز از طریق روش colorimetric enzymatic colorimetric Bertholet سطوح سرمی hs-CRP با استفاده از

ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی ... / مائدۀ مرادی و همکاران

جدول 1. خصوصیات پایه بیماران نفروپاتی دیابتی با میانه امتیاز بار اسیدی رژیم غذایی

p-value	Pro:k (0/28) میانه (-0/2)		p-value	PRAL میانه (0/32) (-0/32)		تمام بیماران	متغیرها*
	بالا n=274	پایین n=273		بالا n=274	پایین n=273		
0/7	65/8±0/6	67/9±0/6	0/7	66/6±0/6	67/1±0/6	66/8±0/4	سن
0/06	24/0±0/2	24/05±0/2	0/8	23/9±0/2	24/0±0/2	24/0±0/1	شخص توده‌ی بدنه
0/2	101/6±0/7	102/8±0/6	0/9	101/8±0/6	102/2±0/7	102/2±0/5	نسبت دور کمر به دور باسن
0/09	2/2±0/04	2/3±0/04	0/5	2/3±0/04	2/2±0/04	2/3±0/03	فعالیت بدنه (ساعت متابولیک در هفت‌هفته)
0/8	61/9	63/1	0/8	63/1	61/9	62/5	خانم (درصد)
0/6	38/1	35/8	0/7	36/2	37/8	36/6	اضافه‌وزن یا چاقی**
0/3	79/1	82/8	0/8	80/7	81/3	81/0	چاقی شکمی*** (درصد)
0/6	12/3	12/3	0/3	12/8	10/1	11/3	صرف دارو (درصد)
0/02	80/6	72/3	0/08	79/6	73/3	76/4	ضعیف یا متوسط (درصد)
							SES

(شناخت توده بدنه)، PRAL (اسیدهای ابناشته کلیوی)، K (نسبت پروتئین به پتاسیم)، SES (شرط اقتصادی و اجتماعی)، WC (دور کمر).

mean±SE*

* برای متغیرهای پیوسته P-value از طریق آزمون t مستقل و برای متغیرهای طبقه‌بندی شده از طریق آزمون χ^2 محاسبه شد.

** اضافه‌وزن و چاق: BMI بالای 25

*** چاقی شکمی: دور کمر بالای 102 در مردان و بالای 88 سانتی‌متر در خانم‌ها

داروهایی مثل ضد فشارخون، داروهای کاهنده چربی خون، داروهای ضد دیابت، آنتی‌اسیدها، هورمون‌ها، مولتی ویتامین‌ها و املاح و داروهای ضد انعقاد خون

جدول 2. دریافت‌های غذایی بیماران نفروپاتی دیابتی با میانه امتیاز بار اسیدی دریافتی *

p-value**	Pro:k (0/028) میانه (-0/0)		p-value***	PRAL میانه (0/32) (-0/32)		متغیرها
	بالا n=274	پایین n=273		بالا n=274	پایین n=273	
0/6	2229/8±16/0	2217/6±16/0	0/8	2220/9±16/0	2226/5±16/0	انرژی (کیلوکالری در روز)
<0/0001	22/1±0/9	-0/6±0/9	<0/0001	2±0/8	-1/8±0/8	بار اسیدی
0/05	96/5±2/0	90/8±2/0	<0/0001	103/3±1/9	84/0±1/9	پروتئین (گرم در روز)
0/002	69/8±2/4	80/2±2/4	0/01	79/2±2/4	70/8±2/4	چربی (گرم در روز)
<0/0001	306/2±6/0	351/7±6/0	0/4	332/6±6/1	325/4±6/1	کربوهیدرات (گرم در روز)
0/02	212/0±5/6	192/8±5/6	<0/0001	226/2±5/4	178/4±5/4	کلسترول (میلی گرم در روز)
0/02	39/5±2/5	27/6±2/5	<0/0001	44/8±2/4	22/3±2/4	غلات کامل (گرم در روز)
0/002	513/5±10/7	465/3±10/7	0/004	465/3±10/7	476/5±10/7	غلات تصفیه شد (گرم در روز)
<0/0001	433/2±14/6	690/4±14/6	<0/0001	478/2±15/7	646/2±15/7	میوه و سبزی (گرم در روز)
<0/0001	420/5±16/7	513/4±16/6	0/4	476/3±15/8	457/8±15/9	لبنیات (گرم در روز)
<0/0001	157/9±3/7	109/1±3/7	<0/0001	159/7±3/6	107/1±3/6	گوشت و چایگزین‌های آن (گرم در روز) ***
0/3	53/7±4/2	48/1±4/2	0/001	60/5±4/2	41/2±4/2	مغزها و لوبیاها (گرم در روز)
<0/0001	16/0±0/6	20/5±0/6	0/05	17/4±0/7	19/2±0/7	فیبرها (گرم در روز)
0/02	1581/0±37/0	1708/0±37/0	<0/0001	1768/6±36/3	1520/1±36/4	فسفر (میلی گرم در روز)
<0/0001	3020/0±74/7	3999/5±74/8	0/003	3341/4±79/5	3680/3±79/6	پتاسیم (میلی گرم در روز)
<0/0001	1057/2±30/9	1300/0±30/8	0/6	1191/6±31/6	1166/0±31/6	کلسیم (میلی گرم در روز)
<0/0001	298/6±7/0	351/4±7/0	0/5	351/4±7/0	321/9±7/2	منیزیم (میلی گرم در روز)
0/3	6499/7±390/7	7079/3±390/0	0/3	7079/3±390/0	6528/8±389/7	سدیم (میلی گرم در روز)
<0/0001	1/2±0/01	0/9±0/01	<0/0001	1/2±0/01	0/9±0/01	نسبت پروتئین به پتاسیم (گرم بر میلی اکووالان)

DN (بیماری دیابتی)، PRAL (اسیدهای ابناشته کلیوی)، K (نسبت پروتئین به پتاسیم)

* مقدار جدول بر اینرد با مقدار میانگین بدست آمده \pm خطای معیار. مواد غذایی و گروههای غذایی بر اساس سن، جنس و دریافت‌های انرژی دریافت از اساس سن و جنس تعدیل شدند.

** به دست آمده از آنالیز کوواریانس

*** جایگزین‌های گوشت شامل پنیر و تخم مرغ

فشار خون دیاستولی (DBP)، BMI و hs-CRP در هیچ یک از مدل‌های تعدیل شده‌ی چند متغیره یا خام با Pro:K و PRAL در ارتباط نبود. با تعدیل اثر مخدوشگری BMI و دریافت‌های غذایی، ارتباط مثبت معنی‌داری بین PRAL با فشار خون HbA1c، SBP (Systolic Blood pressure) و سیستولی (triglyceride) (hemoglobin A1c) (TG) دیده شد؛ در حالی که قندخون ناشتا و کراتینین به طور معکوسی با PRAL در ارتباط بودند. Pro:K بالا با اندازه‌ی دور کمر و LDL-C پایین و HbA1c بالا در ارتباط بود. تنها HbA1c پس از کنترل مخدوشگرها مختلف به طور معنی‌داری با PRAL و Pro:K داشت. تفاوت‌های دو جنس در جدول ضمیمه ۱ گزارش شده است.

جدول ۳ ارتباط بار اسیدی رژیم غذایی با دریافت‌های غذایی و نماگرهای بیوشیمیابی در بیماران نفروپاتی دیابتی*

جدول ۳ ارتباط بار اسیدی R:K و PRAL با نماگرهای بیوشیمیابی، مواد مغذی و غذاهای دریافتی را نشان می‌دهد. متغیرهای وابسته برای سن، جنس و کل کالری دریافتی کنترل شدند. PRAL و K به طور معنی‌داری با هم ارتباط داشتند ($p < 0.0001$ و $\beta = 0.84$). Pro:K و PRAL ارتباط مثبت معنی‌داری با پروتئین، گوشت‌ها و جایگزین‌های گوشت داشتند، در حالی که ارتباط منفی با میوه‌ها، سبزی‌ها و پتاسیم وجود داشت. همچنین ارتباط مثبت معنی‌داری بین Pro:K با کراتینین و BUN مشاهده شد. میانگین‌های ($\pm SE$) تعدیل شده‌ی خام و چند متغیره برای عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی و نماگرهای کلیوی در نمونه‌های جمع آوری شده در جدول ۴ ارائه شده است.

* جدول ۳. ارتباط بار اسیدی رژیم غذایی با دریافت‌های غذایی و نماگرهای بیوشیمیابی در بیماران نفروپاتی دیابتی

Pro:K		PRAL		متغیرها
Mیانه	P-value	Mیانه	P-value	
0/8	0/009	0/03	0/09	قندخون ناشتا
1/0	-0/002	0/7	0/02	هموگلوبین گلیکوزیله
0/7	-0/02	0/5	-0/03	تری اسایل گلیسرول
<0/0001	-0/1	<0/0001	-0/1	کلسیترول تام
0/9	-0/007	0/5	0/03	LDL
-0/003	0/1	0/002	0/1	کراتینین
0/003	0/1	0/02	0/1	BUN
0/1	0/06	0/2	0/05	Hs-CRP
0/03	0/09	0/1	0/06	فشار سیستولی
1/0	-0/001	0/7	0/01	فشار دیاستولی
0/3	0/04	0/6	0/02	شاخص توده بدنی
1/0	-0/002	1/0	0/001	دور کمر
<0/0001	0/84	<0/0001	1/0	PRAL
<0/0001	0/2	<0/0001	0/4	پروتئین (گرم در روز)
0/1	-0/07	0/001	0/1	چربی (گرم در روز)
<0/0001	-0/1	0/9	-0/004	کربوهیدرات (گرم در روز)
<0/0001	0/2	<0/0001	0/4	کلسیترول (میلی گرم در روز)
<0/0001	0/5	<0/0001	0/3	غلات کامل (گرم در روز)
<0/0001	0/2	<0/0001	0/1	غلات تصفیه شده (گرم در روز)
<0/0001	-0/5	<0/0001	-0/3	میوه و سبزی (گرم در روز)
<0/0001	-0/2	0/2	0/05	لبنیات (گرم در روز)
<0/0001	0/5	<0/0001	0/6	گوشت‌ها (گرم در روز)
0/06	0/08	0/001	0/1	مغزها (گرم در روز)
<0/0001	-0/2	0/006	-0/1	فیر (گرم در روز)
0/3	-0/04	<0/0001	0/3	فسفر (میلی گرم در روز)
<0/0001	-0/4	<0/0001	-0/2	پتاسیم (میلی گرم در روز)
<0/0001	-0/2	0/3	0/04	کلسیم (میلی گرم در روز)
<0/0001	-0/2	0/9	0/003	منزیم (میلی گرم در روز)

* تعدیل شده از نظر جنسیت، سن و دریافت کالری

شاخص دور کمر تعدیل نشد.

مقادیر بتا از طریق روش آماری Linear regression test به دست آمده اند.

ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی ... / مائدۀ مرادی و همکاران

جدول 4. غلظت سرمی نماگرهای بیوشیمیایی و کلیوی با میانه‌ی اسکور بار اسیدی رژیم غذایی در بیماران نفروفاتی دیابتی*

متغیرها	قندخون ناشتا	PRAL میانه پایین	PRAL میانه بالا	†p-value	Pro:K میانه پایین	Pro:K میانه بالا	**p-value
هموگلوبین گلیکوزیله	خام	131/0±0/9	132/1±0/9	0/1	131/3±0/9	131/9±0/9	0/3
مدل 1	خام	131/5±0/8	131/6±0/8	0/8	131/4±0/8	131/7±0/8	1/0
مدل 2	خام	131/0±1/0	132/1±1/1	0/01	129/5±1/0	133/6±1/0	0/5
مدل 3	خام	131/0±1/0	132/1±1/1	0/01	129/4±1/0	133/7±1/0	0/5
تری اسیل گلیسرول	خام	7/2±0/6	6/3±0/03	0/03	7/2±0/6	6/2±0/03	0/03
مدل 1	خام	7/2±0/4	6/3±0/4	0/08	7/2±0/4	6/2±0/4	0/1
مدل 2	خام	7/6±0/5	5/8±0/5	0/01	7/8±0/5	5/7±0/5	0/03
مدل 3	خام	7/6±0/5	5/8±0/5	0/01	7/8±0/5	5/7±0/5	0/03
کلسترول تام	خام	251/8±1/9	252/6±2/1	0/01	253/7±1/8	250/8±2/2	0/09
مدل 1	خام	252/8±1/9	251/6±1/9	0/2	254/0±1/9	250/3±1/9	0/7
مدل 2	خام	253/7±2/4	250/6±2/4	0/004	257/5±2/3	246/8±2/3	0/4
مدل 3	خام	253/7±2/4	250/6±2/4	0/4	268/5±1/6	270/7±1/6	0/2
LDL-C	خام	266/7±1/5	272/7±1/2	0/07	266/7±1/5	272/8±1/2	0/2
مدل 1	خام	266/8±1/3	272/7±1/3	0/002	266/8±1/3	272/5±1/3	0/001
مدل 2	خام	267/8±1/7	271/4±1/7	0/5	268/7±1/6	270/6±1/6	0/2
مدل 3	خام	267/9±1/7	271/4±1/7	0/4	268/5±1/6	270/7±1/6	0/2
کراتینین	خام	132/5±1/2	136/6±1/4	0/9	134/4±1/3	134/7±1/3	0/008
مدل 1	خام	132/7±1/3	136/0±1/3	0/8	134/5±1/3	134/9±1/3	0/02
مدل 2	خام	129/4±1/6	140/1±1/6	0/2	133/2±1/6	136/3±1/6	<0/0001
مدل 3	خام	129/4±1/6	140/1±1/6	0/3	133/3±1/6	136/1±1/6	<0/0001
BUN	خام	2/0±0/02	1/9±0/01	0/02	2/0±0/02	1/9±0/01	0/001
مدل 1	خام	2/0±0/01	1/9±0/01	0/5	2/0±0/01	1/9±0/01	0/1
مدل 2	خام	1/9±0/02	2/0±0/02	0/02	1/92±0/02	1/99±0/01	0/2
مدل 3	خام	1/9±0/02	2/0±0/02	0/01	1/92±0/02	1/99±0/02	0/2
فشار سیستولیک	خام	19/5±0/2	19/2±0/2	0/02	19/5±0/2	19/2±0/1	0/5
مدل 1	خام	19/5±0/2	19/1±0/2	0/1	19/5±0/2	19/1±0/2	0/1
مدل 2	خام	19/2±0/2	19/5±0/2	0/8	19/3±0/2	19/4±0/2	0/4
مدل 3	خام	19/2±0/2	19/5±0/2	0/7	19/3±0/2	19/4±0/2	0/4
دور کمر	خام	105/0±0/6	104/4±0/6	0/7	105/8±0/6	103/6±0/6	0/8
مدل 1	خام	105/3±0/6	104/4±0/6	0/01	105/9±0/6	103/7±0/6	0/3
مدل 2	خام	104/4±0/7	105/3±0/7	0/02	106/2±0/7	103/5±0/7	0/5
مدل 3	خام	104/4±0/7	105/3±0/7	0/03	106/1±0/7	103/6±0/7	0/5
مقدار جدول برای بند میانگین بدست آمده ± خطای معیار، که این مقدار با استفاده از آزمون t مستقل روی مدل اولیه و انجام تحلیل کوواریانس روی مدل‌های تعديل شده چندمتغیره به دست آمده اند.							
مدل‌های آماری بر اساس آزمون آماری ANCOVA (analysis of covariance) تعریف شدند. مدل 1. تعديل سن و کل انرژی جذب شده جنسیت ، میزان فعالیت‌های فیزیکی و داروهای مصرف شده. مدل 2. کنترل بیشتر روی معنی دار بودن رژیم غذایی اختاز شده. در جدول 2 برای آماره‌ی PRAL تاثیرات پروتئین، چربی، کلسترول، غلات سبوس دار و غرسوسوس دار، گوشت، پتاسیم، فسفر، حبوبات و مغزها و سبزیجات کنترل شده بود. برای آماره‌ی Pro:K Pro:K، پتاسیم، فسفر، چربی، کربوهیدرات، پروتئین، کلسترول، غلات سبوس دار و بدون سبوس، شیر، گوشت، فیبر و میوه و سبزیجات کنترل شده بود. مدل 3. همان مدل 2 که به آن BMI اضافه شده است.							
** P-Value با استفاده از آزمون ANCOVA. شاخص‌های بیوشیمیایی و روی متغیرهای طبقه‌بندی شده از مقادیر اسیدی‌چرب خوراکی به دست آمده است.							

• بحث

LDL-C و دور کمر دیده شد. به دلیل ارتباط معنی‌دار HbA1c با PRAL و Pro:K، نتایج حاصل از این مارکر نسبت به سایر نماگرهای بیوشیمیایی که تنها با یکی از شاخص‌های بار اسیدی رژیم غذایی مرتبط بودند قابل اطمینان‌تر است. هیچ یک از شاخص‌های Pro:K و PRAL در

به طور خلاصه، پس از در نظر گرفتن مخدوشگرهای مختلف، ارتباط قابل توجهی بین HbA1c با PRAL و TG PRAL با PRAL مثبت معنی‌داری بین SBP و کراتینین و قند خون ناشتا وجود داشت. هم چنین این ارتباط بین

(18). علی‌رغم تناقضاتی که در مطالعات قبلی وجود دارد به جز در تعدادی نماگرهای بیوشیمیایی هیچ گزارشی مبنی بر اثرات مفید بار اسید بالای رژیم غذایی مشاهده نشد. ارتباط مثبت PRAL و Pro:K با HbA1c بیانگر اثرات مفید بار اسید پایین رژیم غذایی در بیماران مبتلا به نفوropاتی دیابتی می‌باشد. این اثر مفید ممکن است به دلیل مقاومت انسولینی (IR) بالاتر باشد که نتیجه‌های رژیم اسیدوژنیک است (7). رژیم‌هایی که بار اسید بالایی دارند با افزایش دفع منیزیم در ارتباط بوده و ممکن است منجر به کاهش حساسیت انسولینی گردد (29).

مطالعات قبلی در مقایسه با مطالعه‌ی حاضر در جمعیت‌های جوان‌تر انجام شده است (سال $0/4 \pm 8/66$: سن [SE] میانگین) (10-8)؛ به جز مطالعه Rotterdam که در افراد مسن انجام شد (12). مطالعات قبلی در افراد سالم انجام شده بودند در حالی که مطالعه حاضر در افراد دیابتی و اختلالات کلیوی انجام شد که این اختلالات می‌توانند بر شرایط اسید-باز متابولیک اثرگذار باشند (30، 13). تفاوت در ارزیابی دریافت غذایی افراد ممکن است دلیل دیگری برای تناقضات موجود باشد. مطالعات پیشین به منظور تخمین بار اسیدی رژیم غذایی از روش ثبت غذایی 1 روزه در 3 روز غیرمتوالی استفاده کرده (10-12)، در حالی که در مطالعه‌ی حاضر از پرسشنامه‌ی بسامد غذایی (FFQ) یا تاریخچه‌ی غذایی به این منظور استفاده شد. همسو با مطالعه‌ی قبلی، افرادی که در گروه بار اسید بالای رژیم غذایی واقع بودند دریافت پایین‌پتاسیم، میوه‌ها و سبزیجات و دریافت بالای پروتئین را داشتند. به علاوه، اثر مخدوشگرهاي مختلف در مطالعات مختلف ممکن است در تفاوت نتایج نقش داشته باشد. به عنوان مثال در یکی از مطالعات دریافت‌های غذایی کنترل نشدنده (8)، در حالی که در سایر مطالعات در مورد آیتم‌های غذایی مختلف کنترل صورت گرفت (10، 9). توجه به این مورد ضروری است که دریافت‌های بالای پروتئین لزوماً با افزایش دفع اسید همراه نیستند (31).

افزایش مصرف غذاهای بر پایه‌ی آلکالین مثل میوه‌ها و سبزیجات ممکن است اثر تولید اسید به دنبال رژیم‌های پر پروتئین را کاهش دهد (31). به علاوه، دریافت بالای پروتئین، آمونیوم بیشتری فراهم می‌کند (پذیرنده‌ی اصلی پروتئون ادراری) که خود دفع اسید توسط کلیه را تسريع می‌بخشد (31). افراد شرکت کننده در مطالعه‌ی حاضر در مقایسه با زنان ژاپنی، دریافت‌های بالای میوه و سبزی، پتاسیم، کلسیم و منیزیم داشتند. مصرف فیبر قابل تخمیر از منابع گیاهی

مدل‌های تعديل نشده یا در مدل‌های تعديل شده چندمتغیره مختلف با BMI و DBP-hs-CRP ارتباط قابل ملاحظه‌ای نداشتند. افرادی که در گروه PRAL و Pro:K پایین واقع بودند بیشتر در گروه وضعیت اقتصادی (SES) قوی قرار داشتند.

بار اسیدی رژیم غذایی توسط مدل‌های مختلف که در افراد با بیماری کلیوی اعتبارسنجی شده‌اند تخمین زده می‌شود (18). تا به امروز مطالعات اندکی ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و عوامل خطرهای CVD را ارزیابی کرده‌اند که نتایج این مطالعات متناقض است (12-8). برخی مطالعات ارتباط معکوس گزارش کردهند (8-11) و برخی دیگر هیچ ارتباطی را نشان ندادند (12) یا نتایج مختلفی برای هر یک از شاخص‌های PRAL و Pro:K با عوامل خطرهای کاربیومتابولیک گزارش کرده‌اند (8). به عنوان مثال، در یک مطالعه‌ی مقطعی در 1136 زن جوان یک ارتباط مستقل و مثبت بین PRAL و TC و HDL مشاهده شد، در حالی که NEAT و WC تنها با Pro:K همبستگی قابل ملاحظه‌ای داشتند (10). به علاوه، با وجود این که بیشتر مطالعات ارتباط مثبتی بین فشارخون بالا و بار اسیدی رژیم غذایی گزارش دادند، نتایج مطالعه‌ی Rotterdam پس از 6 سال پیگیری، هیچ ارتباطی را در افراد مسن نشان نداد (12). ارتباط هر دوی PRAL و NEAT با بروز دیابت در یک مطالعه‌ی کوهورت مشاهده شد (9)، در حالی که هیچ ارتباطی با گلوكز سرم و HbA1c در زنان ژاپنی یافت نشد (8). با این وجود، در ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و SES مطالعات بیشترین هم‌سوسیتی را داشتند (26). امتیازهای بالا در بار اسیدی رژیم غذایی در بین گروه SES پایین می‌تواند نشان دهنده‌ی توانایی پایین افراد در خرید میوه و سبزی تازه باشد. در واقع، مطالعات قبلی نشان داده‌اند که افرادی که سطح تحصیلات و درآمد پایین‌تری دارند روزانه میوه و سبزی کمتری مصرف می‌کنند (27، 28).

تا به امروز، هیچ مطالعه‌ای ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و نماگرهای CVD را در بیماران نفوropاتی دیابتی بررسی نکرده است. با این وجود، مطالعاتی در زمینه‌ی ارتباط بین اسیدوز ادراری یا متابولیک با نماگرهای بیوشیمیایی و عملکرد کلیه انجام شده است. در یک مطالعه مقطعی در افرادی که پیوند کلیه انجام داده بودند هیچ ارتباطی بین NAE (acid excretion) (net acid excretion) ADE و TG مشاهده نشد در حالی که افرادی که در سهک‌های بالا واقع بودند سطوح پایین‌تری از کلسیم و hs-CRP داشتند

را در بیماران نفروپاتی دیابتی ارزیابی نمود. به علاوه، چندین نوع شیوه‌ی زندگی و متغیرهای تغذیه‌ای در مطالعه‌ی حاضر در نظر گرفته شد که نشان داد ارتباط بین بار اسید رژیم غذایی و نماگرهای بیوشیمیایی مستقل از مواد مغذی رژیم غذایی است.

هر دو شاخص‌های PRAL و Pro:K ارتباط مثبتی با HbA1c در بیماران نفروپاتی دیابتی داشتند. در حالی که ارتباطی که سایر شاخص‌های بیوشیمیایی و کلیوی با PRAL داشتند متفاوت از ارتباطی بود که با Pro:K داشتند. به عنوان مثال شاخص PRAL ارتباط مستقیمی با TG داشت اما هیچ ارتباط معنی‌داری با شاخص Pro:K نداشت. مطالعات بیشتری به منظور شفاف ساختن پیامدهای بالینی بار اسیدی رژیم غذایی در جمعیت مسن‌تر و در بیماران مزمن کلیوی مورد نیاز است.

سپاسگزاری: نویسنندگان از شرکت کنندگان در این مطالعه قدردانی می‌کنند. این مطالعه توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد حمایت قرار گرفت.

فعالیت فلور میکروبی دستگاه گوارش و متابولیت‌های حاصل از متابولیسم آن‌ها را تنظیم می‌کند (32). بنابراین مصرف بالای میوه و سبزی در این مطالعه می‌تواند توضیحی برای غیرمعنی‌داری ارتباط در مقایسه با زنان ژاپنی باشد.

این مطالعه با محدودیت‌هایی روبرو بود اولاً‌على‌رغم کنترل مخدوشگرهای مختلف در مطالعه حاضر، نتوانستیم اثر مخدوشگرهای باقی‌مانده از جمله مخدوشگرهایی که شناسایی نشدن و قابل اندازه‌گیری نبودند را تعديل و خارج کنیم. ثانیاً، ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی با وضعیت اسیدی ادرار به منظور اطمینان یافتن از بار اسید-باز رژیم غذایی و اسیدوز متابولیک در بیماران نفروپاتی دیابتی ارزیابی نشد. طبیعت مطالعات مقطعی نیز از دیگر محدودیت‌های مطالعه حاضر به شمار می‌آید به این دلیل که رابطه علت و معلوی به ما نمی‌دهد. در آخر، دفع پتانسیم یا سدیم ادراری اندازه‌گیری نشدن زیرا نیاز به اندازه‌گیری شاخص‌های دقیق تری از عملکرد کلیه، مرتبط با بار اسیدی بود. علی‌رغم تمامی محدودیت‌های موجود، این مطالعه، اولین مطالعه‌ای بود که ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی با نماگرهای مرتبط با کلیه

• References

- Ritz E, Rychlisk I, Locatelli F, Halimi S. End-stage renal failure in type 2 diabetes: a medical catastrophe of worldwide dimensions. *Am J Kidney Dis.* 1999; 34: 795-808.
- Amini M, Parvaresh E. Prevalence of macro-and microvascular complications among patients with type 2 diabetes in Iran: a systematic review. *Diabetes Res Clin Pract.* 2009; 8: 18-25.
- Borch-Johnsen K, Kreiner S. Proteinuria: value as predictor of cardiovascular mortality in insulin dependent diabetes mellitus. *Br Med J (Clin Res Ed).* 1987; 294: 1651.
- Haffner M, Steven M, Miettinen M. Insulin resistance implications for type II diabetes mellitus and coronary heart disease. *Am J Med.* 1997; 103: 152-62.
- Azadbakht L, Esmailzadeh A. Soy-protein consumption and kidney-related biomarkers among type 2 diabetics: a crossover, randomized clinical trial. *J Ren Nutr.* 2009; 19: 479-86.
- Azadbakht L, Atabak S, Esmailzadeh A. Soy protein intake, cardiorenal indices, and C-reactive protein in type 2 diabetes with nephropathy: a longitudinal randomized clinical trial. *Diabetes care.* 2008; 31: 648-54.
- Souto G, Donapetry C, Calviño J, Adeva MM. Metabolic acidosis-induced insulin resistance and cardiovascular risk. *Metab Syndr Relat Disord.* 2011; 9: 247-53.
- Murakami K, Sasaki S, Takahashi Y, Uenishi K. Association between dietary acid-base load and cardiometabolic risk factors in young Japanese women. *Br J Nutr.* 2008; 100: 642-51.
- Fagherazzi G, Vilier A, Bonnet F, Lajous M, Balkau B, Boutron-Ruault M-C, et al. Dietary acid load and risk of type 2 diabetes: the E3N-EPIC cohort study. *Diabetologia.* 2014; 57: 313-20.
- Zhang L, Curhan GC, Forman JP. Diet-dependent net acid load and risk of incident hypertension in United States women. *Hypertension.* 2009; 54: 751-5.
- Krupp D, Johner SA, Kalhoff H, Buyken AE, Remer T. Long-term dietary potential renal acid load during adolescence is prospectively associated with indices of nonalcoholic fatty liver disease in young women. *J Nutr.* 2012; 142: 313-9.
- Engberink MF, Bakker SJ, Brink EJ, van Baak MA, van Rooij FJ, Hofman A, et al. Dietary acid load and risk of hypertension: the Rotterdam Study. *Am J Clin Nutr.* 2012; 95(6):1438-44.
- Scialla JJ, Anderson CA. Dietary acid load: a novel nutritional target in chronic kidney disease? *Adv Chronic Kidney Dis.* 2013; 20: 141-9.
- Wesson DE, Simoni J, Broglie K, Sheather S. Acid retention accompanies reduced GFR in humans and increases plasma levels of endothelin and aldosterone. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2011; 300: 830-7.
- Remer T, Manz F. Estimation of the renal net acid excretion by adults consuming diets containing variable amounts of protein. *Am J Clin Nutr.* 1994; 59: 1356-61.

- Downloaded from nsft.sbm.ac.ir at 10:05 IRST on Sunday October 30th 2016
16. Remer T, Dimitriou T, Manz F. Dietary potential renal acid load and renal net acid excretion in healthy, free-living children and adolescents. *Am J Clin Nutr.* 2003; 77: 1255-60.
 17. Frassetto LA, Todd KM, Morris R, Sebastian A. Estimation of net endogenous noncarbonic acid production in humans from diet potassium and protein contents. *Am J Clin Nutr.* 1998; 68: 576-83.
 18. van den Berg E, Engberink MF, Brink EJ, van Baak MA, Joosten MM, Gans RO, et al. Dietary acid load and metabolic acidosis in renal transplant recipients. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2012; 7: 1811-8.
 19. Azadbakht L, Mirmiran P, Hosseini F, Azizi F. Diet quality status of most Iranian adults needs improvement. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2005; 14: 163-8.
 20. Mozaffarian D, Abdollahi M, Campos H, Houssiarad A, Willett W. Consumption of trans fats and estimated effects on coronary heart disease in Iran. *Eur J Clin Nutr.* 2007; 61: 1004-10.
 21. Esmaillzadeh A, Azadbakht L. Major dietary patterns in relation to general obesity and central adiposity among Iranian women. *The Journal of nutrition.* 2008;138(2):358-63.
 22. Fung TT, Hu FB, Pereira MA, Liu S, Stampfer MJ, Colditz GA, et al. Whole-grain intake and the risk of type 2 diabetes: a prospective study in men. *Am J Clin Nutr.* 2002; 76: 535-40.
 23. Ghaffarpour M, Houshia-Rad A, Kianfar H. The manual for household measures, cooking yields factors and edible portion of foods. Tehran: Nashre Olume Keshavarzy. 1999: 1-40.
 24. Ainsworth BE, Haskell WL, Whitt MC, Irwin ML, Swartz AM, Strath SJ, et al. Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. *Med Sci Sports Exerc.* 2000; 32: 498-504.
 25. Garmaroudi GHR, Moradi A. Socio-economic status in Iran: a study of measurement index. *Payesh* 2010; 9(2): 137-44. [In Persian].
 26. Banerjee T, Crews DC, Wesson DE, Tilea A, Saran R, Burrows NR, et al. Dietary acid load and chronic kidney disease among adults in the United States. *BMC nephrology.* 2014; 15: 137.
 27. Kopjar B, Fihn S, Bryson C. Adherence to heart-healthy behaviors in a sample of the US population. 2005.
 28. Kant AK, Graubard BI. Secular trends in the association of socio-economic position with self-reported dietary attributes and biomarkers in the US population: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1971–1975 to NHANES 1999–2002. *Public Health Nutr.* 2007; 10: 158-67.
 29. Rylander R, Remer T, Berkemeyer S, Vormann J. Acid-base status affects renal magnesium losses in healthy, elderly persons. *J Nutr.* 2006; 136: 2374-7.
 30. Adrogue HJ, Eknayan G, Suki WK. Diabetic ketoacidosis: role of the kidney in the acid-base homeostasis re-evaluated. *Kidney Int.* 1984; 25: 591-8.
 31. Remer T. Influence of nutrition on acid-base balance–metabolic aspects. *Eur J Nutr.* 2001; 40: 214-20.
 32. Tuohy KM, Fava F, Viola R. ‘The way to a man’s heart is through his gut microbiota’—dietary pro-and prebiotics for the management of cardiovascular risk. *Proc Nutr Soc.* 2014; 73: 172-85.

The Association between Dietary Acid Load and Cardiovascular Disease Risk among Diabetic Nephropathy Patients

Moradi M¹, Haghigatdoost F¹, Azadbakht L*^{1, 2,3}

1- Food Security Research Center, Dept. of Community Nutrition, Faculty of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2- Diabetes Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3- *Corresponding author: Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: azadbakht@hlth.mui.ac.ir

Received 7 Jan, 2016

Accepted 23 Apr, 2016

Background and Objectives: The association between dietary acid load and cardiovascular disease risk has not been examined among patients with diabetic nephropathy (DN). The purpose of the present study was to assess the association between dietary acid load based on potential renal acid load (PRAL) and protein: potassium ratio scores, and cardiovascular disease risk in patients with DN.

Materials & Methods: In the present cross-sectional study, 547 DN patients were enrolled. A validated food frequency questionnaire was used to assess the dietary intake. Standard methods were also employed to assess the biochemical and anthropometric measures.

Results: The results showed that the low PRAL group had lower hemoglobin (Hb)A1c ($5.7\% \pm 0.5\%$ versus $7.8\% \pm 0.5\%$; $P = 0.01$), triacylglycerols (246.9 ± 2.3 mg/dL versus 257.4 ± 2.3 mg/dL; $P = 0.006$), systolic blood pressure (103.6 ± 0.7 mmHg versus 106.1 ± 0.7 mm Hg; $P = 0.03$), creatinine and fasting blood sugar than the high PRAL group. Pro:K was positively related to HbA1c ($5.8\% \pm 0.5\%$ versus $7.6\% \pm 0.5\%$; $P = 0.03$); however it was inversely associated with low-density lipoprotein and waist circumference.

Conclusion: Both PRAL and Pro:K were positively related to HbA1c in patients with DN. However, biochemical and kidney-related markers depended on the Pro:K and PRAL status.

Keywords: Dietary acid load, Cardiovascular diseases, Diabetic nephropathy