



تنوع گونه های گیاهی ناحیه کوهستانی اوین - درکه

احمدرضا محرابیان

کارشناس ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی یوسفزادی

کارشناس ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی

بهرام زهزاد

کارشناس ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

علی سنبلي

کارشناس ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، مریم پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی

هدی پارسیان

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ناحیه کوهستانی اوین - درکه در شمال غربی تهران. بین طول جغرافیایی 51 درجه و 26 دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 دقیقه تا 35 درجه و 54 دقیقه واقع شده است. ناحیه مورد نظر به عنوان بخشی از ناحیه کوهستانی البرز مرکزی از شرق به تپه های علی آباد و لنگرگ، از غرب به ارتفاعات حصارک، از شمال به ارتفاعات توجال و شاه نشین و از جنوب به ناحیه اوین و سعادت آباد محدود می گردد. میزان متوسط بارندگی سالیانه 400-300 میلی متر و میزان متوسط دمای سالیانه 16/7 درجه سانتی گراد است. پژوهش مورد نظر به منظور معرفی فلور، شناسایی اشکال زیستی و توزیع جغرافیایی گونه های موجود در این ناحیه صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که در این ناحیه 296 گونه گیاهی از 214 جنس متعلق به خانواده وجود دارد. خانواده های Compositae با 47 گونه، Gramineae با 32 گونه، Cruciferae با 30 گونه، Papilionaceae با 30 گونه و Labiatae با 17 گونه بیشترین تعداد گونه ها را به خود اختصاص داده اند. از نظر شکل زیستی همی کرپتوپیت ها 44/3 درصد، تروفیت ها 38 درصد، کامپیت ها 10/5 درصد، کرپتوپیت ها 4/4 درصد و 53/4 ترانوفیت ها 2/8 درصد هستند. از نظر کوروکلوزی عناصر ایران- تورانی درصد، ایران- تورانی - مدیترانه ای 12/5 درصد، ایرانو- تورانی - اروپاسیری 6/4 جهان وطنی 11/8 درصد و بقیه گونه ها به سایر نواحی رویشی تعلق دارند. از این تعداد 21 گونه (1/7 درصد) انحصاری ایران هستند.

کلیدواژه ها : اوین - درکه، تنوع، گیاهان، ناحیه کوهستانی.

Diversity of Plant Species in Evin-Darakeh Mountainous Region

Ahamadreza Mehrabian, M.Sc.
Plant Biosystematic Environmental Science Research Institute,
Shahid Beheshti University
Morteza Yousefzadi, M.Sc.
Plant Biosystematic Applied Science Research Institute, ACECR,
Shahid Beheshti University
Brahram Zehzad, M.Sc.
Plant Biosystematic, environmental Science Research, Shahid
Beheshti University
Ali Sonboli, M.Sc.
Instructor, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid
Beheshti University
Hoda Hoshiar Parsian
M. Sc. Student in plant Biosystematic Department of Biology,
Shahid Beheshti University

Abstract

Evin-Darakeh Mountain region is situated in the northeastern part of Tehran. The area is located at 51°23' north longitude and 35°48' to 35°54' east latitude. This region is as a part of mountain area of central Alborz confined to eastern the hills of Aliabad of Velenjak, westward to highest of east Hessarak, northward Touchal and heights of Shahneshin, southward Evin region. The annual rainfall is 300-400 mm and the mean annual temperature is 16/7 °C. The present survey was carried out to introduce the flora, identify the biotypes and determine the phytogeographical dispersal of plant species existing in the said region. The results of this survey indicate that 296 species out of 214 genera belong to 56 plant families are exist: Compositae with 47 species, Papilionaceae with 32 species, Cruciferae with 30 species, Graminaceae with 30 species, Labiateae with 17 species comprise the highest number of species. From viewpoint of biotypes Hemicryptophytes 44.3% Therophytes 38% Chamephytes 10.5% cryptophytes 4.4% Phanerophytes 2.8% are, from viewpoint of chorological elements Iran-Turanian elements are 51.9% Iran-Turanian-Mediterranean Viewpoint are 14% Cosmopolitan elements are 10.5% and others species are belong to the other regions. From the said numbers, 21(%7.1) species are endemic species.

Keywords: Evin- Darake, Diversity, Plants, Mountain region.

مقدمه

متعددی را پدید آورده‌اند، هریک آشیان اکولوژیکی مناسبی را برای جذب گونه‌های گیاهی ایجاد می‌کنند که مجموعه این شرایط سبب ایجاد تنوع بالا در فلور نواحی کوهستانی می‌گردد. از طرفی در نواحی کوهستانی شب اکولوژیکی ناشی از ناهمگنی شرایط اقلیمی به نوبه خود در ایجاد تنوع و تیپ‌های اکولوژیکی متفاوت و در نهایت در ایجاد تنوعات سازشی بسیار موثر است. بنابراین، انجام مطالعات در این اکوسیستم‌ها ضروری به نظر می‌رسد. رشته کوه‌های البرز یکی از با اهمیت‌ترین این اکوسیستم‌ها در کشور ما می‌باشد و در برگیرنده گونه‌های متعدد گیاهی هستند. دامنه جنوبی آن‌ها مشرف به فلات بزرگ ایران مرکزی و دامنه‌های شمالی آن متأثر از اقلیم مرطوب ناحیه خزری، اکوسیستم منحصر به فردی را پدید آورده‌اند. تیپ پوششی رشته کوه‌های البرز با وجود ارتفاع زیاد و قله‌های متعدد که ارتفاع آن‌ها به بیش از 4000 متر می‌رسد (دماؤند با ارتفاع 5670 متر و علم کوه با ارتفاع 4848 متر) و عرض کم (120 کیلومتر در عرض ترین بخش) بی‌شباهت به کوه‌های پیرنه نیستند. این رشته کوه‌ها به دلیل موقعیت ویژه خود و قرار گرفتن بین دو منطقه جغرافیای گیاهی از شرایط منحصر به فردی برخوردار شده‌اند. بنابر نظر زهری (1973)، دامنه جنوبی البرز در ارتفاعی پایین‌تر از 3000 متر جزو پراوانس ایرانو - تورانی طبقه‌بندی می‌کرد. در حالی که دامنه‌های شمالی آن در زیر این خط ارتفاعی تا سواحل دریای خزر به منطقه گیاهی اروپا سیری (پراوانس هیرکانی) تعلق دارد. رشته کوه‌های البرز به دوران سوم زمین شناختی تعلق داشته و به احتمال زیاد، تقریباً در حدود 65 میلیون سال قبل یعنی اوخر کرتاسه تا اوایل دوران سوم مجموعه فراوانی از گیاهان آوندی به ویژه نهاندانگان در آن به وجود آمدند (شاھسواری، 1376). تمام دامنه‌های جنوبی البرز، قلل و بخشی از دامنه شمالی آن در زیر ارتفاع 3000 متر دارای خشکی فصلی تابستانه می‌باشد و در طول رویش ناگزیر

کشور ایران در میان تمام کشورهای جنوب غرب آسیا از نظر پوشش گیاهی، متنوع‌ترین و پرجاذبه‌ترین شرایط را دارد است. تنوع فلور و پوشش گیاهی ایران قبل از هر چیز مديون تنوع گسترده اقلیمی، پیشینه پوشش گیاهی منطقه و نیز پتانسیل تکامل آن است. خاک‌های خاص و بسترهای صخره‌ای اغلب به دلیل جدا افتادگی و تمایز دارای جنس‌های اندمیک هستند (دلیلی که رشنینگر در اغلب مقالات بر روی آن تأکید داشته است) علاوه بر آن، تنوع فلور و پوشش گیاهی ایران از طریق روی آوردن و پناه گرفتن آن دسته فلوری که پراکندگی وسیعی دارند غنای بیشتری یافته است (Takhtajan, 1986). تاختاجان در کتاب "نواحی فلوریستیک جهان" فلور منطقه ایران - تورانی در بخش فلات ایران را با دارا بودن جنس‌های اندمیک متعدد (شاید در حدود 25 درصد)، غنی ترین فلور گستره ایران - تورانی معرفی نموده است. از قرن شانزدهم تا کنون، پژوهشگران زیادی فلور ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند (مجنویان، 1383). نخستین سنگ بنای پژوهش‌های فلوریستیک در جنوب غرب آسیا و به طریق اولی ایران، فلور اوریentalis بواسیه (Boissier) بود که در فاصله سال‌های 1867-1888 انتشار یافت. امروزه، فلور ایرانیکا (Rechinger, 1998) مهم‌ترین پایه پژوهش‌های بوم شناختی گیاه، محسوب می‌شود. مطالعات اکولوژی گیاهی و تجزیه و تحلیل جغرافیای گیاهی در ایران در سطح جامعه توسط کوتچی (1861) و ملکیور (1937) انجام گرفته است (مجنویان، 1377). زهری (1973) پوشش گیاهی ایران را در شالوده ژئوبوتانیکی خاور میانه را به طور مشروح بررسی کرده است. با توجه به این که قسمت اعظم کشور ایران در حیطه نواحی کوهستانی قرار دارد، قلمروهای کوهستانی به دلیل تنوع در شرایط کلیماتیکی، ادفیکی، توپوگرافیکی و در نهایت اکولوژیکی، زیستگاه‌های

این ناحیه بر اساس رده بندی اقلیمی دومارتن در گروه نواحی خشک قرار می‌گیرد (نمودار 4). رودخانه فصلی در که که از ارتفاعات شمالی سرچشمه می‌گیرد نیز بر فلور منطقه موثر است. در مسیر رودخانه در بسیاری از قسمت‌ها گونه‌های گیاهی دست کاشت وجود دارد. راه باریک کوهستانی در امتداد رودخانه تا ارتفاعات ادامه یافته است. ناحیه مورد نظر به علت ویژگی‌های طبیعی خود یکی از مناطق تفرجگاهی بسیار زیبا می‌باشد که به علت تنوع بالای گونه‌های گیاهی از نظر فلوریستیک نیز بسیار حائز اهمیت است. دره در که از نظر ژئومورفولوژیکی از دو ستیغ موازی با امتداد تقریبی شمالی - جنوبی تشکیل شده است که در فاصله بین این دو ستیغ ساختارهای توپوگرافیکی متنوعی دیده می‌شود. ارتفاعات شرقی در دره اوین - در که از نسبت به بخش غربی، ارتفاع بیشتری برخوردار می‌باشد. وجود توده‌های آذرین بیرونی و لایه‌های نفوذ آذرین با بیرون زدگی خاص در آن به طور کامل، مشهود است. از نظر چینه شناسی منطقه در دامنه جنوبی آنتی کلینیال البرز واقع شده است. تیپولوژی منطقه طیف وسیعی از رسوبی تا آذرین را شامل می‌شود و در جنوب منطقه بخش کنگلومراپی به طور کامل، مشهود است. در بررسی‌های بیشتر، آن چه بیش از همه جلب توجه می‌کند لاوهای آندزیتی است. از نظر تکتونیکی در منطقه سه گسل قطعی و دو گسل فرضی وجود دارد که در حد و مرز تشکیلات زمین شناختی اشاره شده قرار دارد. از نظر خاک شناسی، قسمت اعظم این منطقه مربوط به آئوسن از سری توف سبز ماشیست و سنگ‌های درونی و خروجی است. بر اثر فرسایش طبیعی، در قسمت‌هایی لایه‌های کم عمق خاک با تراشه‌ها، ماسه سنگ‌ها و دانه‌های خردی همراه است که این ترکیب بیشتر در اطراف رودخانه دیده می‌شود (شعبانی، 1379). نقشه منطقه مورد بررسی در تصویر ۱ ارائه شده است.

باید در انتظار نزولات از سوی دریای خزر باقی بمانند. نخستین فلور درباره البرز توسط Buhse در سال 1899 به رشتہ تحریر در آمده است. در این میان (1939) Gilli از جمله پژوهشگرانی است که در البرز به مطالعات جامعه شناختی گیاهی پرداخته است. بر اساس جلدی منشر شده فلور ایرانیکا 71 گونه صرفاً آپی در البرز شناسایی شده است که از این تعداد 36 گونه بومی در طبقه آپی البرز جدا شده‌اند. علاوه بر آن، پنج زون کوهپایه‌ای - آپینی در البرز مشخص گردیده است (Hedge & Wendelbo, 1978) گونه‌های آندمیک هستند. میزان بومزادی (آندمیسم) در البرز از کوههای اروپا بیشتر بوده و به (50/5 درصد) می‌رسد. ده خانواده گیاهی اول در این ناحیه، یگانگی فلوریستیکی منطقه ایران تورانی و نیز یکسان بودن شرایط اکولوژیکی در این کوههای قاره‌ای را نشان می‌دهد. بالا بودن ضریب ژاکارد بالای 65 درصد (مجنونیان، 1377) نشان دهنده طبیعت یکنواخت گیاهی است که بزرگی ضریب ژاکارد (نسبت جنس به گونه) حاکی از همگنی شرایط اکولوژیک و در نتیجه، گونه‌زایی به طور نسبی ضعیف منطقه است (Klein, 1991).

ناحیه مورد بررسی

ناحیه کوهستانی اوین - در که در شمال غربی تهران. بین طول جغرافیایی 51 درجه و 26 دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 دقیقه تا 35 درجه و 54 دقیقه واقع شده است. ناحیه مورد نظر به عنوان بخشی از ناحیه کوهستانی البرز مرکزی از شرق به تپه‌های علی آباد و لنگک، از غرب به ارتفاعات حصارک، از شمال به ارتفاعات توچال و شاه نشین و از جنوب به ناحیه اوین و سعادت آباد محدود می‌گردد. میزان متوسط بارندگی سالیانه 1600-300 میلی متر و میزان متوسط دمای سالیانه 16/7 درجه سانتی گراد می‌باشد. ارتفاع ناحیه مورد بررسی بین 1680-2200 متر متغیر است. ناحیه مذکور دارای زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم و خشک می‌باشد.

مواد و روش‌ها

گونه‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در میان خانواده‌های گیاهی مورد بررسی خانواده Papilionaceae دارای بیشترین میزان گونه انحصاری (9 گونه) می‌باشد که از این میزان 8 گونه به جنس گون (Astragalus) تعلق دارد. گونه‌های Echinophora ، Spaerophysa salsa DC ، Astragalus remotijugus Boiss. ، platyloba DC نمونه‌ای از گونه‌های Astragalus verus Olivier. انحصاری این ناحیه محسوب می‌شوند. چک لیست گونه‌ها در جدول 1 و هیستوگرام درصد فراوانی 5 خانواده اول گیاهی در نمودار 1 آرائه شده است. از نظر شکل زیستی همی کریپتوفت‌ها 44/3 درصد، تروفیت‌ها 38 درصد، کامفیت‌ها 10/5 درصد، کریپتوفت‌ها 4/4 درصد و فانروفیت‌ها 2/8 درصد هستند. شکل زیستی گیاهان نشانگر سازش‌های ریختی آن‌ها نسبت به شرایط اقلیمی، ادافیکی و در نهایت اکولوژیکی منطقه رویشگاهی است. از دیگر کاربردهای شکل زیستی، نمایش و تشریح تغییرات پوشش گیاهی در طول سال است به طوری که با ترسیم و ارائه طیف زیستی شکل‌های حیاتی گونه‌ها در فصول مختلف، می‌توان سهم نسبی هر شکل زیستی را تعیین نمود (نیشاپوری، 1381). درصد نسبتاً بالای همی کریپتوفت‌ها نشانگر سازگاری خاص گیاهان با شرایط اقلیمی سرد و کوهستانی است (Archibald, 1995). وجود اکوسیستم‌های مرطوب کوچک پراکنده در این ناحیه، مانند سایر نواحی البرز مرکزی، زیستگاه‌های منحصر به فردی را برای جذب تاکسونهای رطوبت پستند در آشیان‌های اکولوژیکی خاص در این ناحیه پدید آورده است. هیستوگرام درصد فراوانی اشکال رویشی در نمودار 2 و تصاویر 3 گونه از گیاهان منطقه در تصاویر 4-2 آرائه شده است. از نظر کورولوژی عناصر ایران - تورانی 51/9 درصد، ایرانوتورانی - مدیترانه‌ای 14 درصد جهان وطنی 10/5 درصد و بقیه به سایر نواحی رویشی تعلق دارند.

مطالعات فلوریستیک با جمع آوری گونه‌های گیاهی در اوایل فروردین 1380 اغاز شد در طی چهار فصل رویشی جمع آوری نمونه‌ها صورت گرفت. نمونه‌ها در هرباریوم دانشگاه شهید بهشتی (SBUH) نگهداری می‌شود. شناسایی نمونه‌ها با استفاده از فلورهای ایرانیکا (Rechinger, 1963-1998)، فلور ترکیه (Townsend & Guest 1985-1966)، فلور ایران (Davis, 1965-1985) (1367-1375) رستنی‌های ایران (مبین، 1364-1375) صورت گرفت. با استفاده از سیستم Raunkiaer (1934) که مبتنی بر شکل زیستی گیاهان (که بر اساس سیستم جوانه‌های تجدید حیات کننده به 5 گروه فانروفیت، کامفیت، همی کریپتوفت، کریپتوفت و تروفیت تقسیم می‌شوند) تعیین گردید. برای تعیین کورولوژی گونه‌ها از فلورهای فوق، کتاب جغرافیای گیاهی ایران (مجتبیان، 1377) و شالوده ژئوبوتانی ایران (Zohary, 1973) استفاده گردید. اطلاعات مربوط به گونه‌های اندمیک از فلورهای فوق و کتاب (Jalili & Jamzad, 1999) Red Data Book of Iran استخراج گردید. لیست گونه‌ها در جدول شماره 1 آرائه شده است.

نتیجه گیری و بحث

نتایج بررسی نشان می‌دهد که در این ناحیه 298 گونه گیاهی از 214 جنس متعلق به 56 خانواده وجود دارد. خانواده‌های Papilionaceae با 47 گونه، Compositae با 32 گونه، Cruciferae با 30 گونه، Gramineae با 26 گونه و Labiatae با 17 گونه بیشترین تعداد گونه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. هنگامی که میزان تخریب پوشش گیاهی در یک منطقه افزایش می‌یابد تعداد گونه‌های برخی خانواده‌ها مانند Compositeae افزایش می‌یابد. در این میان جنس Astragalus دارای بیشترین تعداد گونه (16

جدول ۱: لیست گونه های شناسائی شده

گونه	خانواده	شکل زیستی	منطقه رویشی
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adianthaceae	Hem	M
<i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson.	Amaranthaceae	Th	Plur
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amaranthaceae	Th	Plur
<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herb.	Amaryllidaceae	Ge	IT
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae	Ph	IT-M
<i>Aristolochia rotunda</i> Gaub.&Spach	Aristolochiaceae	Hem	IT
<i>Alkana bracteosa</i> Boiss.	Boraginaceae	Hem	IT
<i>Anchusa italicica</i> Retz.	Boraginaceae	Th	IT-ES
<i>Anchusa ovata</i> Lehm.	Boraginaceae	Th	IT- ES
<i>Cynoglossum tehranicum</i> L.	Boraginaceae	Hem	IT
<i>Heliotropium dolosum</i> De Not.	Boraginaceae	Hem	IT
<i>Heliotropium minutiflorum</i> Bunge.*	Boraginaceae	Hem	IT
<i>Lappula barbata</i> (M.B.) Gurke.	Boraginaceae	Th	IT
<i>Lappula sesiliflora</i> (Boiss.) Gurke	Boraginaceae	Th	IT
<i>Mysotis strictata</i> Link.	Boraginaceae	Th	IT-M ES
<i>Nonnea caspica</i> (Willd.) G.Don	Boraginaceae	Th	IT
<i>Onosma bulbotrichum</i> DC.	Boraginaceae	Hem	IT
<i>Onosma microspermum</i> Stev.	Boraginaceae	Hem	IT
<i>Campanula sclerotrichia</i> Boiss.	Campanulaceae	Th	IT
<i>Cannabis sativa</i> L.	Cannabinaceae	Th	-
<i>Capparis spinosa</i> L.	Capparidaceae	Ch	Plur
<i>Cleome iberica</i> DC.	Capparidaceae	Th	IT- ES
<i>Cleome ornithopodioides</i> L.	Capparidaceae	Th	-
<i>Acanthophyllum squarrosum</i> Boiss	Caryophyllaceae	Ch	IT
<i>Cerastium cerastoides</i> (L.) Britton	Caryophyllaceae	Ge	IT
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Caryophyllaceae	Hem	IT
<i>Dianthus orientalis</i> Adams.	Caryophyllaceae	Ch	IT
<i>Dianthus szowitsianus</i> Boiss.*	Caryophyllaceae	Ch	IT
<i>Gypsophila hirsute</i>	Caryophyllaceae	Hem	IT
<i>Mesostemma kotschyanum</i> (Fenz.)	Caryophyllaceae	Th	IT
<i>Minuartia meyeri</i> (Boiss.) Bornm.	Caryophyllaceae	Th	IT
<i>Silene conoidea</i> L.	Caryophyllaceae	Ch	IT
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Caryophyllaceae	Ch	IT
<i>Stellaria media</i> (L.) Cyr.	Caryophyllaceae	Th	Cos
<i>Vaccaria liniflora</i> (Boiss & Hausskn.)	Caryophyllaceae	Th	IT
<i>Atriplex</i> Sp.	Chenopodiaceae	Th	-
<i>Ceratocarpus arenarius</i> L.	Chenopodiaceae	Th	IT
<i>Chenopodium album</i> L.	Chenopodiaceae	Th	Cos
<i>Chenopodium botrys</i> L.	Chenopodiaceae	Th	IT- ES-M
<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	Chenopodiaceae	Th	Plur
<i>Noaea mucronata</i> (Forsk.) Aschers.	Chenopodiaceae	Ch	IT
<i>Salsola kali</i> L.	Chenopodiaceae	Th	Plur
<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae	Hem	ES
<i>Achillea wilhelmsii</i> C.Koch.	Compositae	Hem	IT
<i>Anthemis odontostephana</i> Boiss.	Compositae	Th	IT
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Compositae	Ch	Plur
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Compositae	Th	IT-M-ES
<i>Carthamus oxyacantha</i> M.B.	Compositae	Th	IT-M-SS
<i>Centaurea behen</i> L.	Compositae	Hem	IT- ES
<i>Centaurea depressa</i> M.B.	Compositae	Th	IT- ES
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Compositae	Th	IT-M-SS
<i>Centaurea virgata</i> Lam.	Compositae	Ch	IT-ES
<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae	Hem	Plur

1 جدول اداء

منطقه رویشی	شكل زیستی	خانواده	گونه
Plur	Hem	Compositae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
Plur	Hem	Compositae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
IT	Th	Compositae	<i>Cnicus benedictus</i> L.
-	Th	Compositae	<i>Conysa Canadensis</i> (L.) Cronq.
IT	Hem	Compositae	<i>Cousinia verutum</i> Bunge.
IT	Hem	Compositae	<i>Cousinia belangeri</i> DC. *
-	Hem	Compositae	<i>Crepis elbursensis</i> Boiss.
IT	Th	Compositae	<i>Crepis kotschyana</i> (Boiss.) Boiss.
IT-M	Th	Compositae	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.
IT	Hem	Compositae	<i>Echinops cephalotes</i> DC.*
IT	Hem	Compositae	<i>Echinops elbursensis</i> Rech.f.*
IT	Hem	Compositae	<i>Erigeron acer</i> L.
IT-M	Th	Compositae	<i>Garhadiolus angulosus</i> Jaub & Spach.
IT	Hem	Compositae	<i>Gnaphalium luteo-album</i> L.
IT	Hem	Compositae	<i>Gundelia tournefortii</i> L.
IT	Ch	Compositae	<i>Helichrysum globiferum</i> Boiss. *
IT	Ch	Compositae	<i>Helichrysum oligocephalum</i> DC.
ES	Hem	Compositae	<i>Inula Britannica</i> L.
IT	Th	Compositae	<i>Lactuca scarioloides</i> Boiss.
ES	Hem	Compositae	<i>Lapsana communis</i> L.
IT	Hem	Compositae	<i>Leontodon asperimus</i> (Wild.)
IT	Hem	Compositae	<i>Leontodon hispidus</i> L. *
IT	Hem	Compositae	<i>Ligularia persica</i> Boiss. *
-	Hem	Compositae	<i>Onopordon leptolepis</i> DC.
IT	Hem	Compositae	<i>Outreya carduiformis</i> Jaub& Spach.
IT	Hem	Compositae	<i>Scariola orientalis</i> (Boiss.) Sojak
IT	Hem	Compositae	<i>Senecio desfontainiae</i> Druce.
IT-M	Hem	Compositae	<i>Sonchus oleraceour</i> L.
-	Hem	Compositae	<i>Scorzoner</i> Sp.
IT-ES	Hem	Compositae	<i>Tanacetum balsamita</i> L.
Plur	Hem	Compositae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip
IT	Hem	Compositae	<i>Taraxacum montanum</i> (C.A.Mey.) DC.
IT	Hem	Compositae	<i>Taraxacum syriacum</i> Boiss.
IT	Hem	Compositae	<i>Tragopogon graminifolius</i> DC.
IT	Th	Compositae	<i>Xanthium strumarium</i> L.
-	Hem	Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> L.
Plur	Hem	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
ES	Ch	Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> L. *
IT	Ch	Crassulaceae	<i>Rosularia sempervivum</i> (M.B.) Berger.
IT	Hem	Cruciferae	<i>Alliaria petiolata</i> (M.B.) Cavara & Crande.
IT-M	Th	Cruciferae	<i>Aethionema arabicum</i> (L.) Andrz.ex DC.
IT	Th	Cruciferae	<i>Aethionema grandiflorum</i> Boiss & Hohen
IT	Th	Cruciferae	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf.
IT	Th	Cruciferae	<i>Alyssum linifolium</i> Steph.ex Willd
IT	Th	Cruciferae	<i>Lyssum minus</i> (L.) Rothm.
IT	Th	Cruciferae	<i>Alyssum staphii</i> Vierh.
IT	Th	Cruciferae	<i>Alyssum szowitsianum</i> Fisch.&C.A.Mey.
IT	Th	Cruciferae	<i>Arabis amplexcaulis</i>
IT	Th	Cruciferae	<i>Arabis nova</i> Vill.
IT	Th	Cruciferae	<i>Buchingera axillaries</i> Boiss.&Hohen
IT	Th	Cruciferae	<i>Camelina rumelica</i> Velen.
Cos	Th	Cruciferae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.)

ادمه جدول ۱

گونه	خانواده	شكل زیستی	منطقه رویشی
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Cruciferae	Hem	IT
<i>Clypeola jonthaspi</i> L.	Cruciferae	Th	IT-M
<i>Conringia perfoliata</i> (C.A.Mey.) Busch.	Cruciferae	Th	IT
<i>Descurainia Sophia</i> (L.) Schur.	Cruciferae	Th	IT-M
<i>Eruca sativa</i> Lam.	Cruciferae	Th	Plur
<i>Erysimum repandum</i> L.	Cruciferae	Th	Th
<i>Fibigia multicaulis</i> L.	Cruciferae	Th	IT
<i>Golbachia laevigata</i> (M.B.) DC.	Cruciferae	Th	IT-M
<i>Graellia stylosa</i> (Boiss.&Hohen.)Poulter. *	Cruciferae	Th	IT
<i>Hesperis persica</i> Boiss.	Cruciferae	Th	IT
<i>Malcolmia Africana</i> (L.) R.Br.	Cruciferae	Th	IT-SS
<i>Matthiola ovatifolia</i> (Boiss.) Boiss. *	Cruciferae	Hem	IT
<i>Neslia apiculata</i> Fish.et Mey.	Cruciferae	Th	IT-M
<i>Sameraria stylophora</i> (Jaub.&Spach) Boiss. *	Cruciferae	Th	IT
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Cruciferae	Th	IT-ES
<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Cruciferae	Th	IT
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Cruciferae	Th	IT-M-ES
<i>Cuscuta monogyna</i> Vahl.	Cuscutaceae	Th	IT
<i>Cyperus strigosus</i> L.	Cyperaceae	Hem	IT-ES
<i>Shoenus nigricans</i> L.	Cyperaceae	Hem	Plur
<i>Datisca cannabina</i> L.	Datiscaceae	Hem	IT-M
<i>Cephalaria microcephala</i> Boiss.	Dipsaceae	Hem	IT
<i>Pterocephalus canus</i> Coulx DC.	Dipsaceae	Ch	IT
<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) Juss.	Euphorbiaceae	Hem	IT-M
<i>Euphorbia aucheri</i> Boiss.	Euphorbiaceae	Hem	IT
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbiaceae	Th	IT-M
<i>Euphorbia petiolata</i> Banks&Soland	Euphorbiaceae	Th	IT-M
<i>Euphorbia tehranica</i> Boiss. *	Euphorbiaceae	Th	IT
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel. *	Fumariaceae	Th	IT-M
<i>Centaurium minus</i> Moench.	Gentianaceae	Th	IT-ES
<i>Biebersteinia multifida</i> DC.	Graniaceae	GI	IT-M
<i>Aegilops crassa</i> Boiss.	Gramineae	Th	IT-M
<i>Aegilops triuncialis</i> L.	Gramineae	Th	IT-M
<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	Gramineae	Hem	Plur
<i>Avena fatua</i> L.	Gramineae	Th	IT-M
<i>Avena sativa</i> L.	Gramineae	Th	IT-M
<i>Boissiera squarrosa</i> (Banks.& Soland) Nevski	Geramineae	Th	IT
<i>Bromus danthoniae</i> trin.	Geramineae	Th	Plur
<i>Bromus madritensis</i> L.	Geramineae	Th	Plur
<i>Bromus tectorum</i> L.	Geramineae	Th	Plur
<i>Bromus sterilis</i> L.	Geramineae	Th	Plur
<i>Cynodon dactylon</i> (L.)Pers.	Geramineae	Hem	Plur
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Geramineae	Hem	IT-M-ES
<i>Echinochloa colunum</i> (L.) Link.	Geramineae	Th	-
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaerth.	Geramineae	Th	-
<i>Eremopyrum bonaerpartis</i> (Spreng.) Nevski.	Geramineae	Th	IT
<i>Festuca pratensis</i> Hudson.	Geramineae	Hem	IT
<i>Festuca rubra</i> L.	Geramineae	Hem	-
<i>Hordeum distichon</i> L.	Geramineae	Th	Cos
<i>Hordeum marinum</i> Hudson.	Geramineae	Th	IT-M-ES
<i>Heteranthelium piliferum</i> (Banks & Soland.) Hochst.	Geramineae	Th	IT-SS
<i>Lolium perenne</i> L.	Geramineae	Hem	IT-M-ES

ادامه جدول ۱

گونه	خانواده	شكل زیستی	منطقه رویشی
<i>Melica jacquemontii</i> Decne.	Geramineae	Hem	IT
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Geramineae	Hem	Cos
<i>Phleum paniculatum</i> Hudson.	Geramineae	Th	IT
<i>Poa bulbosa</i> L.	Geramineae	Hem	IT-M
<i>Poa masenderana</i> Freyn & Sint.	Geramineae	Hem	ES
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Geramineae	Th	Plur
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Geramineae	Hem	IT
<i>Stipa hohenackeriana</i> Trin.& Rupr.	Geramineae	Hem	IT
<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.) Nevski.	Geramineae	Hem	IT
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hypericaceae	Hem	IT
<i>Hypericum scabrum</i> L.	Hypericaceae	Hem	IT
<i>Juncus articulatus</i> L.	Juncaceae	Hem	IT-M
<i>Acinos graveolens</i> (M.B) Link	Labiatae	Th	-
<i>Ajuga chamaecistus</i> Ging.	Labiatae	Ch	IT
<i>Eremostachys laciniata</i> (L.) Bunge.	Labiatae	Hem	IT
<i>Eremostachys glabra</i> Boiss.	Labiatae	Hem	IT
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Labiatae	Hem	IT
<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq.	Labiatae	Hem	IT
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Labiatae	Hem	Cos
<i>Nepeta fissa</i> C.A.Mey.	Labiatae	Hem	IT
<i>Phlomis oliveri</i> Benth.	Labiatae	Hem	IT
<i>Salvia hypoleuca</i> L. *	Labiatae	Hem	IT
<i>Salvia nemorosa</i> L.	Labiatae	Hem	IT
<i>Salvia sclarea</i> L.	Labiatae	Hem	IT
<i>Salvia reuterana</i> Boiss.	Labiatae	Hem	IT
<i>Scutellaria pinnatifida</i> A.Hamilt Subsp. <i>pinnatifida</i>	Labiatae	Ch	IT
<i>Stachys inflate</i> Benth.	Labiatae	Ch	IT-M
<i>Teucrium polium</i> L.	Labiatae	Ch	IT
<i>Ziziphra clinopodioides</i> Lam.	Labiatae	Ch	IT
<i>Allium atroviolaceum</i> Boiss.	Liliaceae	Ch	IT
<i>Allium rubellum</i> M.B.	Liliaceae	GI	IT
<i>Gagea gageoides</i> (Zucc.) Vved.	Liliaceae	Ch	IT
<i>Tulipa montana</i> Lindi. Var. <i>Chrysanthia</i> (Boiss.)Wendelbo	Liliaceae	GI	IT
<i>Linum album</i> Key.ex Boiss. *	Linaceae	Hem	IT
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae	Hem	Plur
<i>Alcea sulphurea</i> (Boiss. & Hohen)Alef.	Malvaceae	Hem	IT-ES
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	Th	IT
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	Ph	IT-M
<i>Epilobium minutiflorum</i> Hausskn.	Onagraceae	Ge	IT
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Onagraceae	Ge	IT
<i>Epipactis veratrifolia</i> Boiss.& Hohen.	Orchidaceae	Ch	IT-M-ES
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalidaceae	Th	IT-M
<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae	Hem	Plur
<i>Glaucium corniculata</i> (L.) Rudolph.	Papaveraceae	Hem	IT
<i>Papaver dubium</i> L.	Papaveraceae	Th	IT-ES
<i>Papaver modestum</i>	Papaveraceae	Th	IT
<i>Romeria refracta</i> DC.	Papaveraceae	Th	IT
<i>Alhagi pseudoalhagi</i> (M.B.) Desf.	Papilionaceae	Ch	IT
<i>Astragalus microcephalus</i> Wild.	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus supervisus</i> (Kuntze)Sheld.	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus jessenei</i> Bunge.	Papilionaceae	Hem	IT

ادمه جدول ۱


گونه	خانواده	شكل زیستی	منطقه رویشی
<i>Astragalus aegbromus</i> Boiss.&Hohen.	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus remotijugus</i> Boiss.	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus angustatus</i> Bge. *	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus Verus</i> Olivier. *	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus chrystotrichus</i> Boiss. R*	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus eriocarpus</i> DC.	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus campylorhynchus</i> Fisch. &C.A.Mey	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus jodotropis</i> Boiss.	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus sciureus</i> Boiss. &Hohen. *	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus iranicus</i> Bunge *	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus vegetus</i> *	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Astragalus persicus</i> Fisch. & Mey *	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Cicer arietinum</i> L.	Papilionaceae	Th	Plur
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L. *	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Lens cyana</i> (Boiss.&Hohen)Alef.	Papilionaceae	Th	IT
<i>Lens orientalis</i> Boiss.	Papilionaceae	Th	IT-M
<i>Medicago sativa</i> L.	Papilionaceae	Hem	T
<i>Melilotus officinalis</i> (L.)Desr.	Papilionaceae	Hem	IT-ES
<i>Onobrychis aucheri</i> Subsp. <i>tehranica</i> (Bornm.) Rech.f.	Papilionaceae	Th	IT
<i>Sophora alopecuroides</i> L.	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Spaerophysa salsula</i> DC. *	Papilionaceae	Ph	-
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Papilionaceae	Hem	-
<i>Trifolium pratense</i>	Papilionaceae	Hem	IT-ES
<i>Vicia hybrida</i> L.	Papilionaceae	Hem	Plur
<i>Vicia michauxii</i> Spreng.	Papilionaceae	Hem	IT
<i>Vicia peregrina</i> L.	Papilionaceae	Th	IT-M
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae	Hem	IT-ES
<i>Plantago media</i> L.	Plantaginaceae	Hem	-
<i>Plumbago europaea</i> L.	Plumbaginaceae	Hem	IT
<i>Bongardia chrysogonum</i> (L.) Boiss.	Podophyllaceae	Ge	IT
<i>Polygala hohenackeriana</i> Fisch.&C.A.Mey.	Polygalaceae	Hem	IT
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Polygonaceae	Th	-
<i>Polygonum convolvulus</i> L.	Polygonaceae	Th	Plur
<i>Polygonum polycnemoides</i> Jaub.&Spach.	Polygonaceae	Hem	IT-M
<i>Rheum ribes</i> L.	Polygonaceae	Hem	-
<i>Rumex alveolatus</i> Los.	Polygonaceae	Hem	IT-ES
<i>Rumex cripus</i> L.	Polygonaceae	Hem	IT-ES
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Polygonaceae	Hem	ES
<i>Rumex scutatus</i> L.	Polygonaceae	Hem	IT-M
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	Hem	-
<i>Pilosyles haussknechti</i> Boiss.	Rafflesiaceae	Th	P.Th
<i>Consolida aquilegum</i> Boiss.)Bornm.	Ranunculaceae	Th	-
<i>Adonis flammea</i> Jacq.	Ranunculaceae	Th	Plur
<i>Ranunculus oxyspermus</i> Willd.	Ranunculaceae	Ch	IT
<i>Reseda lutea</i> L.	Resedaceae	Th	IT
<i>Alchemila</i> sp.	Rosaceae	Hem	IT
<i>Amygdalus lycioides</i> Spach.	Rosaceae	Ph	IT
<i>Geum urbanum</i> L.	Rosaceae	Hem	ES
<i>Mespilus germanica</i> L.	Rosaceae	Ph	ES
<i>Rosa persica</i> Michx.ex Juss.	Rosaceae	Ch	IT
<i>Rubus caesius</i> L.	Rosaceae	Ph	IT-ES
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Rosaceae	Hem	IT-M

1ادمه جدول

گونه	خانواده	شكل زیستی	منطقه رویشی
<i>Asperula glomerata</i> (M.B.)Griseb.	Rubiaceae	Hem	IT
<i>Galium aprine</i> L.	Rubiaceae	Th	IT-M
<i>Galium spurium</i>	Rubiaceae	Th	IT-M
<i>Haplophyllum acutifolia</i> DC.	Rutaaceae	Hem	IT
<i>Linaria lineolata</i> Boiss	Scrophulariaceae	Hem	IT
<i>Scrophularia crenophila</i> Boiss.	Scrophulariaceae	Hem	IT
<i>Scrophularia pruinosa</i> Boiss.	Scrophulariaceae	Hem	IT
<i>Scrophularia frigida</i> Boiss. *	Scrophulariaceae	Hem	IT
<i>Verbascum agrimonifolium</i>	Scrophulariaceae	Hem	M
<i>Verbascum aucheri</i> (Boiss.)Hub.&Mor. *	Scrophulariaceae	Th	IT-M
<i>Verbascum sinuatum</i> Var. <i>adenosepalum</i> Murb.	Scrophulariaceae	Hem	IT-M
<i>Veronica biloba</i> Schreb.	Scrophulariaceae	Th	IT-M
<i>Veronica intercedens</i> Bornm.	Scrophulariaceae	Th	IT
<i>Veronica persica</i> Pojr.	Scrophulariaceae	Hem	IT
<i>Salix elburzianis</i> Boiss.	Salicaceae	Ph	IT
<i>Datura stramonium</i> L.	Solanaceae	Th	Plur
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Solanaceae	Hem	Plur
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Solanaceae	Hem	IT-M
<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanaceae	Th	IT-M
<i>Dendrostelllear lessertii</i> (wiksstr.) Van Tighe	Thymelaeceae	Ch	IT
<i>Celtis caucasica</i> Willd.	Ulmaceae	Ph	IT
<i>Bunium cylindricum</i> (Boiss.&Hohen)Drude	Umbelliferae	Gt	IT
<i>Cervaria cervariifolia</i> (C.A.Mey)	Umbelliferae	Hem	ES
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Umbelliferae	Ch	IT-M
<i>Echinophora platyloba</i> DC. *	Umbelliferae	Ch	IT
<i>Prangos ferulacea</i> (L.)Lindi.	Umbelliferae	Hem	IT-M
<i>Scandix stellata</i> Banks.&Soland.	Umbelliferae	Th	IT
<i>Smyrnium aucheri</i> Boiss.	Umbelliferae	Hem	IT
<i>Turgenia latifolia</i> (L.)Hoffm.	Umbelliferae	Th	IT-ES
<i>Ferula sp.</i>	Umbelliferae	Ch	-
<i>Parietaria judaica</i> L.	Urticaceae	Ch	IT-M-ES
<i>Valerianaella platycarpa</i> Trautv.	Valerianaceae	Th	IT
<i>Viola ocuulata</i> Lehmann.	Violaceae	Th	IT
<i>Viola pontica</i> W.Becker.	Violaceae	Th	IT
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Zygophyllaceae	Th	IT-ES-SS




شكل 2




شكل 1

عناصر چند ناحیه‌ای، تعیین خاستگاه بسیار دشوار است. از طرفی رویشگاه‌های فعلی و فلور هر ناحیه با شرایط اقلیمی فعلی انطباق کاملی ندارند، زیرا به شدت متأثر از دگرگونی‌های دوران‌های زمین‌شناسی گذشته است (عصری و همکاران، 1381). ممکن است یک عنصر رویشی متعلق به ناحیه خزری در بخش‌هایی ویژه‌ای از ناحیه ایرانو-تورانی دیده شود که بنابراین، حضور این عنصر نشان دهنده تعلق آن به ناحیه ایرانو-تورانی نیست، بلکه به دلیل تشکیل یک میکروکلیما یا یک آشیان اکولوژیک مناسب جهت آن عنصر است. بنابراین، مطالعات فیلوزنیکی و تطبیق آنها با شواهد جغرافیایی زیستی، دیرین شناسی و زمین شناسی می‌تواند در آشکار ساختن خاستگاه گیاهان بسیار موثر باشد. هیستوگرام درصد فراوانی نواحی رویشی در نمودار ۳ ارائه گردیده است.



نمودار ۳- درصد فراوانی اشکال زیستی گونه گیاهی



نمودار ۳- درصد فراوانی عناصر رویشی گونه‌های گیاهی


مظفریان در سال 1381 (سازمان حفاظت محیط زیست) با مطالعه گونه‌های گیاهی پارک ملی لار، با ارائه فهرست




شایان به ذکر است که با توجه به پراکنش جغرافیایی گیاهان نمی‌توان درباره منشأ و خاستگاه آنها به طور دقیق نظر داد. گونه‌هایی که تنها در یک ناحیه رویشی پراکنش دارند، با قطعیت زیادی می‌توان از آن ناحیه به عنوان منشأ و خواستگاه اشتراق آن نام برد. اما درباره

البرز مرکزی)، از غنای گونه‌ای بیشتری برخوردار است. اسلامی (1383) روند تغییرات پوشش گیاهی را در امتداد شیب رطوبتی در منطقه گدوک فیروزکوه (بخش‌های شرقی البرز مرکزی) مورد مطالعه قرار داده است. در این ناحیه فوق نیز بدلیل موقعیت اکوتونی، منطقه نسبت به منطقه مورد بررسی (اوین - درکه)، از تنوع گونه‌ای بیشتری برخوردار است.

ناحیه کوهستانی اوین - درکه به دلیل علت بهره‌برداری‌های نامناسب مانند برداشت بی‌رویه گیاهان اعم از غذایی و دارویی، آتش سوزی و تخریب بافت کوهستانی توسط گردشگران و کوهنوردان از بعد گیاهی به شدت مورد تخریب قرار گرفته است که کاهش تنوع گونه‌های گیاهی، حضور گونه‌های مهاجم، فرسایش خاک و... دلایلی بر این ادعا هستند. اکوسیستم‌های کوهستانی به علت داشتن گونه‌های گیاهی خاص خود، برای حفظ تنوع گونه‌های گیاهی (یکی از مظاهر اصلی تنوع زیستی) به نوعی خزانه ژنتیکی و مرکزی محسوب می‌شوند. از طرفی این مناطق به دلیل پتانسیل‌های ویژه خود در جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای و دارا بودن منابع طبیعی متنوع بسیار آسیب پذیر می‌باشند، که اعمال برنامه ریزی‌های متناسب جهت اعمال سیاست‌های حفاظتی واχایی در این مناطق بسیار ضروری است. از آن جا که حفاظت و نگهداری گیاهان در زیستگاه‌های طبیعی آن‌ها، اغلب به عنوان حفاظت از کانون اصلی گونه‌های گیاهی تلقی می‌شود در مناطقی که به نوعی تعارض بهره‌برداری‌های انسانی و حفاظت از طبیعت مواجه هستیم باید انواع زیستگاه‌ها، عوامل تهدید، نگرش و رفتارهای اجتماعی و تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرند. به همین دلیل حفاظت و نگهداری گیاهان به طیف وسیعی از گزینه‌های مدیریت نیاز دارد تا بتواند از یک سو نیازهای ویژه گونه و اکوسیستم را برآورد و از سوی دیگر به همان اندازه تأمین کننده نیازهای مردم باشد (مجنویان، 1382).



نمودار 4- درصد فراوانی خانواده‌های گیاهی



نمودار 4- نمودار آمبروترومیک (نمودار بارندگی با ° و نمودار دما با ° مشخص شده است)

فلورستیک و طبقه بندی گونه‌ها و نیز تیپ بندی گونه‌ها براساس ویژگی‌های رویشگاه، بخش گستردگی از گونه‌های گیاهی ناحیه البرز (بخش شرقی البرز مرکزی) را مورد بررسی قرار داده است. وی تعداد گونه‌ها را در حدود 407 گونه از 220 جنس معرفی نموده است. که درصد بالای ضریب جاکارد و تنوع گونه‌ای زیاد یانگر تنوع بیشتر شرایط اکولوژیکی و پتانسیل بالای گونه‌زایی در این بخش از البرز می‌باشد. نظریان در سال 1382 پوشش گیاهی حوضه‌های آبخیز الیکا و دونا (بخش‌های شمالی از دامنه‌های جنوبی ناحیه کوهستانی البرز مرکزی) را مورد مطالعه قرار داده است. در این ناحیه به دلیل پدید آمدن شرایط اکوتونی، پوشش گیاهی نسبت به ناحیه کوهستانی اوین - درکه (نواحی جنوبی ناحیه کوهستانی

اسفندیاری، اسفندیار (1366). فهرستی از اسامی علمی گیاهان موجود در هر مجموعه گیاهان وزارت کشاورزی. موسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی اسلامی، بهمن و همکاران (1383). مطالعه تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزکوه. محیط‌شناسی شماره 36: 57-76.

پاکروان، منیژه (1373). بررسی گونه‌های بخش پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم دانشگاه تهران.

ثابتی، حبیب‌الله (1355). جنگلها، درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی.

دزفولی، محمد امین (1376). گیاهان هرز کشیده برگ گندمیان ایران. تهران، مرکز نشر دانشگاهی

زهربی و همکاران (1378). مترجم: هنریک مجنوئیان. جغرافیای گیاهی ایران (مجموعه کاربرد جغرافیای گیاهی در حفاظت). انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

زهربی، میکائیل (1383). شالوده‌های ژئوبوتانیکی خاورمیانه. مترجمین: هنریک مجنوئیان و باریس مجنوئیان. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

سازمان حفاظت محیط زیست (1381). مطالعه و تهیه طرح جامع مدیریت پارک ملی لار (جلد دهم: پوشش گیاهی) تهران. سازمان حفاظت محیط زیست.

سالنامه آماری سازمان هواشناسی کشور (1383-1373). سازمان هواشناسی کشور

پی‌نوشت‌ها

1- نقشه ناحیه کوهستانی اوین - در که

Amygdalus lycioides Spach. - 2

Onosma microspermum Stev. - 3

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph. - 4

Sameraria stylophora (Jaub.&Spach) Boiss - 5

مخف‌ها :

Ph = Phanerophyte

Th = Therophyte

Ch = Chamaephyte

Hem = Hemicryptophyte

Ge = Geophyte

IT = ایرانو - تورانی

SS = صحارا - سندی

Cos = جهان‌وطنی

Plur = چند ناحیه‌ای

ES = اروپا - سیبری

M = مدیترانه‌ای

تقدیر و تشکر

به این وسیله از راهنمایی‌های جناب آقای دکتر شاهین زارع و جناب آقای حبیب‌الله دیبری تشکر و قدردانی می‌گردد.

منابع

اسدی، مصطفی (1382). معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیای گیاهی منطقه ورامیان، پژوهش و سازندگی (منابع طبیعی) شماره 62:

اسدی، مصطفی و همکاران (هیات ویراستاران). (1367-1383). جلد‌های (1-45)، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

محرابیان، احمد رضا و بهرام زهزاد (1382). بررسی
فلور و فضای سبز دانشگاه شهید بهشتی. پژوهه تحقیقاتی
دانشجویی. گروه زیست‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

مظفریان، ولی الله (1379). رده بندی گیاهی
(جلدهای 1-2). تهران. انتشارات امیر کبیر.

مظفریان، ولی الله (1377). فرهنگ نامهای گیاهان
ایران. تهران. انتشارات فرهنگ معاصر.

معصومی، علی اصغر (1365-1379). گونهای
ایران (جلد های 1-4)، تهران ، موسسه تحقیقات جنگلها و
مراعن.

مقدم، محمدرضا (1380). اکولوژی توصیفی و
آماری پوشش گیاهی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
نظریان، حسن (1382). بررسی اکتو-
فیتوسوسیولوژی حوضه های آبخیز الیکا و دونا (البرز
مرکزی). پایان نامه دکتری علوم گیاهی دانشگاه تهران.
نیشابوری، اصغر (1381). جغرافیای زیستی. تهران.
انتشارات سمت.

Archibald ,O.W.(1995). *Ecology of World Vegetation.*
London. Chpman and Hall Inc.

Boissier, E. (1872). *Flora orientalis.* Genevae&
Basileae, Lugduni., Vol 2.

Buhse, F. & C. Winkler (1899). *Die Flora des Alburz
und der Kaspischen Südküste.* Arbeit. Naturf.
Ver. Riga, N.F. 8 : 1-61.

Davis, P.H (ed) (1965-1985) .*Flora of Turkey* (Vol.1-
9) Edinburgh. Edinburgh University Press

Gilli, A. (1939). *Die pflanzengesellschaften der
Hochreion des Elburzgebirges in Nordiran Beih.
Bot. Cbl. Abt. 59 : 317-344, pls. III-IV.*

شاهسواری، عباس (1376). منطقه هیرکانی (مطالعه
وبررسی دیرینه شناسی و جغرافیای گیاهی جنوب دریای
خزر). موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

شعبانی، نگین (1379). برنامه ریزی فضایی - فعالیتی
گذران اوقات فراغت و دره های کوهستانی با تاکید بر
حساسیت های زیست محیطی نمونه موردی بخش شمالی
در که. پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشکده
معماری دانشگاه شهید بهشتی.

صحت نیاکی، نصرت (1374). پوشش گیاهی علوفه
ایران در هرباریوم کیو لندن. اهواز. دانشگاه شهید چمران
اهواز.

عصری، یونس و محمد مهرنیا (1381). معرفی فلور
بخش مرکزی سفید کوه، مجله منابع طبیعی ایران. جلد
(3)55.

قهرمان، احمد و فریده عطار (1380). تنوع زیستی
گونه های گیاهی ابر شهر تهران. انتشارات دانشگاه تهران.

کنعانی، محمد (1378). بررسی پوشش های گیاهی
پارک ملی بمو(استان فارس). پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی.

میین ، صادق (1378). رستنی های ایران. (جلد 4)
تهران. دانشگاه تهران.

متین، فریده (1376). لاله های ایران. تهران، سازمان
تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.

مجنویان هنریک (1382). مناطق حفاظت شده و
توسعه پایدار. تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط
زیست.

Hedge.I.C & P. Wendelbo (1978). Patterns of Distributions and Endemism In Iran . *Notes Edinb. Roy.Bot. Gard.* 24(2) : 51-71.

Jalili A & Z. Jamzad (1999). *Red data Book of Iran (A preliminary Survey of Endemic Rare and Endangred plant Species in Iran)*. tehran .Research Institute of Forest and Rangeland(RIFI) Publication

Klein, J. C. (1991). Endemism a1, Alborz (Iran). Flora et Vegetatio Mundi . IX : 247-261.

Korner, C. & M. Espehnoe, (Editors) (2002). *Mountain biodiversity(a global Assesment)* .USA. The Partenon publishing Group

Melchior, H.(1937) Zur Pflanzengeographie des Elburs Gebriges in Nord Iran. Sitzb. *Ges. Naturf. Freunde Berlin.* No : 1-3: 181-194.

Moussavi, M. & M. Iranshahr, (2004). Plants of Heydar-Baba. *Enviromental sciences*. Vol 2: 2-16.

Rechinger,K.H,(Ed.) (1963-1999).Flora Iranica. Vien, Graz : Akademische Druck and veragsatalt. vol 1-178.

Takhtajan, A. (1986). *Floristic Regions of the World*. University of California Press..

Townsend,C.C. & E. Guest (Eds). (1966-1985).*Flora of Iraq*. Vol 1-9.Baghdad Ministry of Agriculture AndAgrarian Reform

Zohary , M. (1973). *Geobotanical Foudations of the Middle East*. 2 vol. Stuttgart. 739 p.



