

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علوفه‌ای - مرتعی *Agropyron elongatum*

رضا محمدی^۱، مجتبی خیام نکویی^۱، آفاغر میرلوحی^۲ و خورشید رزمجو^۲

۱- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور، اصفهان.

۲- دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ۲۳ جمعیت از گونه علوفه‌ای مرتعی *Agropyron elongatum* جمع‌آوری شده از مناطق مختلف کشور، در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور انجام گرفت. بذرها ابتدا در گلدانهای پلاستیکی در گلخانه کاشته شدند. بعد در اوایل اسفند ۱۳۸۱ گیاهان بر اساس طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه کشت گردیدند. اندازه‌گیری روی ۱۰ صفت مختلف در طی دو سال انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اختلاف نمونه‌های مورد مطالعه برای همه صفات در سال اول و اغلب صفات در سال دوم در سطح ۱ درصد معنی دار گردید. ضریب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی داده‌های سال دوم برای صفات مهمی مانند عملکرد علوفه خشک به ترتیب ۳۶/۷۴ و ۵۹/۸۵ و برای تعداد ساقه به ترتیب ۱۳/۹۷ و ۲۸/۶۳ بود که نشان‌دهنده وجود تنوع بالا در میان نمونه‌های مورد مطالعه برای این صفات می‌باشد. از این رو می‌توان در برنامه‌های پنهان‌سازی از این تنوع ژنتیکی برای بهبود آنها استفاده نمود. صفات عملکرد علوفه، تعداد روز تا گرده افسانی، تعداد روز تا ظهر خوش، قطر یقه و ارتفاع بوته جزء واریانس ژنتیکی نسبتاً بالایی داشتند و قابلیت توارث عمومی آنها به ترتیب ۸۴/۹۸، ۷۱/۵۵، ۷۵/۸۵ و ۶۶/۰۸، ۶۳/۶۹ بود. برای بقیه صفات قابلیت توارث عمومی در حد متوسط بود. برآورد ضرایب همبستگی فنوتیپی صفات در سال اول حاکی از همبستگی بالای عملکرد علوفه چین اول با تعداد ساقه و ارتفاع بوته بود. بررسی ضرایب همبستگی فنوتیپی صفات در سال دوم داد که عملکرد علوفه با صفات تعداد روز تا ظهر خوشه ($r=-0.531$) و تعداد روز تا گرده افسانی ($r=-0.642$) همبستگی منفی و معنی داری ($P<0.01$) دارد. از طرف دیگر عملکرد علوفه با صفات ارتفاع بوته ($r=0.335$)، عرض برگ پرچم ($r=0.413$)، تعداد ساقه ($r=0.602$) و قطر یقه ($r=0.419$) همبستگی مثبت و معنی داری ($P<0.01$) دارد. طول خوش و طول برگ پرچم همبستگی معنی داری با عملکرد علوفه نداشتند.

واژه‌های کلیدی: تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری، ضریب همبستگی، *Agropyron elongatum* (Host) Beauv.

مقدمه

تبديل شده و به تاسب آن افزایش تعداد دام موجب فشار زیاد بر مراعع گردیده است، به طوری که سطح وسیعی از این مراعع در حال تخریب بوده و قادر به تأمین نیازهای دامی کشور نمی‌باشدند. بررسی‌های انجام شده گویای این امر است که ظرفیت بالقوه تولید علوفه در مراعع کشور با مدیریت صحیح، پس از اصلاح و احیاء چند برابر ظرفیت فعلی آنهاست (مقدم، ۱۳۷۷). برای اصلاح و احیاء مراعع به بذر گیاهان علوفه‌ای مرتعی نیاز می‌باشد و بهتر است که این بذرها اصلاح شده و مرغوب باشند. این در حالی است که در کشور به تولید، مدیریت و اصلاح گیاهان علوفه‌ای در مقایسه با سایر محصولات زراعی کمتر توجه

از میان فرآورده‌های غذایی، فرآورده‌های دامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. بر اثر افزایش جمعیت نیاز کشور به این فرآورده‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. بنابراین توسعه بیشتر دامپروری در کشور یکی از نیازهای اساسی می‌باشد. یکی از مهمترین عوامل محدود کننده توسعه دامداریها کمبود مواد غذایی دام حاصل از مراعع و گیاهان علوفه‌ای کشت شده می‌باشد.

مراعع کشور از زمانهای دور تاکنون مورد چرا قرار گرفته‌اند، لیکن در دهه‌های اخیر متاسفانه همزمان با رشد سریع جمعیت قسمتی از مراعع به زمین‌های کشاورزی

بررسی تنوع ژنتیکی در

جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای - مرتعی *Agropyron elongatum*

اگر مقداری از مریستم مذکور بر اثر برداشت علوفه از بین برود، این قبیل مریستم‌ها امکان دارد به طور منظم و پیوسته با ظهور پنجه‌های جدید جایگزین شوند. در بیشتر گراسها گرهات داخلی ساقه تنها با ظاهر شدن گل آذین امتداد می‌یابند، بنابراین دوره آسیب پذیری اندام‌های زایشی در مقابل چرای دام به حداقل می‌رسد. تعداد محدودی از گیاهان از چنین سازوکار مؤثری برای رشد ترمیمی برخوردارند، به همین دلیل گراسها از موقعیت ممتازی به عنوان گیاهان علوفه‌ای برخوردار می‌باشند (مدیر شانه‌چی، ۱۳۷۱).

آگروپایرونها گیاهانی هستند که در فصل سرد بهتر رشد می‌کنند. آگروپایرونها دگرگشن بوده، اما به طور کامل خود ناباور نیستند. آمیزش‌های موفقیت‌آمیزی میان بعضی از گونه‌های آگروپایرون نظریه *A. elongatum* با تیپ‌های مختلف گندم انجام شده است. آگروپایرون‌های مهم دائمی هستند و اغلب آنها دارای فرم چمنی می‌باشند که از ریزوم‌های خزنده قوی حاصل می‌شوند. این گیاهان با ایجاد پنجه جوان از ناحیه یقه به صورت دسته‌ای مجتمع و متراکم در می‌آیند (سندگل، ۱۳۶۸b). آگروپایرونها به خشکی و سرما بسیار مقاوم بوده و به شرایط شوری و قلیایی بردبار هستند. این گیاهان از نظر عملکرد و کیفیت علوفه مطلوب می‌باشند (Vogel & Moore, 1998). پایداری و سازگاری علف گندمی‌ها به انواع مختلف خاک، شرایط متفاوت رطوبتی و شرایط بد آب و هوایی، آنها را در زمرة بهترین گیاهان برای حفاظت خاک قرار داده است. از این رو آشکال چمنی این گیاهان ارزش خاصی برای کنترل فرسایش دارند. جوانه زنی بذر گندمی‌ها سریع و زیاد می‌باشد و گیاهچه‌های جوان در رقابت با علفهای هرز و سایر گراسها پایدار می‌باشند.

گونه *A. elongatum* از مهمترین گونه‌های جنس *Agropyron* است. این گیاه مقاومت خوبی به شوری و قلیاییت خاک داشته، شرایط نامساعد را به خوبی تحمل

شده است. در این راستا منابع تنوع ژنتیکی گیاهی گنجینه‌های بالقوه‌ای هستند که به عنوان پشتوانه‌ای ارزشمند برای متخصصان اصلاح نباتات محسوب می‌گردند، زیرا اساس تحقیقات به نزدیک گیاهان بر پایه تنوع ژنتیکی وسیع استوار است. تولید ارقام علوفه‌ای که علاوه بر عملکرد خوب دارای مواد غذایی مناسب برای انواع متفاوت دامها هستند، یکی از اهداف مهم به نزدیکان و تولید کنندگان محصولات علوفه‌ای می‌باشد. کشور ما به دلیل اینکه خاستگاه اصلی مهمترین گیاهان علوفه‌ای است از استعداد بالقوه‌ای برای توسعه این محصولات برخوردار می‌باشد. بهره برداری بهتر از این پتانسیل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مناسب است، به نحوی که بتوان این تنوع بی‌نظیر را حفظ کرده و از آن بهره برداری نمود. توسعه چراگاههای مصنوعی از طریق گزینش گیاهان برتر و کشت آنها در مناطقی که برای کشت سایر محصولات مناسب نیستند، یکی از راهبردهای عملی برای جلوگیری از تعرض به مناطق طبیعی است.

در دید کلی گیاهان مرتعی که برای برنامه‌های بذرکاری جهت احیاء مراعع انتخاب می‌شوند، باید دائمی، مقاوم به خشکی، مقاوم به درجه حرارت پایین و بالا، مقاوم به چرای دام، خوشخوراک، قابلیت هضم بالا، تولید علوفه خوب، دوره رشد طولانی و مقدار تولید بذر آنها زیاد بوده و در مقابل آفات و امراض موجود در منطقه حساسیت نداشته باشند (سندگل، ۱۳۶۸ a).

گراسها از مهمترین گیاهان مرتعی هستند که به لحاظ تولید علوفه، حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک اهمیت زیادی دارند. در گراسها تا قبل از مرحله گلدهی، تشکیل برگ در ضمن هر برداشت یا پس از آن ادامه می‌یابد، از این رو گراسها سازگاری خوبی به چرا و برداشت دارند. این امر بدان علت است که در خلال دوره رویشی، نواحی مریستمی نزدیک سطح خاک قرار گرفته و توسط برگهای غلاف‌دار محافظت می‌شوند و دور از دسترس دام و ماشین آلات برداشت قرار می‌گیرند. حتی

گلخانه انتقال داده شدند. گیاهان براساس طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در اواخر اسفند ۱۳۸۱ در مزرعه کشت گردیدند، به طوری که در هر تکرار ۱۰ بوته از هر اکسشن در یک ردیف کشت شد. فاصله بوته‌ها در روی ردیف و میان ردیفها ۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد. پس از کاشت گیاهان بلافاصله آبیاری صورت گرفت. عملیات داشت شامل آبیاری، کوددهی و وجین در طی فصل رشد به طور مرتب انجام گرفت. در سال اول تعداد ساقه، ارتفاع، عملکرد علوفه‌تر و علوفه خشک در دو چین و در سال دوم شامل روز تا ظهور خوش، روز تا گرده افشاری، ارتفاع بوته، طول خوش، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، عملکرد علوفه‌تر، عملکرد علوفه خشک، تعداد ساقه و قطر یقه اندازه‌گیری شدند. اندازه‌گیری صفات در سال اول پس از استقرار گیاهان از اواخر بهار ۱۳۸۲ بر اساس جدول ۲ شروع شد. در سال دوم با توجه به این که گیاهان به طور کامل مستقر شده بودند و از اوایل بهار شروع به رشد کردند، اندازه‌گیری صفات از اوایل فروردین ۱۳۸۳ شروع شد. داده‌های حاصل از اندازه‌گیری صفات بر اساس مدل آماری طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و جهت تجزیه آماری داده‌ها از نرمافزار آماری S.A.S استفاده شد. اجزای واریانس محیطی و ژنتیکی بر اساس امید ریاضی میانگین مربعات برآورد گردیدند (Steel, 1980). برآورد وراثت پذیری صفات نیز از طریق فرمول ذیل صورت گرفت (Halluer, 1998). در این فرمول σ^2_g برآورده از واریانس ژنتیکی و σ^2_e برآورده واریانس خطأ در جدول تجزیه واریانس و h^2 وراثت

$$h^2 = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_g + \frac{\sigma^2_e}{r}}$$

پذیری عمومی صفت می‌باشد:

کرده (Johnson, 1991 ; Shannon, 1978) و برای احیاء مراتع و تولید علوفه در کشور مناسب می‌باشد. تخمین تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت پذیری صفات مهم زراعی، در برنامه‌های بهنژادی نقشی اساسی در بررسی کارآیی انتخاب و بهبود صفات مورد نظر دارد. میزان قابلیت توارث عامل مهمی در تعیین روش مناسب جهت بهبود یک صفت در برنامه‌های بهنژادی و همچنین شاخصی از نحوه تأثیر روش‌های انتخاب برای بهبود آن صفت می‌باشد. Ray et. al. (1997) با بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات مهم زراعی ۳۰ خانواده ناتنی علف گندمی تاجدار در دو سال مشخص کردند که صفاتی نظیر عملکرد علوفه، ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم، تعداد سنبلاچه در سنبله و قدرت رویش مجدد دارای وراثت پذیری بالایی میان ۶۸ تا ۸۶ درصد بودند. Vogel & Moore (1998) با بررسی اکسشن‌های مختلف علف گندمی پابلند از نظر کیفیت و عملکرد علوفه و مقایسه آنها با دو رقم زراعی به عنوان شاهد اظهار داشتند که در میان اکسشن‌ها تنوع ژنتیکی خوبی وجود دارد و برخی از اکسشن‌ها از نظر عملکرد و کیفیت علوفه از ارقام شاهد بهتر بودند. بنابراین می‌توان از این اکسشن‌ها برای تولید ارقام مناسب‌تر استفاده نمود.

این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت پذیری صفات و همچنین بررسی روابط و نحوه تأثیر صفات مختلف از جمله اجزای عملکرد بر عملکرد علوفه در گونه علوفه ای- مرتعی *Agropyron elongatum* گردید.

مواد و روشها

در این تحقیق ۲۳ نمونه بذر موجود در بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور (جدول ۱) که از مناطق مختلف کشور جمع آوری شده بودند، در گلدانهای پلاستیکی در گلخانه کشت گردیدند. بعد از جوانه‌زنی، گلданها برای بهاره‌سازی به بیرون

جدول ۱- کد و محل جمع آوری نمونه‌های مورد مطالعه از گونه *Agropyron elongatum*

ردیف	کد گیاه	منشاء و محل جمع آوری
۱	۱۰۰۰/۲۵۱	اصفهان- بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
۲	۱۰۰۰/۱۱۶	اصفهان- بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
۳	۱۰۰۰/B5	همدان
۴	۱۰۰۰/B6	چهار محال بختیاری
۵	۱۰۰۰/۱۹۶	اصفهان- فریدن
۶	۱۰۰۰/۲۴۹	سمنان- ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاهرود
۷	۱۰۰۰/۷۳	اصفهان- بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
۸	۱۰۰۰/۲۸۱	اصفهان- فریدون شهر- چشمehr لنگان
۹	۱۰۰۰/۱۷۴	اصفهان- بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
۱۰	۱۰۰۰/۳۰۳	اردبیل- بعد از پلیس راه
۱۱	۱۰۰۰/C3	اصفهان
۱۲	۱۰۰۰/C11	اصفهان- سمیرم- قلعه سنگی
۱۳	۱۰۰۰/C12	اصفهان
۱۴	۱۰۰۰/۲۸۹	گلستان- گند کاروس- مراوه تپه
۱۵	۱۰۰۰/۴۲۹	اصفهان- سمیرم- حناه
۱۶	۱۰۰۰/۲۷۹	سمنان- ایستگاه تولید بذر
۱۷	۱۰۰۰/۳۰۳-۱	اردبیل- بعد از پلیس راه
۱۸	۱۰۰۰/۳۰۶	اصفهان- بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
۱۹	۱۰۰۰/۳۴۴	دمواند
۲۰	۱۰۰۰/۲۷۹-۱	سمنان- ایستگاه تولید بذر
۲۱	۱۰۰۰/۱۱۶-۱	اصفهان- بانک بذر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
۲۲	۱۰۰۰/۱۹۵	تبریز
۲۳	۱۰۰۰/۳۰۵	ارومیه - خان تختی

جدول ۲- صفات مورد بررسی و نحوه اندازه گیری آنها

ردیف	صفات مورد بررسی *	نحوه اندازه گیری صفات
۱	تعداد روز تا خوشه دهی	تاریخ ظهر خوشه بر اساس تعداد روز از اول فروردین تا ظهر سه خوشه در هر بوته
۲	تعداد روز تا گرده افشاری	تعداد روز از اول فروردین تا ظاهر شدن پرچمها در سه خوشه از هر بوته
۳	ارتفاع بوته (سانتمتر)	ارتفاع بلندترین ساقه در زمان گرده افشاری
۴	تعداد ساقه	شمارش تعداد ساقه در زمان گرده افشاری
۵	عرض برگ پرچم (میلیمتر)	میانگین عرض سه برگ پرچم در زمان گرده افشاری
۶	طول برگ پرچم (سانتمتر)	میانگین طول سه برگ پرچم در زمان گرده افشاری
۷	طول خوشه (سانتمتر)	میانگین طول سه خوشه از هر بوته
۸	عملکرد علوفه تر، دو چین در سال (گرم)	وزن تر علوفه بلا فاصله پس از برداشت در مزرعه
۹	عملکرد علوفه خشک، دو چین در سال (گرم)	برای اندازه گیری وزن خشک علوفه، نمونه‌ها در پاکت‌های کاغذی به مدت حداقل ۴۸ ساعت در دمای ۶۵ درجه سانتیگراد خشک شدند و توزین گردیدند.
۱۰	قطر یقه پس از برداشت (سانتمتر)	قطر طوقه پس از برداشت

* در هر تکرار پنج بوته برای هر صفت اندازه گیری و میانگین آن محاسبه شد.

گونه وجود دارد. تفاوت میان مقدار حداقل و حداقل هر

یک از صفات عدد بزرگی را نشان می‌دهد که حاکم از اختلاف زیاد نمونه‌ها از نظر صفات مختلف می‌باشد.

نتایج
آمار توصیفی مربوط به صفات مورد مطالعه در سال اول و دوم در جدول ۳ آمده است. نتایج نشان داد که تنوع زیادی برای صفات مورد مطالعه در میان گیاهان این

جدول ۳ - آمار توصیفی صفات مورد مطالعه در گونه *A. elongatum* در سال اول و دوم

صفات	میانگین	حداکثر	حداقل	دامتنه تغییرات
سال اول	۲۲/۴۷	۵/۴	۵۰/۸	۴۵/۴
	۱۲۰/۴۹	۸۷/۰	۱۵۳/۸	۶۷/۸
	۳۳۱/۶۵	۱۲۸/۲	۷۲۰/۴	۵۹۲/۲
	۱۲۴/۲۳	۴۷/۴	۲۹۲/۸	۲۴۵/۴
	۵۲۱/۸۸	۱۷۶/۰	۱۰۳۰/۶	۸۰۴/۶
	۱۷۹/۳۸	۵۸/۰	۳۴۵/۲	۲۸۷/۲
	۱۰۳/۸۱	۹۳/۶	۱۱۱/۲	۱۷/۶
	۱۲۴/۶۸	۱۱۸/۴	۱۳۰/۴	۱۲/۰
	۱۶۷/۳۶	۱۳۶/۴	۱۹۵/۲	۵۸/۸
	۳۹/۸۳	۳۰/۲	۷۰/۰	۳۹/۷
سال دوم	۱۸/۵۶	۱۲/۹	۳۰/۵	۱۷/۶
	۵/۷۰	۴/۲	۷/۱	۲/۹
	۷۷۷/۳۴	۱۳۹/۶	۱۵۸۷/۲	۱۴۴۷/۶
	۳۶۰/۳۵	۸۷/۲	۷۲۰/۸	۶۳۳/۶
	۹۹/۷۳	۴۰/۶	۳۷۰/۲	۳۲۹/۶
	۲۴/۹۸	۱۶/۰	۳۷/۴	۲۱/۴
	قطر یقه (سانتیمتر)			
	تعداد ساقه			
	عملکرد علوفه خشک (گرم در بوته)			
	عملکرد علوفه تر چین دوم (گرم در بوته)			

معنی دار بود که مبین وجود تفاوت معنی دار برای بیشتر صفات مورد مطالعه در این گونه می باشد.

نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴) نشان داد که اختلاف نمونه های مورد مطالعه برای همه صفات در سال اول و بیشتر صفات در سال دوم در سطح احتمال ۱ درصد

جدول ۴ - میانگین مربعات منابع تغییر در تجزیه واریانس و ضریب تغییرات در گونه *A. elongatum* در سال اول و دوم

صفات	میانگین مربعات	بلوک	تیمار	خطا	ضریب تغییرات (CV%)	df = ۴	df = ۲۲	df = ۲
تعداد ساقه چین اول	۸۳/۹۲ ns			۲۶۹/۰۰**	۲۷/۷۲	۳۸/۸۴	۲۲/۸/۴	
	۸۸۳/۰۶**			۳۵۸/۷۱**	۹/۴۲	۱۲۸/۸۴		
	۶۵۹۶۰/۱۶**			۳۶۰۴۷/۷۳**	۲۲/۳۷	۶۰۱۰/۴۷		
	۴۹۸۸/۹۳*			۵۳۱/۲۷**	۳۰/۸۷	۱۴۷۱/۱۰		
	۴۳۹۴۵/۴۳ ns			۸۰۷۴/۰۰**	۳۱/۲۹	۷۱۲۶/۸۸		
	۱۳۳۶۵/۸۲*			۷۲۶۳/۷۳**	۲۹/۶۱	۲۸۲۲/۸۰		
	۳۵/۷۴**			۲۲/۰**	۲/۴۹	۷/۶۸		
	۲۲/۳**			۱۴/۹۳**	۱/۰۵	۳/۷۳		
	۶۷۲/۷۵**			۲۳۲/۱۹**	۵/۴۸	۸۴/۲۹		
	۱۱/۰۲ ns			۳۵/۲۶ ns	۱۲/۴۳	۲۴/۴۳		
تعداد ساقه چین دوم	۱۷/۷۲ ns			۱۱/۳۴ ns	۱۶/۰۰	۸/۸۳		
	۲/۱۷**			۰/۰۵ ns	۹/۹۳	۰/۳۲		
	۲۴۵۲۰/۱۹۶**			۱۹۷۱/۲۱**	۲۲/۴۳	۴۷۳۸/۲۴۴		
	۴۸۰۷۱/۵۹**			۶۱۸۸۴/۱۸**	۲۶/۷۵	۹۲۹۳/۶۴		
	۲۰۶۵/۱۱ ns			۲۴۴۷/۷۹ ns	۴۳/۲۹	۱۸۶۴/۸۴		
	۲۱/۹۶ ns			۲۱/۱۷**	۱۰/۷۲	۷/۱۸		
	قطر یقه (سانتیمتر)							
	تعداد ساقه در بوته							
	عملکرد علوفه خشک (گرم در بوته)							
	عملکرد علوفه تر چین دوم (گرم در بوته)							

*, ** و ns به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد، ۱ درصد و غیر معنی دار.

نمونه های ۶ و ۹ به ترتیب با ۳۹/۴ و ۳۴/۶۶ ساقه در مرتبه بعد بودند. همچنین کمترین مقدار تعداد ساقه مربوط به نمونه های شماره ۲۱ و ۲۰ به ترتیب با ۹ و

نتایج مقایسه میانگین صفات در سال اول در جدول ۵ آمده است. با توجه به داده های این جدول بیشترین مقدار تعداد ساقه (۴۲/۶۶) مربوط به نمونه شماره ۱ بود و

ترتیب با ۲۰۹/۷۳ و ۱۹۴/۲ گرم در هر بوته و کمترین مقدار آن ۶۴/۷۳ و ۷۳/۸۷ گرم و مربوط به نمونه‌های ۲۳ و ۲۱ بود. بیشترین مقدار عملکرد علوفه خشک در چین دوم متعلق به نمونه‌های ۱۶، ۱ و ۱۴ و کمترین مقدار مربوط به نمونه ۲۳ با ۷۱/۶۷ گرم عملکرد علوفه خشک در بوته می‌باشد.

۱۰/۸ بود. اختلاف میان کمترین مقدار و بیشترین مقدار تعداد ساقه حدود ۳۳ ساقه بود که حاکی از تنوع زیاد میان نمونه‌های مورد مطالعه برای این صفت است. بیشترین ارتفاع بوته مربوط به نمونه‌های ۶ و ۱ به ترتیب با ۱۴۰/۸ با ۱۳۸/۲ سانتیمتر بود و کمترین ارتفاع به نمونه ۱۷ با ۹۹/۲۶ سانتیمتر تعلق داشت. از نظر عملکرد علوفه خشک در چین اول بیشترین مقدار مربوط به نمونه‌های ۶ و ۱ به

جدول ۵- مقایسه میانگین صفات در ۲۳ نمونه از گونه *A. elongatum* در سال اول

صفات	تعداد ساقه چین اول	ارتفاع بوته چین اول (سانتیمتر)	عملکرد علوفه تر چین اول (گرم در بوته)	عملکرد علوفه تر چین دوم (گرم در بوته)	عملکرد علوفه خشک چین دوم (گرم در بوته)	عملکرد علوفه تر چین اول (گرم در بوته)	عملکرد علوفه خشک چین دوم (گرم در بوته)
۲۴۵/۸۷ ab	۷۱/۹ ab	۲۰۹/۷۳ a	۵۴۱/۴۰ ab	۱۲۸/۷۰ ab	۴۲/۶۶ a	۱	
۱۱۰/۶۰ def	۲۹۲/۹ ef	۱۱۵/۴۷ defgh	۲۸۳/۹۳ fghij	۱۲۹/۴۶ abcdef	۳۲/۲۶ bc	۲	
۱۰۲/۷۳ ef	۲۶۲/۷ ef	۸۰/۲۷ efg	۱۹۸/۴۰ ij	۱۳۳/۰۰ abcd	۱۲/۵۳ fg	۳	
۱۱۰/۸۷ def	۲۸۷/۶ ef	۸۱/۴۷ fgh	۲۵۲/۰۷ ghij	۱۱۷/۹۳ cdefghij	۱۶/۵۳ efg	۴	
۱۳۹/۴۷ cdef	۳۸۴/۰ def	۱۴۷/۹۳ abcde	۴۱۷/۸۷ bede	۱۲۵/۱۳ abcdefgh	۲۸/۶۶ cd	۵	
۲۲۱/۲۷ abc	۵۸۷/۳ abcd	۱۹۴/۲۰ ab	۵۷۹/۰۰ a	۱۴۰/۸۰ a	۳۹/۴۰ ab	۶	
۱۴۳/۱۳ cdef	۴۰۰/۹ cdef	۱۳۱/۱۳ bcdefg	۳۸۳/۴۷ cdef	۱۳۵/۵۳ abc	۳۱/۹۳ bc	۷	
۱۷۰/۰۷ bcde	۴۸۴/۱ bcdef	۱۸۴/۷۳ abc	۳۷۰/۱۲ cdefg	۱۲۸/۲۶ abcdefg	۲۰/۴۰ def	۸	
۱۷۳/۵۳ bcde	۵۱۴/۲ bcde	۱۷۵/۴۰ abcd	۴۹۷/۶۰ abc	۱۳۱/۹۳ abcde	۳۴/۶۶ abc	۹	
۱۶۷/۲۰ bcde	۳۵۰/۱ def	۱۰۷/۴۰ efg	۲۹۱/۸۷ fghij	۱۱۲/۲۰ fghij	۳۲/۸۶ abc	۱۰	
۲۰۷/۰۰ abc	۶۰۷/۵ abcd	۱۱۰/۲۷ efg	۳۱۷/۲۰ efgi	۱۱۹/۸۶ bcdefghi	۱۷/۲۰ efg	۱۱	
۱۹۳/۰۰ abcd	۵۷۹/۲ abc	۷۷/۶۰ gh	۲۱۳/۶۰ ij	۱۱۰/۴۶ ghij	۱۴/۷۳ fg	۱۲	
۲۲۴/۹۳ abc	۷۰۵/۵ ab	۱۰۵/۸۰ efg	۳۰۵/۸۷ efgij	۱۱۹/۶۰ bcdefghi	۱۷/۶۰ efg	۱۳	
۲۲۱/۴۷ ab	۷۰۴/۱ ab	۱۹۰/۵۳ abc	۴۷۵/۲۷ abcd	۱۱۸/۵۳ cdefghi	۲۸/۰۰ cd	۱۴	
۲۰۵/۹۳ abc	۶۷۸/۹ abc	۱۲۱/۴۰ defgh	۳۱۵/۷۳ efgij	۱۱۵/۰۰ defghij	۱۷/۰۶ efg	۱۵	
۲۷۴/۴۰ a	۸۱۴/۳ a	۱۲۸/۷۳ cdefg	۳۴۷/۲۷ efg	۱۱۱/۰۶ fghij	۱۹/۰۰ defg	۱۶	
۱۷۴/۲۷ bcde	۵۱۹/۵ bcde	۱۱۰/۵۳ efg	۲۹۹/۹۳ efgij	۹۹/۲۶ j	۲۵/۴۶ cde	۱۷	
۲۱۰/۵۳ abc	۶۶۲/۹ abc	۱۴۲/۶۷ bcdef	۳۵۰/۵۲ defgh	۱۲۵/۶۶ abcdefgh	۲۰/۱۳ def	۱۸	
۱۹۴/۹۳ abcd	۵۸۲/۸ abcd	۱۱۸/۱۳ defgh	۳۲۰/۷۷ efgi	۱۱۳/۴۰ efgij	۱۴/۸۶ fg	۱۹	
۱۹۲/۲۷ abcd	۵۸۹/۸ abcd	۸۰/۴۷ efg	۲۲۴/۴۷ hij	۱۱۶/۰۰ defghij	۱۰/۸۰ fg	۲۰	
۱۹۰/۳۳ abcd	۶۱۵/۲ abcd	۷۷/۸۷ gh	۱۹۸/۰۰ ij	۱۱۵/۶۶ defghij	۹/۰۰ g	۲۱	
۱۷۲/۴۰ bcde	۶۶۴/۳ bcdef	۹۷/۰۰ efg	۲۶۷/۹۳ fghij	۱۰۸/۲۶ hij	۱۵/۲۰ fg	۲۲	
۷۱/۶۷ f	۲۱۷/۳ f	۶۴/۷۳ h	۱۸۹/۲۷ j	۹۹/۲۶ ij	۱۷/۰۰ efg	۲۳	
۸۷/۴۲	۲۶۸/۷	۶۳/۱۱	۱۲۷/۵۷	۱۸/۷	LSD (٪۵)		

میانگین‌هایی که در هر ستون دارای حداقل یک حرف مشابه هستند براساس آزمون LSD دارای تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد نمی‌باشند.

نمونه‌های ۱۳ و ۶ با ۱۸۰ سانتیمتر و کمترین ارتفاع مربوط به نمونه ۱۰ با ۱۴۲ سانتیمتر بود. بیشترین طول خوشه مربوط به نمونه ۱ با ۵۰ سانتیمتر و کمترین طول آن مربوط به نمونه ۱۰ با ۳۲ سانتیمتر بود. از نظر طول برگ پرچم بیشترین مقدار متعلق به نمونه‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ با ۲۲ سانتیمتر و کمترین مقدار طول برگ پرچم متعلق به

نتایج مقایسه میانگین صفات در سال دوم در جدول ۶ آورده شده است. نتایج نشان داد که میانگین بیشتر صفات در نمونه‌های مورد مطالعه اختلاف معنی داری با هم دارند. روز تا ظهر خوشه و روز تا گرددافشانی برای نمونه‌های دیررس به ترتیب ۱۰۷ و ۱۲۸ روز و برای نمونه زودرس ۹۸ و ۱۲۰ روز بود. بیشترین ارتفاع بوته مربوط به

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعمی و جنگلی ایران جلد ۱۴ شماره ۱ نمونه‌های ۳ و ۱۰ با ۱۵ سانتیمتر بود. عرض برگ پرچم برای نمونه‌های دارای عرض برگ بالا $6/3$ میلیمتر و برای نمونه‌های دارای عرض برگ کم ۵ میلیمتر بود. نمونه‌های ۲۱، ۱۵ و ۱۴ با داشتن حدود ۱۰۰۰ گرم وزن تر و بیش از ۵۰۰ گرم وزن خشک دارای بیشترین عملکرد علوفه بودند و نمونه‌های ۴ و ۲ به ترتیب با ۲۶۰ و ۲۱۴ گرم وزن آن مربوط به نمونه‌های ۴، ۳ و ۲ با ۲۱ سانتیمتر می‌باشد.

۲۱

تر و ۱۳۵ و ۱۱۲ گرم وزن خشک دارای کمترین مقدار عملکرد علوفه بودند. بیشترین تعداد ساقه، ۱۷۴ ساقه و مربوط به نمونه شماره ۲۳ و کمترین تعداد ساقه ۵۳ و ۵۲ ساقه و به ترتیب مربوط به نمونه‌های ۴ و ۳ بود. بیشترین قطر یقه نیز مربوط به نمونه ۲۳ با ۳۳ سانتیمتر و کمترین آن مربوط به نمونه‌های ۴، ۳ و ۲ با ۲۱ سانتیمتر می‌باشد.

جدول ۶- مقایسه میانگین صفات در ۲۳ نمونه از گونه *A.elongatum* در سال دوم

نمونه	صفات	روز تا ظهرور خوش	روز تا گرده افشاری	ارتفاع بوته (سانتیمتر)	طول خوش (سانتیمتر)	طول برگ پرچم (میلیمتر)	عرض برگ (سانتیمتر)	عملکرد علوفه خشک (گرم در بوته)	عملکرد علوفه تر (گرم در بوته)	تعداد ساقه (سانتیمتر)	قطر یقه (سانتیمتر)		
۲۵/۰/۶ bcd	abcd	۱۱۲/۲۷	۴۱۷/۵۳ bcdef	۵/۸۲ abcde	۲۰/۳۱ ab	۵۰/۳۸ a	۱۷۳/۶۰ abc	۱۲۶/۰۰ abcde	۱۰۵/۱۳ abcdef	۱			
۲۱/۰/۶ d	۵۹/۰/۰ cd	۱۱۲/۶۰ k	۲۱۴/۷ h	۵/۴۸ abcde	۱۹/۵۴ ab	۳۶/۵۶ bcd	۱۶۷/۶۶ abcdef	۱۲۷/۴۰ ab	۱۰۷/۸۰ a	۲			
۲۱/۳۳ d	۵۲/۲۲ d	۱۳۷/۶۰ jk	۲۶۳/۳ h	۵/۱۴ de	۱۵/۹۷ b	۳۹/۹۶ bcd	۱۶۷/۱۳ abcdef	۱۲۷/۶۶ abcd	۱۰۵/۲۶ abcdef	۳			
۲۱/۳۳ d	۵۳/۸۷ cd	۱۳۵/۳۳ jk	۲۶۰/۸ h	۵/۲۶ bcde	۱۸/۵۶ ab	۴۱/۱۳ bc	۱۶۱/۲۶ cdef	۱۲۷/۶۰ ab	۱۰۷/۰۱ abc	۴			
۲۷/۲۱ bc	۸۰/۰/۷ bcd	۲۷۴/۳۳ efg hij	۵/۸۲ abcde	۱۷/۹۸ ab	۴۰/۳۰ bcd	۱۷۱/۰۰ abcde	۱۲۶/۲۰ abcd	۱۰۷/۸۶ abc	۵				
۲۷/۹۳ bc	۹۵/۱/۶ bcd	۲۴۹/۲۰ ghijk	۵/۰/۷ efg h	۷/۰/۴ abcd	۱۸/۹۵ ab	۴۲/۹۳ ab	۱۷۸/۲۰ ab	۱۲۷/۰۲ abcde	۱۰۴/۹۴ abcdef	۶			
۲۵/۴/۶ bcd	۷۹/۴/۷ bcd	۲۱۸/۳۳ hijk	۴۳۷/۸ fgh	۵/۱/۴ de	۱۷/۸۶ b	۴۱/۴۸ bc	۱۷۲/۵۳ abcde	۱۲۴/۷۶ bcdefgh	۱۳۷/۳ abcdefg	۷			
۲۳/۱۳ bcd	۷۹/۴/۰ bcd	۲۳۸/۷۰ ghijk	۴۶۰/۹ efg h	۵/۴/۲ abcde	۱۶/۷۴ b	۴۲/۰/۴ bcd	۱۶۴/۰۳ bcdef	۱۲۴/۱۳ cdefghi	۱۰۱/۲۰ fgh	۸			
۲۲/۵۳ bcd	bcd	۱۰/۷/۵۳	۲۷۳/۰/۷ ghij	cdefgh	۵/۲۹/۳	۵/۰/۲۰ cde	۱۹/۵۲ ab	۳۹/۰/۸ bcd	۱۶۸/۲۶ abcd	۱۲۷/۸۰ abc	۹		
۲۳/۰/۶ cd	۷۵/۰/۷ bcd	۱۹۲/۰/۰ Ijk	۴۱۸/۷ gh	۵/۱/۰ e	۱۵/۶۳ b	۳۲/۰/۰ d	۱۴۲/۷۳ g	۱۲۸/۲۶ a	۱۰۷/۶۶ ab	۱۰			
۲۶/۲۶ bc	abcd	۱۰/۹/۴۷	۴۷۴/۰/۰ abcd	۸۳/۷/۹ abcd	۷/۳/۱ a	۲۲/۴/۷ a	۳۸/۰/۸ bcd	۱۷۵/۷۳ abc	۱۲۲/۶۰ ghij	۱۰۲/۰۰ defgh	۱۱		
۲۵/۱۳ bcd	۹۳/۰/۷ bcd	۳۷۷/۴/۷ cdefgh	bcdefg	۵/۷/۷ abcd	۲۲/۴/۲ a	۳۸/۹/۰ bcd	۱۵۷/۸/۶ ef	۱۲۵/۰/۶ bcdefg	۱۰۷/۰/۶ abcd	۱۲			
۲۲/۸/۶ cd	abcd	۱۱/۰/۲	۴۳۲/۶/۰ abcd	abcde	۷/۱/۸ ab	۲۲/۲/۷ a	۳۸/۲/۸ bcd	۱۸۰/۰/۶ a	۱۲۳/۰/۰ efg hij	۱۰۱/۵/۳ efg h	۱۳		
۲۵/۴/۰ bcd	abcd	۱۱/۸/۷۳	۵۰/۲/۸/۴/۷ abc	۹۴/۸/۱ ab	۵/۷/۴ abcde	۱۷/۲/۱ b	۳۸/۳/۲ bcd	۱۶۴/۱/۳ bcdef	۱۲۰/۲/۶ j	۹۸/۸۰ h	۱۴		
۲۵/۰/۶ bcd	abcd	۱۱/۰/۷۳	۵۶/۹/۲/۷ ab	۱۱/۰/۲/۰ a	۵/۰/۸/۲ abcde	۱۷/۸/۸ ab	۴۰/۴/۶ bcd	۱۷۳/۴/۶ abcd	۱۲۲/۸/۰ fghij	۱۰۳/۵/۳ bcdefg	۱۵		
۲۶/۳۳ bc	abc	۱۲۳/۹/۸	۴۹/۱/۲۷ abcd	abcde	۵/۷/۷ abcd	۱۶/۹/۱ b	۴۱/۴/۵ bc	۱۷۲/۰/۶ abcd	۱۲۱/۶/۰ hij	۱۰۲/۰۰ defgh	۱۶		
۲۳/۰/۶ cd	abcd	۱۱/۰/۱	۳۸/۸/۸/۷ cdefg	bcdefg	۷/۷/۰/۹	۵/۱/۲ de	۱۷/۰/۰ b	۳۶/۷/۸ bcd	۱۶۱/۰/۰ cdef	۱۲۲/۷/۳ ghij	۱۰۱/۴/۰ efg h	۱۷	
۲۳/۸/۰ bcd	۹۸/۴/۳ bcd	۴۵/۷/۸/۰ abcd	abcde	۷/۱/۸ ab	۱۹/۸/۱ ab	۴۱/۶/۷ bc	۱۷۴/۰/۶ abc	۱۲۱/۱/۳ ij	۹۸/۸/۶ h	۱۸			
۲۶/۸/۵ bc	abcd	۱۲/۲/۶	۴۸/۳/۹/۳ abcd	۹۱/۸/۱ ab	۶/۳/۱ a	۱۸/۳/۶ ab	۴۱/۶/۹ bc	۱۶۶/۹/۳ abcdef	۱۲۴/۰/۶ cdefghi	۱۰۱/۶/۰ efg h	۱۹		
۲۴/۳/۳ bcd	۸۸/۴/۰ bcd	۴۴/۱/۶/۷ abcd	abcdef	۷/۸/۹/۴	۵/۰/۰ abcd	۱۸/۱/۸ ab	۳۸/۲/۰ bcd	۱۷۲/۷/۶ abcd	۱۲۴/۷/۶ bcdefgh	۱۰۳/۱/۳ cdefg	۲۰		
۲۶/۶/۶ bc	abcd	۱۶/۴/۹۳	۵۷/۷/۲۰ a	۱۱/۱/۹ a	۵/۸/۶ abcde	۱۶/۸/۳ b	۳۹/۷/۴ bcd	۱۷۵/۰/۶ abc	۱۲۲/۶/۰ defghi	۱۰۰/۴/۰ gh	۲۱		
۲۷/۵/۳ b	۱۳/۸/۵/۳ ab	۴۶/۷/۴/۷ abcd	۸۹/۸/۵ abc	۶/۲/۵ a	۱۸/۵/۰ ab	۳۹/۸/۸ bcd	۱۵۲/۹/۳ fg	۱۲۷/۹/۳ abc	۱۰۷/۶/۰ ab	۲۲			
۳۳/۲/۶ a	۱۷/۴/۷/۸ a	۳۵/۰/۴/۰ defghi	cdefgh	۵/۳/۱/۱	۱۶/۱/۲ abc	۱۸/۹/۸ ab	۳۴/۰/۸ cd	۱۵۸/۴/۶ def	۱۲۵/۹/۶ abcdef	۱۰۵/۶/۵ abcd e	۲۳		
۴/۴/۰	۷۱/۰/۶	۱۵/۸/۶۴	۳۵/۸/۱۹	۰/۹۳	۴/۸/۹	۸/۱۳	۱۵/۱۰	۳/۱۷	۴/۲۵	(%.) LSD			

میانگین‌هایی که در هر ستون دارای حداقل یک حرف مشابه هستند براساس آزمون LSD دارای تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد نمی‌باشند.

تعداد ساقه به ترتیب ۱۳/۹۷ و ۲۸/۶۳ بود که نشاندهنده وجود تنوع ژنتیکی بالا در میان نمونه‌های مورد مطالعه

تنوع ژنتیکی و فنتوپی برای صفات مهمی مانند عملکرد علوفه خشک به ترتیب ۳۶/۷۴ و ۵۹/۸۵ و برای

بررسی تنوع ژنتیکی در

جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای - مرتعی *Agropyron elongatum*

واریانس ژنتیکی مطلوبی داشتند و قابلیت توارث عمومی آنها به ترتیب $84/۹۸$, $۷۱/۵۵$, ۷۵ , $۷۱/۰۸$ و $۶۳/۶۹$ بود، ولی برای بقیه صفات قابلیت توارث عمومی در حد متوسط بود.

برای این صفات بود (جدول ۷). بنابراین، از این تنوع ژنتیکی می‌توان برای بهبود صفات مورد نظر در برنامه‌های بهنژادی استفاده نمود. صفات عملکرد علوفه، روز تا گرده افشاری، روز تا ظهر خوش، قطر یقه و ارتفاع بوته جزء

جدول ۷- برآورده اجزای واریانس، ضریب تنوع و قابلیت توارث صفات در ۲۳ نمونه از گونه *A. elongatum* در سال دوم

صفات	برآورده اجزای واریانس					
	قابلیت توارث عمومی %	ضریب تنوع (CV%)	قابلیت توارث عمومی %	ضریب تنوع (CV%)	قابلیت توارث عمومی %	ضریب تنوع (CV%)
تعداد روز تا ظهر خوش	۷۱/۵۵	۲/۶۹	۲/۲۸	۲/۲۲	۵/۶۰	۷/۸۳
تعداد روز تا گرده افشاری	۷۵/۰۰	۱/۷۸	۱/۰۵	۱/۲۴	۳/۷۳	۴/۹۷
ارتفاع بوته (سانتیمتر)	۶۳/۶۹	۵/۲۵	۴/۱۹	۲۸/۰۹	۴۹/۳۰	۷۷/۳۹
طول خوش (سانتیمتر)	۳۰/۷۰	۸/۶۲	۴/۷۸	۸/۱۴	۳/۷۰	۱۱/۷۵
طول برگ پرچم (سانتیمتر)	۲۲/۱۳	۱۰/۴۷	۴/۹۲	۲/۹۴	۰/۰۳	۳/۷۸
عرض برگ پرچم (سانتیمتر)	۳۸/۰۳	۸/۲۰	۵/۰۶	۰/۱۰	۰/۰۶	۰/۱۷
عملکرد علوفه تر (گرم در بوته)	۷۵/۹۶	۳۸/۱۹	۳۳/۲۹	۱۵۷۹۴/۱۵	۴۹۹۱۲/۸۰	۶۵۷۰۷/۰۰
تعداد ساقه در بوته	۸۴/۹۸	۵۹/۸۵	۳۷/۷۴	۳۰۹۷۴/۸۸	۱۷۵۳۰/۱۸	۲۰۶۲۸/۰۰
قطر یقه (سانتیمتر)	۲۳/۸۱	۲۸/۶۳	۱۳/۹۷	۶۲۱/۶۱	۱۹۴/۳۱	۸۱۵/۹۳
	۶۶/۰۸	۱۰/۶۳	۸/۷۴	۲/۳۹	۴/۶۶	۷/۰۵

همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح احتمال 1% وجود داشت که نشاندهنده آن است که بوتهایی که در چین اول عملکرد بالایی داشتند در چین دوم نیز دارای عملکرد بالا بودند. چون تعداد ساقه و ارتفاع بوته در چین اول اندازه گیری شدند بنابراین همبستگی این صفات با عملکرد علوفه در چین دوم معنی‌دار نشده است.

برآورده ضرایب همبستگی فنتوپی ی صفات در سال اول (جدول ۸) حاکی از همبستگی مثبت و معنی‌دار عملکرد علوفه چین اول با تعداد ساقه و ارتفاع بوته در سطح احتمال 1% می‌باشد. در واقع تعداد ساقه و ارتفاع بوته از مهمترین اجزای عملکرد علوفه به شمار می‌آیند که با افزایش آنها عملکرد علوفه افزایش می‌یابد. همچنین میان عملکرد علوفه در چین دوم با عملکرد علوفه چین اول

جدول ۸- ضرایب همبستگی فنتوپی صفات اندازه‌گیری شده در سال اول ($n = ۶۹$)

صفات	۱	۲	۳	۴	۵
	تعداد ساقه چین اول	ارتفاع بوته چین اول (سانتیمتر)	عملکرد علوفه تر چین اول (گرم در بوته)	عملکرد علوفه خشک چین اول (گرم در بوته)	عملکرد علوفه تر چین دوم (گرم در بوته)
ارتفاع بوته چین اول (سانتیمتر)	۰/۴۲۵**	۰/۰۷۹۰**	۰/۰۷۹۳**	۰/۰۲۳ ns	۰/۱۱۹ ns
عملکرد علوفه تر چین اول (گرم در بوته)	۰/۵۲۷**	۰/۰۴۷۰**	۰/۰۰۹۳ ns	۰/۰۱۳ ns	۰/۰۱۳ ns
عملکرد علوفه خشک چین اول (گرم در بوته)	۱	۰/۰۴۷۰**	۰/۰۴۷۰**	۰/۰۰۹۳ ns	۰/۰۱۳ ns
عملکرد علوفه تر چین دوم (گرم در بوته)	۱	۰/۰۸۴۵**	۰/۰۳۰۵*	۰/۰۲۷۸*	۰/۰۹۴۹**
عملکرد علوفه خشک چین دوم (گرم در بوته)	۱	۰/۰۳۶۲**	۰/۰۳۰۵*	۰/۰۲۷۸*	۰/۰۹۴۹**

*، ** و ns به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال ۵ درصد، ۱ درصد و غیر معنی‌دار.

عملکرد بهتری باشد. از طرف دیگر عملکرد علوفه با صفاتی نظیر ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم، تعداد ساقه و قطر یقه همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح احتمال 1% داشتند. طول خوش و طول برگ پرچم همبستگی معنی‌داری با عملکرد علوفه نداشتند.

ضرایب همبستگی فنتوپی صفات در سال دوم در جدول ۹ آمده است. عملکرد علوفه با صفات روز تا ظهر خوش و روز تا گرده افشاری همبستگی منفی و معنی‌داری در سطح احتمال 1% داشت. بنابراین استنباط می‌شود که هر گیاهی که زودتر به گل می‌رود دارای

جدول ۹- ضرایب همبستگی فنتیپی صفات اندازه‌گیری شده در سال دوم (n=۶۹)

	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	صفات
										تعداد روز تا ظهر خوش
									۱	۰/۸۴۸***
										تعداد روز تا گرده افشاری
										ارتفاع بوته
										طول خوش
										طول برگ پرچم
										عرض برگ پرچم
										عملکرد علوفه تو
										عملکرد علوفه خشک
										عداد ساقه
										قطر یقه
										*
										** و ns به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد، ۱ درصد و غیر معنی دار.

بهبود آنها از طریق برنامه‌های انتخاب فراهم می‌باشد، بنابراین می‌توان از طریق برنامه‌های به نژادی و انتخاب نسبت به تولید ارقام با خصوصیات زراعی مطلوب اقدام نمود.

شکل ۱- گیاه *Agropyron elongatum* در مزرعه آزمایشی

نتایج این پژوهش نشان داد که نمونه‌های ۲۱، ۱۵ و ۱۴ با بیش از ۵۰۰ گرم وزن خشک دارای بیشترین عملکرد علوفه در هر بوته و نمونه‌های ۶ و ۱۳ با ۱۸۰ سانتیمتر دارای بیشترین ارتفاع بوته بودند. در حالی که در مطالعه Vogel & Moore (1998) بیشترین عملکرد علوفه ۴۸۰ گرم در هر بوته و بیشترین ارتفاع ۱۳۸ سانتیمتر گزارش شده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که این گونه سازگاری خوبی به شرایط آب و هوایی کشور داشته و تنوع ژنتیکی کافی برای صفات مختلف از جمله عملکرد علوفه و اجزای آن در میان نمونه‌های مورد مطالعه وجود دارد. به نظر می‌رسد که ارتفاع بوته، تعداد ساقه و قطر یقه از مهمترین اجزای عملکرد علوفه باشند که بهبود آنها باعث افزایش عملکرد علوفه خواهد شد. بنابراین در برنامه‌های به نژادی و انتخاب به منظور افزایش عملکرد علوفه، باید به روابط میان صفات به ویژه اجزای عملکرد با عملکرد علوفه توجه کافی نمود. صفات عملکرد علوفه، روز تا گرده افشاری، روز تا ظهر خوش، قطر یقه و ارتفاع بوته جزء واریانس ژنتیکی مطلوبی داشتند و قابلیت توارث عمومی آنها بالا بود، بنابراین روش‌های مبتنی بر گزینش برای این صفات از کارآیی بالایی برخوردار خواهد بود. بنابراین با توجه به وجود تنوع ژنتیکی و میزان قابلیت توارث نسبتاً بالا برای این صفات، امکان

بررسی تنوع ژنتیکی در

جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای - مرتعی *Agropyron elongatum*

مدیر شانه چی، م.، ۱۳۷۱. تولید و مدیریت گیاهان علوفه‌ای. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. ۴۴۸ صفحه.

مقدم، م. ر.، ۱۳۷۷. مرتع و مرتعداری. انتشارات دانشگاه تهران. ۴۷۰ صفحه.

Halluer, A.R., and Miranda, J.B. 1998. Quantitative genetic in maize breeding. Iowa State Univ, Press, Ames Iowa.

Johnson, R.C. 1991. Salinity resistance, water relations, and salt content of crested and tall wheatgrass accessions. *Crop Sci.* 31:730-734.

Ray, I.M., Frank, A.B. and Berdahl, J.D. 1997. Genetic variances of agronomic and morphological traits of diploid crested wheatgrass. *Crop Sci.* 37: 1503-1507.

Shannon, M.C. 1978. Testing salt tolerance variability among tall wheatgrass lines. *Agron. J.* 65:26-30.

Steel, R.G.D., and Torrie, J.H. 1980. *Principles and procedures of statistics*. A biometrical approach. 2ned. Mc Graw-Hill book company, New York.

Vogel, K.P. and Moore, K.J. 1998. Forage yield and quality of tall wheatgrass accessions in the USDA germplasm collection. *Crop Sci.* 38:509-51.

سپاسگزاری

از مدیریت محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان که امکان اجرای این پژوهش را فراهم نمودند، صمیمانه قدردانی می‌گردد.

منابع مورد استفاده

سنگل، ع.ع.، a. ۱۳۶۸. اصول تولید و نگهداری بذر گیاهان مرتعی و علوفه‌ای. انتشارات وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. ۱۰۸ صفحه.

سنگل، ع.ع.، b. ۱۳۶۸. چگونگی رشد گراسها. انتشارات وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. ۱۱۴ صفحه.

Investigation of genetic variation in tall wheat grass (*Agropyron elongatum* (Host) Beauv.) populations

R. Mohammadi¹, M. Khayyam-Nekouei¹, A.F. Mirlohi² and Kh. Razmjoo²

1- Agricultural Biotechnology Research Institute of Central region of Iran. E-mail: m_riza51@yahoo.com

2- Department of Agronomy and Plant Breeding, Isfahan University of Technology.

Abstract

The objectives of this experiment were to study genetic variation and relationships among 11 traits in 23 accessions of *Agropyron elongatum* for two years. The experiment was conducted in Agricultural Biotechnology Research Institute of Central region of Iran research farm using a randomized complete block design with 3 replications. Results of variance analysis showed significant differences between the accessions for all of the traits in the first year and most traits in the second year. The results also showed that there was considerable phenotypic and genotypic variation for forage yield and number of stems per plant. Broad-sense heritability was high (63-84%) for forage yield, days to heading, crown diameter and plant height. Forage yield per plant had a significant ($P<0.01$) negative correlation with days to heading ($r = -0.53$) and days to pollination ($r=-0.64$), but a significant ($P<0.01$) positive correlation with plant height ($r = 0.33$), flag leaf width ($r = 0.41$), number of stems ($r = 0.6$) and crown diameter($r = 0.4$).

Key words: *Agropyron elongatum* (Host) Beauv., Genetic variation, Heritability and Correlation coefficients.