

بررسی سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس شبدر (*Trifolium spp.*)، در استان آذربایجان شرقی

حمیده جوادی^۱ و سیدمحسن حسامزاده حجازی^۲

۱- مریبی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، E-mail:javadi@rifr-ac.ir

۲- استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، E-mail:smhessamzadeh@rifr-ac.ir

تاریخ پذیرش: ۸۷/۴/۳۱ تاریخ دریافت: ۸۶/۴/۳۱

چکیده

گونه‌های جنس شبدر از لحاظ مورفولوژیکی و سیتوژنتیکی تنوع زیادی نشان می‌دهند. تنوع کاریوتیپی در ۱۱ گونه شبدر از منطقه شمال غرب بر اساس شکل، تعداد و اندازه کروموزومها، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه کاریولوژی نمونه‌های نوک ریشه نشان داد که ۹ گونه با پایه کروموزومی $x=8$ دیپلوئید و ۲ گونه با پایه کروموزومی $x=8$ تراپلوبloid می‌باشند. با اندازه‌گیری عاملهای A₁ (شاخص عدم تقارن درون کروموزومی)، A₂ (شاخص عدم تقارن بین کروموزومی)، TF% (درصد شکل کلی کاریوتیپ)، کلاس تقارن استیبیز (SC) و فرمول کاریوتیپی مشخص گردید که گونه‌های T. canescens و T. pratense دارای کاریوتیپ متقارن‌تری می‌باشند. تجزیه واریانس با طرح پایه کاملاً تصادفی با پنج تکرار برای داده‌های حاصل از اندازه‌گیری هفت ویژگی کاریوتیپی (L/S, L, CI, TL, DRL, L+S) نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در بین گونه‌ها در سطح ۱٪ بود. در مقایسه میانگین این هفت صفت نیز مشخص گردید که گونه T. canescens بیشترین طول بازوی کوتاه (S)، طول بازوی بلند (L) و طول کل کروموزوم (L+S) را دارد. بیشترین مقدار نسبت بازوها (L/S) در گونه T. echinatum می‌باشد که گونه T. arvense و T. repens نسبت کوتاه‌ترین مقدار شاخص سانترومی (CI) در گونه T. pratense دارد. همچنین بیشترین مقدار دامنه طول نسی کروموزومها (DRL) در گونه T. arvense و بیشترین مقدار طول کل ژنوم (TL) مربوط به گونه T. ambiguum و T. repens بود. تجزیه خوشای گونه‌ها به روش Ward توانست کل گونه‌ها را در فاصله اقلیدسی ۲/۵۳ در چهار گروه قرار دهد. بیشترین فاصله اقلیدسی بین دو گونه T. canescens و T. hybridum و کمترین فاصله اقلیدسی بین دو گونه T. striatum و T. phleoides بود. بر این اساس، گونه‌هایی که در یک گروه قرار می‌گیرند، صفات کاریوتیپی مشابه داشته و در نتیجه می‌توانند در تلاقی‌های بین گونه‌ای استفاده شوند.

واژه‌های کلیدی: کاریوتیپ، تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، تجزیه خوشای و آنالیز تصویری.

مقدمه

یکی از بزرگترین جنس‌های تیره بقولات (Fabaceae)

بوده و از گیاهان علوفه‌ای و مرتعی با ارزش بشار می‌رود (حسامزاده حجازی و ضیایی نسب، ۱۳۸۵). انتخاب گیاهان علوفه‌ای علاوه بر تأمین نیازهای غذایی

جنس شبدر (*Trifolium*) با حدود ۲۵۰ گونه علفی یکساله و چند ساله که در مناطق معتدله مرطوب مدیترانه‌ای و برخی قسمتهای سرد دنیا پیدا می‌شوند،

- ۱- شناسایی و تعیین گونه‌های موجود در منطقه شمال غرب کشور
- ۲- جمع آوری بذر و شناسایی دقیق آنها
- ۳- تعیین کاریوتیپ گونه‌ها، مطالعه شکل، اندازه و تعداد کروموزوم‌ها
- ۴- دسته‌بندی گونه‌ها از نظر تکامل کاریوتیپی
- ۵- تعیین گونه‌هایی که امکان تلاقی بین آنها میسر است.

مواد و روشها

به منظور بررسی تنوع کاریوتیپی در گونه‌های مختلف جنس شبدر مربوط به منطقه آذربایجان شرقی، ۱۱ گونه شبدر در مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی مورد مطالعه سیتوژنتیکی قرار گرفت (جدول ۱). به این منظور، بذرهای گونه‌ها پس از ضد عفونی کردن با محلول هیپوکلریت سدیم ۱۵ درصد به مدت ۲ دقیقه، روی کاغذ صافی استریل داخل پتری دیش کشت و در شرایط دمایی ۲۰ درجه سانتیگراد (با ۲ درجه نوسان دمایی)، رطوبت ۷۰٪ و دوره نوری ۱۲ ساعت نگهداری شدند. پس از جوانه‌زنده زمانی که طول ریشه به $1-1/5$ سانتیمتر رسید، نمونه‌گیری انجام شد و مراحل مختلف شامل پیش تیمار (با محلول ۵٪ آلفابرموفتالین به مدت ۴ ساعت در یخچال)، تثیت (با محلول لویتسکی: اسید کرومیک ۱٪ + فرمالین ۱۰٪ به حجم مساوی از هر کدام به مدت ۲۴ ساعت در یخچال)، هیدرولیز (با 1 NaOH) در داخل بن‌ماری ۶۰ درجه به مدت ۱۰-۸ دقیقه) و رنگ‌آمیزی (با هماتوکسیلین به مدت ۳-۴ ساعت در دمای اتاق) روی ریشه‌ها اعمال شد. سپس اسلاید به روش اسکواش درون یک قطره اسید استیک ۴۵٪ تهیه گردید. اسلایدهای آماده شده با میکروسکوپ نوری BX50 و با لنز ۱۰۰ مورد مطالعه قرار گرفتند. تصاویر

دام و انسان، نقش مهمی در حاصلخیزی و حفاظت خاک ایفا می‌کنند. از این رو، انتخاب گیاهان علوفه‌ای مرغوب باعث افزایش تولید، بالا رفتن عملکرد کمی و کیفی علوفه و کم شدن فشار روی مراتع گردیده و در نتیجه تولیدات دامی افزایش می‌یابد (حیدری شریف‌آباد و دری، ۱۳۸۰). در اصلاح ژنتیکی هر گونه گیاهی، داشتن اطلاعات کافی در خصوص سطح پلوریتی و ویژگیهای کاریوتیپی از مهمترین نیازهای اولیه اصلاح‌گران می‌باشد (کریمی، ۱۳۶۷). اطلاعات بدست آمده از مطالعات کروموزومی علاوه بر طبقه‌بندی گیاهان، در تعیین ارتباط بین گیاهان نیز کاربرد دارد (Skula & Mirsa, 1994; Stace, 1984) کاریوتیپی انجام شده در جنس شبدر نشان می‌دهد که تعداد کروموزوم پایه در گونه‌های مختلف آن متفاوت است (۸، ۶، ۷، ۵، $x=5$) و حالت‌های پلی پلوریتی را نیز نشان می‌دهند (Ansari et al., 1999). حتی در یک گونه نیز پایه‌های کروموزومی متفاوتی را گزارش نموده‌اند که این پدیده تنوع می‌تواند حاکی از فاکتورهای اکولوژیکی مربوط به محیط پیدایش آنها باشد (Issolah & Belguerfi, 1999). همچنین، کارهای انجام شده بر روی ۱۹ ژنوتیپ متعلق به ۱۰ گونه شبدر، پایه‌های کروموزومی متفاوت (۸ و ۷، $x=5$) را نشان داده است که این امر بیانگر تنوع بین گونه‌ها می‌باشد. گونه *T. repens* با $2n=4x=32$ تترالپلوریت و گونه *T. pratense* با $2n=2x=14$ دیپلوریت گزارش شده است (حسام‌زاده حجازی و ضیایی نسب، ۱۳۸۵). با توجه به تنوع بالای گونه‌های مختلف جنس شبدر از لحاظ تعداد کروموزوم پایه و خصوصیات سیتوژنتیکی؛ تحقیق حاضر جهت اهداف زیر انجام گرفته است.

DRL و L+S (TL) برای هر کاریوتیپ با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار (5 صفحه متفاصلی) تجزیه آماری شدند. برای تعیین نقش هر یک از صفات اندازه‌گیری شده در ایجاد تنوع بین گونه‌ها از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و Ward برای گروه‌بندی گونه‌ها از تجزیه خوش‌های به روش SAS و تجزیه به استفاده شد. تجزیه آماری در برنامه JMP انجام گرفت. کلاس تقارن استیبنز (SC) (Stebbins, 1971)، شاخص عدم تقارن درون کروموزومی (A₁) و بین کروموزومی (A₂) (Romero & Zarco, 1980)، شکل کلی کاریوتیپ (Huziwara, 1962) (TF%)، میزان کروماتین نسبی (TF%) کروموزوم‌ها/طول کل کروموزوم‌ها=VRC و فرمول کاریوتیپی نیز برای هر گونه جداگانه محاسبه شد.

کروموزومی با استفاده از دستگاه مانیتورینگ و با بزرگنمایی ۲۰۰۰× تهیه شدند. برای هر گونه، ۵ صفحه متفاصلی (تکرار) در نظر گرفته شد. برای هر متفاصل پس از تهیه کاریوتیپ در نرم افزار Photoshop بازوهای کروموزوم‌ها و طول کل آنها با استفاده از نرم افزار MicroMeasure اندازه‌گیری و نهايیتا برای هر کاریوتیپ ميانگين طول بازوی کوتاه، بازوی بلند و طول کل کروموزوم محاسبه شد. عاملهای نسبت بازوها (Arm ratio:L/S) (Levan *et al.*, 1964) به روش لوان (Arm ratio:L/S) شاخص سانترومی (CI=S /L+S)، دامنه طول نسبی کروموزوم‌ها (طول نسبی کوتاهترین کروموزوم- طول نسبی بلندترین کروموزوم= DRL=L+S) و طول کل ژنوم (TL=Σ) برای هر صفحه متفاصلی محاسبه و نهايیتا داده‌های بدست آمده از محاسبه هفت عامل کاریوتیپی (L, S, CI, L/S).


جدول ۱- گونه‌های مورد مطالعه شبد

ردیف	گونه	محل جمع‌آوری	ارتفاع(متر)
۱	<i>T. canescens</i> Willd.	ارسیاران- نرسیده به سه راهی عباس‌آباد	۱۲۰۰
۲	<i>T. hybridum</i> L.	کوه میشو- ورودی دره سیوان	۱۶۵۰
۳	<i>T. echinatum</i> M.B.	ارسیاران- مسیر روستای وینه	۱۲۰۰
۴	<i>T. fragiferum</i> L.	کوه میشو- دره سیوان	۱۷۰۰
۵	<i>T. suffocatum</i> L.	ارسیاران- نرسیده به سه راهی عباس‌آباد	۱۸۵۰
۶	<i>T. pratense</i> L.	کوه میشو- دره سیوان	۱۶۵۰
۷	<i>T. arvense</i> L.	ارسیاران- نرسیده به سه راهی عباس‌آباد	۱۹۰۰
۸	<i>T. phleoides</i> P.W.	ارسیاران- نرسیده به سه راهی عباس‌آباد	۱۸۵۰
۹	<i>T. striatum</i> L.	ارسیاران- نرسیده به سه راهی عباس‌آباد	۱۸۵۰
۱۰	<i>T. ambiguum</i> M.B.	مشگین شهر- مراتع سبلان	۲۵۰۰
۱۱	<i>T. repens</i> L.	کوه میشو- دره سیوان	۱۶۰۰

نتایج

میتوزی گونه‌ها در شکل ۱ ارائه شده است.

در این بررسی، مطالعه کاریولوژیکی بر اساس شکل، اندازه و تعداد کروموزوم‌ها انجام گرفت. تصویر متفاصل



شکل ۱- تصاویر متاباز میتوزی در گونه‌های مورد مطالعه شبدر



ادامه شکل ۱- تصاویر متافاز میتوزی در گونه‌های مورد مطالعه شبدر

در گونه‌های مورد مطالعه نه گونه با پایه کروموزومی $x=8$ و گونه با پایه کروموزومی $x=7$ دیپلولئید و دو گونه با پایه کروموزومی $x=8$ در گونه‌های مورد مطالعه بودند (جدول ۲).

جدول ۲- تعداد کروموزوم پایه و سوماتیک، کلاس تقارن استیبیز (SC)، شاخص‌های عدم تقارن (A_1 و A_2)، درصد شکل کلی کاریوتیپ (TF%)، دامنه طول نسبی کروموزوم‌ها (DRL)، میزان کروماتین نسبی (VRC) و فرمول کاریوتیپی در گونه‌های مورد مطالعه شبدر

گونه	دوره رویشی	n	x	SC	A_1	A_2	TF%	DRL	VRC	فرمول کاریوتیپی
<i>T. canescens</i>	چند ساله	۱۶	۸	۱A	۰/۲۶۳۹	۰/۰۸۶۴	۳۹/۴۶۲۳	۴/۳۵	۲/۱۶۴۴	۷m+۱Sm
<i>T. hybridum</i>	چند ساله	۱۶	۸	۲A	۰/۴۴۷۳	۰/۱۴۷۹	۳۳/۱۷۷۸	۷/۴۷	۱/۹۸۸۹	۳m+۵Sm
<i>T. echinatum</i>	یک ساله	۱۶	۸	۲A	۰/۴۹۰۲	۰/۱۴۲۰	۳۲/۰۵۱۸	۵/۹۳	۲/۳۵۶۲	۷Sm+۱St
<i>T. fragiferum</i>	چند ساله	۱۶	۸	۱A	۰/۳۲۲۵	۰/۱۴۹۶	۳۷/۶۳۹۱	۷/۲۳	۲/۴۲۲۷	۸M
<i>T. suffocatum</i>	یک ساله	۱۶	۸	۱A	۰/۳۷۱۴	۰/۰۷۹۲	۳۷/۴۶۷۱	۲/۵۴	۱/۸۲۷۴	۵m+۳Sm
<i>T. pratense</i>	چند ساله	۱۴	۷	۱A	۰/۲۵۴۷	۰/۱۶۲۳	۳۹/۴۹۴۰	۷/۲۷	۲/۱۳۸۲	۷M
<i>T. arvense</i>	یک ساله	۱۴	۷	۱A	۰/۳۴۵۳	۰/۱۷۲۲	۳۷/۰۱۸۹	۸/۴۶	۲/۳۱۳۱	۶m+۱Sm
<i>T. phleoides</i>	یک ساله	۱۴	۷	۱A	۰/۳۱۱۹	۰/۱۳۳۲	۳۸/۳۷۹۳	۷/۴۸	۱/۹۵۳۶	۷M
<i>T. striatum</i>	یک ساله	۱۴	۷	۱A	۰/۳۱۱۳	۰/۱۲۵۷	۳۸/۰۱۴۳	۷/۳۰	۱/۶۸۴۸	۷M
<i>T. ambiguum</i>	چند ساله	۳۲	۸	۱A	۰/۳۶۰۶	۰/۰۷۹۸	۳۶/۵۴۱۸	۲/۰۷	۲/۱۱۵۲	۱۲m+۴Sm
<i>T. repens</i>	چند ساله	۳۲	۸	۱A	۰/۳۴۲۷	۰/۱۵۲۴	۳۷/۱۱۶۹	۴/۲۰	۲/۲۲۵۴	۱۲m+۴Sm

دلالت بر تنوع ژنتیکی کافی به منظور گزینش برای صفات مورد نظر است (جدول ۳). نتایج حاصل از مقایسه میانگین این هفت ویژگی در جدول ۴ آورده شده است.

نتیجه تجزیه واریانس داده‌های حاصل از اندازه‌گیری هفت ویژگی کاریوتیپی (L, S, L/S, DRL, CI, TL) نشان داد که در بین گونه‌ها از لحاظ این صفات اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال ۱٪ وجود دارد که

جدول ۳- میانگین مربوطات حاصل از تجزیه واریانس صفات کاریوتیپی مورد مطالعه

منابع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربوطات						
		L+S	L	S	L/S	CI	DRL	TL
بین گونه‌ها	۱۰	۰/۷۶۹**	۰/۲۸۲**	۰/۱۴۳**	۰/۱۶۵**	۰/۰۰۴**	۱۸/۲۰**	۳۲۹/۰۱**
اشتباه آزمایشی	۴۴	۰/۱۲۵	۰/۰۵۴	۰/۰۱۳	۰/۰۳۲	۰/۰۰۱	۲/۱۱	۹/۰۶
CV%	-	۱۶/۰۸	۱۸/۰۵۴	۱۴/۰۸	۱۱/۰۵۵	۵/۰۶۳	۲۵/۰۶۲	۱۵/۰۶

**: معنی دار در سطح احتمال ۱٪

جدول ۴- مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه به روش دانکن در سطح احتمال ۱٪


گونه	L+S	L	S	L/S	CI	DRL	TL
<i>T. canescens</i>	۳/۱۶۴ a	۱/۷۳۱ a	۱/۲۴۹ a	۱/۳۸۷ c	۰/۴۵ ab	۴/۳۵ cde	۲۵/۳۲ b
<i>T. hybridum</i>	۱/۹۸۹ bc	۱/۲۰۵ bc	۰/۶۶۰ c	۱/۸۳۸ ab	۰/۳۸ b	۷/۴۷ ab	۱۵/۹۱ cdef
<i>T. echinatum</i>	۲/۳۵۶ bc	۱/۵۰۹ ab	۰/۷۵۵ bc	۱/۹۴۵ a	۰/۳۷ b	۵/۹۳ bcd	۱۸/۸۵ cd
<i>T. fragiferum</i>	۲/۴۲۳ b	۱/۳۵۲ ab	۰/۹۱۲ b	۱/۴۸۹ c	۰/۴۳ abc	۷/۲۳ bc	۱۹/۳۸ c
<i>T. suffocatum</i>	۱/۸۲۷ bc	۱/۰۷۹ bc	۰/۶۶۶ c	۱/۶۱۲ bc	۰/۴۱ c	۳/۵۴ ef	۱۴/۶۲ def
<i>T. pratense</i>	۲/۱۳۸ bc	۱/۱۳۱ bc	۰/۸۴۴ bc	۱/۳۴۵ c	۰/۴۶ a	۷/۲۷ ab	۱۴/۹۷ def
<i>T. arvense</i>	۲/۳۱۳ bc	۱/۳۰۹ bc	۰/۸۵۶ bc	۱/۵۲۹ bc	۰/۴۲ bc	۸/۴۶ a	۱۷/۱۹ cde
<i>T. phleoides</i>	۱/۹۵۴ bc	۱/۰۹۲ bc	۰/۷۵۰ bc	۱/۴۶۳ c	۰/۴۴ abc	۷/۴۸ ab	۱۳/۶۸ ef
<i>T. striatum</i>	۱/۶۸۵ c	۰/۹۳۳ c	۰/۶۴۰ c	۱/۴۶۴ c	۰/۴۴ abc	۶/۳۰ bc	۱۱/۷۹ f
<i>T. ambiguum</i>	۲/۱۱۵ bc	۱/۲۲۰ bc	۰/۷۷۳ bc	۱/۵۸۲ bc	۰/۴۳ abc	۲/۰۷ f	۳۳/۸۴ a
<i>T. repens</i>	۲/۲۲۶ bc	۱/۲۶۸ bc	۰/۸۲۶ bc	۱/۵۳۳ bc	۰/۴۳ abc	۴/۲۰ de	۳۵/۶۱ a

براساس صفات کاریوتیپی، تجزیه خوشه‌ای به روش Ward انجام شد (شکل ۳). با برش دندروگرام در فاصله ژنتیکی ۲/۵۳ کل گونه‌ها در چهار گروه قرار گرفتند.


برای تعیین سهم هر یک از صفات کاریوتیپی مورد استفاده در تنوع بین گونه‌ها، از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی نتایج آن در جدول ۵ و پلات مربوطه در شکل ۲ آورده شده است. همچنین برای گروه‌بندی گونه‌ها

جدول ۵- مقادیر ویژه، ضرایب بردارهای ویژه و درصد واریانس سه مؤلفه اصلی اول، دوم و سوم حاصل از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

ویژگی کاریوتیپی	TL	DRL	CI	L/S	S	L	L+S	ویژگی کاریوتیپی
ریشه‌های راکد								۰/۲۴۶
درصد واریانس								۰/۲۴۹
درصد واریانس تجمعی								۰/۱۹۵
								۰/۰۶۱
								-۰/۰۱۰
								۰/۷۲۴
								-۰/۰۵۰
								۱/۴۲۵
								۲۰/۳۶۲
								۹۵/۹۸۴



شکل ۲- دیاگرام پراکنش گونه‌های شبدر براساس دو مؤلفه اصلی اول و دوم حاصل از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، در ویژگیهای کاریوتیپی



شکل ۳- دیاگرام پراکنش گونه‌های شبدر حاصل از تجزیه خوش‌های به روشنی Ward از نظر ویژگیهای کاریوتیپی

بحث

و DRL (معرف عاملهای عدم تقارن بین کروموزومی) یک رابطه خطی و مستقیم است با توجه به این که در گونه‌های مورد بررسی این رابطه نیز مستقیم و خطی است، بنابراین اندازه‌گیری یکی از دو عامل فوق جهت تعیین تغییرات بین کروموزومی کفایت می‌کند.

بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگینها، که در جدول ۴ آورده شده است، گونه *T. canescens* بیشترین طول کل، طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه کروموزوم را بخود اختصاص داد و با سایر گونه‌ها اختلاف معنی‌داری را در سطح احتمال ۱ درصد نشان داد. گونه *T. hybridum* و *T. echinatum* بیشترین مقدار نسبت بازوها (L/S) و کمترین مقدار شاخص سانترومی (CI) را نشان دادند. در حالی که گونه *T. pratense* را نشان دادند که این امر نیز بیانگر بالا بودن درجه تکاملی در دو گونه *T. hybridum* و *T. echinatum* نسبت به بقیه گونه‌های است. بیشترین طول کل ژنوم (TL)، مربوط به دو گونه *T. repens* و *T. ambiguum* است و در بین دیپلولئیدها گونه *T. canescens* بعلت داشتن بیشترین طول کل کروموزوم، بیشترین طول ژنوم را نشان داد.

در تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، بر اساس هفت صفت کاریوتیپی (L, S, CI, L/S, TF% و TL)، سه مؤلفه اول، دوم و سوم توانست بیش از ۹۵٪ از واریانس کل را توجیه کند. مقادیر بردارهای راکد براساس مؤلفه اول برای صفات طول کل کروموزوم (L+S)، طول بازوی بلند (L) و طول بازوی کوتاه (S)، بر اساس مؤلفه دوم برای صفات نسبت بازوها (L/S) و شاخص سانترومی (CI) و برای مؤلفه سوم، صفات اختلاف دامنه طول نسبی کروموزومها (DRL) و طول کل ژنوم (TL) معنی‌دار بدست آمد.

وجود پایه‌های کروموزومی متفاوت دلیل بر تنوع بین گونه‌ها بوده و این موضوع قبل از اثبات رسیده است (حسامزاده حجازی و ضیایی نسب، ۱۳۸۵). در گونه‌های دیپلولئید یک جفت و در تراپلولئیدها دو جفت کروموزوم ماهواره‌دار مشاهده گردید که ماهواره بر روی بازوی کوتاه کروموزوم واقع بود. از نظر تیپ کروموزومی بیشتر گونه‌های مورد مطالعه دارای کروموزوم‌های متسانتریک بوده و در جدول دو طرفه استیبنز در کلاس ۱A قرار می‌گیرند. این موضوع نشان دهنده تقارن کاریوتیپی *T. hybridum* و *T. echinatum* آنهاست، به استثناء گونه *T. canescens* که در کلاس ۲A واقع می‌شوند. این دو گونه بیشترین مقدار شاخص عدم تقارن درون کروموزومی (A₁) و نسبت بازوها (L/S)، همچنین کمترین مقدار TF% را بخود اختصاص دادند. بنابراین، همه موارد فوق نشان می‌دهند که کاریوتیپ در این دو گونه نسبت به سایر گونه‌ها نامتقارن است. فاکتورهای A₁ و TF%، عنوان عاملهای متقارن بودن درون کروموزومی هستند که رابطه آنها با هم یک رابطه معکوس است. با توجه به این که در گونه‌های مورد مطالعه، این دو فاکتور رابطه معکوس نشان دادند، بنابراین با اندازه‌گیری یکی از دو عامل فوق، به میزان متقارن و نامتقارن بودن کروموزوم‌ها پی خواهیم برد (حسامزاده حجازی و ضیایی نسب، ۱۳۸۵). گونه‌های A₁ و *T. canescens* و *T. pratense* با داشتن کمترین مقدار TF% دارای کاریوتیپ متقارن بودند. بیشترین مقدار عدم تقارن بین کروموزومی (A₂) و اختلاف طول نسبی کروموزوم‌ها (DRL) در گونه *T. arvense* و کمترین مقدار مقدار این دو عامل در گونه *T. ambiguum* مشاهده شد (رابطه مستقیم A₂ با DRL). روند تغییرات دو عامل A₂

بنابراین گزینش بر اساس اولین، دومین و سومین مؤلفه، منجر به گزینش گونه‌هایی خواهد شد که از لحاظ صفات یاد شده دارای اهمیت بالایی هستند.

T. hybridum و *T. echinatum* دارای کاریوتیپ نامتقارن بوده و در یک گروه مجزا از بقیه گونه‌ها قرار می‌گیرند، بنظر می‌رسد که این دو گونه بعلت داشتن کاریوتیپ نامتقارن، گونه جدید باشند.

منابع مورد استفاده

حسامزاده حجازی، س.م. و ضیائی نسب، م.، ۱۳۸۵. بررسی کاریولوژیکی برخی از گونه‌های جنس شبدر موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران، مجله زیست‌شناسی ایران، ۱۹(۳): ۲۹۹-۳۱۳.

حیدری شریف‌آباد، ح. و دری، مع.، ۱۳۸۰. نباتات علوفه‌ای (نیامداران) جلد اول. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران.

کریمی، هادی. ۱۳۶۷. زراعت و اصلاح گیاهان علوفه‌ای. انتشارات دانشگاه تهران.

Ansari, H.A., Ellison, N.W., Reader, S.M., Badaeva, E.D., Bernd Friebe, T.E. Miller and Willians, W.D., 1999. Molecular Cytogenetic Organization of 5S and 18S-26S r DNA Loci in White Clover (*Trifolium repens* L.) and related species. Annals of Botany. 83:199-206.

Huziwara, Y., 1962. Karyotype analysis in some genera of *compositae*. VIII. Further studies on the chromosome of *Aster*. Amer. J. Bot. 49: 112-116.

Issolah, R. and Belguerfi, A., 1999. Chromosome number within some spontaneous population of 10 *Trifolium* species in Algeria. Caryologia. 52:151-154.

Levan, A., Fredga and A. Sandberg, 1964. Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas, 52: 201-220.

Romero, Zarco, C. 1980. A new method for estimating karyotype asymmetry. Taxon, 35: 526-630.

Skula, P. and Misra, S. P., 1994. An introduction to taxonomy of angiosperms. VIKS publishing House Put LTD, New Delhi, 256 PP.

Stace, C.A., 1984. Plant taxonomy and biosystematics. Pitman Press, Bath, 382 PP.

Stebbins, G.L., 1971. Chromosome evolution in higher plants. Addison-Wesleg, New York, USA.

بنابراین گزینش بر اساس اولین، دومین و سومین مؤلفه، منجر به گزینش گونه‌هایی خواهد شد که از لحاظ صفات یاد شده دارای اهمیت بالایی هستند.

نتایج حاصل از تجزیه خوش‌های با نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی مطابقت می‌کند. افرادی که در یک گروه قرار دارند از لحاظ ویژگی‌های کاریوتیپی بهم شبیه‌ند. گونه *T. canescens* در کلاس جداگانه از بقیه گونه‌ها قرار می‌گیرد با توجه به مواردی که قبلاً یاد شد، تنها عاملی که سبب جدایی این گونه از بقیه گونه‌ها شده است، داشتن بیشترین طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه و طول کل کروموزوم است و این سه صفت به عنوان صفات مهم در مؤلفه اصلی اول بودند. گونه *T. hybridum* بهدلیل داشتن بیشترین مقدار نسبت بازوها (L/S) و کمترین مقدار شاخص سانترومی (CI) و در نتیجه، داشتن کاریوتیپ نامتقارن و تکامل یافته‌تر، از بقیه گونه‌ها جدا افتاده‌اند و دو گونه *T. ambiguum* و *T. repens* با توجه به تترالپوئید بودن و داشتن بیشترین طول کل ژنوم در یک گروه هستند. بقیه گونه‌ها در یک کلاس جداگانه قرار می‌گیرند که در این گروه، گونه *T. suffocatum* و *T. fragiferum* با پایه‌های کروموزومی متفاوت با سایر افراد گروه، با داشتن شباهت در طول کل، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه و نسبت بازوها کروموزوم‌ها، با بقیه افراد در یک گروه واقع شده‌اند. بیشترین فاصله ژنتیکی بین دو گونه *T. canescens* و *T. hybridum* و کمترین فاصله ژنتیکی بین دو گونه *T. striatum* و *T. phleoides* وجود دارد.

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه خوش‌های PCA و مقادیر A₁ و TF%، مشخص گردید که دو گونه

A cytogenetic study of some species of *Trifolium* in Eastern Azarbayjan province

H. Javadi¹ and S.M. Hesamzadeh Hejazi²

1- Member of Scientific Board, Research Institute of Forests & Rangelands, E-mail:javadi@rifr.ac.ir
2-Assistant Professor, Research Institute of Forests & Rangelands, E-mail:smhessamzadeh@rifr.ac.ir

Abstract

The species of *Trifolium* differ from each other based on morphology and cytogenetic characters. For study of karyotype variation, 11 species of *Trifolium* were selected from North-West in Iran and karyological study was performed on number, size and type of chromosomes. Results of karyological studies in root tip samples showed that nine species were diploid with $x=7$ or 8 and two species were tetraploid with $x=8$. Based on A_1 , A_2 , TF%, SC and formula of karyotype *T. pratense* and *T. canescens* had much symmetrical karyotype. Analysis of variance for seven karyotype characters (L, S, L/S, CI, DRL, L+S, and TL) based on randomized complete design with five replications was performed. The results showed significant differences between the species ($p<0.1$). *T. canescens* had the highest total length (L+S), long (L) and short arm characters. For arm ratio (L/S) trait, *T. hybridum* had the highest and for CI *T. pratense* showed the highest average values. Also the highest DRL value was, obtained in *T. arvense* and the highest TL value was obtained in *T. ambiguum* and *T. repens*. Cluster analysis divided the species into 4 groups. The highest metric distance was obtained between *T. canescens* and *T. hybridum*, and lowest metric distance values were obtained between *T. phleoides* and *T. striatum*. The species which located in same group have similar karyotype, so they can be used in interspecific crossing.

Keywords: Cluster analysis, principal components analysis and image analysis