



برآورد پارامتر قابلیت اطمینان با تابع مفصل برای مولفه‌های دارای توزیع نمایی تعمیم‌یافته

محمد نصیری فر، محمدرضا آخوند، محمدرضا زادکرمی

گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده: پارامتر قابلیت اطمینان برای اکثر خانواده توزیع‌های حاشیه‌ای با فرض استقلال بین دو مؤلفه قدرت و تحمل برآورد شده است، اما متأسفانه کمتر در مورد دو مؤلفه بهم وابسته بحث شده است. به تازگی روشی مبتنی بر تابع مفصل برای برآورد پارامتر قابلیت اطمینان تحت فرض وجود همبستگی بین مولفه‌های قدرت و تحمل ارائه شده است. در این مقاله از این روش برای برآورد پارامتر قابلیت اطمینان وقتی توزیع مؤلفه‌ها نمایی تعمیم‌یافته باشد استفاده شده است. برای این منظور توابع مفصل فارلی - گامبل - مورگنسترن، فارلی - گامبل - مورگنسترن تعمیم‌یافته و فرانک به کار گرفته شده است. سپس مطالعه‌ای شبیه‌سازی به منظور نشان دادن تناسب برآوردهای بدست آمده انجام شده است. در پایان پارامتر قابلیت اطمینان برای داده‌های توزیع نسبی جمعیت برحسب گروه‌های عمده سنی به تفکیک مناطق شهری و روستایی ایران در سال ۱۳۹۰ برآورد شده است.

واژه‌های کلیدی: پارامتر قابلیت اطمینان، مفصل فرانک، مفصل فارلی - گامبل - مورگنسترن، مفصل فارلی - گامبل - مورگنسترن تعمیم‌یافته.

آدرس الکترونیک مسئول مقاله: محمدرضا آخوند، Mr. Akhoond@Scu.ac.ir
کد موضوع بندی ریاضی (۲۰۱۰): 62N02, 62N05, 62F10

۱ مقدمه

مطالعات فراوانی در مورد مدل‌های قدرت-تحمل^۱ انجام شده است، این مدل شامل دو متغیر تصادفی X و Y است و پارامتر موردها $R = P(Y < X)$ می‌باشد. به‌طور طبیعی X را می‌توان به‌عنوان قدرت یک ساختار و Y را به‌عنوان تحمل آن در نظر گرفت. به احتمال R پارامتر قابلیت اطمینان گفته می‌شود. تمرکز در مدل‌های قدرت-تحمل بر روی ارزیابی R است. این مدل‌ها ابتدا فقط در علوم مهندسی و فیزیک کاربرد داشتند اما با گذشت زمان در بسیاری از علوم دیگر جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و مورد استفاده قرار گرفتند. تا اواخر دهه ۸۰ برآورد R برای اکثر خانواده توزیع‌های معمول آماری برای حالتی که X و Y مستقل از هم باشند، به دست آمد. به‌عنوان مثال می‌توان به کارهای اواد و گراف (۱۹۸۶)، کنستانتین و همکاران (۱۹۸۶)، اسماعیل و همکاران (۱۹۸۶)، ایواز (۱۹۸۷)، ریزر و گاتمن (۱۹۸۶) و وینو و همکاران (۱۹۸۴) اشاره کرد. همه موارد ذکر شده با تکیه بر فرض استقلال قدرت و تحمل به دست آورده شده‌اند. با این حال توجه کمتری به ارزیابی R در زمینه‌های واقعی‌تر که X و Y وابسته هستند، شده است. در بسیاری از شرایط واقعی بین X و Y یک وابستگی وجود دارد. تلاش‌هایی برای ارزیابی R با در نظر گرفتن رابطه بین X و Y با فرض یک توزیع دو متغیره از قدرت و تحمل انجام شده است. به‌عنوان مثال: نرمال دو متغیره (گوپتا و سوبرامانین، ۱۹۹۸)، پارتو دو متغیره (هنگال، ۱۹۹۷؛ جیواناند ۱۹۹۷)، نمایی دو متغیره (ناداراجه و کوتز، ۲۰۰۶)، بتای دو متغیره (ناداراجه، ۲۰۰۵)، گامای دو متغیره (ناداراجه، ۲۰۰۴) و لگ نرمال دو متغیره (گوپتا و همکاران، ۲۰۱۲).

با این حال، نقطه ضعف این روش‌ها این است که توزیع چند متغیره اغلب یک شکل خاص از وابستگی بین حاشیه‌ها را در نظر می‌گیرد و اینکه توزیع‌های حاشیه‌ای آن‌ها از یک نوع هستند. برای رفع این نقطه ضعف‌ها دوما و جوردانو (۲۰۱۳) روشی جدید برای ارزیابی R ارائه دادند، که در آن از تابع مفصل به‌منظور به دست آوردن توزیع توأم مؤلفه‌های X و Y تحت فرض عدم استقلال این مؤلفه‌ها استفاده می‌شود. آنها R را با مفصل‌های فارلی - گامبل - مورگنسترن^۲، (FGM) تعمیم‌یافته فارلی - گامبل - مورگنسترن^۳ (GFGM) و فرانک به دست آوردند که با مفصل‌های FGM و GFGM پارامتر قابلیت اطمینان شکل بسته ریاضی خواهد داشت، اما با مفصل فرانک شکل بسته ریاضی ندارد و باید بر اساس روش‌های عددی محاسبه شود. در این مطالعه پارامتر قابلیت اطمینان را با در نظر گرفتن توزیع متغیرهای حاشیه‌ای به‌صورت نمایی تعمیم‌یافته بر

¹Stress-strength reliability model

²Farlie-Gumbel-Morgenstern

³Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern

اساس روش پیشنهادی دوما و جوردانو (۲۰۱۳) برآورد می‌شود. توزیع نمایی تعمیم‌یافته دارای تابع چگالی تک مدی چوله به راست است و تابع خطر یکنواختی مشابه با توزیع وایبل و گاما دارد. این توزیع برای تحلیل داده‌های طول عمر همانند توزیع‌های وایبل، گاما و لگ نرمال مفید است. در بخش ۲ نمادها و یک مرور کوتاه بر تابع مفصل ارائه خواهد شد. در بخش ۳ روش تابع مفصل را برای برآورد R تحت فرض وجود وابستگی بین مؤلفه‌ها بر اساس سه مفصل FGM، GFGM و فرانک معرفی خواهیم کرد. در بخش ۴ نتایج مربوط به شبیه‌سازی با مفصل FGM، GFGM و فرانک ارائه خواهد شد. در بخش ۵ نیز یک مثال عددی بر اساس داده‌های واقعی ارائه می‌شود و در آخر به بحث و نتیجه‌گیری پرداخته خواهد شد.

۲ تابع مفصل

بنابر قضیه اسکالر (۱۹۵۹) یک مفصل دو بُعدی تابعی همانند C است که از مجموعه $[0, 1]^2$ به بازه یکتای $[0, 1]$ رفته و در شرایط زیر صدق می‌کند:

الف. برای هر $u, v \leq 1$ و $0 \leq u, v$

$$C(u, 0) = C(0, v) = 0, C(u, 1) = u, C(1, v) = v$$

ب. برای هر u_1, u_2, v_1, v_2 که $0 \leq u_1 < u_2 \leq 1$ و $0 \leq v_1 < v_2 \leq 1$ باشد:

$$C(u_2, v_2) - C(u_2, v_1) - C(u_1, v_2) + C(u_1, v_1) \geq 0$$

بنابراین مفصل دو بُعدی $C(\cdot, \cdot)$ یک توزیع دو متغیره از $[0, 1]^2$ با حاشیه‌های یکنواخت $U(0, 1)$ بر

بازه $[0, 1]$ است. در حقیقت بر اساس قضیه اسکالر (۱۹۵۹) هر توزیع دو متغیره $H(x, y)$ از متغیره‌های X و Y با تابع حاشیه‌های $F(x)$ و $G(y)$ را می‌توان به صورت $H(x, y) = C(F(x), G(y))$ نوشت، که در آن C تابع مفصل است؛ بنابراین هر مفصل، همراه با توابع حاشیه‌ای، به ما اجازه می‌دهد تا ساختار توزیع توأم را به دست آوریم. تابع چگالی توأم نیز بر اساس تابع مفصل به صورت

$$h(x, y) = c(F(x), G(y)) f(x) g(y)$$

قابل محاسبه است که در آن $c(F(x), G(y)) = \frac{\partial^2 C(F(x), G(y))}{\partial F(x) \partial G(y)}$ چگالی مفصل، $f(x)$ و $g(y)$ نیز چگالی‌های حاشیه‌ای هستند.

۳ برآورد R تحت مؤلفه‌های وابسته با تابع مفصل

دوما و جوردانو (۲۰۱۳) باهدف بررسی نقش وابستگی میان مؤلفه‌ها بر مدل‌های قدرت-تحمل، قابلیت اطمینان را تحت یک توزیع دو متغیره که با تابع مفصل به دست می‌آید، بررسی کردند. لازم به ذکر است که بر اساس این روش هیچ لزومی بر یکسان بودن توزیع‌های حاشیه‌ای وجود ندارد. اندازه R برای X و Y وابسته به صورت

$$R = P(Y < X) = \int_0^{\infty} \int_0^x h(x, y) dy dx = \int_0^{\infty} \int_0^x f(x)g(y)c(F(x), G(y)) dy dx \quad (1)$$

است.

۱.۳ برآورد R با تابع مفصل FGM

تابع مفصل FGM نخستین بار توسط مورگنسترن (۱۹۵۶) به صورت

$$C(u_1, u_2; \theta) = u_1 u_2 (1 + \theta(1 - u_1)(1 - u_2)), -1 \leq \theta \leq 1$$

با چگالی مفصل

$$c(u_1, u_2) = 1 + \theta(1 - 2u_1)(1 - 2u_2)$$

معرفی شد. در حالتی که متغیرها از هم مستقل باشند، $\theta = 0$ خواهد بود. در میان معیارهای همبستگی برای این تابع مفصل، τ کندال برابر $\tau = \frac{2\theta}{9}$ و ρ اسپرمن برابر $\rho = \frac{\theta}{3}$ است. این تابع مفصل به دلیل دارا بودن فرم ساده و مناسب، در عمل کاربرد فراوانی دارد، اما این مفصل فقط برای وابستگی‌های ضعیف مناسب است به گونه‌ای که ضریب ρ اسپرمن و τ کندال برای این مفصل به ترتیب از 0.33 و 0.22 تجاوز نمی‌کنند. با جایگذاری مفصل FGM در رابطه (۱) داریم:

$$\begin{aligned} R &= P(Y < X) = \int_0^{\infty} \int_0^x f(x)g(y)c(F(x), G(y)) dy dx \\ &= \int_0^{\infty} \int_0^x f(x)g(y) dy dx + \theta \int_0^{\infty} \int_0^x (1 - 2F(x))(1 - 2G(y))f(x)g(y) dy dx. \end{aligned}$$

همچنین R را می‌توان به صورت ترکیب خطی

$$R = R_I + \theta D \quad (۲)$$

نوشت، که در آن

$$R_I = \int_0^{\infty} \int_0^x f(x)g(y)dydx \quad (۳)$$

نشان‌دهنده قابلیت اطمینان برای مؤلفه‌های قدرت و تحمل مستقل ($\theta = 0$) و

$$D = \int_0^{\infty} \int_0^x (1 - F(x))(1 - G(y)) f(x)g(y) dydx \quad (۴)$$

نشان‌دهنده سهم وابستگی مؤلفه‌ها، در صورت وجود، بر R است. رابطه (۲) که از این پس R -خطی نامیده می‌شود، ویژگی منحصر به فرد این خانواده است، به این معنی که فقط برای FGM و تعمیم‌های آن برقرار است (دوما و جوردانو، ۲۰۱۳).

توزیع سه پارامتری نمایی تعمیم‌یافته (GE) دارای تابع توزیع تجمعی

$$F(x) = (1 - \exp(-\lambda(x - \mu)))^\alpha; x > \mu, \lambda, \alpha > 0$$

و تابع چگالی

$$f(x) = \alpha \lambda (1 - \exp(-\lambda(x - \mu)))^{\alpha-1} \exp(-\lambda(x - \mu)); x > \mu, \lambda, \alpha > 0$$

است، که در آن α ، μ و λ به ترتیب پارامترهای شکل، مکان و مقیاس توزیع هستند. از این به بعد توزیع نمایی تعمیم‌یافته با $GE(\alpha, \lambda, \mu)$ نشان داده می‌شود. فرض کنید $X \sim GE(\alpha, \lambda, 0)$ و $Y \sim GE(\beta, \lambda, 0)$ ، بنابراین تابع توزیع X و Y به ترتیب به صورت $F(x) = (1 - \exp(-\lambda x))^\alpha$ و $G(y) = (1 - \exp(-\lambda y))^\beta$ خواهند بود. بنابراین

$$R_I = \int_0^{\infty} \int_0^x f(x)g(y)dydx = \int_0^{\infty} f(x)G(x)dx = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad (۵)$$

و

$$\begin{aligned} D &= \int_0^{\infty} \int_0^x (1 - F(x)) (1 - G(y)) f(x) g(y) dy dx \\ &= \int_0^{\infty} (1 - F(x)) (G(x) - G^{\vee}(x)) f(x) dx \\ &= \alpha \frac{\beta}{\alpha + \beta} - \frac{1}{\alpha + \beta} - \frac{\beta}{\alpha + \beta} \end{aligned} \quad (۶)$$

در نتیجه

$$R = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} + \theta \alpha \left[\frac{\beta}{\alpha + \beta} - \frac{1}{\alpha + \beta} - \frac{\beta}{\alpha + \beta} \right]$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، R -خطی تابعی از پارامترهای حاشیه‌ای است و تعیین علامت وزن وابستگی بین دو مؤلفه بر R ، به پارامترهای حاشیه‌ای بستگی دارد. در شکل ۱ به ازای دو ترکیب دلخواه از پارامترهای حاشیه‌ای، R -خطی رسم شده است. در نمودار الف در صورتی که X و Y از هم مستقل باشند، پارامتر قابلیت اطمینان برابر ۵۷٪ خواهد بود و در صورت وجود رابطه مثبت بین این دو مؤلفه، در بیشترین حالت R به ۵۸۵٪ خواهد رسید و در صورت منفی بودن این رابطه نیز برآورد R در کمترین مقدار به ۵۴٪ کاهش خواهد یافت. R -خطی مادامی که $\alpha \geq \beta$ باشد، صعودی و در صورتی که $\alpha < \beta$ باشد، نزولی خواهد بود. نمودار ج نیز نشان‌دهنده τ کندال است. تمامی نمودارها در بازه مجاز $[0, 1]$ رسم شده‌اند. پارامتر مقیاس توزیع‌ها (λ) تأثیری بر R -خطی ندارد.


۲.۳ برآورد R با مفصل GFGM

چون مفصل FGM برای وابستگی ضعیف مناسب است. تعدادی از نویسندگان با افزودن پارامتر به این مفصل سعی در حل این مشکل داشته‌اند. یکی فرم‌های گسترش یافته FGM که توسط بایرامو و همکاران (۲۰۰۱) ارائه شد و با GFGM نشان داده می‌شود به صورت:

$$C(u, v) = uv [1 + \theta(1 - u^{m_1})^{p_1} (1 - v^{m_2})^{p_2}]$$

است، که در آن تمام پارامترها مثبت و محدوده مجاز θ بین $\theta_u \leq \theta \leq \theta_l$ است به طوری که:

$$\theta_l = - \min \left\{ 1, \frac{1}{m_1 m_2} \left(\frac{1 + m_1 p_1}{m_1 (p_1 - 1)} \right)^{(p_1 - 1)} \left(\frac{1 + m_2 p_2}{m_2 (p_2 - 1)} \right)^{(p_2 - 1)} \right\},$$



شکل ۱: نمودار پارامتر قابلیت اطمینان به ازای الف- $\beta = 3, \alpha = 4$ ، ب- $\beta = 5, \alpha = 4$ ، ج- نمودار τ کندال (خط ممتد R و خط چین R_I)

$$\theta_u = \min\left\{\frac{1}{m_1} \left(\frac{1+m_1 p_1}{m_1(p_1-1)}\right)^{(p_1-1)}, \frac{1}{m_2} \left(\frac{1+m_2 p_2}{m_2(p_2-1)}\right)^{(p_2-1)}\right\}.$$

در صورتی که تمامی پارامترهای m_1, m_2, p_1 و p_2 برابر یک باشند، تبدیل به حالت اصلی FGM خواهد شد. تابع چگالی مفصل GFGM به صورت

$$c(u, v) = [1 + \theta [1 - u^{m_1}]^{(p_1-1)} [1 - (1 + m_1 p_1) u^{m_1}]] \times [1 - v^{m_2}]^{(p_2-1)} [1 - (1 + m_2 p_2) v^{m_2}]$$

است. از میان معیارهای همبستگی τ کندال آن به صورت

$$\tau = \frac{8\theta p_1 p_2}{(2 + m_1 p_1)(2 + m_2 p_2)} B\left(\frac{2}{m_1}, p_1\right) B\left(\frac{2}{m_2}, p_2\right)$$

است، که در آن $B(\cdot, \cdot)$ تابع بتا است.

دوما و جوردانو (۲۰۱۳) نشان دادند که اگر فرض شود p_1 و p_2 عدد صحیح هستند، آنگاه

$$c(F(x), G(y)) = [1 + \theta \sum_{i=0}^{p_1-1} \sum_{j=0}^{p_2-1} \binom{p_1-1}{i} \binom{p_2-1}{j} \times (-1)^{i+j} F(x)^{m_1 i} G(y)^{m_2 j}] \times [1 - (1 + m_1 p_1) F(x)^{m_1}] [1 - (1 + m_2 p_2) G(y)^{m_2}]$$

چون R -خطی برای تمام خانواده FGM برقرار است، بنابراین $R = R_I + \theta D$ ، که در آن R_I در رابطه

(۳) معرفی شد و

$$D = \int_0^{\infty} \sum_{i=0}^{p_1-1} (-1)^i \binom{p_1-1}{i} F(x)^{m_1 i} [\lambda - (\lambda + m_1 p_1) F(x)^{m_1}] f(x) J(x) dx,$$

که در آن

$$J(x) = \sum_{j=0}^{p_2-1} \binom{p_2-1}{j} (-1)^j \int_0^x G(y)^{m_2 j} [\lambda - (\lambda + m_2 p_2) G(y)^{m_2}] g(y) dy.$$

بعد از انجام عملیات جبری داریم:

$$D = \sum_{i=0}^{p_1-1} \sum_{j=0}^{p_2-1} (-1)^{i+j} \binom{p_1-1}{i} \binom{p_2-1}{j} [I(i, j) - (\lambda + m_2 p_2) I(i, j+1) - (\lambda + m_1 p_1) I(i+1, j) + (\lambda + m_1 p_1)(\lambda + m_2 p_2) I(i+1, j+1)] \quad (۷)$$

که در آن

$$I(r, s) = \frac{\lambda}{m_2 s + \lambda} \int_0^{\infty} F(x)^{m_1 r} G(x)^{m_2 s + \lambda} f(x) dx. \quad (۸)$$

با جایگذاری توابع چگالی و توزیع بیان شده در رابطه (۸) خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} I(r, s) &= \frac{\lambda}{m_2 s + \lambda} \int_0^{\infty} F(x)^{m_1 r} G(x)^{m_2 s + \lambda} f(x) dx \\ &= \frac{\lambda}{m_2 s + \lambda} \int_0^{\infty} (1 - \exp(-\lambda x))^{(m_1 r + 1)\alpha + (m_2 s + 1)\beta - 1} \lambda \exp(-\lambda x) dx \\ &= \frac{\alpha}{(m_2 s + \lambda)[(m_1 r + 1)\alpha + (m_2 s + 1)\beta]} \end{aligned}$$

که با توجه به رابطه (۷)، R -خطی به صورت $R = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} + \theta D$ حاصل خواهد شد.

شکل ۲ نشان دهنده R -خطی و τ کندال به ازای ترکیب‌های دلخواهی از پارامترهای حاشیه‌ای و مفصل در بازه مجاز θ است. در نمودارهای ۲-الف و ب پارامترهای حاشیه‌ای یکسان انتخاب شده و پارامترهای مفصل در نمودار ۲-ب به‌گونه‌ای انتخاب شده که مفصل GFGM به مفصل FGM تبدیل و قابل مقایسه باشند. همانطور که در شکل ۲-ب ملاحظه می‌شود، در صورت مثبت بودن رابطه X و Y ، برآورد پارامتر

قابلیت اطمینان در بزرگ‌ترین مقدار خود ($\theta = 1$) برابر 0.585 خواهد بود، اما اگر از مفصل GFGM برای برآورد R استفاده شود (شکل ۲-الف) این مقدار به 0.600 (به ازای $\theta = 0.44$) افزایش خواهد یافت و بلعکس در صورتی که رابطه بین این دو مؤلفه منفی باشد، در شکل ۲-ب پارامتر قابلیت اطمینان در کمترین مقدار خود (به ازای $\theta = -1$) برابر 0.554 خواهد بود، در حالی که در شکل ۲-الف پارامتر قابلیت اطمینان در کمترین مقدار خود (به ازای $\theta = -0.19$) برابر 0.556 خواهد بود.

برای مشاهده نقش هر یک از پارامترهای حاشیه‌ای بر میزان انحراف از فرضیه استقلال مؤلفه‌های X و Y از شکل ۳ استفاده می‌شود. روند تغییرات نمودار $\Delta_u = R_u - R_I$ مقدار R به ازای θ ماکسیم (مقدار τ کندال به ازای θ ماکسیم) یکسان است، به این معنی که در صورت افزایش نمودار τ_u نمودار Δ_u نیز افزایش خواهد یافت.


۳.۳ برآورد R با مفصل فرانک

خانواده مفصل FGM علی‌رغم اینکه دارای فرم ساده‌ای هستند، اما تنها برای وابستگی کم مناسب هستند. به این منظور یکی از معروف‌ترین توابع مفصل به نام فرانک معرفی می‌شود که برخلاف مفصل FGM اجازه می‌دهد تا τ کندال در بازه $[-1, 1]$ قرار گیرد. مفصل فرانک به چند دلیل محبوبیت و کاربرد بیشتری پیدا کرده است. اول اینکه برخلاف بعضی از توابع مفصل دیگر اجازه می‌دهد تا بتوان یک رابطه منفی را بین حاشیه‌ای‌ها در نظر گرفت. دومین دلیل وابستگی متقارن در هر دو دم^۴ آن، همانند مفاصل گوسی و t -استیودنت^۵ است. سوم اینکه یک حالت جامع دارد، به این معنا که طیف وسیعی از وابستگی‌ها را شامل می‌شود. در نتیجه مفصل فرانک برای مدل‌هایی با وابستگی قوی مثبت یا منفی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، مطالعات شبیه‌سازی حاکی از آن است که وابستگی در دم‌های مفصل فرانک در مقایسه با مفصل گوسی، تمایل به ارتباط ضعیف‌تری دارد و بیشترین وابستگی متمرکز در میانه توزیع است. در نتیجه مفصل فرانک برای داده‌هایی که وابستگی ضعیف در دم‌ها دارند، مناسب‌تر است. تابع مفصل فرانک به صورت:


$$C(u, v) = -\theta^{-1} \log \left\{ 1 - \frac{(1 - e^{-\theta u})(1 - e^{-\theta v})}{1 - e^{-\theta}} \right\}$$

⁴tail


⁵Student's t-copula




(ب)




(الف)




(د)




(ج)




(و)



(ه)




(ح)




(ز)


شکل ۲: نمودارهای R (خط ممتد)، R_I (خط چین) و τ کندال الف و ج- به ازای $\alpha = 4, \beta = 3$ ،
 ب و د- به ازای $\alpha = 4, \beta = 3, p_1 = p_2 = 2, m_1 = m_2 = 5$ ،
 ه و ز- به ازای $\alpha = 6, \beta = 3, p_1 = 3, p_2 = 2, m_1 = 3, m_2 = 2$ ،
 و او و ح- به ازای $\alpha = 3, p_1 = 3, p_2 = 2, m_1 = 3, m_2 = 2, \beta = 5$




(ب)



(الف)



(د)



(ج)

شکل ۳: نمودار الف- m_1 متغیر و $\alpha = 4, \beta = 3, m_2 = 5, p_1 = p_2 = 2$ ، ب- m_2 متغیر و $\alpha = 4, \beta = 3, m_1 = 5, p_1 = p_2 = 2$ ، ج- p_1 متغیر و $\alpha = 4, \beta = 3, m_1 = 5, p_2 = 2$ ، د- p_2 متغیر و $\alpha = 4, \beta = 3, m_1 = m_2 = 5, p_1 = 2$ (مربع نشان دهنده Δ و ستاره نشان دهنده τ -کندال)

است، که در آن $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. تابع چگالی مفصل فرانک به صورت

$$c(u, v) = \frac{\theta(1 - e^{-\theta}) e^{-\theta(u+v)}}{[1 - e^{-\theta} - (1 - e^{-\theta u})(1 - e^{-\theta v})]^2}$$

با τ کندال $\tau = 1 - \frac{\theta}{\theta} (1 - Deb_1(\theta))$ است، که در آن

$$Deb_n(\theta) = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta \frac{t^n}{e^t - 1} dt, n = 1, 2, \dots$$

. همچنین ρ اسپرمن آن به صورت $\rho_\theta = 1 - \frac{\theta}{\theta} (Deb_1(\theta) - Deb_2(\theta))$ تعریف می‌شود. فرض کنید


تابع توزیع X و Y به ترتیب برابر $F(x) = (1 - \exp(-\lambda x))^\alpha$ و $G(y) = (1 - \exp(-\nu y))^\beta$

باشند، در این صورت


$$\begin{aligned}
 R &= \int_0^{\infty} \int_0^x \frac{\theta(1 - e^{-\theta})e^{-\theta(F(x)+G(y))} f(x)g(y)}{(1 - e^{-\theta} - (1 - e^{-\theta F(x)})(1 - e^{-\theta G(y)}))^2} dy dx \\
 &= \int_0^{\infty} \int_0^x \frac{z \exp(-\theta((1 - \exp(-\lambda x))^{\alpha} + (1 - \exp(-vy))^{\beta}))}{(1 - \exp(-\theta) - (1 - \exp(-\theta(1 - \exp(-\lambda x))^{\alpha})))} \\
 &\quad \times \frac{\exp(-\lambda x - vy)(1 - \exp(-\lambda x))^{\alpha-1}(1 - \exp(-vy))^{\beta-1}}{(1 - \exp(-\theta(1 - \exp(-vy))^{\beta})))^2} dy dx \quad (9)
 \end{aligned}$$

که در آن $z = \theta(1 - e^{-\theta})\alpha\lambda\beta v$. برای حل این انتگرال نیاز به روش‌های عددی است که می‌توان از نرم‌افزار Maple استفاده کرد.

شکل ۴ پارامتر قابلیت اطمینان و τ کندال به ازای یک ترکیب دلخواه از پارامترهای حاشیه‌ای است که در بازه مجاز θ رسم شده است. همان‌طور که از شکل ۴ الف مشخص است، در صورت مستقل بودن دو مؤلفه X و Y پارامتر قابلیت اطمینان برابر ۰/۸۵ خواهد بود، در صورتی که اگر بین این دو مؤلفه ارتباط وجود داشته باشد، این پارامتر در بازه θ رسم شده تا ۰/۹۸ (در صورت مثبت بودن ارتباط) افزایش خواهد یافت.



(ب)



(الف)

شکل ۴: نمودار الف- پارامتر قابلیت اطمینان به ازای $\alpha = 3, \lambda = 2, \beta = 4, v = 6$ (خط ممتد R و خط چین R_I) ب- نمودار τ کندال به ازای این پارامترها

۴ مطالعه شبیه‌سازی

برای ارزیابی برآورد پیشنهادی دوما و جوردانو (۲۰۱۳) برای برآورد R ، از شبیه‌سازی استفاده می‌شود. در این بخش ابتدا نتایج شبیه‌سازی با مفصل FGM ارائه خواهد شد. فرض کنید $X \sim GE(\alpha, \lambda, 0)$ و

$Y \sim GE(\beta, \lambda, \circ)$ و مقادیر پارامترها به صورت $\alpha = 4, \beta = 3, \lambda = 2$ و $\theta = \circ/5$ باشند. مقدار پارامتر قابلیت اطمینان مطابق این پارامترها برابر $\circ/579$ است. تعداد تکرار شبیه‌سازی در تمامی حالات برابر 1000 در نظر گرفته شده است. برآورد پارامترها از دو روش IFM و توأم به دست آورده شده است. در روش IFM ابتدا پارامترهای حاشیه‌ای برآورد شده، سپس پارامتر تابع مفصل را برآورد می‌شود. اما در روش توأم تمامی پارامترها هم‌زمان باهم برآورد می‌شوند. همان‌طور که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود، در تمام حالات برآورد R از روش IFM نسبت به روش توأم دارای MSE کمتری است که دلیلی بر بهتر بودن این برآورد است. برای شبیه‌سازی از تابع مفصل $GFGM$ از روش شی و امورا (۲۰۱۶) استفاده گردید. شبیه‌سازی‌ها با در نظر گرفتن $\alpha = 4, p_1 = 3, p_2 = 3, m_1 = 3, m_2 = 2$ و $\theta = \circ/5$ و پارامترهای توزیع‌های حاشیه‌ای به صورت $\alpha = 4, \beta = 3, \lambda = 2$ بدست آمدند. مقدار پارامتر قابلیت اطمینان مطابق این پارامترها برابر $\circ/584$ است. با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ۲ برآورد پارامتر قابلیت اطمینان با هر دو روش دارای MSE کوچکی است که نشان دهنده مناسب بودن روش پیشنهادی است. همچنین برآورد حاصل از روش IFM به دلیل کوچک‌تر بودن MSE بر روش توأم ترجیح داده می‌شود. با فرض آنکه $X \sim GE(\alpha, \lambda, \circ)$ و $Y \sim GE(\beta, v, \circ)$ ، مقادیر پارامترها به صورت $\alpha = 3, \lambda = 2, \beta = 4, v = 6$ و $\theta = 2$ در نظر گرفته شده‌اند که پارامتر قابلیت اطمینان به ازای این مقادیر برابر $\circ/898$ است. همان‌طور که در جدول ۳ ملاحظه می‌شود برآوردهای حاصل از هر دو روش دارای MSE کوچک با اختلاف ناچیز هستند که نشان دهنده مناسب بودن برآوردهای انجام شده است.

۵ مثال کاربردی

توزیع نسبی جمعیت یک کشور برحسب گروه‌های سنی از موضوعاتی است که سیاستمداران و مسئولین یک کشور به‌منظور برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری، ایجاد رفاه و امکانات باید موردتوجه داشته باشند. در صورت جوان بودن یک جامعه، دولت‌مردان باید به فکر امکانات تحصیلی، شغل آینده این جوانان، امکانات تفریحی و بسیاری از مسائل دیگر باشند و همچنین برای جوامعی که نسبت رده سنی کهن‌سال در آن بالا باشد، دولت باید خدمات رفاهی، امور پزشکی و درمانی، حقوق بازنشستگی و خدمات دیگر موردنیاز این رده سنی را در نظر داشته باشد. در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، توزیع نسبی جمعیت برحسب گروه‌های عمده سنی \circ تا ۱۴ ساله، ۱۵ تا ۶۴ ساله، ۶۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان ارائه شد که در جدول ۴ دو گروه سنی

جدول ۱: نتایج برآورد R و پارامترها با استفاده از مفصل FGM

α	λ	β	θ	R	پارامتر	روش	n
۴/۳۲۴	۲/۰۶۲	۳/۱۸۲	۰/۴۸۲	۰/۵۸۱	برآورد		
۰/۳۲۴	۰/۰۶۲	۰/۱۸۲	-۰/۰۱۸	۰/۰۰۲	اریبی	IFM	
۱/۳۸۸	۰/۰۸۶	۰/۵۷۲	۰/۱۴۷	۰/۰۰۳	MSE		
۴/۲۸۴	۲/۰۵۵	۳/۱۹۴	۰/۴۵۱	۰/۵۷۹	برآورد		۵۰
۰/۲۸۴	۰/۰۵۵	۰/۱۹۴	-۰/۰۴۹	-۰/۰۰۱	اریبی	توام	
۰/۸۳۴	۰/۰۴۳	۰/۴۲۰	۰/۱۶۴	۰/۰۰۳	MSE		
۴/۱۳۸	۲/۰۲۲	۳/۰۷۲	۰/۴۹۸	۰/۵۸۱	برآورد		
۰/۱۳۸	۰/۰۲۲	۰/۰۷۲	-۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	اریبی	IFM	
۰/۳۸۹	۰/۰۲۹	۰/۱۷۷	۰/۰۵۵	۰/۰۰۱	MSE		
۴/۰۹۲	۲/۰۱۷	۳/۰۷۸	۰/۴۵۰	۰/۵۷۷	برآورد		۱۵۰
۰/۰۹۲	۰/۰۱۷	۰/۰۷۸	-۰/۰۰۳	-۰/۰۰۲	اریبی	توام	
۰/۳۰۲	۰/۰۱۴	۰/۱۱۴	۰/۰۵۷	۰/۰۰۲	MSE		
۴/۰۷۵	۲/۰۱۵	۳/۰۲۳	۰/۴۹۰	۰/۵۸۲	برآورد		
۰/۰۷۵	۰/۰۱۵	۰/۰۲۳	-۰/۰۱۰	۰/۰۰۲	اریبی	IFM	
۰/۲۰۲	۰/۰۱۶	۰/۱۰۹	۰/۰۳۴	۰/۰۰۱	MSE		
۳/۹۷۹	۲/۰۱۰	۳/۰۵۱	۰/۵۰۱	۰/۵۷۱	برآورد		۲۵۰
۰/۰۲۱	۰/۰۱۰	۰/۰۵۱	۰/۰۰۹	-۰/۰۰۸	اریبی	توام	
۰/۲۹۸	۰/۰۰۸	۰/۰۸۰	۰/۰۳۱	۰/۰۰۳	MSE		

۰ تا ۱۴ ساله و ۶۵ ساله و بیشتر ذکر شده است. در این جدول برای هر استان توزیع نسبی جمعیت برحسب گروه‌های سنی و به تفکیک نقاط شهری و روستایی ارائه شده است. برای بررسی این دو گروه سنی در مناطق

جدول ۲: نتایج برآورد R و پارامترها با استفاده از مفصل GFGM

α	λ	β	θ	R	پارامتر	روش	n
۴/۴۰۸	۲/۰۶۸	۳/۲۳۳	۰/۳۸۷	۰/۵۸۶	برآورد		۵۰
۰/۴۰۸	۰/۰۶۸	۰/۲۳۳	۰/۰۱۳	۰/۰۰۱	اریبی	IFM	
۱/۵۸۲	۰/۰۸۷	۰/۶۱۰	۰/۱۱۱	۰/۰۰۳	MSE		
۴/۱۹۴	۲/۰۴۸	۳/۱۷۲	۰/۴۱۷	۰/۵۸۱	برآورد		۱۵۰
۰/۱۹۴	۰/۰۴۸	۰/۱۷۲	۰/۰۱۷	-۰/۰۰۴	اریبی	توام	
۰/۸۳۴	۰/۰۵۱	۰/۴۱۵	۰/۱۴۷	۰/۰۰۳	MSE		
۴/۱۳۳	۲/۰۲۵	۳/۰۶۶	۰/۳۹۴	۰/۵۸۶	برآورد		۱۵۰
۰/۱۳۳	۰/۰۲۵	۰/۰۶۶	-۰/۰۰۶	۰/۰۰۱	اریبی	IFM	
۰/۰۳۸	۰/۰۲۸	۰/۱۷۷	۰/۰۴۲	۰/۰۰۱	MSE		
۴/۰۶۴	۲/۰۱۷	۳/۰۳۹	۰/۴۱۱	۰/۵۸۵	برآورد		۱۵۰
۰/۰۶۴	۰/۰۱۷	۰/۰۳۹	۰/۰۱۱	۰/۰۰۰	اریبی	توام	
۰/۲۴۷	۰/۰۱۶	۰/۱۱۴	۰/۰۴۳	۰/۰۰۱	MSE		
۴/۰۸۳	۲/۰۲۰	۳/۰۳۶	۰/۳۹۸	۰/۵۸۶	برآورد		۱۵۰
۰/۰۸۳	۰/۰۲۰	۰/۰۳۶	-۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	اریبی	IFM	
۰/۲۱۵	۰/۰۱۶	۰/۱۱۷	۰/۰۲۴	۰/۰۰۱	MSE		
۴/۰۲۳	۲/۰۲۷	۳/۰۴۵	۰/۴۰۲	۰/۵۸۱	برآورد		۱۵۰
۰/۰۲۲	۰/۰۲۷	۰/۰۴۵	۰/۰۰۲	-۰/۰۰۴	اریبی	توام	
۰/۲۰۵	۰/۰۲۶	۰/۰۸۰	۰/۰۲۶	۰/۰۰۲	MSE		


شهری و روستایی استان‌های کشور، بزرگ‌تر بودن نسبت جمعیت هر رده سنی در یک منطقه (شهری و روستایی) نسبت به منطقه دیگر نیازمند توجه بیشتر به آن منطقه است. به‌عنوان مثال در صورت بزرگ‌تر بودن توزیع نسبی جمعیت ۰ تا ۱۴ ساله در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری یک استان، توجه ویژه به نیازهای این رده سنی

جدول ۳: نتایج برآورد R و پارامترها با استفاده از مفصل فرانک


α	λ	β	ν	θ	R	پارامتر	روش	n
۳/۲۸۰	۲/۰۸۳	۴/۴۴۴	۶/۲۶۲	۲/۰۳۶	۰/۹۰۰	برآورد		
۰/۲۸۰	۰/۰۸۳	۰/۴۴۴	۰/۲۶۲	۰/۰۳۶	۰/۰۰۲	اریبی	IFM	
۰/۳۷۲	۰/۰۴۵	۰/۸۵۲	۰/۳۹۲	۰/۳۸۲	۰/۰۰۱	MSE		۵۰
۳/۲۸۱	۲/۰۸۲	۴/۳۹۳	۶/۲۲۳	۱/۹۹۶	۰/۹۰۰	برآورد		
۰/۲۸۱	۰/۰۸۲	۰/۳۹۳	۰/۲۲۳	-۰/۰۰۴	۰/۰۰۲	اریبی	توام	
۰/۳۸۶	۰/۰۵۳	۰/۷۱۱	۰/۳۵۰	۰/۴۱۷	۰/۰۰۱	MSE		
۳/۰۸۶	۲/۰۲۴	۴/۱۲۹	۶/۰۷۵	۱/۹۷۷	۰/۸۹۹	برآورد		
۰/۰۸۶	۰/۰۲۴	۰/۱۲۹	۰/۰۷۵	-۰/۰۲۳	۰/۰۰۱	اریبی	IFM	
۰/۰۹۲	۰/۰۱۵	۰/۲۰۷	۰/۱۳۶	۰/۱۳۳	۰/۰۰۰	MSE		
۳/۰۸۸	۲/۰۲۹	۴/۱۰۲	۶/۰۴۴	۲/۰۰۴	۰/۸۹۹	برآورد		۱۵۰
۰/۰۸۸	۰/۰۲۹	۰/۱۰۲	۰/۰۴۴	۰/۰۰۴	۰/۰۰۱	اریبی	توام	
۰/۰۷۸	۰/۰۱۴	۰/۱۸۷	۰/۱۱۹	۰/۱۳۷	۰/۰۰۰	MSE		
۳/۰۵۶	۲/۰۱۴	۴/۰۸۶	۶/۰۴۰	۲/۰۰۷	۰/۹۰۰	برآورد		
۰/۰۵۶	۰/۰۱۴	۰/۰۸۶	۰/۰۴۰	۰/۰۰۷	۰/۰۰۱	اریبی	IFM	
۰/۰۴۸	۰/۰۰۸	۰/۱۰۰	۰/۰۷۲	۰/۰۷۷	۰/۰۰۰	MSE		
۳/۰۵۶	۲/۰۱۷	۴/۰۶۷	۶/۰۴۵	۲/۰۲۵	۰/۹۰۰	برآورد		۵۰
۰/۰۵۶	۰/۰۱۷	۰/۰۶۷	۰/۰۴۵	۰/۰۲۵	۰/۰۰۲	اریبی	توام	
۰/۰۴۷	۰/۰۰۹	۰/۰۹۹	۰/۰۷۰	۰/۰۷۵	۰/۰۰۰	MSE		

در مناطق روستایی این استان را می‌طلبند و مسئولین آن استان نیز می‌توانند برای آینده شغلی استان بر نیروی کار موجود در مناطق روستایی حساب ویژه‌ای باز کرده و با تأمین امکانات رفاهی، تحصیلی و شغلی از مهاجرت این افراد به شهر جلوگیری کنند. با بررسی این موضوع در تمامی استان‌ها می‌توان نتایج را به سطح کشور

گسترش داد و تصمیمات لازمه را در سطح کلان در نظر گرفت. برای سادگی کار نسبت جمعیت ۰ تا ۱۴ سال مناطق شهری را با X و مناطق روستایی با Y و نسبت جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر در مناطق شهری و روستایی به ترتیب با Z و W نشان داده می‌شود. فرض کنید $(X \sim GE(\alpha_1, \lambda_1, 0), Y \sim GE(\alpha_2, \lambda_2, 0), Z \sim GE(\alpha_3, \lambda_3, 0)$ و $W \sim GE(\alpha_4, \lambda_4, 0)$ باشند. توزیع نمایی تعمیم یافته به داده‌ها برازش داده و پارامترها با روش ماکسیمم درستنمایی برآورد می‌شود. برای آزمون مناسب بودن توزیع برازش شده از آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف ($K-S$) و آندرسون دارلینگ (AD) استفاده می‌شود. نتایج مندرج در جدول ۵ حاکی از مناسب بودن توزیع نمایی تعمیم یافته برای داده‌های ذکر شده است. از نمودارهای تابع توزیع تجمعی و چندک - چندک به منظور درک شهودی مناسب بودن توزیع‌های برازش داده شده به داده‌ها، استفاده می‌شود (شکل‌های ۵ تا ۸).



(ب)



(الف)

شکل ۵: الف- نمودار چندک-چندک ب- تابع توزیع تجمعی (خط چین تابع تجربی و خط ممتد تابع توزیع نمایی تعمیم یافته) نسبت جمعیت ۰ تا ۱۴ سال مناطق شهری


نمودارهای تابع توزیع برآورد شده به خوبی بر تابع توزیع تجربی داده‌ها منطبق شده است. به دلیل کوچک بودن حجم نمونه، در نمودارهای چندک - چندک انحرافات مشاهده می‌شود. τ کندال تجربی بین X و Y (τ_1^E) برابر ۰/۵۶ و بین Z و W (τ_2^E) برابر ۰/۴۳۱ است، بنابراین برای برآورد پارامتر قابلیت اطمینان باید از تابع مفصلی استفاده کرد که این همبستگی را پوشش دهد. در اینجا به منظور برآورد پارامتر قابلیت اطمینان

جدول ۴: توزیع نسبی جمعیت به تفکیک استان، مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۰


نام استان	۱۴ تا ساله		۶۵ ساله و بیشتر	
	مناطق شهری	مناطق روستایی	مناطق شهری	مناطق روستایی
شرقی آذربایجان	۲۱/۱	۲۴/۶	۶/۷	۷/۸
غربی آذربایجان	۲۴/۱	۲۷/۳	۵/۳	۵/۵
اردبیل	۲۳/۱	۲۶/۴	۵/۲	۷/۷
اصفهان	۲۰/۸	۲۲/۱	۶/۲	۸/۳
البرز	۲۱/۰	۲۳/۳	۴/۶	۶/۲
ایلام	۲۲/۴	۲۲/۶	۴/۲	۵/۵
بوشهر	۲۳/۸	۲۴/۷	۳/۵	۴/۸
تهران	۱۹/۵	۲۴/۹	۶/۳	۴/۲
بختیاری و چهارمحال	۲۳/۵	۲۷/۴	۵/۱	۵/۶
جنوبی خراسان	۲۷/۴	۲۷/۸	۵/۰	۱۰/۳
رضوی خراسان	۲۴/۸	۲۸/۱	۵/۱	۷/۳
شمالی خراسان	۲۵/۳	۲۷/۸	۴/۵	۴/۲
خوزستان	۲۴/۸	۳۰/۳	۴/۱	۴/۱
زنجان	۲۱/۹	۲۴/۳	۵/۷	۷/۶
سمنان	۲۱/۳	۲۲/۰	۵/۹	۹/۶
بلوچستان و سیستان	۳۵/۲	۳۹/۷	۲/۶	۳/۸
فارس	۲۱/۳	۲۴/۱	۵/۴	۵/۹
قزوین	۲۲/۲	۲۲/۸	۴/۷	۸/۵
قم	۲۵/۱	۲۲/۱	۴/۵	۹/۲
کردستان	۲۲/۸	۲۴/۰	۴/۹	۷/۰
کرمان	۲۵/۲	۲۸/۷	۴/۴	۵/۴
کرمانشاه	۲۰/۸	۲۲/۶	۵/۵	۶/۵
بویراحمد و گهگلوویه	۲۵/۸	۲۷/۲	۴/۳	۵/۷
گلستان	۲۳/۵	۲۷/۲	۴/۴	۴/۶
گیلان	۱۸/۶	۱۸/۷	۶/۴	۱۰/۷
لرستان	۲۲/۳	۲۵/۳	۵/۴	۵/۶
مازندران	۱۹/۴	۱۹/۹	۵/۶	۸/۰
مرکزی	۲۱/۹	۲۰/۳	۵/۶	۱۲/۵
هرمزگان	۲۶/۸	۳۱/۲	۲/۹	۴/۸
همدان	۲۰/۶	۲۳/۲	۶/۳	۷/۶
یزد	۲۵/۲	۲۳/۱	۵/۴	۹/۷

جدول ۵: برآورد ماکسیمم درست‌نمایی، مقدار ماکسیمم درست‌نمایی، آزمون $K - S$ و AD

متغیر	پارامتر	برآورد	ماکسیمم مقدار درست‌نمایی	آزمون $K - S$ (مقدار - p)	آزمون AD (مقدار - p)
X	α_1	۱۶۷۰۹/۴	-۷۴/۳۲	۰/۰۷۵	۰/۲۴۵
	λ_1	۰/۴۴۳		(۰/۹۹۴)	(۰/۹۷۰)
Y	α_2	۲۲۱/۵	-۸۳/۲۸	۰/۰۹۴	۰/۳۰۰
	λ_2	۰/۳۲۷		(۰/۹۴۵)	(۰/۹۳۷)
Z	α_3	۶۳/۱	-۴۸/۲۶	۰/۱۵۲	۱/۱۴۳
	λ_3	۰/۹۳۰		(۰/۴۶۹)	(۰/۲۸۹)
W	α_4	۳۱/۳	-۶۵/۳۵	۰/۰۹۹	۰/۲۳۱
	λ_4	۰/۵۷۹		(۰/۹۲۴)	(۰/۹۷۹)



(ب)




(الف)

شکل ۶: الف- نمودار چندک-چندک ب- تابع توزیع تجمعی (خط چین تابع توزیع تجربی و خط ممتد تابع توزیع نمایی تعمیم یافته) نسبت جمعیت ۰ تا ۱۴ سال مناطق روستایی


از مفصل فرانک استفاده می‌شود. توابع چگالی توأم (X, Y) و (Z, W) بترتیب به صورت

$$f(x, y) = \frac{\theta_1(1-\exp(-\theta_1)) \exp(-\theta_1((1-\exp(-\lambda_1 x))^{\alpha_1} + (1-\exp(-\lambda_2 y))^{\alpha_2}))}{[1-\exp(-\theta_1) - (1-\exp(-\theta_1(1-\exp(-\lambda_1 x))^{\alpha_1})) (1-\exp(-\theta_1(1-\exp(-\lambda_2 y))^{\alpha_2}))]^{\alpha_1}} \times \alpha_1 \lambda_1 (1 - \exp(-\lambda_1 x))^{\alpha_1 - 1} \alpha_2 \lambda_2 (1 - \exp(-\lambda_2 y))^{\alpha_2 - 1}$$

$$f(z, w) = \frac{\theta_2(1-\exp(-\theta_2)) \exp(-\theta_2((1-\exp(-\lambda_3 z))^{\alpha_3} + (1-\exp(-\lambda_4 w))^{\alpha_4}))}{[1-\exp(-\theta_2) - (1-\exp(-\theta_2(1-\exp(-\lambda_3 z))^{\alpha_3})) (1-\exp(-\theta_2(1-\exp(-\lambda_4 w))^{\alpha_4}))]^{\alpha_2}} \times \alpha_3 \lambda_3 (1 - \exp(-\lambda_3 z))^{\alpha_3 - 1} \alpha_4 \lambda_4 (1 - \exp(-\lambda_4 w))^{\alpha_4 - 1}$$




(ب)




(الف)

شکل ۷: الف- نمودار چندک-چندک ب- تابع توزیع تجمعی (خط چین تابع توزیع تجربی و خط ممتد تابع توزیع نمایی تعمیم یافته) نسبت جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر مناطق شهری



(ب)



(الف)

شکل ۸: الف- نمودار چندک-چندک ب- تابع توزیع تجمعی (خط چین تابع توزیع تجربی و خط ممتد تابع توزیع نمایی تعمیم یافته) نسبت جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر مناطق روستایی

هستند. با جایگذاری پارامترهای حاشیه‌ای برآورد شده، برآورد ماکسیمم درست‌نمایی پارامترهای همبستگی برابر $(\hat{\theta}_1 = 7/718)$ و $(\hat{\theta}_2 = 4/728)$ خواهد بود. با توجه به پارامترهای همبستگی برآورد شده، $\hat{\tau}_1 = 0/59$ و $\hat{\tau}_2 = 0/439$ هستند که به مقدار τ کندهال تجربی داده‌ها نزدیک است. با جایگذاری پارامترهای حاشیه‌ای و همبستگی برآورد شده در رابطه (۹)، برآورد پارامترهای قابلیت اطمینان برابر $\hat{R}_1 =$

می‌باشند که به مقدار تجربی این پارامترها $\hat{R}_2 = P(W \geq Z) = 0/894$ و $P(Y \geq X) = 0/823$ یعنی $R_1^E = 0/903$ و $R_2^E = 0/967$ نزدیکند. با توجه به نتایج به دست آمده، مناطق روستایی در هر دو گروه سنی نسبت به مناطق شهری سهم بیشتری از جمعیت منطقه را به خود اختصاص داده‌اند، در واقع نسبت گروه سنی ۰ تا ۱۴ ساله و ۶۵ ساله و بیشتر در مناطق روستایی از مناطق شهری کشور بیشتر است.

۶ بحث و نتیجه‌گیری

هدف این مقاله برآورد پارامتر قابلیت اطمینان برای توزیع نمایی تعمیم‌یافته با فرض وجود همبستگی بین مؤلفه‌های X و Y با استفاده از روش دوما و جوردانو (۱۳۰۲) بود. به این منظور فرم بسته R برای توزیع نمایی تعمیم‌یافته تحت مفصل‌های FGM و GFGM به دست آورده شد. اما به دلیل عدم وجود شکل بسته R بر اساس تابع مفصل فرانک به صورت عددی محاسبه شد و ملاحظه گردید که در نظر گرفتن وابستگی میان دو مؤلفه بسته به پارامترهای حاشیه‌ای و مفصل انتخاب شده سبب افزایش یا کاهش پارامتر قابلیت اطمینان نسبت به حالت مستقل آن خواهد شد. ارزیابی برآوردها در مطالعه مناسب بودن این روش برآورد R را تأیید نمود. در بخش کاربردی نیز داده‌های مربوط به توزیع نسبی جمعیت برحسب گروه‌های عمده سنی به تفکیک استان در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۰ تحلیل شد. با در نظر گرفتن توزیع نمایی تعمیم‌یافته درصد گروه‌های سنی و استفاده از تابع مفصل فرانک پارامتر قابلیت اطمینان برای رده‌های سنی صفر تا ۱۴ سال و ۶۵ سال و بیشتر در مناطق شهری و روستایی مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از بیشتر بودن نسبت دو گروه سنی بررسی شده در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بود.

تقدیر و تشکر

از داوران و ویراستار محترم مجله که با نظرات ارزشمند خود موجب ارائه بهتر مقاله گردید قدردانی می‌شود. این مقاله برگرفته از پایان نامه نویسنده اول مقاله است و بدینوسیله از حمایت‌های معنوی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکر می‌شود.

مراجع

- Awad, A. M. and Gharraf, M. K. (1986), *Statistics for Spatial Data*, Revised Edition, John Wiley, New York.
- Awad, A. M. and Gharraf, M. K. (1986), Estimation of $P(Y<X)$ in the Burr Case: A Comparative Study, *Communications in Statistics-Simulation and Computation*, **15**, 389-403.
- Constantine, K., Karson, M. and Tse, S. K. (1986), Estimators of $P(Y<X)$ in the Gamma Case, *Communications in Statistics-Simulation and Computation*, **15**, 365-388.
- Domma, F. and Giordano, S. (2013), A Copula-Based Approach to Account for Dependence in Stress-Strength Models, *Statistical Papers*, **54**, 807-826.
- Gupta, R. C., Ghitany, M. E. and AL-Mutari, D. K. (2012), Estimation of Reliability from a Bivariate Log-Normal Data, *Journal of Statistical Computation and Simulation*, **83**, 1068-1081.
- Gupta, RC. and Subramanian, S. (1998), Estimation of Reliability in a Bivariate Normal Distribution with Equal Coefficients of Variation, *Communications in Statistics-Simulation and Computation*, **27(3)**, 675-698.
- Hangal, D. (1997), Note on Estimation of Reliability under Bivariate Pareto Stress-Strength Model, *Statistical Papers*, **38**, 453-459.
- Ismail, R., Jeyaratnam, S. and Panchapakesan, S. (1986), Estimation of $P(X>Y)$ for Gamma Distributions, *Journal of Statistical Computation and Simulation*, **26**, 253-267.
- Iwase, K. (1987), On UMVU Estimators of $Pr(Y<X)$ in the Two-Parameter Exponential Case, *Memoirs of the Faculty of Engineering. Hiroshima University*, **9**, 21-24.

- Jeevanand, ES. (1997), Bayes Estimation of for a Bivariate Pareto Distribution, *Statistician*, **46**, 93-99.
- Morgenstern, D. (1956), Einfache Beispiele Zweidimensionaler Verteilungen, *Mitteilungsblatt fur Mathematische Statistik*, **8**, 234-235.
- Nadarajah, S. (2004), Reliability for some Bivariate Gamma Distributions, *Mathematical Problems in Engineering*, **2005**, 151-163.
- Nadarajah, S. (2005), Reliability for some Bivariate Beta Distributions, *Mathematical Problems in Engineering*, **2005**, 101-111.
- Nadarajah, S. and Kotz, S. (2006), Reliability for some Bivariate Exponential Distributions, *Probabilistic Engineering Mechanics*, **21**, 338-351.
- Reiser, B. and Guttman, I. (1986), Statistical Inference for $\Pr(Y < X)$: the Normal Case, *Technometrics*, **28**, 253-257.
- Shih, J. H. and Emura, T. (2016), Bivariate Dependence Measures and Bivariate Competing Risks Models under the Generalized FGM Copula, *Statistical Papers*, doi:10.1007/s00362-016-0865-5.
- Sklar, M. (1959), Fonctions de répartition à n Dimensions et Leurs Marges, *Mathematical Institut de Statistiques de l'Université de Paris*, **8**, 229-231.
- Voinov, V. G. (1984), On Unbiased Estimation of $P(Y < X)$ in the Normal Case, *Zapiski Nauchnykh Seminarov POMI*, **136**, 5-12.

Estimation of Reliability Parameter Using Copula Function for Components with Generalized Exponential Distribution

Nasiri Far, M., Akhoond, M.R , Zadkarami, M.R

Department of Statistics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Abstract: The parameters of reliability for the most family marginal distribution is estimated with the assumption of independence between two component stress and strength, but, unfortunately when these two component are correlated, have been less discussed. Recently, a method based on a copula function for estimating the reliability parameter is proposed under the assumption of correlation between stress and strength components. In this paper, this method is used to estimate the reliability parameter when the distribution of componets is Generalized Exponential (GE). For this purpose FGM, generalized FGM and frank copula function have been used. Then simulation is also used to demonstrate the suitability of the estimates. In the end, reliability parameter for data relative contribution of major groups in terms of age breakdown of the population of urban and rural areas in Iran in the year 1390 will be estimated.

Keywords: Reliability Parameter, Frank Copula, FGM Copula, GFGM Copula.

Mathematics Subject Classification (2010): 62F10, 62N05, 62N02.