

تعیین راهبردهای بهینه‌ی آبیاری ذرت دانه‌یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی (

(

*) صابونی

تاریخ دریافت: 1389/01/30 تاریخ پذیرش: 1390/08/02

چکیده

حاضر با استفاده از معیارهای برتری تصادفی به بررسی راههای کمآبیاری ذرت دانه‌یی در نتایج نشان داد که راهبرد بهینه‌ی کمآبیاری بر اساس عملکرد و بازده ناچالص در شرایط محدودیت آب و زمین، کشاورز ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس هر برنامه‌ی آبیاری از خود نشان دادند. کشاورز ریسک‌گریز به ۱۰٪ کمآبیاری در مرحله‌ی دوم و چهارم رشد و ریسک‌پذیر به برنامه ۵٪ کمآبیاری در چهار مرد رشد ذرت، بالاترین سطح زیرکشت را اختصاص دادند.

Q25 , C61 : JEL

های کلیدی: کمآبیاری، معیار برتری تصادفی، ذرت دانه‌یی، زرقان

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورز

* ترتیب دانشی گروه اقتصاد کشاورز

Email: msabuhi39@yahoo.com

p.jansouz@gmail.com

گونگی حفاظت و بهبود

مدیریت

کارآیی آب تنظیم می . . . جا که کشاورزی فعالیتی با میزان مصرف کاهش آب آبیاری می میزان قابل توجهی بخش کشاورزی را در اختیار ها و مصارف دیگر قرار دهد. آبیاری کامل برای کسب بیشترین محصول از واحد سطح در شرایطی قابل به کارگیری است که اولاً آب به مقدار کافی در اختیار باشد و دوم امکان توسعه و افزایش سطح زیرکشت وجود نداشته باشد. اما، شرایط اقلیمی و زمین‌های کشاورزی در بیشتر مناطق کشور به گونه‌یی است که نه کافی در دسترس نیست، که زمین‌های مستعد و قابل احیای زیادی وجود دارند که در صورت رسیدن آب به آن امکان افزایش تولید قابل توجهی وجود دارد.

با توجه به این که بسیاری از مناطق ایران در نواحی خشک واقع شده نیاز مبرم برای آب در بخش کشاورزی با هدف کاهش مصرف بھینه . وینبرگ . کاهش مصرف آب کمک کرد: (1993) که در کشاورزی می کاهش مصرف آب استفاده کارآیی 1) بهبود کارآیی استفاده های مناسب آبیاری 2) کاشت محصولات مقاوم به شوری و کمآبی 3) کمآبیاری. کم بیاری آبیاری محصول با هدف کاهش مصرف آب که به کیفیت و کمیت محصول ضرر قابل توجهی و با کاهش هزینه آبیاری منجر به افزایش بخشی کشاورز شرایط عرضه ، تعریف می (انگلیش و راجا، 1996). هدف اصلی از اجرای راه های کمآبیاری، افزایش بازده کاربرد آب، از طریق کاهش میزان آب آبیاری در هر نوبت، و یا حذف آبیاری‌هایی است که کمترین بازدهی را دارند. در مناطقی که کشاورزان آب کمی در اختیار دارند می‌توانند یکی از کارهای زیر را انتخاب کنند: 1) سطح زیرکشت را کاهش دهند و آب را تا حد کافی و نیاز در اختیار گیاهان باقی 2) تمام سطح را زیرکشت ببرند ولی بخشی از نیاز آبی گیاه را برآورده کنند. کار دوم مرتبط با کمآبیاری است. این روش تحولی در اقتصاد آب در

بخش کشاورزی به همراه داشته است که نیازمند تحقیقات علمی و کاربردی در این زمینه (1995) در آفریقای جنوبی به بررسی کمآبیاری در مراحل مختلف رشد گیاه .

پرداخت، نتیجه این تحقیق نشان داد که در مراحل خاصی از رشد گیاه کمآبیاری نه تنها باعث کاهش قابل توجهی در عمل کرد محصول نمی کند که به افزایش کارآبی استفاده آب در کشاورزی کمک می کند. (1990) به ارزیابی ریسک مربوط به کمآبیاری گندم با (2006) تصادفی با توجه به یکتابع (SDRF) .

تکنیک کارآبی تصادفی با توجه به یکتابع (SERF) برای مقایسه های کمآبیاری بر پایه قطعیت (CE) استفاده کرد. تحقیقات اخیر در آفریقای جنوبی کمآبیاری را به عنوان روشی برای استفاده یعنی از آب تحت شرایط محدود، مورد بررسی قرار داده در تمام این تحقیقات برنامه های کمآبیاری به طور فرضی از پیش تعریف (2002). زیبایی و همکاران (1380)

تصادفی و برتری تصادفی با توجه به یک فرم بع، به بررسی راهبرد ریسک - کارآبی آبیاری کاران منطقه کوار و اهمیت لحاظ کردن ریسک در مدل های تحلیل رفتار کشاورزان پرداختند. تیموری و چیذری (1387)، به بررسی خودکفایی پویا در تولید ذرت یی در ایران پرداختند. نتایج نشان داد که بهره یی در کشور با وجود صعودی بودن، کمتر از یک بوده است. چونین بهره وری کل عوامل تولید ذرت دانه بی، در دو استان فارس و خوزستان کاهش پیدا کرده و نرخ رشد آن منفی است.

گیاه ذرت به علت مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی بالا و قدرت سازگاری با آب و هوای مختلف در بیشتر نقاط جهان کشت می شود. در ایران بالاترین سطح زیرکشت و میزان تولید را استان فارس دارد، اما این استان از لحاظ عمل کرد مقام مناسبی را میان استان کشت کننده ندارد. زرقان فارس یکی از شهرستان های مهم کشت ذرت در میان دلیل این که گیاه ذرت در حال حاضر یکی از مهم ترین غلات از لحاظ ارزش غذایی بالا و از لحاظ اقتصادی در تامین دانه برای انسان و علوفه برای

دام استفاده می کرد گیاه ذرت و تاثیر رفتار ریسکی کشاورزان در انتخاب برنامه های کم آبیاری در شرایط محدودیت آب و زمین است. بر این اساس، در بخش اول به مقایسه کم آبیاری (SSD) معيار برتری تصادفی درجه (FSD) معيار برتری تصادفی با توجه به کارآیی تصادفی با توجه به .
 یکتابع بر اساس معيار معادل اطمینان کردن ترجیحات ریسکی تصمیم گیرنده به ارایه بهینه سازی کارآیی تصادفی در شرایط محدودیت زمین و آب پرداخته .

روش تحقیق

یکی از مشکلاتی که هنگام استفاده از تابع مطلوبیت مورد انتظار ذهنی قرار گرفتن انگیزه افراد در تابع مطلوبیت مصرف کنندگان است. این مساله می دلایل مختلفی اتفاق یافت، مانند دسترسی نداشتن به شخص مناسب، بیش از یک تعداد اشخاص تصمیم گیرنده و مواردی از این قبیل. به عنوان نمونه، برای استخراج ترجیحات مردان و یا در کشاورزی هنگامی که نیاز به توصیه ترویجی برای خصوص وقتی این گروه هزار یا چند صد نفر باشند، در کل های زیادی برای استخراج تابع مطلوبیت .

تصمیم گیرنده های آن در تحلیل تصمیم گیری های کشاورزی صورت گرفته است (کینگ و راین 1984 و آندرسون و هارداکر 2003). در بخشی از آن استخراج یک تابع مطلوبیت ویژه، روش هایی با عنوان برتری تصادفی و معيارهای کارآیی پیش . معيارهای برتری تصادفی معمولاً برای وضعیت هایی که یک تصمیم گیرنده با ترجیحات نه دقیقاً مشخص و یا بیش از یک تصمیم گیرنده وجود داشته باشد، مانند تحلیل

گزینه‌های ریسکی مختلفی که یک فرد می‌تواند با آن مواجه شود، و یا تحلیل توصیه ترویجی و تصمیم‌گیری در کشاورزی پیش‌نهاد می (هارداکر، 2004).

معیار برتری تصادفی درجه (FSD): در معیار برتری درجه اول محدودیت تابع مطلوبیت آن است که تصمیم‌گیرندگان در معیار سنجش دارای مطلوبیت نهایی مثبت هستند (مقدار بیش‌تر بر کم‌تر ترجیح د می). بنابراین برای دو گزینه‌ی ریسکی A که هر دارای توزیع احتمال نتایج x بر اساس تابع توزیع تراکمی (CDF) ترتیب معادل ($F_A(x)$) باشد، گزینه A بر گزینه B اساس معیار درجه (هارداکر و همکاران، 1997):

$$F_A(x) \leq F_B(x) \quad \forall x \quad (1)$$

بدان معنا است که تابع توزیع تجمعی A باید همواره قبل و در سوی راست تابع توزیع تجمعی B قرار گیرد. اگر دو تابع توزیع تجمعی یک‌دیگر را قطع کند، اساس معیار برتری درجه (FSD) هیچ‌کدام نمی‌تواند بر دیگری غالب باشد، این موضوع بیان‌گر قدرت کم معیار برتری درجه اول در نشان دادن تمایز میان گزینه (هارداکر و همکاران، 1997).

معیار برتری تصادفی درجه (SSD): در معیار برتری تصادفی درجه محدودیت‌های اضافی بیش‌تری برای تابع مطلوبیت در نظر گرفته می‌شود که برای همهٔ مقادیر x تصمیم‌گیرندگان ریسک‌گریز . این فرض، تابع مطلوبیت با شبیه مثبت اما کاهشی را بیان می‌کند، یعنی $U'(x) < 0$ $U''(x) < 0$. بر اساس معیار SSD گزینه A ب ترجیح داده می (هارداکر و همکاران، 1997):

$$\int_{-\infty}^{x^*} F_A(x) dx \leq \int_{-\infty}^{x^*} F_B(x) dx \quad \forall x^* \quad (2)$$

در این معیار، نتایج بر اساس سطوح زیر منحنی‌های تابع توزیع تجمعی با هم مقایسه می . SSD نیازمند آن است که سطح تجمعی زیر منحنی تابع توزیع تجمعی (CDF)

برای گزینه‌ی برتر در همه جا قبل و در سمت راست منحنی متناظر گزینه‌ی دیگر قرار گیرد. FSD قدرت تمایز بیش SSD زیر FSD ی کارآیی حاصل از (هارداکر و همکاران، 1997).

معیار کارآیی تصادفی با توجه به یکتابع (SERF): این معیار، درک بیش مقایسه‌ی گزینه‌ها بر حسب سطح معادل اطمینان ریسک‌گریزی مورد نظر ارایه می‌کند. برای هر گزینه‌ی ریسکی و متناسب با هر شکل از تابع مطلوبیت، فرضیه‌ی مطلوبیت ذهنی م (SEU) بدان معنی است که مطلوبیت می‌ریسک‌گریزی «r» و پی‌آمد تصادفی x دست آید (هارداکر و همکاران، 2004)، به این ترتیب که:

$$U(x, r) = \int U(x, r) f(x) dx \quad (3)$$

برای مقادیر مختلف r ریسک‌گریزی تعیین شده قابل محاسبه است. چونین مقدار CE برای هر کدام از مقادیر U صورت زیر محاسبه می‌شود (هارداکر و همکاران، 2004):

$$CE(x, r) = U^{-1}(x, r) \quad (4)$$

ی کلی تحلیل SERF های داده شده، آن است که مجموعه‌ی کارآفقط شامل گزینه‌هایی است که بیشترین (یا مساوی با بیشترین) CE را برای بعضی مقادیر r برای تحلیل در ابتدا تصمیم در مورد استفاده از تابع مطلوبیت نمایی گرفته می‌شود که مستلزم در نظر گرفتن یک بازه‌ی مناسب برای ضریب‌های ریسک‌گریزی های اولیه‌ی تئوری مطلوبیت انتظاری، (هارداکر و همکاران، 1997). مطلوبیت هر گزینه‌ی ریسکی برابر (هارداکر و همکاران، 1997).

تابع مطلوبیت مورد استفاده در رابطه 5

$$E[U(X_j)] = U(X_j) = [\sum P_i U(Y_{ij} X_j)] \quad (5)$$

که: X_{ij} سطح زیرکشت براساس برنامه‌ی آبیاری j احتمال گزینه i مطلوبیت تصمیم‌گیرنده (کشاورز). از تابع تعريف شده واضح است که مطلوبیت مورد انتظار تابعی از احتمال هر گزینه‌ی ریسکی و ترجیح تصمیم‌گیرنده است. شکل تابع مطلوبیت انتظارات ذهنی کشاورز را تحت شرایط ریسک نشان می (هارداکر و همکاران، 1997). ضریب ریسک‌گریزی (RAC) 6 قابل تعريف است (1965-1996).

$$RAC = U''(X_j)/U'(X_j) \quad (6)$$

که U'' به ترتیب مشتق ی اول و دوم تابع مطلوبیت است. براین تابع مطلوبیت با توجه به رابطه 5 به این شکل نوشته می :

$$EU(X_j) = \sum P_i (e^{RAC \times Y_{ij} \times X_j}) \quad (7)$$

برای آسان کردن تفسیر مطلوبیت، از مفهوم معادل اطمینان (CE).

است از کمترین میزان پولی که به فرد (کشاورز) پرداخت می‌شود تا نسبت به انتخاب میان گزینه‌ی ریسکی و گزینه‌ی مطمئن بی (ریچاردسون، 2004). بنابراین، ارتباط یک به یکی میان معادل اطمینان و مطلوبیت وجود دارد. معادل اطمینان یک معیار عددی از مطلوبیت فرد است (هارداکر و همکاران، 1997). می‌توان با به دست آوردن معکوس تابع مطلوبیت، مقادیر مطلوبیت را به مقادیر CE تبدیل کرد (هارداکر و همکاران، 2004). بنابراین معادل اطمینان (CE) برابر با مجموع یک سری از مقادیر مطمئن با مطلوبیت‌های یک

$$8 \text{ مقادیر CE} \quad \text{هر گزینه‌ی ریسکی در بازه} \quad .$$

RAC دست می‌آید، و برای تحلیل تصمیم‌گیری می . معیار اولویت گزینه‌ها بر اساس بالاترین مقدار CE شده برای مقادیر واقع در بازه‌ی ریسک‌گریزی CE را دارا است گزینه ر و بقیه‌ی گزینه . گزینه‌بی که بالاترین CE

مزیت روش SERF در این است که می سطح مطلوبیت که بتوان معکوس آن را محاسبه کرد به کار گرفته شود (هارداکر و همکاران، 2004).

$$CE = \ln(EU(X_j)) / RAC = \ln(\sum p_i(e^{RAC \times Y_{ij} \times X_j})) \quad (8)$$

ریزی ریاضی: برای توجه به اثر شرایط

سطح بهینه‌ی کشت با توجه به ریسک تولید و آبیاری، از مدل برنامه‌ریزی غیر خطی ریاضی (DEMP) ماقزیمم کردن CE (بیسورت و مک کارل، 1990) که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\text{Max } CE = \ln(\sum P_i(e^{RAC \times Y_{ij} \times X_j})) / RAC \quad (9)$$

s.t

$$\begin{array}{ll} X_j & \text{Land} \\ a_{ij}X_j & \text{Water} \end{array}$$

محدودیت بیشترین زمین در دست حسب هکتار

میزان کل آب مصرفی بر حسب مترمکعب، a_{ij} نیاز ناخالص آبیاری آبیاری j بر حسب مترمکعب بر هکتار و X_j سطح زیرکشت در برنامه آبیاری j هکتار است.

با توجه به این که آبیاری ذرت در مرحله‌ی رشد رویشی و زایشی زمانی صورت می‌گیرد که رطوبت خاک به 70% ظرفیت کشاورزی رعه رسیده باشد (بنابراین در

تحقيق حاضر در مراحل رشد رویشی و زایشی رطوبت خاک 60% کم‌آبیاری در هر مرحله به معنی 10% کم‌آبیاری در هر مرحله.

های فرضی کم‌آبیاری ذرت در نظر گرفته شامل:

(1) 10% کم‌آبیاری در مرحله

- (2) ۱۰٪ کم آبیاری در مرحله
- (3) ۱۰٪ کم آبیاری در مرحله
- (4) ۱۰٪ کم آبیاری در مرحله
- (5) ۱۰٪ کم آبیاری در مرحله
- (6) ۱۰٪ کم آبیاری در مرحله
- (7) ۵٪ کم آبیاری در هر چهار مرحله

برای تعیین عملکرد هر یک از برنامه‌های آبیاری نیاز به تابع تولید آبیاری است.
کرد مزرعه تحت تاثیر شرایط آب و هوایی و همچونین سیاست

کشاورزی قرار دارد. بنابراین، برای به دست آوردن عملکرد واقعی نیاز به رابطه‌یی است که تحت تاثیر این عوامل قرار نگیرد، و تنها رابطه‌یی از آب، خاک و گیاه باشد. سلطانی و همکاران (1992) معتقدند که عواملی مانند ناکافی بودن داده‌های تجربی، زمان و هزینه‌ی زیاد برای تخمین توابعی که عملکرد را به میزان آب مصرفی ارتباط می‌دهد، از مشکلات اساسی مدیریت آبیاری در کشورهای جهان سوم است. بنابراین به دلیل خاص منطقه‌یی بودن تابع تولید تجربی این گونه توابع انتقال‌پذیر نیست، اما توابعی که عملکرد را به تبخیر و تعرق مربوط سازد، انتقال‌پذیر است و می‌توان از این توابع در مدیریت آبیاری بهره گرفت. بنابراین، این توابع برای عملکرد واقعی گیاه، در واقع می‌توان کم آبیاری یا به عبارتی ای آب کمتر از نیاز کامل گیاه، و در نتیجه عملکرد آن را مدل سازی کرد. بی که (1988) و دورنباش و کاسام (1979) برای پیش‌بینی محصول پیشنهاد کرده

صورت زیر است:

$$Y_a / Y_{\max} = \prod [1 - K_{yn} (1 - ET_{an} / ET_{\max})] \quad (10)$$

این رابطه n گیاه، y_{\max} بیشترین عملکرد قابل حصول (بدون محدودیت در شرایط بدون تنفس، y_a مقدار محصول در شرایط تنفس آبی، ET_{a1}, \dots, ET_{an} تبخیر و

تعرق واقعی، ET_{mn} ، ET_{ml} , ..., ET_{m1} تبخیر و رق پتانسیل k_{yn} فاکتور پاسخ عمل کرد گیاه نسبت به تنش آبی در مرحله n . این رابطه برای محاسبه کرد استفاده شد.

ی تبخیر و تعرق و نیاز آبی گیاه روش‌های متفاوتی از جمله اصل بیلان جرمی و روش محاسباتی و روش پنمن مانیث استفاده می (1385).

-Fao مربوط به تبخیر و تعرق و نیاز آبی گیاه به روش پنمن مانیث CropWat . بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مسولان جهاد کشاورزی و آب مقادیر

بی استان فارس شاخص کارآبی مصرف آب در سطح 44% مربوط به فاکتور حساسیت نسبت به تنش آبی در مراحل مختلف رشد گیاه متفاوت است.

چونین امکان بررسی تاثیرات تنش کم‌آبی بر عمل کرد گیاه را فراهم می‌سازد که توسط دورنbas و کاسام (1979) 33 محصول و نیریزی و ردزوفسکی (1977)

11-86 با توجه به این که منطقه زرگان فارس در طی سال 3 سال خشک و 6 سال تراسالی بوده (

1361 17 ہواشناسی منطقہ Bestfit کرد)، شبیه

. بهترین توزیع داده‌ها با استفاده از این نرم افزار، بتا جنرال

مشخص شد و سپس بر اساس بهترین توزیع داده‌ها شبیه سازی .

ی با توجه به قیمت ذرت در سال 86-87 و هزینه

مرربوط به تولید و هزینه‌ی آبی

ی رشد، بازده هر یک از برنامه‌های آبیاری سپس تابع توزیع تجمعی (CDF) هر یک از برنامه‌های آبیاری به امکان تجزیه و تحلیل بر اساس معیارهای برتری فراهم شد.

نتایج و بحث

(1) کرد ذرت دانه‌یی شبیه سازی شده در شرایط آب و هوایی نرمال نشان

. با توجه به مقادیر شبیه سازی شده در راه های مختلف کم آبیاری (D1,.....,

(D7) بالاترین عملکردها برای هر شبیه D1 D5 و کمترین مربوط
 (2) توزیع احتمال تجمعی بر اساس عملکرد دانه‌بی برای D4 D2
 های مختلف کم‌آبیاری محاسبه شده است. از این جدول برای تحلیل بر اساس معیار
 برتری تصادفی درجه .

کرد دانه‌بی (بر حسب تن در هکتار) شبیه .(1)

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
5/60	3/63	5/00	3/86	5/39	3/11	4/51
5/67	3/68	5/12	3/89	5/47	3/22	4/62
5/72	3/72	5/21	3/91	5/52	3/36	4/68
5/77	3/78	5/36	3/96	5/57	3/39	4/71
5/83	3/82	5/41	4/00	5/61	3/54	4/79
5/85	3/88	5/44	4/07	5/64	3/57	4/83
5/88	3/91	5/51	4/11	5/69	3/63	4/89
5/90	3/98	5/59	4/17	5/73	3/67	4/99
5/92	4/04	5/67	4/21	5/86	3/73	5/07
5/95	4/09	5/74	4/25	5/94	3/77	5/13
5/97	4/15	5/81	4/29	5/96	3/92	5/20
6/00	4/28	5/86	4/31	6/08	3/98	5/29
6/02	4/37	5/92	4/34	6/10	4/08	5/34
6/11	4/45	5/97	4/43	6/15	4/11	5/46
6/21	4/54	6/08	4/50	6/29	4/23	5/57
6/28	4/62	6/12	4/54	6/42	4/29	5/62
6/32	4/74	6/17	4/59	6/47	4/32	5/72
6/36	4/84	6/22	4/63	6/56	4/39	5/79
6/45	5/06	6/28	4/68	6/68	4/43	5/83
6/52	5/22	6/43	4/89	6/76	4/69	6/02

: یافته‌های تحقیق

(2). توزیع احتمال تجمعی کرد یی

P₁	P₂	P₃	P₄	P₅	P₆	P₇
0/058824	0/098844	0/034284	0/075119	0/077023	0/04153	0/062723
0/097066	0/118488	0/063244	0/090727	0/108056	0/068865	0/098684
0/129011	0/136079	0/095398	/102394	0/131538	0/121483	0/123755
0/173382	0/165674	0/173153	0/136241	0/158324	0/140058	0/137838
0/23803	0/187558	0/206214	0/168318	0/182165	0/226076	0/18057
0/2622	0/223559	0/227731	0/235177	0/201443	0/246711	0/204757
0/300675	0/24294	0/282535	0/279148	0/236164	0/294536	0/244443
0/32766	0/291484	0/352014	0/351758	0/266158	0/324879	0/318831
0/355577	0/336385	0/426831	0/403597	0/37515	0/378864	0/384349
0/398902	0/375712	0/49464	0/457189	0/448365	0/405106	0/435884
0/428532	0/424632	0/562604	0/511573	0/467052	0/541021	0/497354
0/47369	0/533659	0/610155	0/538747	0/579256	0/599509	0/576273
0/504021	0/60816	0/665057	0/579133	0/597586	0/683293	0/619026
0/637741	0/671286	0/70831	0/693877	0/648537	0/709303	0/71507
0/773925	0/736804	0/793089	0/772105	0/756369	0/788262	0/791456
0/841123	0/788857	0/81988	0/8112	0/841562	0/830415	0/821746
0/875183	0/854487	0/850145	0/853827	0/870859	0/847592	0/873515
0/90378	0/897431	0/876814	0/882883	0/908354	0/879505	0/902844
0/950092	0/95833	0/904188	0/913114	0/946667	0/897152	0/917184
0/972063	0/980751	0/9678	0/981098	0/964212	0/967186	0/964579


(مقادیر احتمال تجمعی برای هر راه p_1, \dots, p_7)

: یافته‌های تحقیق

تحلیل بر اساس برتری تصادفی درجه (FSD) نتایج FSD را که بر ملاحظه می‌شود که بر آبیاری کرد دانه‌یی، برنامه‌یی آبیاری (3)

D_6 هر شرایطی نسبت به برنامه‌های دیگر مغلوب است و پایین‌ترین عمل کرد دانه‌یی را دارا این یافته می‌تواند به این دلیل باشد که ذرت در دوره دهی و شکل‌گیری دانه با شرایط آب و هوای گرم تابستان مواجه است که حساس‌ترین مرحله تنش آبی است (میرهادی، 1380). بنابراین تنش در این مرحله تاثیری منفی بر عمل کرد گیاه و از طرفی بازده برنامه‌یی دارد. D_5 نیز نسبت به دیگر برنامه ولی نمی‌توان براساس معیار FSD مشخص کرد که گزینه‌یی برتر میان برنامه D_5 D_1 دلیل قطع CDF ها کدام . در نهایت تصمیم‌گیرنده باید میان D_5 D_1 به دلیل بالاتر های دیگر با توجه به شکل تابع CDF کرد دانه‌یی آن کرد دانه‌یی، های دیگر، انتخاب کند. انتخاب کند.

معیار FSD امکان انتخاب میان این دو .



: یافته‌های تحقیق

کرد ذرت دانه‌یی (1). برتری تصادفی درجه

(3). گزینه‌های غالب و مغلوب بر اساس معیار FSD کرد دانه‌یی ذرت

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	
		بی				-	D1
			بی تفاوت		-		D2
				-			D3
			-			بی	D4
		-				بی تفاوت	D5
	-						D6
-							D7

: یافته‌های تحقیق

ملاحظه می‌شود که بر اساس معیار FSD امکان تفکیک گزینه SSD کامل وجود ندارد. برای تفکیک از معیار SSD کرد در هکتار، مساحت زیر منحنی فراوانی تجمعی برنامه‌های آبیاری کارآمد است. باقی مانده از معیار FSD مساحت زیر منحنی تجمعی در برنامه D1 کم مساحت زیر منحنی فراوانی تجمعی برنامه D5 است. بنابراین، بر اساس معیار SSD می‌توان نتیجه گرفت که کم آبیاری در مرحله چهارم رشد ذرت نسبت به دیگر مراحل D5 (4) مساحت زیر منحنی رشد از حساسیت کم ترتیب با S5 S1

(4). مقادیر مساحت تجمعی دو راه D1 , D5


S ₅	P ₅	S ₁	P ₁	کرد
0	0/077023	0	0	5/39
0/006162	0/108056	0	0	5/47
0/017727	0/131538	0	0	5/52
0/024303	0/158324	0	0	5/57
0/030003	0/170244	0/036	0/058824	5/60
0/030684	0/182165	0/04	0/077945	5/61
0/036149	0/201443	0/07	0/087506	5/64
0/043401	0/218803	0/10	0/097066	5/67
0/046464	0/236164	0/12	0/113039	5/69
0/053549	0/251161	0/15	0/129011	5/72
0/056061	0/266158	0/16	0/151196	5/73
0/066707	0/293406	0/2	0/173382	5/77
0/084311	0/320654	0/26	0/23803	5/83
0/090725	0/347902	0/28	0/2622	5/85
0/094204	0/37515	0/29	0/281437	5/86
0/101707	0/393454	0/31	0/300675	5/88
0/109576	0/411757	0/33	0/32766	5/9
0/117811	0/430061	0/35	0/355577	5/92
0/126412	0/448365	0/37	0/37724	5/92
0/130896	0/457708	0/38	0/398902	5/95
0/135473	0/467052	0/39	0/413717	5/96
0/140143	0/495103	0/40	0/428532	5/97
0/154996	0/523154	0/43	0/47369	6
0/165459	0/551205	0/45	0/504021	6/02
0/198532	0/579256	0/51	0/570881	6/08
0/210117	0/597586	0/53	0/604311	6/10

(4)

S ₅	P ₅	S ₁	P ₁	کرد
0/216093	0/623062	0/54	0/637741	6/11
0/245377	0/648537	0/587	0/705833	6/15
0/282992	0/702453	0/64	0/773925	6/21
0/328651	0/729411	0/71	0/841123	6/28
0/335945	0/756369	0/72	0/858153	6/29
0/358636	0/798966	0/75	0/875183	6/32
0/390595	0/820264	0/79	0/90378	6/36
0/439811	0/841562	0/85	0/926936	6/42
0/465058	0/950092	0/88	0/950092	6/45
0/48881	0/870859	0/905	0/961077	6/47
0/527999	0/889606	0/95	0/9720693	6/52
0/563583	0/908354	0/99	0/972063	6/56
0/672585	0/946667	1/11	0/972063	6/68
0/748319	0/964212	1/19	0/972063	6/76

یافته‌های تحقیق

نتایج جدول (1) بیان این است که به ازای هر سطحی از احتمال تجمعی، مساحت زیر منحنی یا به عبارتی مطلوبیت مورد انتظار برنامه‌ی آبیاری D5 بیشتر از مساحت زیر منحنی (Mطلوبیت مورد D1) . این موضوع در نمودار (2) .




: یافته های تحقیق

(2). مساحت تجمعی هر یک از برنامه های آبیاری D5, D1 بر اساس معیار SSD

برای تحلیل بر اساس SERF نیاز به محاسبه معیار CE و مشخص کردن ضریب ریسک گریزی . بدین منظور، برای محاسبه d CE از تابع نمایی استفاده شد. برای تعیین ضریب ریسک گریزی از رابطه میان ریسک گریزی نسبی و مطلق استفاده گردید. این ضریب ریسک گریزی میان ریسک گریزی نسبی، $r_{a(w)}$ ضریب ریسک گریزی میان ریسک گریزی نسبی، $r_{f(w)}$ که $r_{a(w)} = r_{f(w)} / w$ ضریب ریسک گریزی نسبی است. آندرسون و دیلون (1992) ضریب ریسک گریزی نسبی را در بازه بی میان 0/5 (به سختی ریسک گریز) 4 (خیلی ریسک گریز) معین کردند. تابع مطلوبیت تصمیم گیرنده براساس ثروت یا سود ناخالص حاصل از آن گزینه ریسکی در نظر گرفته شد. هر چند که می وان تحلیل را بر اساس عمل کرد انجام داد، اما تفسیر نتایج، مشکل و یا غیر معقول است. بنابراین، مطابق با فرض های کلاسیک، تابع مطلوبیت تابعی از بازده برنامه بی در نظر گرفته شد. میانگین بازده ناخالص در هفت برنامه آبیاری برابر 383/91 (هزار ریال در هکتار) . بنابراین، بازه ریسک گریزی آبیاری مورد مطالعه میان 0,0105 0,0105 کشاورزان . کم آبیاری بر اساس بیشترین معادل اطمینان (CE) .

نتایج در نمودار (3) ملاحظه می شود که در طول ریسک گریزی، گزینه D5 گزینه D1 را می کارآیی حاصل از روش SERF را می بنا براین روش SERF توانایی بیشتری در تمایز میان گزینه ها دارد و در یک ضرایب ریسک گریزی، تعداد کمتری گزینه در مجموعه ای کارآرایه می کند.



: یافته های تحقیق

(3). نتایج روش SERF براساس معیار CE

برای تعیین سطح زیرکشت کشاورزا های مختلف کم آبیاری با توجه به محدودیت عرضه آب و دیدگاه آنها نسبت به ریسک، بازه ریسک گریزی 0,0105 مورد بررسی قرار گرفت. کشاورزان با $RAC=0/0105$, $RAC=0/0013$, ریسک گریز و ریسک پذیر در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از مدل بهینه 5 ارایه شده است.

5 ملاحظه می شود که کشاورز ریسک پذیر، بیشترین سطح زیرکشت را به در واقع کشاورز ریسک گریز، به برنامه D7 و کشاورز ریسک گریز، ریسک خود را میان گزینه ها پخش می کند، اما از دید کشاورز ریسک پذیر بالاتری ناخالص اهمیت بیشتری دارد، بنا براین بیشترین سطح زیرکشت را به گزینه بی اختصاص

می‌دهد که این هدف او را تامین کند. اما زمانی که کشاورزان با محدودیت آب رویه‌رو نیستند (نتایج مدل SERF)، تمام سطح زیرکشت را به طور قطع به برنامه D5 به دلیل بالاتر بودن کرد و به دنبال آن بازده ناخالص اختصاص می‌گردید. کشاورزان در شرایط محدودیت زمین و آب بر اساس نوع رفتار ریسکی، تصمیمات متفاوتی در رابطه با گزینه‌های مختلف کم‌آبیاری از خود نشان می‌خواهند. این امر می‌خواهد در شرایط محدودیت آب در مدیریت مزرعه اهمیت فراوانی داشته باشد.

(5). نتایج مدل برنامه ریزی ریاضی براساس RAC (انتخاب سطح زیر کشت در راههای مختلف کم‌آبیاری بر حسب هکتار)

کشاورز ریسک گریز (RAC = 0/0105)	کشاورز ریسک پذیر (RAC = 0/0013)	کم‌آبیاری
2/1	3	D1
0	0	D2
3/2	3/4	D3
0/3	0	D4
3/9	9/1	D5
0/7	0	D6
10/2	4/2	D7

: یافته‌های تحقیق

نتیجه‌گیری و پیش

های مختلف کم‌آبیاری ذرت دانه بی با استفاده از معیار برتری تصادفی غالب مورد بررسی قرار گردید. به طور کلی نتایج بر اساس معیار FSD نشان داد که آبیاری D₆ هر شرایطی نسبت به برنامه‌های دیگر مغلوب است، و پایین‌ترین

کرد دانه‌یی را دارا است. **D5** نیز نسبت به دیگر برنامه ولی بر اساس معیار FSD قابل تفکیک نبو . نتایج SSD نشان داد که در شرایطی که محدودیت آب و زمین وجود ندارد سطح زیر منحنی تابع توزیع تجمعی در برنامه‌ی آبیاری **D5** بیش از آبیاری **D1** . این موضوع نشان داد که گیاه ذرت در مرحله به میزان کمتر نسبت به کمآبیاری حساس است. رای لحاظ کردن ترجیحات ریسکی کشاورزی آبیاری از معیار SERF ریسک‌گریزی 0/0105 مقادیر معادل اطمینان (CE) و یا به عبارتی ارزش پولی گزینه کمآبیاری در برنامه **D5** های دیگر است. ین نتایج به شرایط نبود محدودیت در مقدار آب و زمین قابل تعمیم است. اما نتایج مدل بهینه‌سازی نشان داد که زمانی که کشاورز با محدودیت آب و زمین مواجه شود، بر اساس نوع دیدگاه ریسکی خود رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت در هر برنامه‌ی آبیاری نشان می . کشاورزان ریسک‌پذیر بالاترین سطح زیرکشت را به برنامه **D5** (کمآبیاری در مرحله در حالی که بالاترین سطح زیرکشت کشاورزان ریسک‌گریز در برنامه **D7** (کمآبیاری در هر) . این نتیجه بیان‌گر اهمیت دیدگاه و درجه‌ی ریسکی کشایط محدودیت آب در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس برنامه‌های متفاوت کمآبیاری است، و می‌تواند در تصمیم‌گیری و کاهش مصرف آب در مزرعه و تاثیر بر عمل کرد محصول و به بی کشاورز موثر باشد. بنابراین، ش کشاورزی، ب کارگیری هر راهکار به جویی در آب و نیز افزایش سطح زیرکشت اهمیت زیادی . از طرفی در تمام برنامه‌هایی که برای کشاورزان در سطح تصمیم‌گیری کلان یا خرد صورت می‌گیرد، توجه به دیدگاه آنان نسبت به ریسک می تحلیل تصمیمات و سیاست ها اثرگذار و مفید باشد.

امیر تیموری، س. و چیدری، ا. (1378). بررسی خودکفایی پویا در تولید ذرت دانه‌یی در ایران، رهیافت محاسبه وری کل عوامل تولید: پژوهش و سازندگی در زراعت و باطنی. 79.

زیبایی، م.، سلطانی، غ.، ترکمانی، ج.، خلیلی. و بهبودیان، ج. (1380). ریسک - کاری آبیاری گندم در منطقه کوار. کاربرد معیارهای برتری تصادفی، اقتصاد کشاورزی و توسعه 36 (9): 75-90.

کمیته ملی اصول و کاربرد کمآبیاری. (1385). توکلی، ع. آبیاری و زهکشی ایران.

میرهادی، م. (1380). سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.

Anderson, J.R., Dillon, J.L. and Hardaker, J.B. (1992). Agricultural Decision Analysis. Iowa State University press. Ames.

Arrow, K.J. (1965). Aspects of the theory of risk-bearing. Academic Bookstore, Economics, Texas A , M University. Helsinki. introduction to the Excel simulation add-in: Simetar. Department of Agricultural

Boisvert, R.N. and McCarl, B. (1990). Agricultural Risk Modeling Using Mathematical Programming. Bulletin NO 356, Southern Cooperative Series, Department of Agricultural Economics, Cornell University, Ithaca, NY.

Botes, J.H.F. (2005). An Economic of Wheat Irrigation Scheduling Strategies using Stochastic Dominance. MScAgric Dissertation. Department of Agricultural Economics, University of the Free State, Bloemfontein

Doorenbos, J. and kassam, A.H. (1979). Yield Response to Water, FAO Irrigation and Drainage Paper, NO.33, Rome, Italy.

English, M. and Raja, S.N. (1996). Review: perspectives on deficit irrigation. *Agricultural Water Management*, 32(1):1-14.

Gravte, B. and Nel, F. (2006). Stochastic efficiency analysis of alternative water conservation strategies. *Journal of Agricon*, 45: 131-152.

- Grove, B. and Oosthuizen, L.K. (2002). An economic analysis of alternative water use strategies at catchment level taking into account an Instream flow requirement. *Journal of American Water Resources Association*, 38(2): 385-395.
- Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M. and Anderson, J.R. (1997). Coping with Risk in Agriculture. CAB International, Wallingford, UK.
- Hardaker, J.B. and Lien, G. (2003). Stochastic efficiency analysis with risk-aversion bounds: a simplified approach. Working Paper No. 2003-1, University of New England, Department of Agricultural and Resource Economics, Armidale, NSW.
- Hardaker, J.B., Richardson, J.W., Lien, G. and Schumann, K. D. (2004). Stochastic efficiency analysis with risk aversion bounds: a simplified approach. *The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 2: 253–270.
- Mottram, R., De Jager, J.M., Jackson, B.J. and Gordijn, R.J. (1995). Irrigation water distribution management using linear-programming. Proceedings of the Southern African Irrigation Symposium, 4-6 June 1991, Durban. WRC Report No TT 71/95, The Water Research Commission, Pretoria, 32: 36-122.
- Nairizi, S., and Rydzewski, J.R. (1977). Effects of dated soil moisture stress on crop yields, Exp.Agnic, 13: 51-59.
- Pratt, J.W. (1964). Risk Aversion in the Small and in the large. *Econometrica*, 32:36-122.
- Rao , N.H., Sarama, P.B.S. and Chander, S. (1988). A simple Dated Water- Production Function for use in Irrigated Agriculture, *Agric. Water Management*, 13: 25-32.
- Richardson, J.W., Schumann, K. and Feldman, P. (2004). Simetar: Simulation for Excelto analyse risk. Department of Agricultural Economics, Texas A, M University.
- Soltani, G.R., Pandey, S. and Musgrave, W.F. (1992). Problems of transferring crop- water production function knowledge to developing countries, *Water Resource Research*, 96-101.
- Weinberg, M., Kling, C.L. and Wilen, J.E. (1993). Water markets and water utility. *American Journal of Agricultural Economics*, 75(2): 278-291.