

مروري بر مکانيسم ها و تئوري های پيرى

دكتر غلامرضا آذری
استاديار دانشگاه علوم بهريستي و توانبخشي

چكيده:

فاكتورهاي متعددی مشوق مطالعات مربوط به طول عمر بوده اند که افزایش متوسط طول عمر و افزایش حداکثر طول عمر و افزایش درصد سالمندان جوامع و افزایش درصد بودجه جوامع که صرف سالمندان می شود از آن جمله اند.

ديگاه های اخیر نسبت به مکانيسم های پيری حاکی از فرایندهای بسيار پيچيده و چند عاملی می باشد که بر خلاف ديگاه های اوليه است که بر علت مشخص مانند اثر يك زن يا از بين رفتن يك عامل کلیدي تاکيد می کردنند (۱).

اين مروري مختصر سعی دارد مکانيسم های پيری را در سطوح مولکولي سلولی و سيستميک بررسی نماید و همچنین جنبه های مختلف تاثير مقابل ژنتيك و محيط را مدنظر داشته باشد.

تئوري های تکاملی پيری را تئيجه کاهش نيري انتخاب طبیعی می دانند و در مقابل تئوري های مولکولي بر تنظيم ژنتيكی پيری تاکيد دارند و سالمندي را نتيجه تغييرات در ژن ها می دانند.

تئوري های سلولی نيز وجود دارند که مشهورترین آنها تئوري تلومر است و پيری حاصله از استرس نيز در اين گروه قرار دارد. تئوري های آزاد راه شناخته شده بعدی برای آسیب های سلولی است.

در نهايّت تئوري های سيستميک قرار دارند که شامل دو گروه اصلی نوزواندوكرین و ايمونولوژيك می باشد.

كلید واژه ها: پيری، تئوري های مکانيسم ها

دكتر غلامرضا آذری
استاديار دانشگاه علوم بهريستي و
توانبخشي
تلفن: ۰۴۴۱۷۷۵۳
azarig@dr-azarig.com

آنها يك جنبه را بيشتر توجيه می کند و در عمل تمام اين مکانيسم ها به همراه يكديگر می توانند فرایند کلی پيری را شکل دهند.

علاوه بر تنوع مکانيسم ها و تئوري های پيری حتی تعريف خود پيری هنوز مورد اختلاف است (۲،۳).

در پاسخ سؤال "چرا ما پير می شويم؟" پيری يك موضوع رشد شناسی است، پروسه اى شامل مسن تر شدن و مجموعه اى از تمام تغييرات فيزيولوژيك و ژنتيك و مولکولي که طی گذر زمان از تشکيل سلول تحتم تا مرگ فرد رخ می دهند. در پاسخ سؤال "چرا ما همين قدر عمر می کنيم؟" پاسخ تکاملی - تطبیقی را خواهيم یافت و در پاسخ سؤال "چرا ما می ميريم؟" پاسخ باید پيری را به عنوان يك پروسه به مرگ یعنی حادثه اى که در تمام زندگی می توانند رخ بدهد ربط دهد. اگرچه پيری با عدم توانائي پاسخ به استرس و افزایش عدم تعادل هوموستاتيك و بروز پاتولوژي مشخص می شود و هنوز مرگ به عنوان پروسه نهايی پيری باقی می مانند.

تئوري هايي که سعى کرده اند پيری را توضیح دهند در

متن:

طي دهه های اخير، مطالعات پيری شناسی و سعی بسياري پيدا کرده اند که محرك اين افزایش و سعی شاملا چند عامل زير است:

- ۱) افزایش ميانگين طول عمر بشر در تمامي کشورها
 - ۲) افزایش كمتر ولی معنی دار در حداکثر طول عمر بشر
 - ۳) افزایش تعداد سالمندان بخصوص در کشورهای توسعه يافته
 - ۴) افزایش درصد بودجه بهداشتی درمانی که توسط سالمندان مصرف می شود
- داده های فراوان بیولوژيك، اپيدميولوژيك و دموغرافيک باعث شده اند که تئوري های متعددی برای توضیح و تفسیر پيری و متعاقباً مرگ بوجود بیانند هرچند که در سال های اخیر به جای يك عامل مانند ژن يا يك عامل کلیدي ديگر به مکانيسم های پيری به شکل چند عاملی و پيچيده نگاه شده است.

علاوه بر آن در تئوري های جدید يك تئوري به تنهايي تمام جنبه های پيری را توجيه نمي کند و هر کدام از

توسط بیماری های قلبی - عروقی طی سال های ۱۹۷۰-۸۰ می باشد^(۴).

هم چنین یافته های آزمایشگاهی مبنی بر افزایش طول عمر توسط محدود کردن کالری مصرفی یا دخالت در مکانیسم تولید رادیکال های آزاد و آسیب رسان و دخالت سیستم هورمونی وجود دارد^(۵). جدول شماره ۱ لیستی از مکانیسم ها و تئوری های پیری را ارائه می کند که در ادامه به ترتیب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تئوری های تکاملی

چرا ما همین قدر زندگی می کنیم؟ تئوری های تکاملی عنوان می کنند که پیری نتیجه کاهش نیروی انتخاب طبیعی است، چون فرایند تکامل می خواهد حداکثر تطابق تولید مثلی را در فرد فراهم کند بنابراین طول عمر فقط در صورت مفید بودن آن انتخاب خواهد شد.

تئوری های تکاملی در سال ۱۹۴۰ براساس مشاهده یک بیماری بوجود آمدند^(۶). بیماری هانتینگتون که در آن فرد طی ۳۰-۴۰ سالگی می میرد ولی قبل از مردن فرصت تولید مثل را دارد بنابراین تئوری تجمع موتاسیون مطرح شد که موتاسیون های غیر مؤثر بر تولید مثل زیاد شده و در نهایت

چند گروه بندی جای می گیرند:

خیلی از آنها پیری را برنامه ریزی شده یا بر عکس محصول خطای می دانند مطابق تئوری برنامه ریزی شده ساعت های بیولوژیک طول عمر را مشخص می کنند و از طریق گذر از مراحل رشد و توسعه، بلوغ و میانسالی به پیری می رسدند این سیر می تواند به زن ها وابسته باشد که طی زمان های مشخصی سیگنال های روشن و خاموش را به سیستم عصبی - غددی و ایمونولوژیک ارسال می کنند و مسئول هومئوستاز و پاسخ های ایمنی هستند. در مقابل تئوری های مبتنی بر خطای مسائل محیطی آسیب رسان را مسئول می دانند که به طور پیشرونده ای به موجود زنده آسیب می رسانند.

گروه بندی شایع دیگر تئوری هارا در گروه های تکاملی مولکولی، سلولی و سیستمیک قرار می دهد. علت انتخاب این ترتیب، اثر فیزیولوژیک مرتب بر آن است یعنی اختلالات مولکولی می تواند به اختلالات سلولی و اختلالات سلولی می تواند به اختلالات سیستمیک متوجه شوند و تمام اینها تحت تأثیر فرایند تکامل می باشند.

در واقع افزایش طول عمر بشر حاصل ۱- تغییرات اپیدیمیولوژیک طی دهه های اخیر در کاهش بیماری های عفونی پس از کشف آتشی بیوتیک ها ۲- کاهش مرگ و میر

Table 1 : Classification and brief description of main theorise of aging

Biological Level / Theory	Description
Evolutionary Mutation accumulation Disposable soma Somatic Antagonistic pleiotropy	Mutations that affect health at older ages are not selected against. cells are maintained only to ensure continued reproductive success; after reproduction, soma becomes disposable. Genes beneficial at younger age become deleterious at older ages.
Molecular Gene regulation Codon restriction Error catastrophe Somatic mutation Dysdifferentiation	Aging is caused by changes in the expression of genes regulating both development and aging. Fidelity/accuracy of mRNA translation is impaired due to inability to decode codons in mRNA. Decline in fidelity of gene expression with aging results in increased fraction of abnormal proteins. Molecular damage accumulates, primarily to DNA/genetic material. Gradual accumulation of random molecular damage impairs regulation of gene expression.
Cellular Cellular senescence (Telomere theory) Free radical Wear-and-tear Apoptosis	Phenotypes of aging are caused by an increase in frequency of senescent cells Senescence may result from telomere loss (replicative senescence) or cell stress (cellular senescence). Oxidative metabolism produces highly reactive free radicals that subsequently damage lipids, protein and DNA. Accumulation of normal injury. Programmed cell death from genetic events or genome crisis.
System Neuroendocrine Immunologic Rate-of-living	Alterations in neuroendocrine control of homeostasis results in aging-related physiological changes. Decline of immune function with aging results in decreased incidence of infectious diseases but increased incidence of autoimmunity. Assumes a fixed amount of metabolic potential for every living organism (live fast, die young).

را پیش می‌برند ولی اخیراً "بعضی تغییرات ژنتیک که منجر به کاهش یا افزایش طول عمر می‌شوند شناخته شده‌اند. یکی از پیشرفت‌های تحقیقات پیری شناسی یافتن یک مسیر سیگنالینگ شبه انسولینی است که طول عمر کرم و مگس و موش را تنظیم می‌کند^(۱۰). دستکاری این مسیر سیگنالینگ باعث افزایش طول عمر می‌شود که نشانه آن است که تظاهر ژن می‌تواند طول عمر را تنظیم کند. فهمیدن این که چگونه طبیعت پیری را توسط تغییر در تظاهر ژن به عقب می‌اندازد می‌تواند مطالب زیادی را در پروسه پیری آشکار نماید و نقطه شروعی برای درمان‌های آهسته کننده پیری باشد.

مطالعات مربوط به افراد صد ساله و بستگان آنها آشکار کرده است که نوعی توانائی ژنتیک برای رسیدن به این سنین وجود دارد. در یک مطالعه نشان داده شد که فراوانی مرگ و میر در برادران و خواهران افراد صد ساله نصف افراد طبیعی می‌باشد^(۱۱، ۱۲). این نشان دهنده آن است که طول عمر این افراد بیشتر به عامل ژنتیکی وابسته است تا عوامل محیطی یا فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی. اخیراً یک مطالعه دیگر محلی روی کروموزوم ۴ را حاوی ژن هایی دانسته است که در طول عمر مؤثرند^(۱۳). اکثر مطالعات ژنتیک روی موجوداتی با طول عمر کوتاه انجام شده است و جالب خواهد بود که این مطالعات روی موجودات با طول عمر زیاد یا انسان نیز انجام شود.

تئوری‌های سلولی

پیری سلولی و تئوری تلومر:

تئوری پیری سلولی در سال ۱۹۶۵ ارائه شد که پیری سلولی به عنوان پروسه‌ای توصیف شد که تعداد تقسیم سلول در محیط کشت را محدود می‌کند^(۱۴). این محدودیت در قدرت تکثیر بعد از تعداد مشخصی از تقسیم در سلول‌ها با تغییرات فیزیولوژیک مشخص اتفاق می‌افتد. پیری سلولی می‌تواند در پاسخ به وقایع مولکولی مشخص نیز اتفاق بیفتد در این بحث مابین پیری سلولی از هر نوع با پیری تکثیری و پیری سلولی حاصله از استرس تفکیک قائل خواهیم شد. پیری تکثیری یک نوع اختصاصی از پیری سلولی است که نتیجه از بین رفتن تلومرها می‌باشد که ساختمان‌های اختصاصی هستند که در انتهای هر کروموزوم خطی قرار

منجر به پاتولوژی و پیری می‌شوند البته در حال حاضر مدارک کمی مبنی بر واقعیت داشتن این تئوری وجود دارد^(۷). در طرف مقابل طول عمر تقریباً "مشخص هرگونه از موجودات زنده به بهترین وجه توسط این تئوری توجیه می‌شود زیرا طول عمر، حاصل استراتژی بقا و تولید مثل در یک محیط رقابتی می‌باشد. از طرف دیگر موجوداتی که به علت آسیب‌های محیطی زودتر می‌میرند در واقع طول عمر مناسب محیط اختصاصی خود را داشته‌اند. این تئوری با حذف دشمنان طبیعی یک موجود زنده در محیط آزمون شده است و مشاهده شده که طول عمر آنها زیادتر شده و روند پیری در آنها کاسته می‌شود.

تئوری بدن یک بار مصرف یا دور اندامختنی می‌گوید که جسم ارگانیسم نگهداری می‌شود که تولید مثل انجام دهد و پس از آن باید بدور اندامخته شود. اصل در این تئوری آن است که نگهداری جسم ارگانیسم یا به عبارتی طول عمر هزینه‌ای دارد و این هزینه باید در مقابل کار آن برای تطبیق تولید مثلی سنجیده شود پس می‌توان از تقسیم منابع مصرف شده برای نگهداری جسم بر تطبیق تولید مثلی آن موجود طول عمر مناسب را پیدا کرد.

تئوری پلیوتروپی آنتاگونیستیک می‌گوید که بعضی از ژن‌ها ممکن است برای منافعی که در ابتدای زندگی برای موجود دارند انتخاب شوند ولی عوارض غیرانتخابی در طول زندگی داشته باشند و به سالمندی منتهی شوند. این تضاد بین تولیدمثل و طول عمر بوسیله تجربیاتی در حیوانات حمایت شده است. در انسان نیز مثلاً "رشد و عملکرد طبیعی پروستات توسط آنдрوروژن‌ها صورت می‌گیرد ولی در پیری همان هورمون در اتیولوژی کانسر پروستات شرکت می‌کند که یکی از عوامل مرگ و میر مردان مسن است. البته رابطه بین طول عمر و باروری مطلق نیست مثلاً "مورچه‌های کارگر از ملکه حمایت می‌کنند و او هر روز تولید مثل می‌کند و تا سی سال می‌تواند زندگی کند^(۸).

تئوری‌های مولکولی

تئوری تنظیم ژنی پیری بیان می‌کند که سالمندی از تغییرات در بروز ژن‌ها ناشی می‌شود^(۹). اگر چه ژن‌های بسیاری هستند که تظاهر آنها با افزایش سن تغییر می‌کند بعید است که انتخاب روحی ژن‌هایی اثر کند که سالمندی

فیزیولوژی تغییر یافته سلول پیر ممکن است در ایجاد پیری و سرطان بوسیله اثرات ثانویه سلول بر روی بافت نقش داشته باشد به عنوان مثال سلول های اندوتیال پیر سیتو توکسین پیش التهابی ایترولوکین ۱a و فاکتور رشد شبه EGF را بیشتر تولید می کند. این تغییرات در یک محیط آسیب رسان به کاهش عملکرد ارگان افزایش خطر بروز کانسر منتهی خواهد شد (۲۵،۲۶).

پروتئین مهار کننده تومور P53 یک تنظیم کننده کلیدی پاسخ های نقطه کنترلی برای بحران های ژنومی است. از جمله چندین عملکرد که برای آن قائل شده اند فعال کردن ایست گذرای چرخه سلول، آپوپتوزیس، پیری برداری و SIS در پاسخ به آسیب DNA در اثر اشعه و از بین رفتن تکثیر تلومری می باشد (۲۷). نوع پاسخ سلولی وابسته به P53 "معمول" به نوع سلول اختصاصی و شدت آسیب بستگی دارد.

موس دارای موتاسیون P53 افزایش بروز سرطان را نشان می دهد (۲۸) و سیگنالینگ P53 در تقریباً ۸۰ درصد سرطان های انسانی تغییر می کند. نشان می دهد که عملکردهای وابسته به P53 در مهار تومورها مهم هستند.

پیری کپی برداری و SIS ممکن است نقش بیولوژیک پیش گیری از سرطان را با محدود کردن قدرت تکثیر سلولی داشته باشند، البته اگر پیری سلولی مانع بروز سرطان می شود پس چگونه می توان توضیح داد که سرطان و پیری سلولی با افزایش سن هر دو زیاد می شوند؟ یکی از راه حل های این مسئله آن است که به تئوری پاییوتربی آنتاکوئنیستیک برگردیم که پیری سلولی برای مهار سرطان در ابتدای زندگی انتخاب شده است ولی اثرات غیر انتخابی آن در مراحل پس از سن باروری نمود پیدا می کند.

P53 برای پیری سلولی لازم است و کمبود P53 مانع فنوتایپ پیری زودرس در موس دارای موتاسیون تلومری می شود. این داده ها پیشنهاد می کنند که پروسه های وابسته به P53 از جمله پیری سلولی مسئول فنوتایپ پیری زودرس در موس دارای موتاسیون تلومری می باشد (۲۹). از طرف دیگر موس های دارای P53 بیش فعال خیلی کمتر دچار کانسر می شوند و درمان هایی که P53 را در سلول های پیر غیرفعال کنند باعث می شوند که سلول ها "مجدد" وارد چرخه تکثیر شوند. به هر حال اگرچه در موس معلوم نیست

دارند. با هر تقسیم قسمتی از DNA انتهای کروموزوم از بین می رود و تلومر کوتاه تر می گردد چنانچه تلومر از حدی کوتاه تر شود سلول قابلیت تکثیر خود را از دست می دهد و در واقع پیری تلومری اتفاق می افتد (۱۵). فعال کردن آنزیم تلومراز تلومر را بازسازی می کند و از این نوع پیری جلوگیری می شود و کشت های سلولی فنا ناپذیر را ایجاد می کند (۱۶).

پیری سلولی حاصله از استرس یا SIS در پاسخ به استرسورهای متعددی اتفاق می افتد که "معمول" شامل (۱) آسیب ۲ DNA (تغییرات در ساختمان هتروکروماتین) (۲) سیگنال میتوژنیک قوی در نتیجه تظاهر انکوژن ها می باشد (۱۷).

سلول های اختصاصی فنا ناپذیر مثل Stem cell یا Grem cell و لنفوسيت آنزیم تلومراز را تولید می کنند و طول تلومر را ترمیم می کنند یا فرسایش آن را به تأخیر می اندازنند. هم چنین همه سلول های سرطانی تلومراز را فعال می کنند و یا مسیر مشابهی را برقرار می کنند که مانع پیری تلومری شود.

تجربه های اولیه در سلول های کشت شده نشان داد که رابطه ای بین سن اهدا کننده و قدرت تکثیر سلول وجود دارد که پیشنهاد می کند که سلول های افراد مسن تر قابلیت محدود تری برای تکثیر های بعدی دارند. به طرز مشابهی ارگانیسم های با طول عمر کمتر دارای سلول هایی هستند که سریع تر پیر می شوند و در مقابل سول های ارگانیسم های با طول عمر بیشتر دیرتر پیر می شوند.

نشانگرهایی نیز وجود دارند که با افزایش سن روی سلول ها تجمع پیدا می کنند و در اکثر بافت ها مشاهده می شوند. البته هنوز قطعی نیست که این نشانگر ها نشان دهنده یک سلول مسن در بدن باشد (۱۸،۱۹). هم چنین مطالعات متعددی پیشنهاد می کنند که آترواسکلروز از تغییرات پیری در سلول های اندوتیال بوجود می آید (۲۰،۲۱،۲۲). سندرم ورنر یک حالت مشخص است که در آن تا بلوغ فرد سیر طبیعی را می پیماید ولی پس از آن پیری زودرس مشاهده می شود و جالب است که این پیری زودرس همراه آترواسکلروز است و علاوه بر آن سلول های فرد دارای سندرم ورنر و مدل حیوانی مشابه در موس هر دو با تغییرات پیش رو نده پیری در کشت سلولی مشخص می شوند (۲۳،۲۴).

"واقعاً" دچار بیماری می شوند و زودتر می میرند اگرچه باز هم واضح نیست که آنها در عمل سریع تر پیر شوند . هم چنین در جوندگان با SOD بیش فعال طول عمر بیشتری ایجاد ننمی شود.

اشعه یونیزه کننده باعث تولید رادیکال های آزاد می شود و با کمال تعجب مقدار کم اشعه یونیزه کننده که مداوم باشد طول عمر جوندگان را زیاد می کند^(۳۴)! محدودیت کالری دخالتی است که طول عمر تقریباً "هر ارگانیسمی را زیاد می کند. در جوندگان محدودیت کالری تولید ROS را از میتوکندری کم می کند و در پی آن آسیب تجمعی رادیکال آزاد کم می شود^(۳۵). تئوری رادیکال آزاد توضیح خوبی برای اثر افزایش طول عمر توسط محدودیت کالری است زیرا با وجود اینکه محدودیت کالری باعث تغییر عملکرد بسیاری از مولکول ها و سلول ها و سیستم های بدن می شود ولی پیدا کردن رابطه ای فیزیولوژیک بین این تغییرات فراوان و افزایش طول عمر مشکل است.

تئوری رادیکال های آزاد به چند فرضیه تقسیم شده است این تقسیم براساس نقش اختصاصی ارگانل ها و انواع مولکول های آسیب دیده طی پروسه پیری است. یکی از این فرضیه ها بیان می دارد که موتاسیون در DNA میتوکندری آسیب رادیکال آزاد را بوسیله تغییر در اجزای آنزیمی زنجیره انتقال الکترون تشکیل می کند. انتقال ناقص الکترون منجر به نشت بیشتر رادیکال آزاد و موتاسیون بیشتر DNA میتوکندری می کردد و سیکل مثبت آسیب ادامه پیدا می کند. این چرخه مثبت موتاسیون و تولید اکسیدان درنهایت به فاجعه سلولی و ناتوانی ارگان و پیری می انجامد^(۳۶).

فرضیه دیگر بحث می کند که رادیکال های آزاد باعث پیری می شوند زیرا پروتئین های اکسیده در سلول تجمع پیدا می کنند و یک کاهش وابسته به سن در توانایی از رده خارج کردن پروتئین های اکسیده ممکن است به ساخت مولکول های آسیب دیده منجر شده و عملکرد سلول مختلط می گردد. تئوری موتاسیون سوماتیک بیان می کرد که تجمع موتاسیون های ژنتیک در سلول های سوماتیک عامل اصلی پیری است و رادیکال آزاد می تواند منبع مهم ایجاد موتاسیون باشد^(۳۷).

که پیری تلومری چقدر در پیری نهائی شرکت داشته باشد ولی دلایل دیگری وجود دارد که در انسان این پدیده در پیری معمولی شرکت می کند.

تئوری رادیکال های آزاد:

این تئوری در سال ۱۹۷۵ پیشنهاد شد^(۳۰) و یکی از بهترین و شناخته شده ترین تئوری هاست و البته تا امروز مورد اختلاف نظر فراوان نیز بوده است. همه ارگانیسم ها در محیطی زندگی می کنند که دارای رادیکال های آزاد از جمله انواع اکسیژن واکنشی یا ROS می باشند، تنفس میتوکندریال که در تمام یوکاریوت ها پایه تولید انرژی است ROS را تولید می کند که این تولید به نشت از چرخه انتقال الکترون وابسته است^(۳۱). از خاصیت عام رادیکال آزاد اکسیداتیو در حضو آنزیم دیسموتاز سوپراکسید(SOD) کاسته می شود. این آنزیم در همه ارگانیسم های هوایی وجود دارد و منحصرآ" آبیون های سوپراکسید را از بین می برد.

آسیب اکسیداتیو سلولی غیراختصاصی است و دلایلی مبنی بر آسیب DNA و پروتئین و مولکول های چربی وجود دارد^(۳۲). تئوری رادیکال های آزاد بیان می کند که واکنش به رادیکال های آزاد در بیولوژی ذاتی است و به آسیب تجمعی و پیری می انجامد و در عمل سطح بالای آسیب اکسیداتیو DNA و پروتئین در ارگانیسم های مسن قابل مشاهده است. اگرچه آسیب رادیکال های آزاد با افزایش سن تجمع پیدا می کند ولی هنوز معلوم نیست که این پروسه چگونه به پیری کلی کمک می کند. با توجه به وسعت بحث رادیکال های آزاد مقالات مور متعددی برای بررسی تئوری فوق نوشته شده است.

در بعضی از گونه های کرم با طول عمر دراز مشاهده شده است که دارای SOD بیشتری بوده اند و با افزایش سن فعالیت SOD آنها نیز افزایش پیدا می کند^(۳۳) و همراه با شواهد دیگر این امر نشان می دهد که آنتی اکسیدان ها می توانند باعث آهسته شدن روند پیری در این ارگانیسم های با عمر کوتاه بشوند ولی هنوز معلوم نیست که این اثر در پستانداران بزرگ با طول عمر بیشتر چگونه است. آنتی اکسیدان های خوراکی تجمع مولکول های اکسید شده را در موش کاهش می دهد ولی این موضوع به افزایش طول عمر موش متنه نمی شود. جوندگان با موتاسیون SOD

هیجانی ممکن است ظرفیت سازگاری را تحریک یا تضعیف کند و متنهی به چیزی شود که به آن "بیماری سازگاری" می‌گویند و البته در نهایت به مرگ منجر خواهد گردید. بنابراین کاهش توانایی مقابله با استرس یکی از تعاریف متعدد پیری است که رابطه نزدیک استرس و طول عمر را بیان می‌کند (۴۲، ۴۳).

اجتماع محرك های محیطی که هیپوتالاموس باید به آنها پاسخ دهد توسط قسمت های مختلف سیستم عصبی جمع‌آوری شده و به هیپوتالاموس منتقل می‌شود این قسمت ها شامل قشر مغز، لوب لیمبیک و تشکیلات مشبك می‌باشد.

خود هیپوتالاموس تنظیم موارد زیر را بر عهده دارد:

- (۱) عملکردهای مهم و متعددی از سیستم عصبی به عنوان

مثال فعالیت های احساسی سمپاتیک و پاراسمپاتیک

۲) رفتارها مانند رفتارهای هورمونی، جنسی، خشم و

ترس

۳) عملکردهای غددی مانند هورمون های محرك و مهاری از هیپوفیز

در پاسخ به سیگنانل های هیپوتالاموس، هیپوفیز به عنوان اصلی ترین غده بدن تولید و ترشح چندین هورمون را به عنوان اصلی ترین تنظیم کننده فعالیت های مهم بدن به عهده دارد. تنظیم هیپوفیزی با آزاد کردن هورمون مانند هورمون رشد، اکسی توسین و وازوپروسین و یا تحریک کردن غده درون ریز دیگری مانند قشر فوق کلیه، تیروئید یا گنادها صورت می‌گیرد.

غده فوق کلیه از یک قشر که یک قسمت مرکزی را احاطه می‌کند تشکیل شده است. هورمون های اصلی قسمت مرکزی کاتکول آمین های ابی نفرین و نوراپی نفرین هستند که به عنوان نوروترانسミترهای بخش سمپاتیک سیستم عصبی خود مختار عمل می‌کنند. این دو به هر نوع استرس محیطی یا داخلی سریعاً پاسخ می‌دهند و نتیجه کار آنها تنظیم گردن خون (افزایش فشار خون) و تنظیم متابولیسم (افزایش مصرف چربی و کربوهیدرات) می‌باشد (۴۴). در پیری کاهش پاسخ دهی سمپاتیک به استرس ایجاد می‌شود که مشخصه آن:

۱) کاهش گیرنده های کاتکول آمین ها در بافت هدف

۲) کاهش پروتئین های شوک حرارتی که مقاومت را

نسبت به استرس افزایش می‌دهند

در تئوری های سیستمیک پروسه پیری به زوال ارگان هایی از سیستم ربط داده می‌شود که برای دو مورد زیر اساسی باشند:

۱) کنترل و نگهداری دیگر سیستم های داخل ارگانیسم

۲) حفظ توانائی ارگانیسم برای برقراری ارتباط و سازگاری با محیطی که در آن زندگی می‌کند

۳) در انسان همه سیستم ها ضروری هستند و برای بقا

لازم‌مند ولی سیستم عصبی - غددی و ایمنی یک نقش کلیدی دارند به علت اینکه این دو سیستم اثرات جامعی در هماهنگی دیگر سیستم ها دارند و در پاسخ های واکنشی و دفاعی به

محرك های داخلی و خارجی نقش اصلی را دارند.

تئوری نورواندوکرین:

این تئوری پیشنهاد می‌کند که پیری وابسته به تغییرات

عملکرد سیستم عصبی - غددی می‌باشد که این عملکردها برای موارد ذیل حیاتی هستند:

۱) هماهنگ کردن ارتباط و پاسخ کل سیستم بدن به محیط

خارجی

۲) برنامه ریزی پاسخ های فیزیولوژیک به محرك محیطی

۳) نگهداری حالت عملکردی مناسب برای تولید مثل و بقا در حین پاسخ به تقاضاهای محیطی

این تغییرات در طبیعت تعیین کننده اند و نه تنها بطور انتخابی روی نورون ها و هورمون ها اثر می‌کنند و عملکردهای معنی دار تکاملی را شکل می‌دهند بلکه بر روی تنظیمهای سیستم عصبی - غددی اثر می‌کنند و بقا را از طریق سازگاری با استرس تأمین می‌کنند.

بنابراین طول عمر به عنوان یکی از عملکردهای چرخه ای بدن است که بوسیله ساعت های بیولوژیک تنظیم می‌شود و در ادامه مراحل متوالی قرار می‌گیرد که توسط سیگنانل های سیستم عصبی - اندوکرین ایجاد می‌شود (۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸).

یک جزء مهم این تئوری درک محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - غده فوق کلیوی (HPA) می‌باشد که تنظیم کننده اصلی می‌باشد و پیس میکری است که بروز و پایان هر مرحله زندگی را سیگنانل می‌نماید. یکی از عملکردهای اصلی محور HPA آن است که مجموعه ای از تنظیمات فیزیولوژیک را ایجاد

کند که برای حفظ و نگهداری هوموستاز داخلی برخلاف تغییرات ادامه دار در محیط لازم است. در طول زندگی برخورد با استرس های شدید از انواع فیزیکی بیولوژیکی و

نشان می‌شود که این سیستم نورواندوکرین اولیه در نماتدها نه تنها قابلیت تنظیم آنچه در سلول اتفاق می‌افتد را داراست بلکه ایجاد پاسخ‌های متناسب به استرس را نیز بر عهده دارد.

تئوری نورواندوکرین - ایمونولوژیک

در سلسه مراتب تنظیمی مولتی سیستم در سراسر مراحل متواالی زندگی، نقش مهمی برای واکنش و هماهنگی بین سیستم نورواندوکرین و سیستم ایمنی وجود دارد.

این واکنش و هماهنگی توسط موارد ذیل اتفاق می‌افتد:
۱) نوروپیتیدها و سیتوکین‌ها که هم ارتباطات داخل سیستم ایمنی و هم ارتباطات بین نورواندوکرین و سیستم ایمنی را برقرار می‌کنند

۲) هورمون‌های متعددی از هیپوفیز خلقی (وازوپرسین) و قدامی (TSH و پرولاکتین و ACTH و GH) ترشح می‌شوند که عملکردهای مهم سیستم ایمنی را کنترل می‌کنند این عملکردها شامل تولید آنتی‌بادی و سیتوکین، سیتوکسیستی و تکثیر لنفوسيت‌ها و عملکرد ماکروفازها می‌باشد.

۳) عملکرد متقابل سیتوکین‌ها روی عملکردهای نورواندوکرین به عنوان مثال ایترولوکین I HPA, I را بوسیله تحریک ترشح ACTH فعال می‌کند و ممکن است در آزاد ساختن دیگر هورمون‌های هیپوفیزی مانند TSH و GH و LH و پرولاکتین هم نقش داشته باشد.

به موازات واکنش‌های نورواندوکرین سیستم ایمنی واکنش‌های اساسی متعددی را دارد، سیستم ایمنی باید ارگانیسم‌های خارجی را کنترل کند و از بین برد و همزمان مواد و اجزاء بدن نرمال را تشخیص دهد و از آسیب زدن به مولکولهای خودی خودداری نماید. در بیشتر افراد مسن پیری ایمونولوژیکی مشخص می‌شود با مقاومت کاهش یافته به بیماری‌های عفونی و حفاظت کمتر در برابر کانسرو شکست روزافروزن در تشخیص خود بدن و متعاقباً "بیماری‌های اتو ایمون پیش می‌آید"(۵۱,۵۲).

البته پاسخ‌های ایمنی مختلف بطور متضادی تحت تاثیر سن قرار می‌گیرند مثلاً "تیموس در انسان یکی از مهمترین ارگان‌های ایمنی است که در گیر انتخاب و بلوغ T سل ها

(۳) کاهش ظرفیت کاتکول آمین‌ها برای القای تولید پروتئین های شوک حرارتی می‌باشد(۴۵).

هورمون‌های قشر فوق کلیه گلوکوکورتیکوئیدها هستند که تنظیم متابولیسم چربی و پروتئین و کربوهیدرات‌ها می‌باشد که نقش تنظیم آب و الکترولیت و هورمون‌های جنسی را بر عهده دارند. از جمله این هورمون‌ها دهیدروایپان‌اندروسترون است که با افزایش سن کم می‌شود و درمان جایگزینی توسط آن بسیار به کار می‌رود هر چند که نتایج این درمان امیدوارکننده نبوده است(۴۶). گلوکوکورتیکوئیدها مانند دیگر هورمون‌های استروئیدی (از تحمدان و بیضه) بوسیله فیدبک مثبت و منفی بین هورمون‌های هدف و کنترل مرکزی هیپوفیز و هیپوتالاموس تنظیم می‌شوند.

هنگام پیری و وجود استرس شدید و ادامه دار نه تنها مکانیسم‌های فیدبکی ممکن است دچار اختلال شوند بلکه گلوکوکورتیکوئیدها خودشان ممکن است برای سلول‌های عصبی سمیت داشته باشند و بنابراین کنترل فیدبکی و چرخه هورمونی بهم خواهد ریخت(۴۷,۴۸).

تئوری نورواندوکرین اخیراً توسط داده‌هایی حمایت شده است که نشان داده اند یک مسیر شبه انسولین پاسخ‌های استرس و طول عمر را در نماتد الگانس کنترل می‌کند (۴۹).

۱) مقاومت به استرس محیطی شامل شوک حرارتی

۲) افزایش مقاومت به گرسنگی

۳) طول عمر بیشتر می‌شود.

بسیاری از این ژن‌ها در روند تکامل برای انسان حفظ شده اند به عنوان مثال ژن فاکتور رشد شبه انسولینی IGF-I و ژن Daf-2 انسولین و گیرنده IGF-I در انسان می‌باشند و ژن unc-64 و unc-31 مشابه سیتاکسین انسانی و پروتئین‌های فعال کننده کاتابولیک هستند که در آزادسازی نوروتانسیمیر‌ها در سیناپس نقش دارند(۵۰). این ژن‌ها به همراه چند ژن دیگر که آنها نیز معادل انسانی دارند در C الگانس که ارگانیسم نسبتاً پیچیده‌ای است یک سیستم نورواندوکرین قدیمی را شکل می‌دهند. مجموع محرك‌های محیطی و پاسخ‌هایی که در مقابل آنها تولید می‌شود نقش مهمی را در تنظیم حالت‌های متابولیک و تولید مثلثی بازی می‌کنند (در محدوده‌ای که تنظیم انرژی مناسب اجازه بدهد) و در نهایت طول عمر را زیاد می‌کنند. بنابراین خاطر

یک مثال موفق از این تغییر وضعیت عملکردی می‌تواند به وسیله سیگنال‌های نورواندوکرین و ایمنی میانجی گری شود برای مثال حساسیت به انسولین در بافت هدف محیطی درسن بالا کم می‌شود ولی می‌تواند به وسیله محدودیت کالری بهبود یابد. مثال دیگر از طول عمر بیشتر تا حدود ۴۰ درصد توسط محدودیت کالری است (۵۶). این مداخله تجربی در سطوح متعددی از عملکرد اثر داشته و مقدار زیادی از تغییرات مولکولی و سیستمی را ایجاد می‌کند.

جهندهای مختصراً از محدودیت کالری در زیر می‌آید:

محدودیت کالری قویترین و تکرار پذیرترین متغیر محیطی است که قابلیت افزایش طول عمر را دارد و این امر از کرم‌ها تا موش‌ها آزمایش شده است. در این مداخله در ساده‌ترین حالت تغذیه حیوان شامل همه مواد غذایی مورد نیاز و ویتامین‌ها است ولی ۳۰ تا ۷۰ درصد کالری کمتری دارد. علاوه بر شدت محدودیت کالری چند عامل دیگر نیز در افزایش طول عمر نقش دارند مانند گونه حیوان مورد آزمایش و سن نمونه هنگام شروع آزمون و غیره (۵۷).

در محدودیت کالری نه تنها طول عمر افزایش می‌یابد بلکه پاسخ‌های متابولیک (مثل افزایش حساسیت بافت به انسولین) و پاسخ‌های نورواندوکرین و پاسخ‌های ایمنی (مثل افزایش دفاع علیه استرس و عفونت و کانسر) و پاسخ‌های کلژن (مثل کاهش اتصالات متقاطع) به طور معنی داری بهبود می‌یابند.

این گونه تغییرات عملکردی ممکن است با تغییرات در ظاهر پروفایل ژنی ارتباط داشته باشند. برای مثال بعد از محدودیت شدید ۷۶ درصدی و مزمن ۲۸ ماهه در یک نوع موش با طول عمر زیاد تغییرات زیادی در ظاهر ژنی مشاهده شده است (۵۸).

البته بعضی از عوارض محدودیت شدید کالری به مشکلات کاربرد آن در انسان می‌انجامد مثلاً "تأخر در رشد و اختلال در بروز بلوغ از آن جمله اند. مکانیسم‌های مولکولی محدودیت کالری هنوز شناخته نشده اند، البته با توجه به تأثیر بارز محدودیت کالری در طول عمر در تقریباً تمام انواع موجودات زنده آن را به عنوان یکی از زمینه‌های اصلی مطالعات طول عمر قرار داده است.

و تولید هورمون‌های پیتیدی است. تیموس از نظر اندازه و تولید طی بلوغ به حداقل می‌رسد و زمان کوتاهی پس از آن آتروفی پیدا کرده و تولید T سل‌های بالغ می‌کند و هورمون هایش کاهش می‌یابد (۵۳).

هر دو سیستم ایمنی و نورواندوکرین درجه زیادی از انعطاف پذیری را دارا هستند به این معنی که توانائی تطبیق و عملکرد آنها وابسته به تقاضا است. این انعطاف پذیری در سنین پایین بسیار زیاد است ولی در سنین بالاتر بسیار کم می‌شود.

اگرچه مطالعات پیری شناسی انسانی در ۱۹۶۰ الی ۱۹۸۰ بر کاهش عملکردها متمرکز بود که در تمام ارگان‌های سیستم‌های بدن رخ می‌داد (۵۴) ولی از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ برای پروسه پیری دوباره مفهوم سازی شد که موارد ذیل در نظر گرفته شد (۵۵):

- (۱) تاکید مجدد بر دیدگاهی که پیری با کاهش عملکرد و سلامتی مشخص می‌شود
- (۲) تمرکز مجدد بر عدم تجانس ذاتی بین تک تک افراد مسن

(۳) تاکید بر وجود خط سیرهای مثبت پیری یعنی بدون بیماری، ناتوانی و کمبودهای فیزیولوژیک

(۴) بر جسته کردن احتمال دوری از بیماری‌ها و ناتوانی‌های معمولی وابسته به سن

- بنابراین سه خط سیر پیری مشخص شد:
- (۱) مشخص شدن با بیماری و ناتوانی
 - (۲) مشخص شدن با پیری معمولی و عدم حضور پاتولوژی اضافی ولی حضور زوال عملکرد
 - (۳) درنهایت آنچه که "پیری موفق" نامیده می‌شود از بین نرفتن عملکردها و بدون پاتولوژی است.

مکانیسم‌های پیری موفق شامل موارد ذیل می‌باشند:

- (۱) تداوم عملکرد معمولی و انعطاف پذیری
- (۲) پاسخ‌های جبرانی برای ایجاد عملکرد نرمال (مانند ورزش، تغذیه خوب و تحصیلات بالا)
- (۳) مداخله برای جایگزین کردن فانکشن‌های از بین رفته (مانند درمان‌های جایگزین)

- (۴) تغییر وضع سلامتی با تغییر ریسک فاکتورها
- (۵) پیش‌گیری از بیماری‌ها
- (۶) تقویت تداخلات اجتماعی و حمایت

نتیجه گیری پایانی

باید از مرور حاضر روش شده باشد که علت نهایی پیری شناخته نشده است. در واقع مطالب بسیاری در مورد پروسه پیری روشن شده و ممکن است فقط مجموعه‌ای از مدل‌ها و تئوری‌های مختلف برای توجیه پیری نرم‌افزار کاربرد داشته باشد. به نظر می‌رسد پروسه پیری مولتی فاکتوریال و پیچیده ولی قابل شناسایی باشد. بسیاری از تغییرات پلیوتروپیک که با پیری اتفاق می‌افتد ممکن است نتیجه یک یا چند تغییر اولیه باشند که در سطح بالاتری بروز پیدا می‌کنند. این به هم تنیدگی مکانیسم‌های مختلف "معمول" علت اصلی را مبهم تر می‌کند و نتیجه گیری از داده‌های تجربی بدست آمده مشکل تر می‌شود (۵۹).

طول عمر افزایش یافته بامحدودیت کالری "معمول" برای حمایت از این یا آن تئوری ذکر می‌شود برای مثال محدودیت کالری رادیکال‌های آزاد را کم می‌کند و هم چنین مانع تغییرات وابسته به سن در سیستم اندوکرین مانند دانسیتیه رسپتور استروژن در هیپوتالاموس می‌شود. طرفداران تئوری رادیکال‌های آزاد می‌گویند که کم شدن رادیکال آزاد منجر به کاهش آسیب سیستم غددی نیز می‌شود و از طرف دیگر اندوکرینولوژیست‌ها می‌گویند به دلیل تغییر سیستم غددی است که متابولیسم پائین می‌آید و رادیکال آزاد کمتری تولید می‌شود.

یکی از اهداف اصلی تحقیقات پیری شناسی آن است که تعیین شود چگونه یک مداخله فیزیولوژیک نظیر محدودیت کالری می‌تواند طول عمر را زیاد کند؟ آیا این یک واکنش غیرفعال است که همراه با کاهش کالری و متابولیسم صورت می‌گیرد و یا اینکه پاسخ ارگانیسم به کاهش کالری است که منجر به افزایش طول عمر می‌شود؟ پاسخ در حال حاضر مشخص نیست (۶۰).

توانایی سیگنانلینگ شبه انسولینی در تنظیم طول عمر موضوع بعدی خواهد بود. اگرچه هنوز رابطه‌ای بین سیگنانلینگ شبه انسولینی و محدودیت کالری پیدا نشده است ولی امیدواری زیادی وجود دارد که با مطالعه مکانیسم‌های مولکول‌های دخیل در محدودیت کالری و سیگنانلینگ شبه انسولینی شناخت بیشتری در مکانیسم‌های پیری حاصل آید.

- 1- Kowald A and Kirkwood TB. A network theory of ageing: the interactions of defective mitochondria, aberrant proteins, free radicals and scavengers in the ageing process. *Mutat Res* 316: 209-236, 1996.
- 2- Carey JR. Theories of life span and aging. In: *Physiological Basis of Aging and Geriatrics* (3rd ed.), edited by Timiras PS. Boca Raton, FL: CRC, 2003, p. 85-95.
- 3- Sacher GA. Evolutionary theory in gerontology. *Perspect Biol Med* 25: 339-353, 1982.
- 4- Wilmoth JR. Human longevity in historical perspective. In: *Physiological Basis of Aging and Geriatrics* (3rd ed.), edited by Timiras Ps. Boca Raton, FL: CRC, 2003, p. 11-24.
- 5- Masoro EJ and Austad SN. The evolution of the antiaging action of dietary restriction: a hypothesis. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 51: B387-B391, 1996.
- 6- Haldane JBS. New Paths in Genetics. London: Allen & Unwin, 1941.
- 7- Partridge L and Gems D. Mechanisms of ageing: public or private? *Nat Rev Genet* 3: 165-175, 2002.
- 8- Keller L and Genoud M. Extraordinary lifespans in ants: a test of evolutionary theories of ageing. *Nature* 389: 958-960, 1997.
- 9- Kanungo Ms. A model for ageing. *J Theor Biol* 53: 253-261.
- 10- Tatar M, Bartke A, and Antebi A. The endocrine regulation of aging by insulin - like signals. *Science* 299: 1346-1351, 2003.
- 11- Perls T, Kunkel L, and Puca A. The genetics of aging. *Curr Opin Genet Dev* 12: 362-369, 2002.
- 12- Perls tt, EWilmot J, Levenson R, Drinkwater M, Cohen M, Bogan H, Joyce E, Brewster S, Kunkel L, and Puca A. Life-long sustained mortality advantage of siblings of centenarians. *Proc Natl Acad Sci USA* 99: 8442-8447, 2002.
- 13 - Puca AA, Daly MJ, Brewster SJ, Matise TC, Barrett J, Shea-Drinkwater M, Kang S, Joyce E, Nicoli J, Benson E, Kunkel LM, and Perls T. A genome-wide scan for linkage of human exceptional longevity identifies a locus on chromosome 4. *Proc Natl Acad Sci USA*. 98: 10505-1058, 2001.
- 14- Hayflick L. The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. *Exp Cell Res* 37: 614-636, 1965.
- 15- Blackburn EH. Telomere states and cell fates. *Nature* 408:53-56, 2000.
- 16- Bodnar AG, Ouellette M, Frolkis M, Holt SE, Chiu CP, Morin GB, Harley CB, Shay JW, Lichstein S, and Wright WE. Extension of life-span by introduction of telomerase into normal human cells. *Science* 279: 349-352, 1998.
- 17- Campisi J. Cellular senescence and cell death. In: *Physiological Basis of Aging and Geriatrics* (3rd ed), edited by Timirsa PS. Boca Raton, FL: CRC, 2003, p. 47-59.
- 18- Dimri GP, Lee X, Basile G, Acosta M, Scott G, Roskelley C, Medrano EE, Linskens M, Rubelj I, Pereira-Smith O, et al. A biomarker that identifies senescent human cells in culture and in aging skin in vivo. *Proc Natl Acad Sci USA* 92: 9363-9367, 1995.
- 19- Krtolica A and Campisi J. Cancer and aging: a mode for the cancer promoting effects of the aging

- stroma. *Int J Biochem Cell Biol* 34: 1401-1414, 2002.
- 20- Chang E and Harley CB. Telomere length and replicative aging in human vascular tissues. *Proc Natl Acad Sci USA* 92: 11190-11194, 1995.
- 21- Fenton M, Barker S, Kurz DJ, and Erusalimsky JD. Cellular senescence after single and repeated balloon catheter denudations of rabbit carotid arteries. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 21: 220-226, 2001.
- 22- Vasile E, mita Y, Brown Lf, Kocher O, and Dvorak Hf. Differential expression of thymosin -10 by early passage and senescent vascular endothelium is modulaed by VPF/VEGF: evidence for senescent eddothelial cells in vivo at sites of atherosclerosis. *FASEB L* 15: 458-466, 2201
1715 INVITED REVIEW
J Appl Physiol. VOL 95. OCTOBER 2003 . www.jap.org
- 23- Lebel M and Leder P. A deletionwithin the murine Werner syndrome helicase induces sensitivity to inhibitors of topoismoerase and loss of cellular proliferative capacity. *Proc Natl Acad Sci USA* 95: 13097-13102, 1998.
- 24- Martin GM, Sprague CA, and Epstein CJ. Replicative lifespan of cultivated human cells. Effects of donor's age, tissue, and genotype. *Lab Invest* 23: 86-92, 1970.
- 25- Linskens MH, Feng J, Andrews WH, Enlow BE, Saati SM, Tonkin LA, Funk W, and illeponceau B. Cataloging altered gene xpression in young and senescent cells using enhanced differential display. *Nucleic Acids Res* 23: 3244-3251, 1995.
- 26- Maier JA, Voulalas P, Roeder D, and Maciag T. Extension of the life-span of human eddothelial cells by an interleukin-1 alpha antisense oligomer. *Science* 249: 1571-1574, 1990.
- 27- Donehower LA. Dose p53 affect organismal aging? *JCell Physiol* 192: 23-33, 2002.
- 28- Donehower LA, Harvey M, Slagle BL, McArthur MJ, MOntgomery CA jr, Butel JS, and Bradley A. Mice deficient for p53 are developmentally normal but susceptible to spontaneous tumours. *Nature* 356: 215-221, 1992.
- 29- Chin L, Artandi SE, Shen Q, Tam A, Lee SL, Gottlieb GJ, Greider CW, and DePinho RA. p53 Deficiency rescues the adverse effects of telomere loss and cooperates with telomere dysfuncion of ac- celerae carcinogenesis. *Cell* 97: 527-538, 1999.
- 30- Harman D. Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry. *J Gerontol* 2; 298-300, 1957.
- 31- Finkel T and Holbrook NJ. Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing. *Nature* 408: 239-247, 2000.
- 32- Mehlhorn RJ. Oxidants and antioxidants in aging. In: *Physiological Basis of Aging and Geriatrics* (3rd ed.), edited by Timiras PS. Boca Raton, FL: CRC, 2003, p.61-83.
- 33- Tower J. Transgenic methods for increasing *Drosophila* life span. *Mech Ageing Dev* 118: 1-14, 2000.
- 34- Caratero A, Courtade M, Bonnet L, Planel H, and Caratero C . Effect of a continuous gamma iradication at a very low dose on the life span of mice. *Gerontology* 44: 272-276, 1998.

- 35- Merry BJ. Molecular mechanisms linking calorie restriction and longevity. *Int J Biochem Cell Biol* 34: 1340-1354, 2002.
- 36- Mandavilli BS, Santos JH, and Van Houten B. Mitochondrial DNA repair and aging. *Mutat Res* 509: 127-151, 2002.
- 37- Beckman KB and Ames BN. The free radical theory of aging matures. *Physiol Rev* 78: 547-581, 1998.
- 38- Finch CE. Longevity, Senescence and the Genome. Chicago, IL; Univ. of Chicago Press, 1990.
- 39- Finch CE. The regulation of physiological changes during mammalian aging. *Q Rev Biol* 51: 49-83, 1976.
- 40- Timiras P. Neuroendocrine models regulation lifespan. In: Development, Maturation and Senescence of Neuroendocrine Systems: A Comparative Approach, edited by Schreibman MP and Scanes CG. San Diego, CA: Academic, 1989.
- 41- Teimiras Ps. Biological perspectives on aging. *Am Sci* 66: 605-613, 1978.
- 42- McEwen BS. The End of Stress as we Know It. Washington, DC: Joseph Henry Press, 2002.
- 43- Selye H. The Stress of Life. New York: McGraw-Hill, 1976.
- 44- Cannon WB. The Wisdom of the Body. New York: Norton, 1932.
- 45- Udelsman R, Blake MJ, Stagg CA, Li SDG, Putney DJ, and Holbrook NJ. Vascular heat shock protein expression in response to stress. *Endocrine and autonomic regulation of this age-dependent response*. *J Clin Invest* 91: 465-473, 1993.
- 46- Daynes RA and Araneo BA. Prevention and reversal of som age-dependent response by supplemental dehydroepiandrosterone sulfate therapy. *Aging: Immunology, and Infectious Disease* 3: 135-153, 1992.
- 47- Sapolsky RM. Stress, the Aging Brain, and the Mechanisms of Neuron Death. Cambridge, Ma: MIT Press, 1992.
- 48- Sapolsky RM. Why Zebras Don't Get Ulcers: An Updated Guide of Stress. Stress - Related Diseases, and Coping. New York: Freeman, 1998.
- 49- Kawano T, Ito Y, Ishiguro M, Takuwa K, Nakajima T, and Kimura Y. Molecular cloning and characterization of a new insulin/IGF-like peptide of the nematode *Caenorhabditis elegans*. *Biochem Biophys Res Commun* 273: 431-436, 2000.
- 50- Babar P, Adamson C, Waker Ga, Walker Dw, and Lithgow GJ. P13-kinase inhibition induces dauer formation, thermotolerance and longevity in *C. elegans*. *Neurobiol Aging* 20: 513-519, 1999.
- 51- Franceschi C, Valensin S, Bonafe M, Paolisso G, Yashin AI, Monti D, and De Benedictis G. The network and the remodeling theories of aging: historical background and new perspectives. *Exp Gerontol* 35: 879-896, 2000.
- 52- Ginaldi L and Strenberg H. The immune system. In: *Physiological Basis of Aging and Geriatrics* (3rd ed.), edited by Timiras Ps. Boca Raton FL: CRC, 2003.
- 53- George AJ and Ritter MA. Thymic involution with ageing: obsolescence or good housekeeping? *Immunol Today* 17: 267-272, 1996.
- 54- Shock NW. Age changes in physiological functions in the total animal: the role of tissue loss. In: The

- Biology Of Aging: A Symposium (3rd ed.), edited by Strehler BL, Ebert JD, and Shock NW. Washington, DC: Am. Inst. Biol. Sci., 1960
- 55- Rowe JW and Kahn RL. Human aging: usual and successful. *Science* 237: 143-149, 1987.
- 56- Masoro EJ and Austand SN. The evolution of the antiaging action of dietary restriction: a hypothesis. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 51: B387-B391, 1996.
- 57- Meery BJ. Dietary restriction in aging. In: *Studies of Aging*, edited by Sternberg H and Timiras Ps. New York: Springer, 1999.
- 58- Lee CK, Klopp RG, Weindruch R, and Prolla TA. Gene expression profile of aging and its retardation by caloric restriction. *Science* 285: 1390-1393, 1999.
- 59- Brian T., Pola S. Physiology of aging Invited review: Theories of aging. *J Appl Physiol* 95: 1706-1716, 2003.
- 60- Gary C. Physiology of aging. *J Appl Physiol* 95: 1333-1334, 2003.