

Research Paper: Acylated Ghrelin Level Response to Daily Step in the Post-Menopause Active and Sedentary Elderly Women

*Farzad Nazem¹, Zohreh Hosainzadeh², Mohammad Faramarzi³

1. Associate Professor, Department Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2. M.Sc. in Sports Physiology, Department Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Bu Ali Sina University, Iran.

3. Associate Professor, Department Sports Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

Received: 19 Nov. 2013

Accepted: 11 May. 2014

ABSTRACT

Objectives Plasmatic total ghrelin levels (ie, acylate & unacylated isoforms) are changeable during malnutrition, starvation regime, exercise bouts, obesity and hyperglycemia conditions. Studies have reported increases, decreases or no change in total ghrelin concentrations as a resultsresults of exercise. WalkingSince walking is used as a movement current pattern with a different lifestyle conditions, especially in several social jobs activities of daily livings of the middle-aged and elderly, the aim of the present study is to evaluate whether therelationship between the number of step per day steps per day andwith acylated ghrelin of menopausal women is related to different life styles.as well, the effects of physical activity volume on this peptide hormone.

Materials & Methods Daily step volumes voluntarily were measured in the health postmenopausal women (n=40) by the electronic pedometer. Subjects (aged 55.9 ± 4.6) divided by as active group (AG =20) and sedentary group (SG=20).

Results Daily step average in the AG (8022 ± 2659 step/day) significantly was higher than SG (3450 ± 913 step/day) ($P<0.001$). Acylated ghrelin and Insulin concentrations were markedly not different in AG (195.4 ± 131 pg/ml, 9.2 ± 3.03 μ U/ml respectively) and SG (165.4 ± 73 pg/ml, 11.5 ± 4.7 μ U/ml respectively) as well, step per day were not associated with these hormones. There was a significant difference in body composition variables (BMI, %BF, WHR) among 2 groups and significant inverse correlations were found between activity and body composition variables in women.

Conclusion According to the results, it is recommended that trainers, organizations and institutions that deal with the elderly, use the cycling and walking exercises, especially walking and jogging to reduce the risk of further problem in these people.

Key words:

Acylated ghrelin,
Step per day, Active
& sedentary elderly
females

*** Corresponding Author:**

Farzad Nazem, PhD

Address: Faculty of Physical Education, Bu Ali University, Pajooresh Intersection, Hamedan, Iran.

Tel: +98 (918)1117911

E-mail: farzadnazem100@gmail.com

پاسخ سطح گرلین آسیل دار پلاسمایی به تعداد گام روزانه زنان سالمند یائسه فعال و کم تحرک

*فرزاد ناظم^۱، زهره حسینزاده^۲، محمد فرامرزی^۳

۱. دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

۲. کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

۳. دانشیار، گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲ آبان ۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳ اردیبهشت

هدف گرلین تام پلاسمایی در ایزوفورم‌های آسیل دار و بدون آسیل هنگام چاقی، هایپرگلیسمی، سوء تغذیه، ورزش و محدودیت کالری تغییر می‌کند. مطالعات علمی نیمرخ تغییرات و پاسخ هورمون گرلین تام را به دنبال ورزش‌های هوازی ناهمگون نشان داده است. از آنجاکه فعالیت پیاپاهروی به صورت آرام یا نسبتاً تند، در متن فعالیت‌های روزمره اشاره میانسال و سالمند جریان دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی این پرسش است که آیا میانگین تعداد گام روزانه با سطح پایه ایزوفورم گرلین آسیل دار زنان یائسه به سبک‌های زندگی مختلف است؟

مواد و روش‌ها چهل زن یائسه سالمند (سن 46 ± 9 سال) بدون عوارض قلبی-عروقی و متابولیک یا ارتودی و بر مبنای تعداد گام روزانه به دو گروه فعال (بیست نفر) و کم تحرک (بیست نفر) تقسیک شدند.

یافته‌ها میانگین تعداد گام روزانه گروه فعال (2659 ± 80) نسبت به گروه کم تحرک (913 ± 3450) به صورت معنادار بالاتر بود. غلظت‌های پایه گرلین فعال در دو گروه فعال (131 ± 495 pg/ml) و کم تحرک (165 ± 77 pg/ml) تفاوت معناداری نداشت همچنین ارتباط معناداری میان سطح گرلین آسیل دار و تعداد گام روزانه آنان به دست نیامد ($P > 0.05$). تغییرات انسولین ناشتا در دو گروه تفاوت معناداری نداشت و ارتباط آن با تعداد گام روزانه نیز معنادار نبود ($P > 0.05$). با این حال پارامترهای آنتروپومتری BMI، WHR و BF در دو گروه، معنادار و ارتباط معکوس با تعداد گام روزانه را نشان داد ($P < 0.05$).

نتیجه‌گیری افزایش حجم فعالیت بدنه زنان سالمند یائسه با کاهش عوامل خطرزای بیماری‌های مزمن و کنترل چاقی ارتباط پیدا می‌کند. به علاوه افزایش تعداد گام روزانه (حداقل به اندازه 1000 گام در روز) تأثیری بر تغییر سطوح هورمون‌های گرلین آسیل دار و انسولین ناشتا نداشت. به نظر می‌رسد که مطابق شواهد علمی آستانه حداقل 10000 گام روزانه، احتمالاً برای دستیابی به ایجاد پاسخ سازگاری‌های متabolیک این هورمون اشتها در افراد بزرگسال و میانسال قابل توجه باشد که به مراتب پایین‌تر از حجم فعالیت بدنه زنان فعال در این مطالعه مقطعی است.

کلیدواژه:

گرلین آسیل دار، گام روزانه، زنان یائسه فعال و کم تحرک

مقدمه

و عبور از سد مغزی-حونی (BBB)^۱ ضروری می‌باشد. در انسان گرلین غیرفعال یا بدون آسیل با وجود چند برابر بودن حجم آن نسبت به گرلین فعال، فعالیت‌های اندوکراتینی و فیزیولوژیکی گرلین فعال را ندارد [۴]. چاقی، افزایش سن و ابتلاء به بی‌اشتهاای عصبی بر سطوح پایه گرلین مؤثر است [۵]. شواهد علمی روی زنان یائسه آشکار می‌کند که گرلین هم‌سنگ با کاهش وزن و بدون محدودیت کالری نیز افزایش پیدا می‌کند همچنین بین گرلین، نمایه جرم بدن (BMI) و محیط دور کمر به باسن (WHR) همبستگی منفی گزارش شده است [۶].

گرلین پپتیدی با ۲۸ اسید آمینه در زمان تعادل منفی انرژی، مانند: گرسنگی شدید، هیپوگلیسیمی ناشی از انسولین، سوء هاضمه و بی‌اشتهاای عصبی افزایش یافته و در زمان تعادل مثبت انرژی همچون غذا خوردن، هایپرگلیسمیا و چاقی کاهش می‌پابد [۱۰-۱۲]. گرلین پلاسمایی به دو شکل فعال (۱۰% - ۲۰%) می‌باشد [۱۳]. گرلین آسیل دار و غیرفعال (۸۰% - ۹۰%) وجود دارد [۱۴-۳۴]. گرلین آسیل دار (ایزوفورم فعال) برای باند شدن با گیرنده ترشحی هورمون رشد

Blood bring barrier (bbb). ۲

Acylated Ghrelin and De-acyl ghrelin. ۱

* نویسنده مسئول:

دکتر فرزاد ناظم

نشانی: همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده تربیت بدنه.

تلفن تماس: +۹۸ (۰۹۱) ۱۱۱۷۹۱۱

پست الکترونیکی: farzadnazem100@gmail.com

[۳۰۵]، می‌توان انتظار داشت که احتمالاً برنامه‌های پیاده‌روی دراز مدت بر سطوح گرلین پلاسمایی تأثیرگذار باشد.

بنابراین از آنجاکه پیرامون ارتباط حجم فعالیت بدنی به شکل پیاده‌روی با ایزوفورم‌های این هورمون اشتها تحقیقات اندکی صورت گرفته است [۱۸و۱۶]. این پرسش مطرح می‌شود که آیا سطوح پایه گرلین آسیل دار و انسولین ناشتا تحت تأثیر حجم فعالیت بدنی یا گام روزانه زنان سالم‌مند با الگوهای متفاوت سبک زندگی قرار می‌گیرد به علاوه آیا میان ایزوفورم گرلین فعال با عوامل ترکیب بدن آنان ارتباط وجود دارد؟

روش مطالعه

این مطالعه از نوع پس رویدادی است که به روش مقایسه‌ای متغیرهای آنتروپومتری و سطح گرلین آسیل دار پلاسمایی دوگروه فعال و کم‌تحرک ارزیابی می‌شوند. جامعه آماری ۹۶ زن یائسه و اجد شرایط شهرستان شهر کرد با دامنه سنی ۴۸ تا ۶۸ سال و شاخص توده بدن (kg/m^2) 30 ± 3 /۸۱ و نسبت محیط کمر به لگن (WHR) 0.99 ± 0.06 در دو گروه فعال (۲۰ نفر) و کم‌تحرک (۲۰ نفر) داوطلبانه در این پروژه شرکت نمودند.

مقیاس ورود به مطالعه عبارت بود از: گروه نخست با حداقل سابقه ۲ سال فعالیت ورزشی منظم آیروبیک با نظرارت مریبان ورزش بهشیوه تصادفی ساده از میان اعضای سه باشگاه آیروبیک و گروه دوم از دو کانون نگهداری سالم‌مندان بدون پیشینه شرکت منظم در اوقات فراغت ورزشی بطور در دسترس انتخاب شدند ($Z=4.96, CI=4.9/4$). آزمودنی‌ها پس از شرکت در کارگاه آموزشی توجیهی و آگاهی از فرایند پژوهش، رضایت‌نامه‌های کتبی، پرسشنامه‌های پزشکی- PAR-Q و سطح فعالیت روزانه بک (Bakke) را تکمیل نمودند. آنها در ظرف ۱۸ ماه گذشته منتهی به آغاز مطالعه، سابقه ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی، متابولیک یا ارتوپدیک، اختلالات شناختی و مصرف داروی مؤثر (هورمون درمانی) بر متغیرهای وابسته یا مواد دخانی را نداشتند.

اطلاعات مربوط به رژیم غذایی آزمودنی‌ها توسط پرسشنامه «پادآمد خوارک ۲۴ ساعته» در سه روز (دو روز نخست و یک روز انتهای هفته) توسط آزمودنی در برگ مخصوص رژیم غذایی ثبت شد. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا برنامه غذای اصلی روزانه و آشامیدنی‌هایی را که در ظرف ۲۴ ساعت منتهی به تکمیل پرسشنامه مصرف کرده بودند، ثبت کنند.

مقدار مواد غذایی مصرف شده به گرم تبدیل گردید و با استفاده از نرم افزار Food Analyzer ساخت شرکت سلاک طب ایران، بر حسب کالری محاسبه شد.

یافته‌های ناهمگونی پیرامون رابطه این هورمون اشتها با حجم و شدت فعالیت بدنی در دست است، اما در اکثر مطالعات موجود اثر کوتاه مدت ورزش بر گرلین تام بررسی شده است [۷و۶و۹]. دسته دیگر از تحقیقات که اثر یک یا چند نوبت یا ورزش هوازی با شدت‌های متوسط و سبک را سنجیده‌اند، افزایش سطح گرلین فعال پلاسمایی گزارش شده است [۸و۱۰].

در مطالعاتی که شدت‌های بالاتر پرتوکل تمرین هوازی یا مقاومتی به کار رفته باشند، نتایج متناقضی نیز گزارش می‌شود [۱۱و۹]. در زمینه بررسی اثر تمرین طولانی مدت هوازی با شدت پایین و تأکید بر حجم تمرین نیز مطالعات اندکی صورت گرفته است [۲و۱۲]. به‌طوری‌که پژوهش کارین^۳ روی زنان یائسه غیرورزشکار نشان داد که یک سال تمرین استقامتی باعث افزایش ۱۸ درصدی سطح گرلین پلاسمایی در گروهی که بیش از ۳ کیلوگرم کاهش وزن داشتند، می‌شود [۲]. البته این دست تحقیقات روی تغییرات سطح گرلین تام و نه ایزوفورم گرلین آسیل دار متمرکز بوده است.

با این حال، تحقیقات دیگر تمرینات ترکیبی مقاومتی و استقامتی را بر سطوح گرلین تام نشان می‌دهد [۱۲، ۱۳]، اما برآیند این دست گزارش‌های علمی آشکار می‌کند که معمولاً در تدوین چنین برنامه‌های تمرین، مختصاتی همچون مولفه‌های تکرار، مدت و شدت فعالیت بدنی قبل توجه بوده است که محاسبه این پارامترهای تمرینی در طول برنامه مداخله برای شرکت‌کنندگان بهویژه افراد مسن قدری دشوار بهنظر می‌رسد. در حالی که مشاهده عینی فعالیت روزانه با استفاده از ابزارهای کارآمد و آسان همچون پدومترها و شتاب‌سنج‌های گام‌شمار انگیزه مناسبی برای ثبت فعالیت جسمانی اقسام میانسال و سالم‌مند فراهم می‌آورد [۱۴].

به علاوه، شواهد علمی نشان می‌دهد که پیاده روی به عنوان یک الگوی برتر فعالیت بدنی روزانه در افراد سالم‌مند و مسن، بدلیل تأثیر محافظتی آن در برابر پیشامدهای قلبی-عروقی، کنترل پیشرفت بیماری‌های مزمن و مهار نسبی ریسک فاکتورهای آنتروپومتری مورد پذیرش آحاد جامعه قرار گرفته است [۱۶و۱۵]. در این زمینه مطالعات روی زنان در رده‌های سنی مختلف نشان می‌دهد پیاده‌روی بیشتر از ۷۵۰۰ گام در روز به ارتباط معکوس سطح گرلین پلاسمایی با هورمون‌های لپتین و انسولین می‌انجامد [۱۶و۱۷و۱۸و۱۹].

از سوی دیگر افرادی که به‌طور منظم پیاده‌روی می‌کنند نسبت به همتایانشان که کمتر تمایل به پیاده‌روی دارند، اندازه‌های WHR و BMI کمتر دارند [۲۱و۲۲]. با توجه به تأثیر نوع فعالیت جسمانی بر تعادل منفی انرژی و شاخص‌های ترکیب بدن [۲۳و۱۵] و ارتباط بین BMI و سطح گرلین تام پلاسمایی

گرلین فعال (آسیل دار) جداسازی شد و با استفاده از کیت انسانی Acylated Ghrelin ELISA به روش الایزا اندازه گیری شد (۲۶).

روش آماری

در تحلیل آماری داده ها، پس از بررسی همسانی واریانس ها (آزمون لون) و توزیع طبیعی داده ها (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف) با فرض کنترل خطای نوع اول، از آزمون مقایسه میانگین های میان گروهی Multi-variation با ملاحظه خطای نوع اول و در سطح معنی داری $P \leq 0.05$ استفاده شد. همچنین برای سنجش امکان ارتباط میان متغیرها از مدل رگرسیون خطی چند متغیری استفاده گردید. انجام محاسبات در محیط نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ صورت گرفت.

یافته ها

نمونه های این مطالعه با میانگین سنی 46.5 ± 0.4 سال و ویژگی آنتروپومتری $kg/m^2 = 30.0 \pm 0.6$ ، BMI = 1.05 ± 0.05 WHR = 0.74 ± 0.05 و هزینه انرژی ۲۴ ساعته در گروه آیروبیک ($2541 + 2341 + 206 = 2337$) و کم تحرک ($2337 + 206 = 2541$) کیلو کالری متناسب با حجم فعالیت بدنی روزانه شان بر حسب متغیرهای آنتروپومتری استفاده گردید. انجام محاسبات در محیط نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ صورت گرفت.

ابتدا غلظت گرلین آسیل دار زنان سالمند پس از تبدیل به لگاریتم در مبنای de^h در سطح توزیع داده های عادی قرار گرفت. غلظت هورمون اشتها در دو گروه فعال و کم تحرک تفاوت معنی داری را نشان نداد ($P = 0.55 / 0.05$). با این حال میزان این هورمون پیتیدی پلاسمایی در گروه فعال معادل 18.2 ± 1.8 درصد بیشتر از گروه غیرفعال (تقربا 11.3 ± 4.5) بود که از جنبه بالینی قابل تأمل است.

براساس جدول ۱ در متغیرهای پیکر سنجی شاخص توده بدن^۱، درصد چربی بدن^۲ و نسبت دور کمر به لگن^۳ در دو گروه آیروبیک و غیرفعال تفاوت های معناداری به دست آمد ($P < 0.05$).

اطلاعات جدول ۲ نیز رابطه میان عوامل آنتروپومتری BMI و %BF و WHR با تعداد گام روزانه شان را معنی دار نشان

تعیین حجم فعالیت بدنی

به منظور اندازه گیری حجم فعالیت بدنی روزمره، دستگاه گام شمار مدل HJ-152 OMRON ساخت کشور چین مورد استفاده قرار گرفت. پیش از نصب دستگاه، دقت و اعتبار آن به روش آزمون همبستگی بین روش فیلمبرداری از تعداد گام و ثبت آن به وسیله پدومتر در طول 40.0 متر پیاده روی با سرعت گام ترجیحی، مورد بررسی قرار گرفت و اعتبار اندازه گیری این دستگاه با $SEE = 4.03$ ، $P = 0.99$ ، $R = 0.99$ تأیید شد [۲۴].

شرکت کنندگان با دستگاه پدومتر و نحوه کار آن آشنا شدند. سپس از هر آزمودنی خواسته شد که دستگاه را به منظور ثبت تعداد گام روزانه، طی فعالیت های روزمره از هنگام صبح تا پایان روز در خارج از محیط خانه به جز هنگام خواب یا داخل خانه به کمتر نصب نمایند.

هر آزمودنی می بایست طی دو هفته از این گام شمار استفاده نموده و در هر هفته حداقل ۳ روز این گام شمار را به کمتر نصب نماید. در پایان هر هفته اطلاعات دستگاه در اختیار محقق قرار می گرفت و در پایان دو هفته میانگین تعداد گام های ثبت شده به عنوان میانگین تعداد گام های روزانه فرد در تحلیل های آماری مورد استفاده قرار می گرفت. گروه غیرفعال که روزانه تحت برنامه مدیریت کانون سالمندان شهر کرد قرار داشتند، تعداد گام در تمام شرایط داخل محوطه کانون منظور گردید.

تن سنجی

اندازه گیری قد با قدسنج دیواری، بدون کفش و با دقت ۱/۰ سانتی متر انجام شد. سنجش وزن و ترکیب بدن شامل نمایه جرم بدن، نسبت چربی زیر جلدی و محیط های کمر و باسن پس از ۳ ساعت از صرف یک وعده صبحانه با استفاده از دستگاه بیوالکتریک ایمپدسانس^۴ مدل ۲۲۰ ساخت کشور کره انجام گرفت.

اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی

پس از اندازه گیری حجم فعالیت بدنی در پایان ۲ هفته، آزمودنی ها در محل آزمایشگاه طبی جهت خون گیری حضور یافتند. به افراد توصیه شده بود که پس از ۱۲ الی ۱۴ ساعت ناشتا در محل آزمایشگاه حاضر شوند. نمونه گیری به میزان 5 سی سی از ورید بازویی چپ در ساعت ۸-۹ صبح انجام گرفت. نمونه های خونی سانتریفیوژ گردید و سرم جدا شده در دمای -70 درجه سانتی گراد در آزمایشگاه تشخیص طبی برای DRG تحلیل نگهداری شد. انسولین ناشتا با استفاده از کیت Insulin ELISA به روش رادیوایمونورادیومتری اندازه گیری شد [۲۵]. همچنین میزان $5/5$ سی سی از سرم جهت اندازه گیری

Composition analysis body in body .f

سالند

جدول ۱. هم سنجی متغیرهای آنتروپومتریکی و گرلین فعال در دو گروه تحقیق.

P valu	F	غیرفعال (۲۰ نفر) Mean±SD	فعال (۲۰ نفر) Mean±SD	متغیرها
.۰/۵۹	.۰/۲۹۵	۵۶/۳۵ ± ۴/۲	۵۵/۵ ± ۵/۰۶	سن (سال)
.۰/۱۳۲	۲/۳۶۷	۱۵۲ ± ۵/۶۸	۱۵۵ ± ۶/۴۳	قد (cm)
.۰/۰۹۵	۲/۹۴	۷۳/۸۱ ± ۱۱/۸	۶۸/۱ ± ۸/۹	وزن (kg)
.۰/۰۰۹۰	۷/۵۹۳	۳۱/۸ ± ۴/۶۲	۲۸/۲ ± ۳/۳۳	شاخص توده بدن (kg/m^2)
.۰/۰۰۱۰	۱۳/۱۰۵	۴۷/۱۶ ± ۷/۷	۳۹/۸ ± ۴/۶۲	درصد چربی بدن (%)
.۰/۰۰۴۰	۹/۵۱۱	۱/۰۴ ± ۰/۰۹	۱/۰۹۷ ± ۰/۰۴	نسبت محیط کمر به لگن (WHR)
.۰/۰۷۵	۳/۳۵۳	۱۱/۵۲ ± ۴/۷۶	۹/۷ ± ۳/۰۳	انسولین ($\mu\text{IU}/\text{ml}$)
.۰/۵۵۲	.۰/۳۶۰	۲/۱۸۳ ± ۰/۱۳۲۲	۲/۲۲۰۶ ± ۰/۲۴۶	گرلین فعال ($\text{Log}_{10} (\text{pg}/\text{ml})$)
.۰/۰۰۱۰	۵۲۸۵/	۳۴۵۰ ± ۹۱۳	۸۰۲۲ ± ۴۶۵۹	تعداد گام روزانه (step/day)

سالند

*P<0/05

جدول ۲. بررسی ارتباط بین تعداد گام روزانه با متغیرهای پیکر سنجی و ایزو فورم گرلین فعال.

سطح معناداری	همبستگی	
.۰/۱۲۸	-.۰/۲۴۵	وزن (kg)
.۰/۰۳۰	-.۰/۳۵۰	شاخص توده بدن (kg/m^2)
.۰/۰۰۵۰	-.۰/۳۳۴	درصد چربی بدن (%)
.۰/۰۴۵۰	-.۰/۳۱۹	نسبت محیط کمر به لگن (WHR)
.۰/۰۶۴	-.۰/۲۹۶	انسولین پلاسمایی ($\mu\text{IU}/\text{ml}$)
.۰/۰۸۲	.۰/۲۷۸	گرلین فعال ($\text{Log}_{10} (\text{pg}/\text{ml})$)

سالند

*P<0/05

نشان می کند. شواهد علمی نیز اثرات سودمند ورزش بر عوامل خطرزای کاردیومتابولیک و برخی هورمون های پپتیدی همچون گرلین فعال را آشکار کرده است [۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۲۷ و ۲۸]. البته یافته های مطالعات پیشین اغلب پاسخ گرلین تام را در یک نوبت فعالیت بدنی ارزیابی نموده است. به علاوه اطلاعات اندکی درباره تأثیر یک دوره تمرین (کوتاه یا طولانی مدت) بر پاسخ سطح سرمی گرلین [۱۶ و ۲۷] در دسترس است به طوری که در مورد اثر حجم فعالیت روزانه بر تغییرات سطح گرلین آسیل دار در داخل کشور پژوهشی صورت نگرفته است.

در واقع، این مطالعه برای اولین بار تأثیر حجم فعالیت بدنی روزانه زنان یائسه ایرانی و ارتباط آن با سطح پایه ایزو فورم

می دهد ($P<0/05$). اما الگوی این وابستگی بین سطح گرلین فعال و انسولین پلاسمایی با تعداد گام روزانه به سطح معنی دار نزدیک بود ($P=0/۰۶۴$ -۰/۰۸۲).

بر اساس اطلاعات جدول های ۱ و ۲، ارتباط بین سطح انسولین ناشتا و تعداد گام روزانه و همچنین تفاوت غلظت این هورمون بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار نبود ($P>0/05$).

بحث

یافته های مطالعه حاضر نقش حجم فعالیت بدنی (تعداد گام روزانه) را بر تغییرات ریسک نشانگرهای آنتروپومتریک و سطوح گرلین آسیل دار و انسولین پلاسمایی زنان سالمند را خاطر

هنگام دوچرخه سواری و فعالیت‌های اندام فوقانی را نباید از نظر دور داشت. [۲۴]

با اینکه دستیابی به حداقل سازگاری‌های متابولیک-فیزیولوژیک ارگانیسم در پاسخ به حجم فعالیت بدنی، معادل ۱۰۰۰۰ گام در روز توصیه شده است [۱۳۲و۳۱]، اما در برخی مطالعات، تعداد ۸۰۰۰ گام را به عنوان آستانه پایین فعالیت بدنی چهت بهبود سلامتی فیزیولوژیک گزارش شده است [۱۴]. البته از دلایل محتمل عدم تغییر معنادار برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی مانند سطح پایه گرلین آسیل‌دار و انسولین پلاسمایی، نرسیدن حجم فعالیت فیزیکی گروه آیروبیک به آستانه تحريك (۱۰۰۰۰ گام در روز) می‌توان برشمرد. با این حال، دستیابی به ۸۰۰۰ گام روزانه منجر به بهبود شاخص‌های ریسک فاکتور آنتروپومتری زنان فعال گردید.

شواهد علمی نشان می‌دهد که رابطه معکوسی بین تغییرات غلظت‌های لپتین و انسولین با سطح گرلین پلاسمایی وجود دارد [۲۶] برخی از مطالعات نیز ارتباط هورمون‌های آدیپوکاینی آدیپونکتین و لپتین را با تعداد گام روزانه نشان داده است [۱۶و۱۷]، اما به نظر می‌رسد در زمینه بررسی ارتباط سطح گرلین آسیل‌دار با حجم فعالیت روزانه افراد سالم‌مند مطالعه مستقلی صورت نگرفته است.

تحلیل آماری داده‌ها در پژوهش ما رابطه معنی‌دار تعداد گام روزانه و گرلین فعال زنان یائسه را نشان نداد ($P=0.82$)، گرچه این ارتباط به سطح معنی‌داری نزدیک شده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که این حجم فعالیت بدنی روزانه زنان سالم‌مند ایرانی پیش‌گوی مناسبی برای انعکاس تغییرات گرلین پایه آنان باشد. در این راستا مطالعه کارین و همکاران نیز رابطه معنی‌داری بین تغییرات سطح آمادگی جسمانی و اکسیژن مصرفی با گرلین پلاسمانشان نداد [۲].

در تحقیق حاضر، اندازه‌گیری انسولین به عنوان یکی از تنظیم‌گرهای درون‌ریز گرلین [۵]، آشکار نمود که اختلاف سطح پایه انسولین ناشتای زنان فعال در باشگاه‌های آیروبیک (۹/۲ ± ۳/۰۳) کمتر از همتایان کم تحرک (۱۱/۵۲ ± ۴/۷۶) معادل $11\text{U}/\text{ml}$ بود [۲۳] ($P=0.75$) همچنین انسولین ارتباط معناداری با تعداد گام روزانه آنان نداشت ($P=0.64$).

با این حال در گروه آیروبیک میزان حساسیت به انسولین به مراتب بیش از همتایان کم تحرک بود (پروفایل ایندکس HOMA-IR ارائه نشد). در زمینه بررسی قند خون ناشتا و مقاومت انسولینی، مطالعه وولف [۱۶] نشان داد که انسولین ناشتا به میزان $31\text{U}/\text{ml}$ در افراد ۲۰ تا ۶۰ سال فعال به طور معنی‌داری نسبت به افراد کم تحرک پایین‌تر بوده و ارتباط معناداری بین تعداد گام روزانه با انسولین وجود داشت که عامل

گرلین فعال را بررسی می‌کند. با این وجود، شواهد علمی تأثیر برنامه‌های دراز مدت هوازی با تأکید بر حجم تمرين را بر افزایش سطوح مولکول گرلین تام متعاقب ۳ کیلوگرم کاهش وزن نشان می‌دهد [۱۲و۱۲]. همچنان که تحقیق فوستر-شوبرت^۱ و همکاران روی زنان نشان داد که یک سال تمرینات منظم هوازی با شدت متوسط به افزایش ۱۸ درصدی گرلین پایه منجر می‌شود. حالی جمعیت‌های چاق نسبت با همتایان با وزن طبیعی عموماً با کاهش گرلین مواجه هستند [۱۵و۲۸].

در تحقیق حاضر تفاوت معناداری بین $\text{BMI} > 25 \text{ kg}/\text{m}^2$ دو گروه فعال و کم تحرک وجود داشت، اما غلظت پایه گرلین آسیل‌دار میان دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد. البته به دلیل وجود دامنه پراکنده‌گی بالا در غلظت گرلین پایه پلاسمایی هنوز دامنه معینی برای این پیش‌تید معده‌ای در افراد چاق پیکر یا طبیعی گزارش نشده است [۱۱، ۲۷].

با این وجود، میانگین گرلین آسیل‌دار گروه فعال ($195/4 \pm 131/3 \text{ ml}$) معادل 18% بالاتر از گروه غیرفعال ($165/4 \pm 73/4 \text{ ml}$) و با افزایش ۱۳ درصدی غلظت پایه انسولین ناشتا ($11/52 \pm 4.76 \text{ }\mu\text{l}/\text{ml}$) در مقابل $11/52 \pm 3/03 \text{ }\mu\text{l}/\text{ml}$ در گروه آیروبیک بود که از روند سیک زندگی پویا و تعادل منفی انرژی آنها حکایت دارد و احتمالاً ارگانیسم در پاسخ به کاهش یافتن انرژی تام روزانه، رفتار دریافت غذا را با سنتز گرلین تحریک نموده و بدین ترتیب منابع مغذی از دست رفته را جبران می‌کند.

نتایج پژوهش ما همسو با مطالعات میرزایی [۱۱] و کیم اج جی [۲۹]^۱ مبنی بر عدم تأثیر طولانی مدت تمرين بر گرلین فعال می‌باشد. در این زمینه شواهد علمی دلایل متفاوتی را برای تغییرات سطوح گرلین تام یا آسیل‌دار پلاسمایی بیان نموده است، از جمله افزایش هورمون رشد [۱۳]، هزینه انرژی مصرفی، شدت تواتر فعالیت ورزشی هوازی یا مقاومتی [۳۰و۲۹]^۲، تغییرات نروپیتید NPY^۱ و اکسید نیتریک^۲ [۳۱] می‌توان برشمرد.

ربما و همکاران در مورد هزینه انرژی اذغان داشتند: هنگامی که فعالیت ورزشی به تعادل منفی انرژی می‌انجامد، پاسخ گرلین تام به چنین الگوی ورزشی افزایش می‌یابد و آن دسته فعالیت‌های بدنی که تأثیری بر واکنش این هورمون پیتیدی ندارند، احتمالاً از شدت لازم برای ایجاد تعادل منفی انرژی برخوردار نیستند [۲۹]. دلیل دیگر عدم تغییر سطح گرلین آسیل‌دار در زنان یائسه مطالعه ماء می‌تواند پایین بودن تعادل گام‌ها در برنامه‌های پیاده روی روزانه باشد. گرچه عدم توانایی دستگاه پدمتر در تعیین شدت کار یا محاسبه جایه جایی بدن

Foster-Schubert .۹

Kim HJ .۱۰

Neuropeptide Y (NPY) .۱۱

Nitric oxide (NO) pathway .۱۲

منابع

- [1] Ganbari Niaki A, Fathi R. [Ghrelin as a stomach peptide hormone and physical activity (Persian)]. Sport and Movement Sciences Journal. 1998; 6:125-138.
- [2] Karen E, Foster-Schubert A, McTiernan M, Scott Trayo R, Schwartz RS, Kumar RB, et al. Human plasma ghrelin levels increase during a one-year exercise program. J Cline Endocrinol Metab. 2005; 90:820-825.
- [3] Mager U. The role of ghrelin in obesity and insulin resistance. Doctoral dissertation. Finland: Faculty of Medicine of University of KUOPIO; 2008.
- [4] Broglia F, Benso A, Gottero C, Prodam F, Gauna C, et al. Non-acylated ghrelin does not possess the pituitary and pancreatic endocrine activity of acylated ghrelin in humans. J Endocrinol Invest. 2003; 26:192-196.
- [5] Tschop M, Weyer C, Tataranni PA, Devanarayanan V, Ravussin E, Heiman ML. Circulating ghrelin levels are decreased in human obesity. Diabetes. 2001; 50:707-709.
- [6] Kojima M, Kangawa K, Hosoda H, Date Y, Nakazato M, Matsuo H, et al. Ghrelin, structure and function. Physiological Reviews. 2005; 85: 495-499.
- [7] Broom DR, Stensel DJ, Bishop NC, Burns SF, Miyashita M. Exercise-induced suppression of acylated ghrelin in humans. Journal of Applied Physiology. 2007; 102:2165-71.
- [8] Mackelvie K, Graydon J, Meneilly S, Elahi D, Alfred CK. Regulation of appetite in lean and obese adolescents after exercise: Role of acylated and desacyl ghrelin. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2007; 92:648-654.
- [9] Marzullo P, Salvadori A, Brunani A, Verti B, Walker GE. Acylated ghrelin decreases during acute exercise in the lean and obese state. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2008; 99:970-1.
- [10] Ozen S, Sonmez G, Yuktaşir B, Yalcin H, Bugdayci GR. Effects of exercise on leptin and acylated ghrelin hormones in trained males. Journal of Exercise Physiology Online (ASEP). 2010; 12(2):20-30.
- [11] Mirzaei B, Irandoust KH, Rahmani-Nia F, Mohebbi H, Hassan-Nia S. [Unacylated ghrelin levels increase after aerobic exercise program in obese women (Persian)]. Brazilian Journal of Biomotricity. 2009; 3:11-20.
- [12] Leidy HJ, Gardner JK, Frye BR, Snook ML, Schuchert MK., Richard EL, Williams NI. Circulating ghrelin is sensitive to changes in body weight during a diet and exercise program in normal-weight young women. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2004; 88:2659-2664.
- [13] Tasha P, Ballarda C, Melby L, Camusa H. Effect of resistance exercise, with or without carbohydrate supplementation, on plasma ghrelin concentrations and postexercise hunger and food intake. Metabolism Clinical and Experimental. 2009; 58: 1191-1199.
- [14] Tudor-Locke C, Cora LC, Aoyag Y, Bell RC, Croteau KA, De Bourdeaudhuij I, et al. How many steps/day are enough? For older adults and special populations. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2011; 8:80.
- [15] Camhi SM, Church TS, Tudor-Locke C, Johnson WD, Katzmarzyk PT, et al. Accelerometer-determined steps/day and meta-

دامنه سن آزمودنی‌ها گستردہ‌تر از تحقیق حاضر (۵۰ تا ۶۰ سال) شاید دلیل این تفاوت باشد.

در زمینه بررسی عوامل ترکیب بدن بین دو گروه از زنان یائسه فعال و غیرفعال تفاوت معناداری در WHR و BMI مشاهده شد. همچنین این متغیرهای آنتروپومتریک رابطه معناداری با تعداد گام روزانه داشتند که با نتایج مطالعات وولف [۱۶]، تامپسون [۲۱] و کارولین [۲۲] همسو می‌باشد.

نتیجه‌گیری نهایی

به طور کلی از یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان دریافت آگرچه برنامه‌های پیاده‌روی طولانی مدت تأثیر بارزی بر متغیرهای ترکیب بدن سالمندان دارد، اما پیشینه ۲ سال اجرای منظم ورزش آیروبیک با شدت دلخواه به صورت دو نوبت در هفته در کنار فعالیت‌های روزمره زندگی معادل 80.22 ± 26.59 گام در روز به تغییرات بارز غلظت ایزووفورم گرلین آسیل دار زنان یائسه فعال منجر نمی‌گردد؛ به بیان دیگر، این حجم فعالیت بدنی روزانه را نمی‌توان الگوی مناسبی برای تغییرات پاسخ غلظت پایه این هورمون اشتها معرفی کرد.

بلکه به نظر می‌رسد که احتمالاً مطابق توصیه انجمن‌های بهداشتی و تندرستی $ACSM^{13}$ و CDC^{14} به تعداد گام بیشتر (بالاتر از ۱۰۰۰۰ گام روزانه) برای تأثیر بر پروفایل گرلین فعال پلاسمایی نیاز باشد که با تغییر ترکیب بدن $BMI > 25 \text{ kg/m}^2$ زنان سالمند نیز همراه باشد.

البته به دلیل ماهیت پس رویدادی این مطالعه، محدودیت‌هایی مانند عدم کنترل بهینه در برآورد اندازه‌های شدت تمرينات هفتگی و مختصات تدوین برنامه‌های آیروبیک زنان فعال در باشگاه‌های سطح شهر، سنجش دقیق هزینه برنامه کالری روزانه ظرف سه ماه به شروع پروژه، مصرف داروهای آنتی‌بیوتیک زنان کم تحرک در مرکز نگهداری سالمندان یا سطح انگیزش آزمودنی‌ها هنگام شرکت در تمرينات آیروبیک سالانه، دستیابی به نتایج عینی مرهون اجرای مطالعات از نوع تجربی و دستکاری شده می‌باشد.

تشکر و قدردانی

این مطالعه از محل گرانش پژوهشی مؤلف مسئول و با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا انجام شده است. بدین وسیله از حضور آزمودنی‌ها تا پایان طرح، درمانگرهای فیزیکی در پیگیری حجم فعالیت بدنی روزانه آزمودنی‌ها و همیاری مدیریت کانون سالمندان و باشگاه‌های آیروبیک شهرستان شهر کرد سپاسگزاری می‌نماییم.

- parameters of diabetes control in type 2 diabetes mellitus. *Metabolism-Clinical and Experimental.* 2006; 55:1382-1387.
- bolic syndrome. *American Journal of Preventive Medicine.* 2010; 38(6):575-582.
- [16] Woolf K, Reese C, Mason M, Leah P, Beaird C, Tudor-Locke C, et al. Physical activity is associated with risk factors for chronic disease across adult women's life cycle. *Journal of the American Dietetic Association.* 2008; 108:948-959.
- [17] Jürimäe J, Kums T, Jürimäe T. Plasma adiponectin concentration is associated with the average accelerometer daily steps counts in healthy elderly females. *European Journal of Applied Physiology.* 2010; 109(5):823-28
- [18] Swartz AM, Strath SJ, Bassett DR, Moore JB, Redwine BA, et al. Increasing daily walking improves glucose tolerance in overweight women. *Preventive Medicine.* 2003; 37(4):356-62.
- [19] Ukkola O. Ghrelin in type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome. *Molecular and Cellular Endocrinology.* 2011; 340(1):26-28.
- [20] Hornbuckle LM, Bassett DR Jr, Thompson DL. Pedometer-determined walking and body composition variables in African-American women. *Medicine & Science Sports Exercise.* 2005; 37(6):1069-1074.
- [21] Thompson DL, Rakow J, Perdue SM. Relationship between accumulated walking and body composition in middle-aged women. *Medicine & Science Sports Exercise.* 2004; 36(5):911-914.
- [22] Richardson CR, Tiffany L, Newton J, AnandaSen A. A meta-analysis of Pedometer-based walking interventions and weight loss. *Annals of Family Medicine.* 2008; 6:69-77.
- [23] Strath S, Swartz A, Parker S, Miller N. Walking and metabolic syndrome in older adults. *Journal of Physical & Activity Health.* 2007; 4(4):397-410.
- [24] Schneider P, Crouter E, Lukajic O, Bassett DR, JR. Accuracy and reliability of 10 pedometers for measuring steps over a 400-m walk. *Medicine & Science Sports Exercise.* 2003; 35(10): 1779-1784.
- [25] Akamizu T, Shinomiya T, Irako T, Fukunago M, et al. Separate measurement of plasma levels of acylated and desacyl ghrelin in healthy subjects using a direct ELISA assay. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.* 2004; 90:6-9.
- [26] Karen E, Foster-Schubert A, McTiernan M, Scott Trayo R, Schwartz RS, Kumar RB, et al. Human plasma ghrelin levels increase during a one- years exercise program. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.* 2005, 90:820-25.
- [27] Soares JB, Leite-Moreira AF. Ghrelin, des-acyl ghrelin and obestatin: three pieces of the same puzzle. *Peptides.* 2008; 29:1255-70.
- [28] Rima Aak JU, Oivo JU, Rima E, Riit P, Urge P. Plasma ghrelin Is altered after maximal exercise in elite male rowers. *Experimental Biology and Medicine.* 2007; 232:904-909.
- [29] Kim HJ, Lee S, Kim TW, Kim HH, Jeon TY, Yoon YS, Oh SW, Kwak H, Lee JG. Effects of exercise-induced weight loss on acylated and unacylated ghrelin in overweight children. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.* 2008; 68(3):416-22.
- [30] Spencer Gaskin F, Susan A. Farr, W, Banks A, Vijaya B. Kumar J, Morley E. Ghrelin-induced feeding is dependent on nitric oxide. *Peptides.* 2003; 24:913-918.
- [31] Araiza P, Hewes H, Gashegewa C, Chantal A, Vella M, Burge R. Efficacy of a pedometer-based physical activity program on