

**Research Paper****Assessment of the Associations of Depression with Elder Abuse among the Elderly in Kashan City, Iran**

Zahra Khalili <sup>1</sup>, \*Mohsen Taghadosi <sup>2</sup>, Majideh Heravi-Karimooi <sup>3</sup>, Ali Sadrollahi <sup>4</sup>, Hamidreza Gilasi <sup>4</sup>

1. Department of Geriatric Nursing, Young Researchers And Elite Club, Islamic Azad University, Khalkhal Branch, Khalkhal, Iran.

2. Department of Medical Surgical, Trauma Nursing Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.

3. Department of Nursing, Elderly Care Research Center, Faculty of Nursing & Midwifery, Shahed University, Tehran, Iran.

4. Department of Epidemiology, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Received: 24 Jul. 2015

Accepted: 14 Nov. 2015

**ABSTRACT**

**Objectives** Elder abuse is a social and psychological problem of the community that has a significant impact in reducing mental health of the elderly. It can be considered as one of the factors predisposing to aging depression. The purpose of this study was to evaluate the relationship between age and depression in the elderly abused in Kashan, Iran, in 2014.

**Methods & Materials** This descriptive, cross-sectional study was conducted on 500 people aged  $\geq 60$  years old in Kashan City, Iran, in 2014. Subjects were randomly selected from 10 healthcare centers of Kashan. The study instruments were demographic information, elder abuse questionnaire in the family ( $\alpha=0.97$ ), and geriatric depression scale ( $\alpha=0.90$ ).

**Results** Results of the current study showed that 80% of subjects have experienced at least one type of abuse during the last year. The highest rate of abuse was financial abuse (45.6%), and 79.2% had some sort of depression. Linear regression analysis showed that emotional neglect ( $P=0.001$ ,  $\beta=0.20$ ), financial neglect ( $P=0.036$ ,  $\beta=0.117$ ) and ostracizing ( $P=0.001$ ,  $\beta=0.241$ ) were significantly associated with depression. According to the test, a correlation was observed between the elder abuse and depression ( $r=0.490$ ,  $P=0.001$ ).

**Conclusion** The study results indicate the importance and necessity of providing health care services and support for the identification of depressed elderly victims of abuse and prevention to solve this problem and improve their situation.

**Key words:**

Abuse, Depression,  
Elderly

**\* Corresponding Author:**

Mohsen Taghadosi, PhD

**Address:** Department of Medical Surgical, Trauma Nursing Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.

**Tel:** +98 (361) 5575058

**E-mail:** Taghadosi\_m@kaums.ac.ir

## ارزیابی ارتباط افسردگی و میزان سوعرفتار در سالمندان شهر کاشان

زهرا خلیلی<sup>۱</sup>، محسن تقاضی<sup>۲</sup>، مجیده هروی کریموی<sup>۳</sup>، علی صدراللهی<sup>۴</sup>، حمیدرضا گیلاسی<sup>۵</sup>

- گروه پرستاری سالمندان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال، خلخال، ایران.
- گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
- گروه پژوهشی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های سالمندان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

### جکیده

تاریخ دریافت: ۰۲ مرداد ۱۳۹۴

تاریخ پذیرش: ۲۳ آبان ۱۳۹۴

**هدف** سوعرفتار با سالمند یکی از مشکلات روانی و اجتماعی جوامع است که تأثیر بسیاری در کاهش سلامت روانی سالمندان دارد و می‌تواند به عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز ایجاد افسردگی سالمندی باشد. هدف این مطالعه ارزیابی ارتباط بین افسردگی سالمندی و سوعرفتار در سالمندان شهر کاشان در سال ۱۳۹۳ بود.

**مواد و روش‌ها** مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی-مقطعی بود که در سال ۱۳۹۳ انجام شد. جامعه پژوهش ۵۰۰ نفر از سالمندان بالای ۶۰ سال شهر کاشان بودند. نمونه‌گیری به صورت تصادفی انجام شد که از بین ۱۰ مرکز بهداشتی درمانی شهر کاشان انتخاب شد. ابزار مطالعه شامل اطلاعات جمعیت‌شناسنامی و پرسشنامه سوعرفتار با سالمند در خانواده (۰۰۰/۹۷۵) و پرسشنامه ارزیابی افسردگی سالمندی (۰۰/۹۰۰) بود.

**یافته‌ها** نتایج نشان داد ۴۰۰ نفر (۸۰ درصد) از شرکت‌کننده حداقل یکی از انواع سوعرفتار را در یک سال گذشته تجربه کرده بودند. بیشترین میزان شیوع سوعرفتار مربوط به سوعرفتار مالی (۴۵/۶ درصد) بود و ۷۹/۲ درصد، درجات مختلفی از افسردگی داشتند. نتایج رگرسیون خطی نشان داد غفلت عاطفی ( $P=0/001$  و  $Beta=0/036$ ) و غفلت مالی ( $P=0/001$  و  $Beta=0/117$ ) و طردشدنی ( $P=0/001$  و  $Beta=0/241$ ) با افسردگی ارتباط معنادار داشت. برآسان آزمون‌ها، ارتباط معناداری بین نمره سوعرفتار با افسردگی ( $P=0/001$  و  $P=0/490$ ) وجود داشت.

**نتیجه‌گیری** نتایج این مطالعه بیانگر اهمیت و ضرورت ارائه خدمات بهداشتی مراقبتی و حمایتی برای شناسایی سالمندان افسردگی قریبی سوعرفتار و پیشگیری بهمنظور حل این معضل و بهبود وضعیت آنها بود.

### کلیدواژه‌ها:

سوعرفتار، افسردگی، سالمند

### مقدمه

سالمندی یک فرآیند بیولوژیکی اجتناب ناپذیر است که تمام موجودات زنده را درگیر می‌کند و در برخی موارد همراه با تجربیات ناخوشایند است [۱]. تحولات اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت‌های علمی در سال‌های اخیر موجب افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ و میر شده است، که این امر باعث افزایش جمعیت سالمندان در جهان به طرز چشمگیری شده است [۲]. تخمین زده می‌شود جمعیت سالمندان در جهان تا ۴۰ سال آینده دوبرابر خواهد شد [۳].

این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است. ایران نیز به عنوان یکی از این کشورهای در حال توسعه از این تغییرات جمعیتی مستثنی نیست، به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود جمعیت سالمندان از ۸/۷۲۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد [۴]. با وجود رشد جمعیت سالمندان، به نیازها و مشکلات این گروه جمعیتی کمتر توجه شده است [۵] و این مسئله پیامدهای نامطلوب روانی و عاطفی بسیاری بر آنان دارد [۶].

\* نویسنده مسئول:

دکتر محسن تقاضی

نشانی: کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه داخلی جراحی.

تلفن: +۹۸ (۳۶۱) ۵۵۷۵۰۵۸

پست الکترونیکی: Taghadosi\_m@kaums.ac.ir

ارتباط افسردگی و میزان سوурفتار در سالمندان شهر کاشان انجام دهنند. بنابراین، آگاهی از وسعت این مشکل در جامعه به پرستاران، پزشکان، مراقبان و کارکنان بهداشتی کمک می‌کند که در مواجهه و بررسی از اشخاص سالمند، سوурفتار با سالمندان را مدنظر قرار دهند و با آگاهی لازم، نقش حرفه‌ای خود را در زمینه تأمین سلامت سالمندان ایفانمایند.

### روشن مطالعه

پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی از نوع مقطعی بود که در سال ۱۳۹۳ با هدف ارزیابی ارتباط سوурفتار و افسردگی در سالمندان شهر کاشان انجام شد. جامعه پژوهش شامل ۵۰۰ نفر از سالمندان بالای ۶۰ سال زیرپوشش پایگاههای بهداشتی شهر کاشان بود و نمونه‌گیری به صورت تصادفی سهمیه‌ای انجام شد. با توجه به مطالعات گذشته و برآورد میزان شیوع سوурفتار سالمندان در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $d=0.05$ ،  $P=0.32$ ،  $Z=2.69$ ) بر اساس فرمول کوکران، تعداد ۳۳۴ نفر تعیین گردید که به صورت نمونه‌گیری خوش‌های با احتساب ضریب  $1/5$  تعداد نمونه ۵۰۰ نفر بود [۱۲].

مالک ورود این مطالعه داشتن سن بالای ۶۶ سال، داشتن ملیت ایرانی، توانایی تکلم به زبان فارسی، داشتن هوشیاری کامل در زمان مطالعه، وجود توانایی برقراری ارتباط و قدرت پاسخ‌گویی به سوالات مطالعه و ساختن بودن در شهر کاشان بود. ملاک خروج، انصاف نمونه از پاسخ‌گویی به پرسشنامه در حین انجام کار و مصاحبه بود.

پس از هماهنگی با معاونت بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و کسب مجوز برای جمع‌آوری نمونه، در مرحله اول شهر کاشان بر اساس نقشه بهداشتی درمانی به ۵ منطقه تقسیم و از هر منطقه ۲ مرکز بهداشت به صورت تصادفی انتخاب ووارد مطالعه شد. مجموع مراکز بهداشتی انتخاب شده ۱۰ مرکز بود. در مرحله بعد در هر پایگاه تعداد سالمندان زیرپوشش مشخص گردید. پس از آن به صورت تصادفی سهمیه‌ای برمبنای جمعیت زیرپوشش و جنس نمونه‌های پژوهش به منظور ورود به تحقیق انتخاب شدند.

اندازه خوش‌های بر اساس وضعیت جمعیت زیرپوشش و وضعیت جنسی متفاوت بود. سپس در صورت نداشتن بیماری روانی شناخته شده (سایکوز)، بر اساس اعلام همان پایگاه بهداشت و رعایت معیار ورود، از طریق تلفن یا رابطان بهداشتی با سالمند تماس گرفته شد. در صورت عدم تمايل سالمند انتخاب شده، برای همکاری فرد دیگر جایگزین شد.

بر حسب انتخاب سالمند در منزل یا محل پایگاه، پرسشنامه‌های مطالعه پس از بیان اهداف تحقیق و دادن آگاهی لازم درباره آن به سالمند داده شد. پرسشنامه‌ها برای هر فردی جداگانه و با رعایت حریم خصوصی تکمیل شد. سالمندانی که از توانایی خواندن و نوشتن برخوردار نبودند به روش مصاحبه‌ای، هر یک از

سوورفتار با سالمندان یکی از مشکلات مربوط به بهداشت سالمندی است که با ورود به دوران سالمندی در افراد افزایش پیدا می‌کند [۷]. براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، «سوورفتار» تجاوز به حق ذاتی انسان و نوعی خشونت عمدی یا غیرعمدی به صورت جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی، تعیض و غفلت است [۸] که سلامت و ایمنی شخص سالمند را تهدید می‌کند [۹].

سوورفتار نه تنها موجب صدمات فیزیکی می‌شود، بلکه سلامت روان سالمندان را نیز بهشدت تهدید می‌کند [۱۰]. به گزارش آزادس خدماتی و مرکز ملی سوورفتار آمریکا از هر ۱۰ سالمند آمریکایی سالانه یک نفر مورد بدرفتاری قرار می‌گیرد و تنها یکی از ۱۴ مورد گزارش آن می‌گردد [۱۱ و ۱۲]. بیشترین شیوع سوورفتار در آمریکا در زمینه خشونت فیزیکی و در انگلستان خشونت کلامی شدید گزارش شده است [۱۳]. در ایران مطالعات انجام شده نشان داد که سوورفتار با سالمندان وجود دارد [۱۴ و ۱۵]، به طوری که غفلت عاطفی و روانی بیشترین و طردشدنی و سوورفتار جسمی کمترین شیوع را دارد [۱۶].

مطالعات بیان می‌کند سوورفتار می‌تواند باعث بروز اختلالات روانی همچون افسردگی، اضطراب و کاهش کیفیت زندگی شود [۲۰ و ۲۲]؛ به طوری که ۶٪ سالمندان مورد سوورفتار قرار گرفته، از افسردگی شدید رنج می‌برند [۲۳]. علاوه بر این احساس افسردگی ممکن است منعکس کننده آسیب‌پذیری و واستگی فرد در معرض خطر و همچنین یکی از عوامل خطرساز برای سوورفتار باشد.

«دونگ»<sup>۱</sup> در (۲۰۰۸ و ۲۰۱۰) طی مطالعاتی نشان داد سالمندانی که با سوورفتار اواجه بودند، میزان افسردگی بیشتری نسبت به دیگران گزارش کردند [۲۴ و ۲۵]. «فولمر»<sup>۲</sup> (۲۰۰۵) بیان کرد که افسردگی با آسیب‌پذیری و غفلت ارتباط مستقیم دارد [۲۶]. «کوپر»<sup>۳</sup> (۲۰۱۰) نشان داد افزایش سوورفتار را پیشگویی می‌کند [۲۷]. در اضطراب، خطر افزایش سوورفتار را پیشگویی می‌کند [۲۸]. در مقابل «روجو»<sup>۴</sup> (۲۰۰۹) بیان می‌کند که اختلالات روان شناسی مانند افسردگی، احتمال سوورفتار را افزایش نمی‌دهد [۲۹].

سوورفتار با سالمند مشکلی فرآیند برای سلامت و ناقص حقوق سالمندان است [۱۱] و با توجه به اینکه بروز اختلالات روانی ناشی از سوورفتار در افراد سالمند، در نژاد و فرهنگ‌ها متفاوت است [۳۰]، مطالعات نیز میزان افسردگی را در مناطق مختلف بر حسب قومیت، مذهب و نژاد متفاوت نشان دادند [۲۶، ۲۷ و ۲۸].

با توجه به تأثیر انکارناپذیر فرهنگ بر پدیده سوورفتار و کمبود اطلاعات و متفاوت بودن فرهنگ و سیستم‌های بهداشتی ایران با دیگر کشورها، سبب شد تا پژوهشگران مطالعه‌ای با هدف ارزیابی

1. Dong
2. Fulmer
3. Cooper
4. Rojo

ونمره اختصاص داده شده به آیتم «خیر» در ماده مذکور «صفر» و همچنین نمره اختصاص داده شده به مورد «خیر» در سؤالات ۱، ۳، ۷، ۱۱ و ۱۳ عدد «یک» و نمره اختصاص داده شده به مورد «بلی» در سؤالات مذکور «صفر» است.

برای محاسبه امتیازها، تنها امتیاز مربوط به موارد «بلی و خیر» که نمره «یک» را کسب می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود. اخذ امتیاز ۰-۴ نشانگر عدم وجود افسردگی، امتیاز ۵-۸ نشان دهنده افسردگی خفیف، امتیاز ۹-۱۱ نشان دهنده افسردگی متوسط و امتیاز ۱۲-۱۵ نشان دهنده افسردگی شدید است. ضرایب پایابی مقیاس افسردگی سالمندان (الفای کرونباخ) ۰/۹، تصنیف ۰/۸۹ و آزمون باز آزمون ۰/۵۸ بود [۳۰].

مالحاظات اخلاقی این مطالعه در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تأیید شد. شماره کد اخلاق مطالعه ۵۰۰۳ تاریخ ۹۲/۱۲/۵ است. اهداف مطالعه و نیز آزادانه بودن شرکت در مطالعه به همه شرکت کنندگان در تحقیق توضیح داده شد. همه شرکت کنندگان در تحقیق برای شرکت در مطالعه رضایت آگاهانه کتبی دادند. به همه اطمینان داده شده که اطلاعات فردی اخذ شده از آنها محترمانه خواهد ماند.

پس از جمع آوری اطلاعات خام، داده‌ها وارد نسخه ۱۱/۵ نرم افزار آماری SPSS شد و برای بررسی طبیعی بودن داده‌ها آزمون کولموگروف-آسمیرنوف به کار رفت و برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کای اسکوئر و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد. سطح معناداری در تمام آزمون‌ها  $<P/0.5$  بود.

### یافته‌ها

از تعداد ۵۰۰ سالمند شرکت کننده در این مطالعه ۲۹۰ نفر (۵۸ درصد) مرد و ۲۱۰ نفر (۴۲ درصد) زن بودند. میانگین سن جامعه پژوهش در این مطالعه  $۶۰.۷ \pm ۷.۰$  سال و بیشترین فراوانی سالمندان در گروه سنی ۷۰-۶۰ سال بود (۲۳۹ نفر). بیشتر سالمندان این مطالعه (۴۳٪) متاهل بودند و از نظر سطح تحصیلات، بیشترین فراوانی مربوط به افراد بی سواد (۳۰.۶ نفر) بود. در زمینه نحوه اداره زندگی، بیشتر سالمندان موربد بررسی شدند (۲۲۱ نفر) به صورت مستقل زندگی می‌کردند و تعداد ۱۳۱ نفر از سالمندان هیچ بیماری زمینه‌ای نداشتند (جدول شماره ۱).

نمره کل سوعرفتار جامعه پژوهش این مطالعه  $۱۵/۱۵/۶۶ \pm ۳۱$  بود. بر این اساس ۴۰۰ نفر (۸۰ درصد) از سالمندان شرکت کننده در این مطالعه حداقل یک نوع از انواع سوعرفتار را در یک سال گذشته تجربه کردند. میزان سوعرفتار در سالمندان مرد (۲۳۲ نفر) بود (۵۸ درصد) بیشتر از سالمندان زن (۱۶۸ نفر) (۴۲ درصد) بود. بیشترین میزان شیوع سوعرفتار مربوط به سوعرفتار مالی (۱۸۹ نفر) و کمترین شیوع آن مربوط به طردشدن (۱۶/۶ درصد) بود (جدول شماره ۲).

پرسشنامه‌ها برای آنها قرائت شد و گویه‌های پرسشنامه براساس نظر و انتخاب سالمند پر شد.

سالمندانی که از توانایی خواندن و نوشتن برخوردار بودند پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت تا نسبت به پرکردن گویه‌های آن اقدام نمایند. سپس در یک فاصله زمانی ۲۴ ساعته در مراجعته بعدی، پژوهشگر پرسشنامه‌های تکمیل شده را جمع آوری کرد. اگر پرسشنامه‌ای اطلاعات ناقص داشت، از شرکت کننده خواسته شد نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کند. نمونه‌گیری تاجایی که حجم نمونه تعیین شده به دست آید، ادامه یافت.

گردآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه سه‌قسمتی انجام شد: قسمت اول پرسشنامه شامل مشخصات جمعیت‌شناسختی (سن، تعداد فرزند، جنس، تحصیلات، وضعیت تأهل، درآمد، سابقه ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن و توانایی راه‌رفتن).

قسمت دوم ابزار شامل پرسشنامه بررسی سوعرفتار در خانواده نسبت به سالمندان بود. این پرسشنامه شامل عبارت ۴۹ هشت زیرمقیاس غفلت مراقبتی، سوعرفتار روان‌شناسختی، سوعرفتار جسمی، سوعرفتار مالی، سلب اختیار مالی، طردشدنی، غفلت مالی و عاطفی است. ابزار مذکور دارای گزینه‌های «بلی»، «خیر» و «موردی ندارد» هست.

امتیازهای اخذ شده در محدوده ۰-۱۰۰ هستند و امتیاز بالاتر نشان دهنده وجود میزان بیشتری از علائم سوعرفتار است. بدین ترتیب ۱۰۰ نشان دهنده حداکثر میزان میزان سوعرفتار و صفر نشان دهنده عدم وجود شواهدی از سوعرفتار است. کمترین امتیاز مربوط به هر عبارت «صفر» جهت انتخاب گزینه خیر و بیشترین امتیاز «یک» جهت انتخاب گزینه بلی است.

گزینه «موردی ندارد» هیچ امتیازی کسب نمی‌کرد و در هنگام محاسبه امتیاز، عبارات با گزینه «موردی ندارد» حذف می‌شد. این ابزار براساس یافته‌های مطالعه‌ای کیفی روی سالمندان آزار دیده در ایران با توجه به ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایرانی تدوین و اعتبار سنجی شده است و از اعتبار صورت، محتوا و سازه برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ برای پایابی این ابزار، ۰/۹۷ (۲۹) تعیین شده است [۲۹].

قسمت سوم مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)<sup>۵</sup> است که ۱۵ سؤال دارد که به صورت «بلی» و «خیر» پاسخ داده می‌شود و توسط «پیسیوچ»<sup>۶</sup> (۱۹۸۳) برای ارزیابی افسردگی سالمندان ساخته شده است و مقیاسی مناسب برای تشخیص علائم افسردگی در سالمندان به شمار می‌آید. نمره اختصاص داده شده به مورد «بلی» در سؤالات ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ عدد «یک»

5. Geriatric Depression Scale (GDS)

6. Yesavage

# سالمند

جدول ۱. توزیع فراوانی و درصد سالمندان شهر کاشان براساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در سال ۱۳۹۳.

متغیرها	طبقه	تعداد (درصد)
سن	۶۰-۷۰	۲۳۹ (۴۷/۸)
سن	۷۱-۸۰	۱۷۲ (۳۴/۲)
سن	۸۰ و بالاتر	۸۹ (۱۷/۸)
سطح تحصیلات	بی‌سواد	۳۰۶ (۶۱/۲)
سطح تحصیلات	ابتدایی	۱۵۲ (۳۰/۴)
سطح تحصیلات	دبیلم و بالاتر	۴۲ (۸/۴)
وضعیت تأهل	متأهل	۲۳۷ (۸۷/۴)
وضعیت تأهل	مجرد بیوه یا جدشده	۶۳ (۱۲/۶)
تعداد فرزند	*	۱۶ (۳/۲)
تعداد فرزند	۱-۴	۲۱۲ (۴۲/۴)
درآمد	۵ و بالاتر	۲۷۲ (۵۴/۴)
درآمد	مستقل	۲۲۱ (۴۴/۲)
درآمد	وابسته	۱۲۹ (۲۵/۸)
داشتن بیماری مزمن	تحت سازمان‌های حمایتی	۱۵۰ (۳۰)
داشتن بیماری مزمن	دارد	۳۶۹ (۷۳/۸)
داشتن بیماری مزمن	ندارد	۱۳۱ (۲۶/۲)
داشتن توانایی راه‌رفتن	مستقل	۳۳۸ (۶۷/۶)
داشتن توانایی راه‌رفتن	وابسته	۱۶۲ (۳۲/۴)

# سالمند

جدول ۲. توزیع فراوانی و درصد شیوع انواع سوعرفتار نسبت به سالمندان کاشان در سال ۱۳۹۳.

انواع سوعرفتار	وجود سوعرفتار	عدم سوعرفتار	درصد
انواع سوعرفتار	تعداد	درصد	تعداد
غفلت عاطفی	۱۴۹	۲۹/۸	۳۵۱
غفلت مراقبتی	۱۷۸	۳۵/۶	۳۲۲
غفلت مالی	۱۸۹	۳۷/۸	۳۱۱
سلب اختیار	۲۰۶	۴۱/۲	۲۹۴
سوعرفتار روان‌شناختی	۲۲۵	۴۵	۲۷۵
سوعرفتار مالی	۲۲۸	۴۵/۶	۲۷۲
سوعرفتار جسمی	۱۱۱	۲۲/۲	۳۸۹
طردشدنگی	۸۳	۱۶/۶	۴۱۷

# سالمند

جدول ۳. ارتباط و توزیع فراوانی و درصد درجات مختلف افسردگی براساس انواع سوعرفتار در سالمندان کاشان در سال ۱۳۹۳.

P value	افسردگی شدید	افسردگی متوسط	افسردگی خفیف	عدم افسردگی	انواع سوعرفتار
.۰/۰۰۱	۲۴ (۱۶/۱)	۵۸ (۳۸/۹)	۴۸ (۳۲/۲)	۱۹ (۱۲/۸)	غفلت عاطفی
.۰/۰۰۱	۲۳ (۱۲/۹)	۵۹ (۳۳/۱)	۷۵ (۴۲/۱)	۲۱ (۱۱/۸)	غفلت مراقبتی
.۰/۰۰۱	۲۶ (۱۳/۸)	۶۵ (۳۴/۴)	۷۳ (۳۸/۶)	۲۵ (۱۳/۲)	غفلت مالی
.۰/۱۴	۱۶ (۷/۸)	۵۶ (۲۷/۲)	۸۹ (۴۳/۲)	۴۵ (۲۱/۸)	سلب اختیار
.۰/۰۰۱	۱۸ (۸)	۶۲ (۲۷/۶)	۱۱۶ (۵۱/۶)	۲۹ (۱۲/۹)	سوعرفتار روان‌شناختی
.۰/۰۶۹	۱۱ (۴/۸)	۶۷ (۲۹/۴)	۱۰۴ (۴۵/۶)	۴۶ (۲۰/۲)	سوعرفتار مالی
.۰/۰۰۱	۱۹ (۱۷/۱)	۴۰ (۳۶)	۴۲ (۳۷/۸)	۱۰ (۹)	سوعرفتار جسمی
.۰/۰۰۱	۲۲ (۲۶/۵)	۳۴ (۴۱)	۱۸ (۲۱/۷)	۹ (۱۰/۸)	طردشدنگی

سالند

جدول ۴. پیش‌بینی تأثیر انواع سوعرفتار در ایجاد افسردگی سالمندان شهر کاشان در سال ۱۳۹۳.

Adjusted R-Square	R-Square	P	T	Beta	انواع سوعرفتار
۰/۲۲۷	۰/۲۵۱	.۰/۰۰۱	۴/۲۶	.۰/۲۰	غفلت عاطفی
		.۰/۵۷۴	.۰/۵۶۳	.۰/۰۳۱	غفلت مراقبتی
		.۰/۰۳۶	۲/۱۰	.۰/۱۱۷	غفلت مالی
		.۰/۱۱۱	-۱/۵۹	-۰/۰۷۲	سلب اختیار
		.۰/۱۱۱	۱/۵۹	.۰/۷۶	سوعرفتار روان‌شناختی
		.۰/۰۹۹	-۱/۶۵	-۰/۰۷۵	سوعرفتار مالی
		.۰/۰۶۱	۱/۸۷	.۰/۰۸۷	سوعرفتار جسمی
		.۰/۰۰۱	۵/۴۳	.۰/۲۴۱	طردشدنگی

سالند

نتایج رگرسیون خطی برای پیش‌بینی تأثیر انواع سوعرفتار و افسردگی نشان داد غفلت عاطفی ( $P=0/001$ ) و غفلت مالی ( $P=0/036$ ) و سوعرفتار روان‌شناختی ( $P=0/111$ ) و طردشدنگی ( $P=0/001$ ) با افسردگی ارتباط معنادار داشت (جدول شماره ۴).

### بحث

در مطالعه حاضر میزان فراوانی سوعرفتار در سالمندان درصد عنوان شد که در مقایسه با دیگر مطالعات انجام شده در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه رقمی بسیار متفاوت است. این میزان از شیوع بالاتر از میزان گزارش شده در مطالعات انجام شده در آمریکا (۳-۵%) [۳۱]، کره (۴/۲%) [۲]، ژاپن (۱۷/۹%) [۳۲]، روسیه (۲۸/۶۳%) [۳۳] و چین (۳۶/۲%) [۲۱] بود. همچنین مطالعه «منوچهری» و همکاران (۱۳۸۷) [۱]، بیانگر شیوع درصدی تجربه حداقل یک نوع از سوعرفتار در سالمندان مراجعته‌کننده به پارک‌های شهر تهران توسط اعضای خانواده بود [۱۸]. آنکه بالاتر از میزان شیوع مطالعه حاضر است.

نموده کل افسردگی شرکت‌کنندگان این مطالعه  $۲\pm ۸/۶/۷/۹$  بود. براین اساس ۱۱۲ نفر (۲۲/۴ درصد) از سالمندان فاقد افسردگی بودند و تعداد ۲۳۹ سالمند (۴۷/۸ درصد) دارای افسردگی خفیف، ۱۲۰ سالمند (۲۴ درصد) افسردگی متوسط و ۲۹ سالمند (۵/۸ درصد) افسردگی شدید داشتند. از افرادی که سوعرفتار را در یک سال گذشته تجربه و گزارش کردند، ۳۱۷ نفر (۷۹/۲ درصد) درجات مختلفی از افسردگی داشتند. در انواع سوعرفتار بیشترین درجات افسردگی در افرادی وجود داشت که سوعرفتار به شکل طردشدنگی (۷۴ نفر) داشتند. کمترین میزان افسردگی در سوعرفتار (۱۶۱ نفر) به شکل سلب اختیار مشاهده شد (جدول شماره ۳).

براساس آزمون‌ها ارتباط معناداری بین نموده سوعرفتار با افسردگی ( $P=0/001$ ) وجود داشت. براساس زیرگروه انواع سوعرفتار ارتباط معنادار بین سوعرفتار غفلت عاطفی ( $P=0/001$ )، غفلت مراقبتی ( $P=0/001$ )، غفلت مالی ( $P=0/001$ )، سوعرفتار روان‌شناختی ( $P=0/001$ )، سوعرفتار جسمی ( $P=0/001$ ) و طردشدنگی ( $P=0/001$ ) با شدت افسردگی دیده شد (جدول شماره ۳).

همسو حاضر است.

مطالعه‌ای نشان داد که سوурفتار مالی ارتباط بیشتری با میزان افسردگی دارد [۴۰]. همچنین مطالعه‌دیگری بیان می‌کند سوурفتار روانی و جسمی در ارتباط با افزایش علائم افسردگی است [۴۱]. مطالعات دیگری نیز ارتباط بین افسردگی و سوурفتار را تأیید کرده است [۴۲]. از دلایل بالابودن میزان افسردگی سالمندان طردشده می‌توان به نبود خانواده یا نبود تماس‌های اجتماعی و بالطبع احساس تنها‌یی در افراد سالمند اشاره کرد.

مطالعه «آیسیکوپیتر» [۷]، نشان داد سالمندانی که احساس تنها‌یی را تجربه می‌کردند، مورد غفلت و رهاسنگی قرار گرفته بودند [۴۳]. همچنین مطالعه دیگری گزارش کرد سالمندان با میزان احساس تنها‌یی بالا، چهار برابر بیش از سالمندان با میزان تنها‌یی پایین مورد سوурفتار قرار گرفته بودند [۴۴]. مطالعه‌ای نشان داد که افسردگی، احتمال سوурفتار را افزایش نمی‌دهد [۷] که این یافته با مطالعه حاضر همسو نیست.

همچنین مطالعه حاضر نشان داد که مردان سالمند با تجربه سوурفتار به مراتب بیشتر از زنان دچار افسردگی هستند که این یافته با مطالعه «مارگت» [۸] و همکاران [۲۰۰۴] هم خوانی ندارد [۴۵]. زنان سالمند با تجربه سوурفتار به مراتب بیش از کسانی که تجربه این پدیده را ندازند، برای امور درمانی همچون جراحات جسمی و اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.

همچنین مطالعات نشان می‌دهد شیوع افسردگی شدید در بین زنان سالمند بالا است [۴۶]. دونگ و همکاران [۲۰۰۸] طی مطالعه‌ای نشان داد که زنان با تجربه سوурفتار افسردگی بیشتری نسبت به مردان داشتند [۳۹]. دلیل احتمالی این یافته ممکن است در نحوه نمونه‌گیری این مطالعه و بیشتر بودن حضور مردان در مطالعه دانست یا اینکه چون زنان سالمند نسبت به مردان در قبول مسئولیت‌های خانگی مانند پخت و پز و مراقبت از نوه‌ها نقش بیشتری دارند، بیشتر مورد احترام فرزندان و کمتر مورد سوурفتار قرار می‌گیرند.

### نتیجه‌گیری نهایی

با وجود تأکید زیادی که در فرهنگ و دین ما به احترام از سالمند شده است، این گروه از افراد در معرض انواع سوурفتار قرار دارند. نتایج این مطالعه نیز مؤید این یافته است که بین سوурفتار و افسردگی در سالمندان ارتباط دارد. اگرچه ارتباط معنادار بین انواع سوурفتار با تأثیر پیش‌بینی ایجاد افسردگی توسط سوурفتار از قابلیت پایینی برخوردار بود، با وجود اینکه این برداشت وجود داشت که سوурفتار در ایجاد افسردگی قابلیت تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد، اما نتایج مطالعه‌این تأثیر را ضعیف نشان داد.

سوورفتار از مشکلات قدیمی و مربوط به دوره سالمندی است. اما به علت نداشتن تعریف مشخص و کمبود آگاهی، پنهان مانده است و کمتر گزارش می‌گردد. یکی از دلایل تفاوت آماری بین مطالعه حاضر با دیگر مطالعات می‌تواند ناشی از دقت در اجرای تحقیقات، استفاده از ابزارهای متفاوت، مشکلات مرتبط با جمع‌آوری اطلاعات و نبود تعریف واضح و روشن از مفهوم سوурفتار دانست.

پژوهش حاضر نشان داد که سوурفتار مالی و روان‌شناختی، بیشترین نوع سوурفتار با سالمندان بود که این یافته با نتایج مطالعه «کریمی» و همکاران [۱۳۸۷] و «زنندی» [۱۳۸۶] همسو بود [۴۶]. نتایج مطالعه منوچهری و همکاران [۱۳۸۷]، نشان داد بیشتر سالمندان، سوурفتار از نوع عاطفی و غفلت و کمترین آنها تجربه سوурفتار از نوع جسمی را داشتند [۱۸]. برخی مطالعات نیز بیشترین نوع سوурفتار در سالمندان را، سوурفتار روان‌شناختی گزارش کردند [۳۵] و [۲۰]. فراوانی بالای سوурفتار مالی را می‌توان به معضلات اقتصادی و رشد نرخ تورم در سال‌های اخیر و به دنبال آن، افزایش فشارهای اقتصادی بسیار شدید روی فرزندان نسبت داد که موجب بروز سوурفتار مالی می‌شود. از دلایل بالابودن سوурفتار روان‌شناختی نیز می‌توان به واپستگی و دل‌بستگی‌های افراد بهویژه بین والدین و فرزندان نسبت داد. نوع روابط والد و فرزندی در جامعه ماسیب ایجاد تعاملات گسترده و گاهی انتظارات بیش از حد والدین از فرزندان یا فرزندان از والدین می‌شود.

از سوی دیگر، مطالعه حاضر نشان داد طردشده و سوурفتار جسمی کمترین فراوانی را داشت که با نتایج برخی مطالعات همسو است [۳۶ و ۳۷]. در توضیح این یافته می‌توان بیان کرد که چون انواع دیگر سوурفتار، غیرجسمی و معمولاً قابل مشاهده نیست، ممکن است با توجه به کمبود آگاهی‌های مردم به عنوان سوурفتار قلمداد نشود و باعث ارتکاب بیشتر سوурفتار شود.

مطالعه حاضر نشان داد میزان سوурفتار و انواع آن با افسردگی در سالمندان ارتباط دارد. اگرچه ارتباط معنادار بین انواع سوурفتار با ایجاد افسردگی در سالمندان شهرکاشان وجود داشت، اما میزان تأثیر پیش‌بینی ایجاد افسردگی توسط سوурفتار از قابلیت پایینی برخوردار بود. با وجود اینکه این برداشت وجود داشت که سوурفتار در ایجاد افسردگی قابلیت تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد، اما نتایج مطالعه‌این تأثیر را ضعیف نشان داد.

نتایج رگرسیون نشان داد، بیشترین درجات افسردگی در افرادی وجود داشت که سوурفتار به شکل طردشده داشتند. کمترین میزان افسردگی در سوурفتار به شکل سلب اختیار مشاهده شد و ۷۹/۲ درصد از سالمندانی که سوурفتار را در یک سال گذشته تجربه کرده بودند از افسردگی رنج می‌بردند. دونگ [۲۰۰۸] و ۲۰۰۹ طی مطالعاتی نشان داد گروهی از سالمندان که سوурفتار را گزارش کرده بودند، نسبت به کسانی که سوурفتار را تجربه نکرده بودند، افسردگی بیشتری داشتند [۳۸ و ۳۹] که این یافته با مطالعه

7. Eisikovits

8. Margot

- [12] Acierno R, Hernandez MA, Amstadter AB, Resnick HS, Steve K, Muzzy W, et al. Prevalence and correlates of emotional, physical, sexual, and financial abuse and potential neglect in the United States: The National Elder Mistreatment Study. *American Journal of Public Health*. 2010; 100(2):292-7.
- [13] National Center on Elder Abuse. The national elder abuse incidence study: Final report. Washington, D.C: National Center on Elder Abuse; 1998.
- [14] Dong X, Simon MA. Association between elder abuse and use of ED: findings from the Chicago Health and Aging Project. *American Journal of Emergency Medicine*. 2013; 31(4):693-8.
- [15] Cooper C, Selwood A, Livingston G. The prevalence of elder abuse and neglect: A systematic review. *Age and Ageing*. 2008; 37(2):151-60.
- [16] Karimi M, Elahi N. [Elderly abuse in Ahwaz city and its relationship with individual and social characteristics (Persian)]. *Iranian Journal of Ageing*. 2008; 3(7):42-7.
- [17] Amirsadri A, Soleimani H. [Elderly phenomena and its outcomes in Iran (Persian)]. *Journal of Hygian and Health*. 2005; 1(2):19-35.
- [18] Manouchehri H, Ghorbi B, Hosseini Meymanat NON, Karabakhsh M. Degree and types of domestic abuse in the elderly referring to Parks of Tehran. *Faculty of Nursing of Midwifery Quarterly*. 2009; 18(63):39-45.
- [19] Heravi-Karimooi M. [Elder abuse rates family in members of Senior Social Clubs in Tehran City (Persian)]. *Iranian Journal of Ageing*. 2012; 6(4):37-50.
- [20] Dong XO, Simon MA, Beck T, Farran C, McCann J, Mendes de Leon C, et al. Elder abuse and mortality: The role of psychological and social wellbeing. *Gerontology*. 2010; 57(6):549-58.
- [21] Wu L, Chen H, Hu Y, Xiang H, Yu X, Zhang T, et al. Prevalence and associated factors of elder mistreatment in a rural community in People's Republic of China: A cross-sectional study. *PloS One*. 2012; 7(3):e33857.
- [22] Wang JJ. Psychological abuse and its characteristic correlates among elderly Taiwanese. *Archives of Gerontology and Geriatrics*. 2006; 42(3):307-18.
- [23] Mouton CP, Talamantes M, Parker RW, Espino DV, Miles TP. Abuse and neglect in older men. *Clinical Gerontologist*. 2002; 24(3-4):15-26.
- [24] Dong X, Simon MA, Evans D. Cross-sectional study of the characteristics of reported elder self-neglect in a community-dwelling population: findings from a population-based cohort. *Gerontology*. 2009; 56(3):325-34.
- [25] Fulmer T, Paveza G, VandeWeerd C, Fairchild S, Guadagno L, Bolton-Blatt M, et al. Dyadic vulnerability and risk profiling for elder neglect. *Gerontologist*. 2005; 45(4):525-34.
- [26] Cooper C, Blanchard M, Selwood A, Walker Z, Livingston G. Family carers' distress and abusive behaviour: Longitudinal study. *British Journal of Psychiatry*. 2010; 196(6):480-5.
- [27] Gharanjik A, Mohammadi Shahbelaghi F, Ansari GH, Najafi F, Ghaderi SH, Ashrafi K, et al. [Prevalence of Depression in Iranian Turkmen Older Adults-1389 (Persian)]. *Iranian Journal of Aging*. 2011; 6(21):34-39.

سوعرفتار و عاقب ناشی از آن شود، شناسایی و پیشگیری گردد.

### تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری و سالمندی زهرا خلیلی است و کلیه هزینه های مالی این مطالعه که به صورت طرح تحقیقاتی به شماره ۹۲۱۸۰ بود، توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان تأمین شده است. از کلیه سالمندان که با شکیباپی خود، ما را در انجام این تحقیق یاری کردند و از خانم دکتر هروی برای در اختیار گذاشتن پرسشنامه، قدردانی می کنیم و از خداوند منان سلامتی روزافزون آنها را خواهانیم.

### منابع

- [1] Fakari FR, Hashemi MA, Fakari FR. A Qualitative Research: Postmenopausal Women's Experiences of Abuse. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2013; 82:57-60.
- [2] Oh J, Kim HS, Martins D, Kim H. A study of elder abuse in Korea. *International Journal of Nursing studies*. 2006; 43(2):203-14.
- [3] WHO Centre for Health Development. Kobe J. Global Health Expectancy Research Among Older People. 2001; 1(2001):10.
- [4] Statistical Center of Iran. Implementation of the 2011 Iranian Population and Housing Census; 2011. Available from: [http://www.who.int/kobe\\_centre/ageing/en/-2011](http://www.who.int/kobe_centre/ageing/en/-2011).
- [5] Adib-Hajbaghery M, Aghahoseini S. The evaluation of disability and its related factors among the elderly population in Kashan, Iran. *BMC Public Health*. 2007; 7(1):261.
- [6] Rezai S, Manoochehri M. [Comparison of mental disorders between home owner residents and nurse homes elders (Persian)]. *Iranian Journal of Ageing*. 2008; 3(7):16-25.
- [7] Pérez-Rojo G, Izal M, Montorio I, Penhale B. Risk factors of elder abuse in a community dwelling Spanish sample. *Archives of Gerontology and Geriatrics*. 2009; 49(1):17-21.
- [8] Beach SR, Schulz R, Castle NG, Rosen J. Financial exploitation and psychological mistreatment among older adults: Differences between African Americans and Non-African Americans in a population-based survey. *Gerontologist*. 2010; 50(6):744-57.
- [9] Dong X, Simon MA, Evans DA. Prevalence of Self-Neglect across Gender, Race, and Socioeconomic Status: Findings from the Chicago Health and Aging Project. *Gerontology*. 2011; 58(3):258-68.
- [10] Heravi-Karimooi M, Anoosheh M, Froughan M, Sheikhi MT, Hajizadeh E. [Elder abuse by family members: An exploration in the lived experiences of older people (Persian)]. *Iranian Journal of Nursing Research*. 2010; 5(18):6-17.
- [11] Lachs MS, Pillemer K. Elder abuse. *Lancet*. 2004; 364(9441):1263-72.

- [45] Schofield MJ, Mishra GD. Three year health outcomes among older women at risk of elder abuse: Women's Health Australia. Quality of Life Research. 2004; 13(6):1043-52.
- [28] Park J, Roh S. Daily spiritual experiences, social support, and depression among elderly Korean immigrants. Aging & Mental Health. 2013; 17(1):102-8.
- [29] Heravi-Karimooi M, Anoosheh M, Foroughan M, Sheykhi MT, Hajizadeh E. [Designing and determining psychometric properties of the Domestic Elder Abuse Questionnaire (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2010; 5(1):7-21.
- [30] Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Zandi T. Reliability, validity and factor structure of the GDS-15 in Iranian elderly. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2006; 21(6):588-93.
- [31] Levine JM. Elder neglect and abuse. Geriatrics. 2003; 58(10):37-43.
- [32] Anme T, McCall M, Tatara T. An exploratory study of abuse among frail elders using services in a small village in Japan. Journal of Elder Abuse & Neglect. 2006; 17(2):1-20.
- [33] Puchkov P. Elder abuse: Current research in the Russian Federation (2004-2006). Journal of Adult Protection. 2006; 8(4):4-12.
- [34] Zandi F, Fadaei F, editors. [Victimization of elderly (Persian)]. Proceeding of the 2nd congress of Analysis of Geriatrics Issues in Iran. Tehran: Andisheh Kohan; 2008, pp.571-587.
- [35] Pérez-Cárceles M, Rubio L, Pereniguez J, Pérez-Flores D, Osuna E, Luna A. Suspicion of elder abuse in South Eastern Spain: The extent and risk factors. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2009; 49(1):132-7.
- [36] Dong XO, Simon MA, Gorbien M. Elder abuse and neglect in an urban Chinese population. Journal of Elder Abuse & Neglect. 2007; 19(3-4):79-96.
- [37] Yan EC, Tang CS. Elder abuse by caregivers: A study of prevalence and risk factors in Hong Kong Chinese families. Journal of Family Violence. 2004; 19(5):269-77.
- [38] Dong X, Simon M, de Leon CM, Fulmer T, Beck T, Hebert L, et al. Elder self-neglect and abuse and mortality risk in a community-dwelling population. Journal of the American Medical Association. 2009; 302(5):517-26.
- [39] Dong X, Simon MA. A descriptive study of sex differences in psychosocial factors and elder mistreatment in a Chinese community population. International Journal of Gerontology. 2008; 2(4):206-14.
- [40] Harris T, Cook DG, Victor C, DeWilde S, Beighton C. Onset and persistence of depression in older people-results from a 2-year community follow-up study. Age and Ageing. 2006; 35(1):25-32.
- [41] Han J, Richardson VE. The relationship between depression and loneliness among homebound older persons: Does spirituality moderate this relationship? Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought. 2010; 29(3):218-36.
- [42] Dong X, Simon MA, Odwazny R, Gorbien M. Depression and elder abuse and neglect among a community-dwelling Chinese elderly population. Journal of Elder Abuse & Neglect. 2008; 20(1):25-41.
- [43] Winterstein T, Eisikovits Z. The experience of loneliness of battered old women. Journal of Women & Aging. 2005; 17(4):3-19.
- [44] Dong X, Simon MA, Gorbien M, Percak J, Golden R. Loneliness in older Chinese adults: A risk factor for elder mistreatment. Journal of the American Geriatrics Society. 2007; 55(11):1831-5.