

Research Paper**Effect of Eight-Weeks Aerobic Training on Serum Levels of Nitric Oxide and Endothelin-1 in Overweight Elderly Men**Reza Mohammadi¹, *Mehrdad Fathei², Keyvan Hejazi³

1. Department of Sport Sciences, Faculty of Human Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

2. Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3. Department of Sport Sciences, Faculty of Sport Sciences, Toos Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.



Citation: Mohammadi R, Fathei M, Hejazi K. [Effect of Eight-Weeks Aerobic Training on Serum Levels of Nitric Oxide and Endothelin-1 in Overweight Elderly Men (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2018; 13(1):74-85. <https://doi.org/10.21859/sija.13.1.74>

doi: <https://doi.org/10.21859/sija.13.1.74>

Received: 05 Oct. 2017

Accepted: 30 Jan. 2018

ABSTRACT

Objectives Different physical activities can play an important role in improving health and cardiovascular fitness. The aim of this study was to compare the effect of high-intensity interval aerobic training on certain cardiovascular risk factors in overweight elderly men.

Methods & Materials In this semi-experimental study, 24 overweight elderly men were selected by convenience sampling. They were then randomly assigned into two groups based on their body mass index (BMI). The age range in the experimental group was 73.50±3.34 years (n=12) and that in control group was 71.33±3.44 years (n=12). The experimental group underwent high-intensity interval aerobic training that included 3 sessions (each of 45-60 minutes) a week for eight weeks. The control group was given no intervention. Blood samples of all the subjects were measured at baseline and at the end of the study. All tests were two-tailed, and P<0.05 was considered significant. Data analysis was performed using SPSS software (version 16.0, SPSS). For comparison of means within and between the groups, paired and independent t-tests were used, respectively.

Results The weight, BMI, and body fat percentage were found to have significantly decreased in overweight men after high-intensity interval aerobic training (P<0.05). Moreover, the levels of serum endothelin-1 reduced significantly after eight weeks of aerobic training. However, the levels of nitric oxide increased significantly at the end of the training period.

Conclusion This result suggests that eight weeks of high-intensity interval aerobic training led to decreased endothelin-1 serum and increased nitric oxide levels. This is effective in improving cardiovascular health and reducing the risk of atherosclerosis. Therefore, it is suggested that high-intensity interval aerobic training be used to prevent the adverse effects of an increased incidence of atherosclerosis.

Key words:

High-intensity interval aerobic training, Overweight elderly men, Endothelin-1

Extended Abstract**1. Objective**

Cardiovascular diseases are an important factor in mortality and impose a significant financial burden on the health system [1]. These diseases main-

ly originate from inflammation; therefore, vascular stimulation and their injuries, as a result of consuming some substances, can directly increase the sensitivity of vascular endothelial cells such as endothelin-1 and nitric oxide [2]. In this field, secondary prevention measures including changes in lifestyle and performing various physical activities can improve health and cardiovascular fitness of the people. The purpose of

*** Corresponding Author:****Mehrdad Fathei, PhD****Address:** Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.**Tel:** +98 (511) 8833910**E-mail:** mfathei@um.ac.ir

this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training on the levels of certain cardiovascular risk factors in overweight elderly men.

2. Methods and Materials

In this quasi-experimental study, 24 overweight elderly men were selected by available and targeted methods and randomly divided into two groups of experimental (12 subjects) and control (12 subjects). The age range of patients was 73.5 ± 3.34 years in the aerobic training group and 71.33 ± 3.44 years in the control group. The body mass index (BMI) of the selected participants was 25 to 30 kg/m². In this study, the experimental group performed aerobic exercises while the control group continued their inactive way of life. The aerobic exercise program included three sessions of 45-60 minutes per week for eight weeks. The intensity of sessions was gradually increased to 90 to 95 percent of the stored maximum heart rate. The blood samples were collected 48 hours before starting the exercises and 48 hours after the last training session in order to measure endothelin-1 and serum nitric oxide. To determine endothelin-1 levels, the ELISA method and Kazabuyu Kit, made in Japan, were used. Also, the levels of serum nitric oxide were measured using the Zebra Kit, made in Germany. Impedance bioelectric device was used to estimate body composition. Using SPSS software¹⁶, the intra-group and inter-group means were compared by the statistical methods of dependent t-student and covariance analysis (MANOVA). The re-

sults were tested at the significance level of $P < 0.05$. The present paper is based on the master thesis of Mr. Reza Mohammadi registered under code 44485214 at the meeting of the Department of Sports Sciences of Azad University of Bojnord.

3. Result

The results of this study showed that eight weeks of periodic aerobic exercise resulted in a significant reduction in body weight variables from 78.16 ± 4.80 to 77.67 ± 4.50 ($P=0.03$), BMI from 28.43 ± 2.05 kg/m² to 28.26 ± 2.13 kg/m² ($P=0.02$), the percentage of body fat from $44.71 \pm 2.38\%$ to $43.16 \pm 2.63\%$ ($P=0.006$), and Endothelin-1 serum from 4.17 ± 0.68 to 3.86 ± 0.71 ($P=0.001$) in the group of aerobic periodic exercises. The serum nitric oxide increased from 3.34 ± 0.29 to 3.76 ± 0.41 ($P=0.001$). There was a significant difference between intra-group and inter-group means in both the groups with respect to variables such as body weight ($P=0.02$), BMI ($P=0.01$), body fat percentage ($P=0.01$), Endothelin-1 ($P=0.003$), and nitric oxide ($P=0.001$) (Table 1).

4. Conclusion

These results indicate that eight weeks of periodic aerobic exercises are effective in improving cardiovascular health and reducing the risk of atherosclerosis by increasing nitric oxide and endothelin-1 reduction. Performing physical activity is one of the most effec-

Table 1. Comparison of intra-group and intergroup variance changes of Endothelin-1, nitric oxide, and the body composition of overweight elderly men

Variables	Groups	Pre-Test (Mean±SD)	Post-Test (Mean±SD)	P	
				Within Group	* Between Group
Body weight (Kg)	Experimental	78.16±4.80	77.67±4.50	† 0.03	† 0.027
	Control	78.72±4.42	78.88±4.73	0.40	
BMI (Kg/m ²)	Experimental	28.43±2.05	28.26±2.13	† 0.02	0.008
	Control	28.14±1.77	28.20±1.92	0.36	
Body fat (%)	Experimental	44.71±2.38	43.16±2.63	† 0.006	† 0.002
	Control	44.83±4.84	44.80±5.39	0.95	
Endothelin-1 (Picogram/mm)	Experimental	4.17±0.68	3.86±0.71	† 0.001	† 0.001
	Control	4.71±0.65	4.80±0.54	0.19	
Nitric oxide (mmol/l)	Experimental	3.34±0.29	3.76±0.41	† 0.001	† 0.002
	Control	3.53±0.35	3.40±0.33	0.21	

† Significant, * Significance at $P < 0.05$ level, ** t-correlated test, *** Covariance analysis test

tive factors in changing the process of functioning of the cardiovascular system. It is dependent on the severity, duration, type of exercise and physical fitness, type of nutrition, mental and psychological states, and hormonal factors. Based on the results obtained, it can be said that aerobic periodic exercises can improve the performance of the elderly's cardiovascular system. Therefore, it can be suggested that the elderly should enjoy the benefits of physical activity and exercises to strengthen the cardiovascular system by performing varied periodic aerobic exercises with less fatigue.

Acknowledgments

This research was extracted from the MSc. thesis of the first author in the Department of Sport Sciences, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University of Bojnourd, Iran.

Conflict of Interest

The authors declared no conflicts of interest.

Archive of SID

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی نیتریک اکساید و اندوتلین-۱ مردان سالمند با اضافه وزن

رضا محمدی^۱، مهرداد فتحی^۲، کیوان حجازی^۳

- ۱- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.
 ۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 ۳- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: ۱۳ مهر ۱۳۹۶

تاریخ پذیرش: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

اهداف: فعالیت‌های بدنی مختلف می‌تواند در بهبود سلامتی و ارتقای سطح آمادگی قلبی-عروقی افراد نقش مهم و ارزنده‌ای داشته باشد. هدف از این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی مردان سالمند با اضافه وزن بود. **مواد و روش‌ها:** در این مطالعه نیمه‌تجربی، ۲۴ مرد سالمند با اضافه وزن بر اساس نمایه توده بدن در دو گروه تجربی (۱۲ نفر) و کنترل (۱۲ نفر) با دامنه سنی در گروه تمرین تناوبی هوازی $۷۳/۵۰ \pm ۳/۳۴$ و گروه کنترل $۷۱/۳۳ \pm ۲/۴۴$ به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به مدت هشت هفته، سه روز در هر هفته و هر جلسه ۴۵ تا ۶۰ دقیقه به انجام تمرینات تناوبی هوازی پرداختند. نمونه خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی جمع‌آوری شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۶، مقایسه میانگین‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی از روش آماری به ترتیب تی همبسته و تحلیل کوواریانس (MANOVA) محاسبه شد و نتایج در سطح معنی‌داری $P < ۰/۰۵$ تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: هشت هفته تمرین تناوبی هوازی به کاهش معنی‌دار متغیرهای وزن، نمایه توده بدن و درصد چربی بدن منجر شد ($P < ۰/۰۵$). همچنین سطوح اندوتلین-۱ سرمی در پایان دوره کاهش معنی‌دار یافت ($P = ۰/۰۰۵$). سطح نیتریک اکساید نیز در پایان دوره افزایش معنی‌دار یافت ($P < ۰/۰۵$).

نتیجه‌گیری: این نتایج حاکی از آن است که هشت هفته تمرین تناوبی هوازی از طریق افزایش نیتریک اکساید و کاهش اندوتلین-۱ می‌تواند در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش خطر بیماری آترواسکلروز مؤثر باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از تمرینات تناوبی هوازی برای پیشگیری از آثار سوء ناشی از افزایش بروز بیماری آترواسکلروزیس استفاده شود.

کلیدواژه‌ها:

تمرین تناوبی هوازی، مردان سالمند با اضافه وزن، اندوتلین-۱

مقدمه

و عصبی عضلانی می‌شود. از آنجا که با افزایش سن، تحرک بدنی کاهش می‌یابد، این روند به طور عمده با تغییرات اساسی در ترکیب بدن همراه است [۳]. با افزایش سن، قلب با سفت شدن عضله قلب به علت افزایش اندازه سلول‌های عضلانی بطن‌ها همراه با کاهش تعداد این سلول‌ها مواجه می‌شود. همچنین، ماتریکس بین سلولی و کلاژن زیاد می‌شود و ماهیچه قلب دچار فیبروز می‌شود [۴].

منشأ اغلب بیماری‌های قلبی-عروقی التهاب است؛ از این رو، تحریکات عروقی و آسیب‌های آن در نتیجه مصرف برخی مواد به طور مستقیم و در پاره‌ای موارد نظیر افزایش فشار برشی به طور غیرمستقیم سبب افزایش حساسیت مولکول‌های آندوتلیال عروق نظیر اندوتلین-۱ و نیتریک اکساید می‌شود [۵]. اندوتلین-۱ نوعی

بیماری‌های قلبی-عروقی مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در جهان است. بروز این بیماری بر اثر رسوب تدریجی کلسترول (یکی از انواع چربی‌های خون) و دیگر چربی‌ها و مواد در دیواره داخلی سرخرگ‌های (شریان) بدن است و باعث ایجاد پلاک‌هایی در جدار این عروق می‌شود که به تنگ، سفت و سخت شدن دیواره رگ‌ها منجر خواهد شد [۱]. اگرچه بسیاری از عوامل خطر ساز بیماری‌های قلبی-عروقی شناخته شده است، تخمین زده می‌شود که ۱۷ میلیون انسان در سال ۱۹۹۵ به دلیل این بیماری فوت کرده‌اند که بیشتر آن‌ها را افراد مسن تشکیل می‌دادند [۲].

سالمندی موجب تغییر در عملکرد متابولیکی، قلبی-عروقی

* نویسنده مسئول:

دکتر مهرداد فتحی

نشانی: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی.

تلفن: ۰۵۱۱) ۸۸۳۳۹۱۰

پست الکترونیکی: mfathei@um.ac.ir

این حال، سالمندی فرایندی زیست‌شناختی است که با تغییرات و مشکلاتی در بدن انسان از جمله بیماری‌های قلبی-عروقی و در رأس آن‌ها پرفشاری خون و مشکلات عروق کرونری همراه است که ممکن است زندگی فرد را محدود کند. در این میان بیشتر متخصصان بهداشتی و علوم تندرستی درباره روش فعالیت بدنی و رژیم غذایی به عنوان اصولی‌ترین و علمی‌ترین روش کاهش علائم بیماری‌های قلبی-عروقی اتفاق نظر دارند [۱۳]. آن‌ها شرکت کردن در فعالیت‌های بدنی منظم برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها، از جمله بیماری‌های قلبی-عروقی قبل از شروع دارودرمانی، مشاوره تمرینی و تغذیه‌ای را پیشنهاد می‌کنند.

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، مطالعات اندکی اثر تمرینات تناوبی هوازی بر سطح این شاخص‌ها را بررسی کرده‌اند. بنابراین هدف محقق از این تحقیق، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی مردان سالمند با اضافه وزن بود.

روش مطالعه

آزمودنی‌ها

مطالعه حاضر از نوع نیمه‌تجربی باکنترل و از لحاظ هدف کاربردی است که با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل ۲۴ مرد سالمند ساکن شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۵ با دامنه سنی ۶۸ تا ۷۹ سال و با معیار اضافه وزن بود. شرکت‌کنندگان باید نمایه توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم بر مترمربع می‌داشتند. همچنین به روش نمونه‌گیری انتخابی در دسترس و هدف‌دار انتخاب شدند. نخست افراد با ماهیت و نحوه همکاری با اجرای پژوهش آشنا شدند. از بین مراجعه‌کنندگان ۱۰۰ نفر داوطلب پرسش‌نامه تندرستی و بدنی را کامل کردند و پس از تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه، ۲۴ نفر حائز شرایط برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای رعایت ملاحظات اخلاقی، ضمن آشنایی آزمودنی‌ها با تمام مراحل اجرای پژوهش از قبیل برنامه‌های تمرینی و ارزیابی‌های آزمایشگاهی، قبل از تکمیل فرم رضایت‌نامه به آن‌ها توضیح داده شد که اطلاعات دریافتی به صورت محرمانه خواهد بود. همچنین آن‌ها می‌توانستند در صورت تمایل در هر مرحله‌ای از مطالعه خارج شوند.

سالم‌بودن بر اساس پرسش‌نامه تندرستی، مصرف نکردن دارو، عدم استعمال دخانیات و شرکت نکردن در هیچ برنامه تمرینی حداقل به مدت دو ماه پیش از شرکت در برنامه تمرینات از معیارهای ورود به این تحقیق بود. همچنین از جمله معیارهای خروج آزمودنی‌ها از پژوهش حاضر شامل ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت، اختلالات نورولوژیک، فشار خون و حضورنداشتن در برنامه تمرینی مدنظر در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی بود. آزمودنی‌ها بر اساس شرایط تحقیق

پیتید منقبض‌کننده قوی عروق است که سلول‌های اندوتلیال آن را تولید می‌کنند و تأثیر انقباضی قوی در سلول‌های اندوتلیال عروق انسان دارد [۶]. تاکنون دو نوع گیرنده اندوتلین انسانی، نوع A و نوع B، شناخته شده‌اند. گیرنده‌های اندوتلین A بیشتر در قلب و عضلات صاف عروق وجود دارند. همچنین این نوع گیرنده واسطه اصلی انقباض عروق با اندوتلین است، در صورتی که اندوتلین نوع B که توزیع بیشتری دارد، عمدتاً در کلیه، سیستم عصبی مرکزی و سلول‌های اندوتلیال عروق یافت می‌شود و موجب تولید نیتریک اکسید می‌شود [۷]. همچنین از جمله مواد مترشحه از اندوتلیوم عروق اکسید نیتریک است که در حفظ سلامت دیواره عروق و تنظیم عملکرد تنگ‌کنندگی و گشادکنندگی عروق تأثیر زیادی دارد. اکسید نیتریک وزنی معادل ۳۰ کیلودالتون دارد و آنزیم نیتریک اکسید سنتاز از آل-آرژنین، آن را تولید می‌کند [۸].

این بیماری در اثر عوامل خطر قابل تعدیل در سنین کمتر ایجاد می‌شود، به طوری که فقدان فعالیت بدنی خطر رویداد بیماری‌های قلبی-عروقی را حداقل تا دو برابر افزایش می‌دهد. این در حالی است که بی‌حرکی مشکلی جهانی برای سلامت جامعه است. زندگی بی‌تحرك علت عمده مرگ‌ومیر، بیماری و ناتوانی است؛ هر ساله حدود دو میلیون مرگ به علت فقدان فعالیت جسمانی اتفاق می‌افتد [۹]. در این زمینه، جارت و همکاران که تأثیر ۲۴ جلسه تمرین هوازی، هر جلسه ۳۰ تا ۴۰ دقیقه برای مدت هشت هفته با شدت معادل صددرصد MLSS به صورت فزاینده پارامترهای استرس اکسیداتیو زنان یائسه را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که وزن بدن، فشار خون سیستولی و دیاستولی کاهش معنی‌دار یافت. همچنین افزایش ۳۷/۷ درصدی در نیتریک اکساید و ۳۰/۸ درصدی در غلظت cGMP دیده شد. تغییر معنی‌داری در سطوح کورتیزول، لپتین، ADMA اینترلوکین ۱ بتا دیده نشد. تغییری در سطوح مالون دی‌آلدئید (MDA)^۱ و کاتالاز نیز در پایان دوره دیده نشد اما افزایش معنی‌داری را در سوپراکسیداتیو دیس موتاز مشاهده کردند [۱۰].

کراسو و همکاران با بررسی ۱۶ هفته تمرینات هوازی با شدت‌های متفاوت کم، ۳۰-۴۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و متوسط ۵۵ تا ۶۵ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی برای مدت ۳۰ دقیقه در هر جلسه و ۳ جلسه در هفته، روی ۲۵ مرد با دامنه سنی ۵۲ سال و چاق، به این نتیجه رسیدند که تمرین به عدم تغییر معنی‌داری در ترکیب بدن و آمادگی جسمانی شرکت‌کنندگان منجر شد، اما اجرای تمرینات با شدت متوسط به افزایش نیتریک اکسید در مردان منجر شد [۱۱].

مداخله فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم‌های غذایی، مشاوره‌های بهداشتی و دارو درمانی از جمله راه‌هایی است که تا به حال برای پیشگیری و درمان بیماری قلبی-عروقی مطرح شده‌اند [۱۲]. با

1. Malondialdehyde

وضعیت نشست و در حالت استراحت در ۴۸ ساعت پیش از شروع تمرینات و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین را جمع‌آوری کرد. در هر دو نوبت پیش و پس از تمرین، پنج سی‌سی خون از ورید آنتیکوبیتال بازویی گرفته شد و نمونه‌ها در دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد فریز شدند. برای تعیین میزان اندوتلین-۱ از روش الایزا و کیت کازابایو ساخت شرکت ژاپن استفاده شد. همچنین سطوح نیتریک اکساید (NO) سرم نیز با استفاده از کیت زلابیو ساخت کشور آلمان سنجیده شد.

برنامه تمرینی

در این تحقیق فعالیت ورزشی شامل تمرینات تناوبی هوازی به مدت هشت هفته و در هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بود. برنامه تمرین تناوبی شدید شامل گرم کردن با انواع حرکات کششی و نرمشی به مدت ۱۰ دقیقه و سپس اجرای حرکات تناوبی شدید با دو دقیقه استراحت فعال میان هر ست بود. برنامه تمرینی از ساده به مشکل و با در نظر گرفتن اصل اضافه بار و با افزایش شدت تمرین اجرا شد.

الگوی تمرین تناوبی شدید به این صورت بود: در هفته اول، سه وهله اجرای چهار دقیقه با شدت ۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال؛ هفته دوم، چهار وهله اجرای چهار دقیقه با شدت ۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال؛ هفته سوم، پنج وهله اجرای چهار دقیقه با شدت ۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال؛ هفته چهارم، شش وهله اجرای چهار دقیقه با شدت ۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال؛ هفته پنجم، هفت وهله اجرای چهار دقیقه با شدت ۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال؛ هفته ششم، هشت وهله اجرای چهار دقیقه با شدت ۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال؛ هفته هفتم، شش وهله اجرای چهار دقیقه با شدت ۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال و هفته هشتم، پنج وهله اجرای چهار دقیقه با شدت ۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال انجام شد. شدت تمرین با ضربان سنج (پلار ساخت کشور فنلاند) کنترل شد [۱۶]. گروه کنترل هیچ فعالیتی در طول دوره تحقیق نداشتند و غیرفعال بودند (شیوه زندگی غیرفعال داشتند).

در پایان مرحله اجرایی پژوهش، داده‌های جمع‌آوری شده با کمک نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ تجزیه و تحلیل شدند. پس از تأیید عادی بودن توزیع نظری داده‌ها با استفاده از آزمون آماری شاپیرو-ویلک^۴ و همگنی واریانس‌ها توسط آزمون لوین، برای مقایسه میانگین‌های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از آزمون آماری تی استیوودنت وابسته و تحلیل کوواریانس (MANOVA) استفاده شد. معیار تصمیم‌گیری، معنی‌داری با سطح ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت و فرم رضایت‌نامه را امضا کردند. در این پژوهش سطح فعالیت جسمانی افراد با استفاده از پرسش‌نامه ارزیابی فعالیت جسمانی کیزر^۲ مشخص شد [۱۴]. این پرسش‌نامه عادات و الگوهای فعالیت جسمانی را ارزیابی کرد و شامل چهار بخش فعالیت‌های مربوط به امور خانه و مراقبت از خانواده، فعالیت‌های شغلی، عادات زندگی فعال و مشارکت در ورزش است. آینس ورث^۳ و همکاران در سال ۱۹۹۹ این ابزار اندازه‌گیری را برای زنان گروه سنی ۶۵-۲۰ سال تأیید کردند و اعتبار درونی آن، $\alpha = 0.83$ و همکاران در سال ۱۹۹۹ این پرسش‌نامه، زنانی که در کارهای عادی و روزمره زندگی خود فعالیت جسمانی کمی داشتند و ورزشکار نبودند؛ یعنی ۳-۵ سال سابقه ورزشی منظم نداشتند و در دو ماه اخیر بیش از یک جلسه در هفته ورزش نکرده بودند، وارد پژوهش شدند [۱۴]. سپس آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی هوازی (۱۲ نفر) و گروه کنترل (۱۲ نفر) تقسیم شدند. در این مطالعه برای تعیین حجم نمونه از معادله برآورد حجم نمونه فلیس [۱۵] استفاده شد:

$$n = \frac{2\sigma^2(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2}{d^2} = \frac{2(2.5)^2(2+1.28)^2}{3.5^2} \cdot 10.97 \approx 11$$

در این معادله؛ توان آزمون ۰/۸ و آلفای معادل ۰/۰۵ و تغییرات میانگین پنج واحد در نظر گرفته شد. براساس برآورد صورت گرفته، حجم نمونه، ۱۰/۹۷ نفر به دست آمد که با احتیاط بیشتر از میان مردان سالمند داوطلب، ۱۲ مرد سالمند تحت عنوان گروه مداخله انتخاب شدند.

ترکیب بدن

در این تحقیق برای ارزیابی ترکیبات بدن به ترتیب طول قد آزمودنی‌ها با قدسنج سکا (ساخت کشور آلمان) با حساسیت پنج میلی‌متر، محیط باسن و کمر با متر نواری (مایبس-ژاپن) با دقت پنج میلی‌متر، وزن با حساسیت صد گرم و درصد چربی بدن با دستگاه بیوالکتریکال ایمپدانس (مدل In body-۷۲۰ کره جنوبی) اندازه‌گیری شد. از تقسیم وزن بدن بر مجذور قد به متر، نمایه توده بدن بر حسب کیلوگرم بر مترمربع به دست آمد. تمامی اندازه‌گیری‌ها در حالی انجام شد که آزمودنی‌ها از چهار ساعت قبل از آزمون از خوردن و آشامیدن خودداری کرده بودند و تا حد ممکن مثانه، معده و روده آن‌ها تخلیه شده بود.

نمونه خونی

یکی از کارشناسان مجرب علوم آزمایشگاهی در دو وهله نمونه‌های خونی از سیاهرگ دست چپ هر یک از آزمودنی در

2. Kaiser Physical Activity Survey
3. Ains worth

4. Shapiro-Wilk Test

یافته‌ها

با یافته‌های ایروینگ و همکاران همخوانی دارد [۱۷]. به عبارتی تمرینات بدنی منظم به خصوص تمرینات تناوبی هوازی می‌تواند ترکیبات بدنی افراد را کاهش و کارایی سیستم قلبی عروقی آن‌ها را افزایش دهد. نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق حاضر دلالت بر نقش تمرینات منتخب با شدت مناسب بر کنترل وزن و ترکیب بدنی آزمودنی‌ها دارد. البته نوع، شدت و مدت فعالیت بدنی منتخب متغیرهای مهمی هستند که می‌توانند در نوع اثرگذاری فعالیت بدنی بر روی شاخص‌ها دخالت کنند. در این خصوص برای اختلاف بین نتایج تحقیقات و این پژوهش می‌توان دلایل مختلفی ذکر کرد. دلیل مهم آن می‌تواند نوع فعالیت بدنی باشد. از جمله سازگاری‌های فیزیولوژیکی به چنین موضوعی، درک مکانیسم‌هایی است که با آن‌ها انرژی لازم برای عملکرد عضلات به خدمت گرفته می‌شود.

از آنجا که با توجه به توصیه‌های محققان، حجم و زمان به نحوی در نظر گرفته شده بود که برنامه فعالیت به صورت هوازی صورت گیرد، انتظار می‌رود که در حین فعالیت مذکور اسیدهای چرب به عنوان سوخت اصلی با عضله استفاده شود و باعث کم‌شدن چربی بدن شود. بنابراین با توجه به ماهیت تحقیق که هوازی است، اصلی‌ترین عامل در کاهش آن محسوب می‌شود، ولی دخالت متغیرهای گوناگون مانند تغذیه، فعالیت روزانه آزمودنی‌ها و وضعیت ارائه آن‌ها قبل از شروع تحقیق، می‌تواند از دلایل دیگر تفاوت نتایج باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، کاهش وزن با استفاده از تمرینات هوازی بهبود می‌یابد، اما درباره اینکه شدت یا مدت تمرین محرک مهمی برای کاهش چربی بدن

مشخصات آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. بر اساس نتایج این جدول، تفاوت معنی‌داری بین شاخص‌های قد، وزن، نمایه توده بدن، اندوتلین-۱ و نیتریک اکساید در دو گروه کنترل و تجربی وجود نداشت.

بر اساس یافته‌های جدول شماره ۲، نتایج t وابسته نشان داد مقادیر وزن بدن از ۷۸/۱۶ به ۷۷/۶۷ ($P=0/03$)، نمایه توده بدن از ۲۸/۴۳ به ۲۸/۲۶ ($P=0/02$)، درصد چربی بدن از ۴۴/۷۱ به ۴۳/۱۶ ($P=0/006$)، اندوتلین-۱ از ۴/۱۷ به ۳/۸۶ ($P=0/001$) و نیتریک اکساید از ۳/۳۴ به ۳/۷۶ ($P=0/001$) در گروه تمرین تناوبی هوازی به لحاظ آماری معنی‌دار بود. همچنین بر اساس نتایج این جدول، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تغییرات میانگین‌های بین‌گروهی در متغیر وزن بدن ($P=0/02$)، نمایه توده بدن ($P=0/01$)، درصد چربی بدن ($P=0/01$)، اندوتلین-۱ ($P=0/003$) و نیتریک اکساید ($P=0/001$) به لحاظ آماری معنی‌دار بود.

بحث

هدف از مطالعه حاضر مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی مردان با اضافه وزن بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر، برنامه تمرینات تناوبی هوازی به کاهش معنی‌دار وزن بدن، نمایه توده بدن و درصد چربی بدن در گروه تجربی منجر شد. این نتایج

جدول ۱. میانگین، انحراف معیار و همچنین نتایج آزمون T مستقل برای بررسی فرض همگن بودن واریانس‌ها در شروع دوره تمرین

اندازه‌های تن‌سنجی	گروه‌ها	میانگین \pm انحراف معیار	F	P
قد (سانتی‌متر)	تمرین تناوبی هوازی	۱۶۵/۹۲ \pm ۴/۹۰	۰	۰
	کنترل	۱۶۷/۳۳ \pm ۴/۳۱		
وزن (کیلوگرم)	تمرین تناوبی هوازی	۷۸/۱۶ \pm ۴/۸۰	۰/۴۱	۰/۵۲
	کنترل	۷۸/۷۲ \pm ۴/۴۲		
نمایه توده بدن (کیلوگرم/مترمربع)	تمرین تناوبی هوازی	۲۸/۴۳ \pm ۲/۰۵	۰/۸۴	۰/۳۶
	کنترل	۲۸/۱۴ \pm ۱/۷۷		
اندوتلین-۱ (پیکوگرم در میلی لیتر)	تمرین تناوبی هوازی	۴/۱۷ \pm ۰/۶۸	۰/۱۱	۰/۹۰
	کنترل	۴/۱۷ \pm ۰/۶۵		
نیتریک اکساید (میکرومول بر لیتر)	تمرین تناوبی هوازی	۳/۳۴ \pm ۰/۲۹	۰/۵۰	۰/۴۸
	کنترل	۳/۵۳ \pm ۰/۳۵		

جدول ۲. مقایسه تغییرات واریانس درون گروهی و بین گروهی آندوتلین-۱، نیتریک اکساید و ترکیب بدن مردان سالمند دارای اضافه وزن

متغیرها	گروه‌ها	پیش آزمون (میانگین و انحراف استاندارد)	پس آزمون (میانگین و انحراف استاندارد)	تغییرات	
				درون گروه**	بین گروه***
				P	P
وزن بدن (کیلوگرم)	تجربی	۷۸/۱۶±۴/۸۰	۷۷/۶۷±۴/۵۰	۰/۰۳۴	۰/۰۲۷†
	کنترل	۷۸/۷۲±۴/۴۲	۷۸/۸۸±۴/۷۳	۰/۴۰	
نمایه توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)	تجربی	۲۸/۴۳±۲/۰۵	۲۸/۲۶±۲/۱۳	۰/۰۲۴	۰/۰۰۸†
	کنترل	۲۸/۱۴±۱/۷۷	۲۸/۲۰±۱/۹۲	۰/۳۶	
درصد چربی بدن (درصد)	تجربی	۴۴/۷۱±۲/۳۸	۴۳/۱۶±۲/۶۳	۰/۰۰۶†	۰/۰۲†
	کنترل	۴۴/۸۳±۴/۸۴	۴۴/۸۰±۵/۳۹	۰/۹۵	
آندوتلین-۱ (پیکوگرم در میلی لیتر)	تجربی	۴/۱۷±۰/۶۸	۳/۸۶±۰/۷۱	۰/۴۰۰۱	۰/۰۰۱†
	کنترل	۴/۷۱±۰/۶۵	۴/۸۰±۰/۵۴	۰/۱۹	
نیتریک اکساید (میکرومول بر لیتر)	تجربی	۳/۳۴±۰/۲۹	۳/۷۶±۰/۴۱	۰/۰۰۱†	۰/۰۰۲†
	کنترل	۳/۵۳±۰/۳۵	۳/۴۰±۰/۳۳	۰/۲۱	

† معنی دار بودن * معنی داری در سطح $P < 0.05$

آزمون تی همبسته، *آزمونی تحلیل کوواریانس

سالمند

است، همچنان بحث وجود دارد [۱۸].

با بررسی برنامه‌های تمرینی در مطالعات کاهش وزن، مشخص شد در شدت‌های تمرینی یکسان، حجم تمرینی بیشتر به کاهش بیشتر وزن بدن منجر می‌شود [۱۹، ۲۰]. گزارش شده است تمرین شدید باعث کاهش اشتها و افزایش میزان متابولیک استراحتی می‌شود و در نهایت افزایش تعادل منفی انرژی را به همراه دارد [۲۰]. بنابراین، با کنترل حجم تمرین می‌توان اثر شدت تمرین را که بعد دیگر تمرین است، بررسی کرد. اما تمرین با شدت کم در مقایسه با شدت زیاد، موجب کاهش چربی بدنی بیشتری می‌شود. نشان داده شده است فعالیت لیپولیتیکی در ذخایر چربی مختلف (زیرپوستی یا داخل شکمی) ناهمگن است. بافت چربی درون شکمی از نظر فعالیت لیپولیتیکی فعال‌ترین ذخیره بافت چربی است [۲۱].

با وجود سرعت زیاد فعالیت لیپولیتیکی چربی داخل شکمی، بعید است که در فراهم کردن اسیدهای چرب برای اکسایش عضله در طول تمرین سهم مهمی داشته باشد. بنابراین اغلب اسیدهای چربی که وارد گردش خون می‌شوند از بافت چربی زیرپوستی استخراج می‌شوند. مقادیر اسیدهای چرب آزاد شده از بافت چربی بالاتنه بیش از پایین تنه است [۲۲]. همچنین، فعالیت لیپولیتیکی در قسمت‌های مختلف چربی زیرپوستی بدن ناهمگن است. در طول تمرین استقامتی با شدت متوسط حدود نیمی از اسیدهای چرب مورد نیاز را بافت چربی زیرپوستی تأمین می‌کند که سهم چربی زیرپوستی بالاتنه بیش از پایین تنه است [۲۳].

یافته‌های تحقیق نشان داد هشت هفته تمرینات تناوبی هوازی به کاهش معنی دار سطوح آندوتلین-۱ سرمی آزمودنی‌ها در پایان دوره منجر شد. نتایج پژوهش حاضر با یافته‌های قهرمانی مقدم و همکاران و مائد و همکاران همخوانی دارد [۲۴، ۲۵]. اما با نتایج ماراتلی^۵ و همکاران مبنی بر کاهش یافتن سطوح آندوتلین-۱ سرمی همخوانی ندارد [۲۶]. قهرمانی مقدم و همکاران با بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی آندوتلین-۱ و مالون دی آلدئید زنان بیش از ۶۰ سال غیرفعال به این نتیجه رسیدند که آندوتلین-۱ سرمی گروه مداخله پس از هشت هفته تمرین هوازی کاهش معنی دار یافت [۲۴]. مائد و همکاران با بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح لیپیدهای پلاسمایی و آندوتلین-۱ در ۱۶ مرد میان سال، به این نتیجه رسیدند که سطح آندوتلین-۱ در پایان دوره تمرینی کاهش معنی دار یافت [۲۵].

ماراتلی و همکاران در مطالعه‌ای که برای بررسی مقایسه سطح آندوتلین-۱ پلازما در گروه بیماران با پوکی استخوان و افراد سالم انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که تفاوت‌های معنی داری در سطوح آندوتلین-۱ پلازما بین گروه‌های ورزش و کنترل وجود ندارد [۲۶]. از دلایل تناقض یافته‌ها می‌تواند متفاوت بودن برنامه‌های تمرینی، نوع آزمودنی‌ها و به ویژه مدت زمان تمرین‌ها باشد. همچنین به نظر می‌رسد تنظیم هورمون‌های تروپیک بدن بر اثر فعالیت بدنی یا تغییرات در وزن بدن و کل توده چربی و نیز افزایش قدرت و توان عضلات اسکلتی اطراف عروق خونی، همگی باعث کاهش نیاز بدن به عملکرد سلول‌های آندوتلیال عروق

5. Muratli

قطر و هایپر تروفی عروق می شود. شیراسترس از طریق فعال سازی کانال های یونی به ویژه کانال های پتاسیمی موجب تولید افزایش یافته اکسید نیتریک می شود [۳۱]. این تغییرات موجب فعال سازی گیرنده های تیروزین کینازی فاکتورهای رشدی به ویژه VEG-2 و FR-2 و فسفریله شدن گیرنده Tie-2 می شود. نیتریک اکساید از آمینواسید ال-آرژنین توسط انواع مختلف سلولی سنتز می شود. منبع اصلی تولید اکسید نیتریک در سلول های اندوتلیال عروقی Enos است که طی تمرین ورزشی و شیراسترس فعال می شود [۳۲]. شیراسترس با تأثیر بر حسگرهای مکانیکی (پروتئین G کانال های یونی و اینتگرین) که در غشای سلول های اندوتلیال قرار دارند، از طریق چهار مسیر انتقال پیام مکانیکی یعنی مسیرهای ERK، Ras، Raf، c-Src، MEK، پروتئین شوک گرمایی (HSP-90) و مسیر فاکتور قابل القای هایپوکسی یک (HIF-1) با افزایش VEGF موجب فعال سازی eNOS و نهایتاً تولید NO می شود [۳۳]. از جمله محرک های فیزیولوژیک احتمالی برای تولید اکسید نیتریک افزایش جریان خون در مجرای رگ شناخته شده است که در اثر حاد آن موجب افزایش اکسید نیتریک سنتاز و تعدیل اتساع عروق برای متعادل سازی فشار است.

این یافته ها این احتمال را تقویت می کند که به دلیل اینکه تمرین منظم به طور مکرر سبب افزایش فشار نبض و پرضربانی می شود، در نتیجه می تواند در دسترس بودن زیستی اکسید نیتریک را افزایش دهد [۸]. علاوه بر این، مطالعات متعددی بر تعامل بین HSP-90 و آنزیم اکسید نیتریک سنتاز اندوتلیالی متمرکز شده اند. HSP-90 که به عنوان محافظ داخل سلولی عمل می کند، در بیشتر سلول ها از جمله سلول های اندوتلیال وجود دارند و در پاسخ به محرک های مختلفی از جمله استرس ها و ضربه های مکانیکی و تولید رادیکال های آزاد و آسیب اکسایشی آزاد می شوند و تمرین ورزشی نیز عامل تحریکی فیزیولوژیکی برای HSP است. [۳۴]. در این راستا، HSP-90 موجب افزایش آنزیم اکسید نیتریک سنتاز اندوتلیالی در سلول های اندوتلیال در پاسخ به تحریک ایجاد شده در اثر تمرین می شود و در نتیجه تمرینات ورزشی در بهبود عملکرد اندوتلیال عروقی تأثیر دارند [۳۵].

با توجه به اینکه این مطالعه با محدودیت هایی همچون رژیم غذایی متنوع، پاسخ های سازگاری گوناگون به فعالیت بدنی، تعداد کم آزمودنی ها به دلیل انصراف بعضی از آنها از شرکت در تحقیق حاضر و تفاوت های فردی روبه رو بود، در نتیجه جانب احتیاط را بیشتر باید رعایت کرد.

نتیجه گیری نهایی

به طور کلی می توان گفت که هشت هفته تمرین تناوبی هوازی از طریق افزایش نیتریک اکساید و کاهش اندوتلین-۱ در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش خطر بیماری آتروسکلروز مؤثر

می شود که در نتیجه مواد مترشحه از این سلول ها کاهش می یابد [۲۷]. با توجه به اینکه کاهش یافتن غلظت اندوتلین-۱ در خون، احتمالاً به کاهش سطوح فشار خون، بیماری های قلبی و خطر تصلب شرایین منجر می شود و همچنین مانع از ایسکمی کلیه می شود و از آنجایی که در تولید اندوتلین-۱ عوامل مختلفی همچون فاکتورهای عصبی خونی مانند آنژیوتانسین ۲، آرژنین و وازوپروسین نقش دارند، بنابراین عوامل نامبرده خود ممکن است تحت تأثیر تمرین هوازی کاهش یابند [۲۸]. از این رو، آنژیوتانسین ۲ با اثر مستقیم یا با تحریک تولید و آزادسازی نوراپی نفرین (از ناحیه پیش سیناپسی از انتهای اعصاب آدرنرژیک) و با تولید اندوتلین ۱ در اندوتلیوم عروق، موجب انقباض شدید رگ ها می شود. بر اساس مطالعات صورت گرفته با انجام دادن فعالیت های هوازی منظم، آنژیوتانسین ۲ کاهش معنی دار یافت که این عامل می تواند بر تولید اندوتلین ۱ در اندوتلیوم عروق تأثیر گذار باشد [۲۸].

نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات تناوبی هوازی به افزایش معنی داری نیتریک اکساید مردان با اضافه وزن منجر شد. این نتایج با یافته های کراسو و همکاران همخوانی دارد [۱۱]. اما با یافته های رادووانیک^۶ و همکاران مبنی بر افزایش یافتن نیتریک اکساید همخوانی ندارد [۲۹]. کراسو^۷ و همکاران ۱۶ هفته تمرینات هوازی با شدت های متفاوت کم ۳۰-۴۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و متوسط ۵۵ تا ۶۵ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی برای مدت ۳۰ دقیقه در هر جلسه و ۳ جلسه در هر هفته، روی ۲۵ مرد با دامنه سنی ۵۲ سال و چاق انجام دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که تمرین به عدم تغییر معنی داری در ترکیب بدن و آمادگی جسمانی شرکت کنندگان منجر شد، اما اجرای تمرینات با شدت متوسط باعث به بهبود نیتریک اکساید در مردان شد [۱۱].

رادووانیک و همکاران با بررسی اثر چهار هفته تمرینات دوره ای قبل از مسابقات جودو در ۱۰ جودوکار زن با دامنه سنی ۲۰ سال با سابقه ورزشی ۱۱ سال به این نتیجه رسیدند که تغییر معنی داری در پارامترهای استرس اکسیداتیو همچون مالون دی آلدئید، نیتریک اکساید کاتالاز و کربونیل در پایان دوره نشد [۲۹]. اندوتلیوم عروق عضلانی و تارهای عضلانی طی انقباض و در پاسخ به جریان خون بالا یا به عبارتی افزایش نیروهای همودینامیکی (شیر استرس) به طور موضعی اکسید نیتریک را ترشح می کنند. شیر استرس بطور عمده سبب آرتریوژنز و آنژیوژنز تقسیم دوتایی می شود [۳۰]. به نظر می رسد که افزایش حاد و فوری شیر استرس بیشتر موجب ترشح اتساع کننده های عروق به ویژه NO می شود و از این طریق عروق متسع می شوند. اما افزایش مزمن شیراسترس سبب تغییر ساختاری، به ویژه افزایش

6. Radovanovic

7. Krause

است. از این رو می‌توان پیشنهاد کرد سالمنده با انجام تمرینات تناوبی هوازی متنوع با خستگی کمتر، از فواید فعالیت بدنی و ورزش برای تقویت دستگاه قلب و عروق بهره‌مند شود.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا محمدی است که در جلسه گروه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد بجنورد تحت کد ۴۴۴۸۵۲۱۴ ثبت شده است. مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری دادند، اعلام می‌کنیم. این مقاله با حمایت مالی دانشگاه آزاد بجنورد انجام شده است و تضاد منافی وجود ندارد.

Archive of SID

References

- [1] Kim DY, Jung SY. Effect of aerobic exercise on risk factors of cardiovascular disease and the apolipoprotein B/apolipoprotein a-1 ratio in obese woman. *Journal of Physical Therapy Science*. 2014; 26(11):1825-9. doi: 10.1589/jpts.26.1825
- [2] Puska P, Norrving B, Mendis S. *Global atlas on cardiovascular disease prevention and control*. Geneva: World Health Organization; 2011.
- [3] Mir E, Attarzadeh Hosseini SR, Hejazi K, Mir Sayeedi M. [Effect of eight weeks of endurance and resistance training on serum adiponectin and Insulin resistance index of inactive elderly men (Persian)]. *Journal of Gorgan University of Medical Sciences*. 2016; 18(1):69-77.
- [4] Olivetti G, Giordano G, Corradi D, Melissari M, Lagrasta C, Gamberi SR, et al. Gender differences and aging: Effects on the human heart. *Journal of the American College of Cardiology*. 1995; 26(4):1068-79. doi: 10.1016/0735-1097(95)00282-8
- [5] Miyauchi T, Masaki T. Pathophysiology of endothelin in the cardiovascular system. 1999; 61(1):391-415. doi: 10.1146/annurev.physiol.61.1.391
- [6] Guang-da X, Yun-lin W. Regular aerobic exercise training improves endothelium-dependent arterial dilation in patients with impaired fasting glucose. *Diabetes Care*. 2004; 27(3):801-2. doi: 10.2337/1337.3.801
- [7] Zhang W, Li XJ, Zeng X, Shen DY, Liu CQ, Zhang H-J, et al. Activation of nuclear factor- κ B pathway is responsible for tumor necrosis factor- α -induced up-regulation of endothelin B2 receptor expression in vascular smooth muscle cells in vitro. *Toxicology Letters*. 2012; 209(2):107-12. doi: 10.1016/j.toxlet.2011.12.005
- [8] Green DJ, Maiorana A, O'Driscoll G, Taylor R. Effect of exercise training on endothelium-derived nitric oxide function in humans. *The Journal of Physiology*. 2004; 561(1):1-25. doi: 10.1113/jphysiol.2004.068197
- [9] Franke WD, Anderson DF. Relationship between physical activity and risk factors for cardiovascular disease among law enforcement officers. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*. 1994; 36(10):1127-32. doi: 10.1097/00043764-199410000-00016
- [10] Jarrete AP, Novais IP, Nunes HA, Puga GM, Delbin MA, Zaneco A. Influence of aerobic exercise training on cardiovascular and endocrine-inflammatory biomarkers in hypertensive postmenopausal women. *Journal of Clinical & Translational Endocrinology*. 2014; 1(3):108-14. doi: 10.1016/j.jcte.2014.07.004
- [11] Krause M, Rodrigues-Krause J, O'Hagan C, Medlow P, Davison G, Susta D, et al. The effects of aerobic exercise training at two different intensities in obesity and type 2 diabetes: implications for oxidative stress, low-grade inflammation and nitric oxide production. *European Journal of Applied Physiology*. 2013; 114(2):251-60. doi: 10.1007/s00421-013-2769-6
- [12] Buttar HS, Li T, Ravi N. Prevention of cardiovascular diseases: Role of exercise, dietary interventions, obesity and smoking cessation. *Experimental & Clinical Cardiology*. 2005; 10(4):229-49. PMID: PMC2716237
- [13] Kromhout D. Prevention of coronary heart disease by diet and lifestyle: evidence from prospective cross-cultural, cohort, and intervention studies. *Circulation*. 2002; 105(7):893-8. doi: 10.1161/hc0702.103728
- [14] Sternfeld B, Ainsworth BE, Quesenberry CP. Physical activity patterns in a diverse population of women. *Preventive Medicine*. 1999; 28(3):313-23. doi: 10.1006/pmed.1998.0470
- [15] Bartlett JE, Kotrlík JW, Higgins CC. Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research appropriate sample size in survey research. *Information Technology, Learning, and Performance Journal*. 2001; 19(1):43-50.
- [16] American College of Sports Medicine. *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription*. Philadelphia, Pennsylvania: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
- [17] Irving BA, Davis CK, Brock DW, Weltman JY, Swift D, Barrett EJ, et al. Effect of exercise training intensity on abdominal visceral fat and body composition. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2008; 40(11):1863-72. doi: 10.1249/mss.0b013e3181801d40
- [18] Donnelly J, Smith B, Jacobsen D, Kirk E, Dubose K, Hyder M, et al. The role of exercise for weight loss and maintenance. *Best Practice & Research Clinical Gastroenterology*. 2004; 18(6):1009-29. doi: 10.1016/s1521-6918(04)00083-6
- [19] Slentz CA, Duscha BD, Johnson JL, Ketchum K, Aiken LB, Samsa GP, et al. Effects of the amount of exercise on body weight, body composition, and measures of central obesity. *Archives of Internal Medicine*. 2004; 164(1):31. doi: 10.1001/archinte.164.1.31
- [20] Marra CC, Bottaro MM, Oliveira RJ, Novaes JS. Effect of moderate and high intensity aerobic exercise on body composition in overweight men. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2003; 35(Supplement 1):S308. doi: 10.1097/00005768-200305001-01705
- [21] De Glisezinski I, Moro C, Pillard F, Marion-Latard F, Harant I, Meste M, et al. Aerobic training improves exercise-induced lipolysis in SCAT and lipid utilization in overweight men. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*. 2003; 285(5):E984-E990. doi: 10.1152/ajpendo.00152.2003
- [22] Martins C, Morgan LM, Bloom SR, Robertson MD. Effects of exercise on gut peptides, energy intake and appetite. *Journal of Endocrinology*. 2007; 193(2):251-8. doi: 10.1677/joe-06-0030
- [23] Horowitz JF. Fatty acid mobilization from adipose tissue during exercise. *Trends in Endocrinology & Metabolism*. 2003; 14(8):386-92. doi: 10.1016/s1043-2760(03)00143-7
- [24] Ghahremani Moghaddam M, Hejazi K. [Effect of aerobic training on Endothelin-1 and Malondialdehyde in inactive elderly women (Persian)]. *Journal of Gorgan University of Medical Sciences*. 2016; 18(3):52-57.
- [25] Maeda S, Tanabe T, Miyauchi T, Otsuki T, Sugawara J, Iemitsu M, et al. Aerobic exercise training reduces plasma endothelin-1 concentration in older women. *Journal of Applied Physiology*. 2003; 95(1):336-41. doi: 10.1152/jappphysiol.01016.2002
- [26] Muratli HH, Çelebi L, Hapa O, Biçimoğlu A. Comparison of plasma endothelin levels between osteoporotic, osteopenic and normal subjects. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2005; 6(1):49. doi: 10.1186/1471-2474-6-49
- [27] Donato A, Lesniewski L, Delp M. The effects of aging and exercise training on endothelin-1 vasoconstrictor responses in rat skeletal muscle arterioles. *Cardiovascular Research*. 2005; 66(2):393-401. doi: 10.1016/j.cardiores.2004.10.023
- [28] Suen RS, Rampersad SN, Stewart DJ, Courtman DW. Differential roles of endothelin-1 in angiotensin II-induced atherosclerosis and aortic aneurysms in apolipoprotein E-null mice. *The American*

- can Journal of Pathology. 2011; 179(3):1549-59. doi: 10.1016/j.ajpath.2011.05.014
- [29] Radovanovic D, Stankovic N, Ponorac N, Nurkic M, Bratic M. Oxidative stress in young judokas: effects of four week pre-competition training period. *Archives of Budo*. 2012; 8:147-51. doi: 10.12659/aob.883328
- [30] Egginton S. Unorthodox angiogenesis in skeletal muscle. *Cardiovascular Research*. 2001; 49(3):634-46. doi: 10.1016/s0008-6363(00)00282-0
- [31] Cunningham KS, Gotlieb AI. The role of shear stress in the pathogenesis of atherosclerosis. *Laboratory Investigation*. 2004; 85(1):9-23. doi: 10.1038/labinvest.3700215
- [32] Higashi Y, Yoshizumi M. Exercise and endothelial function: Role of endothelium-derived nitric oxide and oxidative stress in healthy subjects and hypertensive patients. *Pharmacology & Therapeutics*. 2004; 102(1):87-96. doi: 10.1016/j.pharmthera.2004.02.003
- [33] Harrison Dg, Widder J, Grumbach I, Chen W, Weber M, Searles C. Endothelial mechanotransduction, nitric oxide and vascular inflammation. *Journal of Internal Medicine*. 2006; 259(4):351-63. doi: 10.1111/j.1365-2796.2006.01621.x
- [34] Irani K. Oxidant signaling in vascular cell growth, death, and survival: A review of the roles of reactive oxygen species in smooth muscle and endothelial cell mitogenic and apoptotic signaling. *Circulation Research*. 2000; 87(3):179-83. doi: 10.1161/01.res.87.3.179
- [35] Xu Q. Role of heat shock proteins in atherosclerosis. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*. 2002; 22(10):1547-59. doi: 10.1161/01.atv.0000029720.59649.50