

Research Paper**The Effect of Yoga Practice Based on Biorhythms Theory on Balance and Selective Attention of the Elderly Women*****Morteza Taheri¹, Khadijeh Irandoost¹, Ali Seghatoleslami², Mina Rezaei¹**

1. Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Ghazvin, Iran.
2. Department of Sport Sciences, Faculty of Physical Education, University of Birjand, Birjand, Iran.



Citation: Taheri M, Irandoost Kh, Seghatoleslami A, Rezaei M. [The Effect of Yoga Practice Based on Biorhythms Theory on Balance and Selective Attention of the Elderly Women (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2018; 13(3):312-323. <https://doi.org/10.32598/SIJA.13.3.312>

doi*: <https://doi.org/10.32598/SIJA.13.3.312>

Funding: See Page 321

Copyright: The Author(s)

Received: 3 Mar 2018

Accepted: 16 Jul 2018

Keywords:

Yoga, Balance,
Selective attention,
Biorhythm

ABSTRACT

Objectives This study aimed to investigate the effect of yoga based on biorhythm theory on the balance and selective attention in the older women.

Methods & Materials A total of 35 older women with mean (SD) age of 61.1(2.8) year were randomly assigned into three groups: yoga based on biorhythm (n=13); yoga (n=13); control (n=11). Static and dynamic balance tests and Vienna system test were applied to measure the study variables. COG test was used to measure the selective attention. One-way ANOVA test was used to analyze data followed by post-hoc Tukey test.

Results The results suggested that both motor and cognitive performance, including balance and selective attention were improved significantly ($P \leq 0.05$).

Conclusion Given the physical and mental weakness of elderly women, practicing yoga exercises are highly recommended in the elderly.

Extended Abstract**1. Objectives**

Degradation in the physiological, physical and psychological capacities created by the environmental conditions affect the elderly lifestyle resulting in disruption of their daily functioning [1, 2]. On the other hand, a decrease in physical fitness can disrupt the elderly's motor function and performance and lead to loss of coordination, balance, muscle strength and flexibility, all of which contribute to reducing sensory motor function, instability and increased risk of collapse [3, 4]. Attention to motor and cognitive function of the elderly, as well as their physical condi-

tion [5], and considering their specific biological conditions, are the major issues that have always been addressed in the elderly. This research aimed to study the effect of yoga practice based on biorhythms theory on the balance and selective attention of the elderly women.

2. Methods and Materials

A total of 35 elderly women with a mean (SD) age of 61.1(2.8) year voluntarily participated in this quasi-experimental study. They were randomly divided into 3 groups: biorhythm yoga (n=13); yoga (n=13); and control (n=13). Inclusion criteria were as follows: older than 60 years, no sleep disturbances (controlled by Pittsburgh sleep quality index), no organized regular activity in the past six months,

*** Corresponding Author:**

Morteza Taheri, PhD

Address: Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Ghazvin, Iran.

Tel: +98 (912) 4070721

E-mail: m.taheri@soc.ikiu.ac.ir

Table 1. One-way ANOVA test results about selective attention variables

Items	Biorhythm		Yoga Group (n=13)		Control Group (n=13)		df	Sum of Square	F	Sig.
	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest				
Sum of hits	21.7±1.39	25.19±0.70	2.77±1.34	2.33±1.36	22.30±1.75	22.32±1.24	2	42.62	22.34	0.001***
Sum of correct rejections	31.70±1.08	33.56±0.7	31.68±1.33	33.33±0.65	31.66±1.30	31.43±1.07	2	17.57	8.64	0.002***
Mean time hits (s)	1.85±0.041	1.62±0.03	1.88±0.05	11.65±0.11	1.86±0.05	1.86±0.04	2	0.21	50.15	0.001***

*** P≤0.001

acquiring functional independence conditions based on self-declaration (the ability to perform routine tasks, 45-minute walking and light exercises), no cognitive disorders such as Alzheimer (self-reported), no depression (controlled by Beck depression inventory), having isocratic diet program (controlled by N4 software), and body mass index (BMI) between 25-30.

Cognitron (COG) test within Vienna Test System (VTS) was used to measure selective attention. This test includes the mean time hits, sum hits, and sum correct rejection. The stork test was used to measure static balance, and Timed Up and Go (TUG) test for measuring dynamic balance [4]. Yoga exercises were performed for 8 weeks, 3 sessions per week including Asana, Pranayama and meditation exercises [6].

The first group (biorhythm yoga) exercises were designed based on the biorhythm chart of each individual. To do so, first, based on the date of birth and its entry into the biorhythm software, the physical, emotional, cognitive, and perceptual status of the subjects was extracted, and then the program was designed accordingly. In this group, the 16 days when the quadruple status of the subjects was above 50%, were selected as training days. The t test, 1-way ANOVA and Tukey post hoc test were used at the significant level of 0.05 for data analysis.

3. Result

Based on KS test resulting in normally distributed data, the parametric test was used. The results of 1-way ANOVA (**Table 1**) showed a significant difference in the selective attention variables among three groups ($P\leq 0.05$). The mean time hits (**Figure 1**) indicated that the biorhythm yoga and yoga groups had a significant improvement after the intervention compared to the control group ($P=0.001$ and $P=0.005$, re-

spectively), and there was no significant difference between these groups ($P=0.44$)

One-way ANOVA test results showed a significant difference between the static and dynamic balances in subjects after intervention ($P\leq 0.005$). According to Tukey post hoc test results about static balance, the biorhythm yoga and yoga groups had a significant improvement after the intervention compared to the control group ($P=0.023$ and $P=0.032$, respectively) and there was no significant difference between these groups ($P=0.65$). The results of t test showed that both static and dynamic balances improved significantly in both experimental groups ($P\leq 0.05$), while there was no significant difference in the control group.

Tukey post hoc test results about dynamic balance also revealed that the biorhythm yoga and yoga groups had a significant improvement after the intervention compared to the control group ($P=0.001$ and $P=0.002$, respectively) and there was no significant difference between these groups ($P=0.43$).




Figure 1. Comparison of mean time hits among three groups before and after intervention

4. Conclusion

Research in the field of executive functions (motor/cognitive factors) in the elderly is limited. Since balancing and improving cognitive performance are very important in old age, evaluation of balancing performance as well as executive performance of the elderly following effective exercise protocols are strongly recommended. Balance and selective attention have the potential to improve with exercises like yoga, which is very important in motor control. Improvement of selective attention and balance can help elderly people in two categories of cognitive and motor abilities, and result in their well-being. However, there is a need for further research on the effectiveness of biorhythms, since it is affected by psycho-biological functions, too.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This study was conducted after obtaining the permission of the Ethics Committee of Imam Khomeini International University (Ethics Code: 17628).

Funding

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflict of interest

The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgements

Hereby, we appreciate all the people who participated in this research specially Ms. Zahra Dadmehr and Maryam Irandoost who helped us with collecting data.

تأثیر تمرین یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر تعادل و توجه انتخابی زنان سالمند

*مرتضی طاهری^۱، خدیجه ایران‌دوست^۱، علی ثقة‌الاسلامی^۲، مینا رضایی^۱

۱- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

۲- گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

تاریخ پذیرش: ۲۵ تیر ۱۳۹۷

هدف هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرین یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر عملکرد تعادلی و توجه انتخابی سالمندان بود.
مواد و روش‌ها در این تحقیق نیمه‌تجربی، ۳۵ زن سالمند با میانگین سنی 61 ± 2 به طور تصادفی در ۳ گروه تمرینات یوگا مبتنی بر بهینگی بیوریتم زیستی ($n=13$)، تمرینات یوگا ($n=11$)، و کنترل ($n=11$) قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی تعادل پویا و توانایی حفظ تعادل از آزمون زمان برخاستن و رفتن، برای سنجش تعادل ایستا از آزمون لکلک، و برای سنجش توجه انتخابی از مجموعه آزمون‌های توجه سیستم وینا استفاده شد. اطلاعات مربوط به توجه انتخابی در آزمون‌ها با استفاده از آزمون ارزیابی توجه و تمرکز کوتاه‌مدت در نرم‌افزار وینا در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها نتایج تحقیق نشان داد تعادل ایستا و پویای سالمندان به طور معنی‌داری پس از مداخله تحقیقی بهبود یافت. از طرف دیگر، شاخص‌های مرتبط با توجه انتخابی مشتمل بر متوسط زمان عکس‌عمل و همین‌طور پاسخ مناسب به محرك‌های اعمال شده تغییر مثبت معنی‌داری داشت ($P \leq 0.05$)، اما برنامه‌ریزی تمرینی به اقتضای بیوریتم تأثیری بر عملکردهای مذکور نداشت.

نتیجه‌گیری با توجه به اینکه سالمندان به دلیل ضعف جسمانی و همین‌طور شناختی درگذر زمان زوال جسمانی شناختی را تجربه می‌کنند و با عنایت به محدودیت‌های جسمانی، توانایی اجرای برنامه‌های تمرینی مختلف را ندارند، اجرای تمرینات یوگا برای تقویت هر دو بخش تأکید می‌شود.

کلیدواژه‌ها:

یوگا، تعادل، توجه
انتخابی، بیوریتم زیستی

مقدمه

در علوم شناختی پرداختن به ذهن و اثرات آن بر فیزیولوژی و مسائل روانی یکی از موضوعاتی است که همواره مدنظر محققان بوده است. بیوریتم یکی از تازه‌ترین موضوعات در حیطه شناسایی ارگونومی ذهن است که بر اساس سه چرخه جسمانی، شناختی، و عاطفی می‌تواند در تنظیمات جسمانی و روانی انسان مؤثر باشد. بر اساس این نظریه، زندگی هر فرد تحت تأثیر سه چرخه زیستی ریتمیک به نام‌های سیکل حسی، سیکل فکری، و سیکل جسمی است. این چرخه‌های سه‌گانه در بدن هر فرد بر اساس ساعت درونی و بیولوژیکی عمل می‌کنند. هر چرخه بر اساس موج سینوسی با دوره‌های متفاوت در حال گردش است که نقطه شروع همه آن‌ها، روز تولد فرد است.

چرخه جسمی هر ۲۳ روز یکبار، چرخه حسی یا عاطفی هر ۲۸ روز یکبار و چرخه ذهنی هر ۳۳ روز یکبار تکرار می‌شود.

* نویسنده مسئول:

دکتر مرتضی طاهری

نشانی: قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه تربیت بدنی.

تلفن: +۹۸ (۰)۰۷۲۱ ۴۰۷۰۷۲۱

پست الکترونیکی: m.taheri@soc.iiku.ac.ir

تصادفی در ۳ گروه تمرينات یوگا مبتنی بر بهینگی بیوریتم زیستی ($n=13$)، تمرينات یوگا ($n=11$)، و کنترل ($n=11$) قرار گرفتند. در اين پژوهش برای ارزیابی تعادل پویا و توانایی حفظ تعادل از آزمون زمان برخاستن و رفت، برای سنجش تعادل ایستا از آزمون لکلک، و برای سنجش توجه انتخابی از مجموعه آزمون‌های توجه سیستم وینا استفاده شد. اطلاعات مربوط به توجه انتخابی در آزمودنی‌ها با استفاده از آزمون ارزیابی توجه و تمرز کوتاه‌مدت^۲ در نرم‌افزار وینا در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون جمع‌آوری شد.

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: داشتن سن بالای ۶۰ سال، نداشتن اختلال خواب (کنترل شده با پرسشنامه کیفیت خواب پیتبورگ)، نداشتن فعالیت بدنی منظم و سازمان‌یافته در شش ماه گذشته، احرار شرایط استقلال عملکردی بر اساس خوداظهاری (توانایی انجام کارهای روزمره، توانایی ۴۵ دقیقه پیاده‌روی و انجام نرم‌شاهی سبک)، نداشتن اختلالات شناختی اعم از فراموشی (به استناد خوداظهاری)، عدم ابتلا به افسردگی (کنترل شده با پرسشنامه افسردگی بک)، داشتن برنامه غذایی ایزوکالریک (کنترل شده با نرم‌افزار ن)، ساختار توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰٪.

در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون از آزمون ارزیابی توجه و تمرز کوتاه‌مدت از مجموعه آزمون‌های وینا استفاده شد. مجموعه ابزار وینا از یک نرم‌افزار ویره، یک صفحه نمایشگر و یک صفحه کلید شامل دودسته فلزی تشکیل شده است. آزمون ارزیابی توجه و تمرز کوتاه‌مدت یکی از آزمون‌های روانی حرکتی برای بررسی مؤلفه‌های شناختی و ذهنی نظیر سرعت و اکنش، دقت انتخابی، توجه و تمرز است که برآیند کلی آن ظرفیت توجه انتخابی آزمودنی را نشان می‌دهد. این آزمون مبتنی بر مدل نظری رولخ (1991) است.

بر اساس این مدل تمرز از سه جزء انرژی (میزان انرژی صرف‌شده در اجرای یک تکلیف)، اجرا (نقش تمرز در اجرای یک عمل و پردازش و ثبت آن) و دقت^۳ تشکیل شده است. هنگام تمرز این سه مؤلفه باید تنظیم و متعادل شوند. این آزمون در ارزیابی دقیق میزان توجه و تمرز و سطح درک فرد به آزمونگر کمک می‌کند. نتایج آزمون می‌تواند آزمونگر را راهنمایی کند که میزان تمرز فرد در اجرای تکلیفی خاص چقدر است و یا اینکه آزمودنی در کار حرفه‌ای خود توجه کافی را به کار می‌برد و می‌تواند دقت لازم را در انجام تکالیف شناختی تا پایان تکلیف حفظ کند یا خیر. در آزمون ارزیابی توجه و تمرز کوتاه‌مدت چهار تصویر در یک ردیف و یک تصویر در زیر آن ظاهر می‌شود. آزمودنی باید حداقل در بازه زمانی ۱/۸ ثانیه‌ای تصمیم بگیرد که تصویر زیرین با کدام‌یک از تصاویر چهارگانه بالای مطابقت دارد.

2. Cognitron (COG)

3. Precision

حیطه کنترل حرکتی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی است که در دوران میان‌سالی برای بهزیستی هر چه بهتر نمود بیشتری می‌یابد [۶]. برخی تغییرات رفتاری قبل مشاهده در دوران سالمندی همچون اختلال کنترل قامت و تغییرات در الگوهای راه رفت ناشی از افت زمان واکنش و نقصان توجه و تمرز است [۷]. تغییرات زوالی در ظرفیت‌های فیزیولوژیکی، جسمانی و روان‌شناختی که به واسطه شرایط محیطی ایجاد می‌شود، سبک‌زننده سالمندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت عملکرد روزانه سالمند را مختلف می‌کند.

کاهش آمادگی جسمانی می‌تواند عملکرد و قابلیت‌های حرکتی سالمندان را مختلف کند و منجر به از دست دادن هماهنگی، تعادل، قدرت عضلانی و انعطاف‌پذیری شود. همه این عوامل در کاهش عملکرد حسی حرکتی و بی‌ثباتی قامت و افزایش خطر سقوط مؤثرند [۸]. در همین راستا، کارکردهای اجرایی^۱ در سیستم عصبی سالمندان که مشتمل بر فرایندهای پردازشی و عصب‌شناختی است از جمله مواردی هستند که باید با مداخلات محیطی مؤثر همچون فعالیت بدنی، تغذیه، داشتن چرخه مناسب خواب و بیداری و عوامل محیطی دیگر مورد توجه قرار گیرند.


بیوریتم زیستی با تقسیمات چهارگانه (ریتم جسمانی، احساسی، شناختی و ادارکی) می‌تواند کنترل حرکتی را تحت تأثیر قرار دهد [۹] با توجه به گرایش امروزه سالمندان به اجرای تمرينات که به صورت ایستا و بدون حرکت اجرا می‌شوند، ورزش یوگا در این پژوهش بررسی شد. میزان علاوه‌مندی سالمندان به این ورزش در جامعه روبه افزایش است. همچنین به نظر مختصان، اهمیت این فعالیت‌ها برای سالمندان از آنجا پیداست که این گروه به دلیل آنوفی عضلانی و زوال سیستم اسکلتی قادر به انجام تمرينات هوایی و مقاومتی معمول نیستند و در این صورت احتمال آسیب‌دیدگی آن‌ها وجود دارد.

آثار مثبت مداخلات حرکتی و تمرينی همچون برنامه ورزش در آب، تمرينات قدرتی، تمرينات هوایی بر عملکرد روانی حرکتی و شناختی بهخوبی روش شده است [۹، ۸]. این در حالی است که اثربخشی تمرينات ایستا و بدون جایه‌جایی همچون یوگا در این ادبیات تحقیقی کمتر درباره جامعه سالمندی به چشم می‌خورد. بنابراین هدف از اجرای این تحقیق، تأثیر تمرين یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر عملکرد تعادلی و توجه انتخابی زنان سالمند حرکتی بود.

روش مطالعه

در این تحقیق نیمه‌تجربی، ۳۵ زن سالمند با میانگین سن ۶۱/۱±۲/۸ شرکت کردند که در سال ۱۳۹۶ برای ارزیابی سلامت و کنترل وزن به مرکز مشاوره ورزشی هیئت پزشکی ورزشی استان قزوین مراجعه کرده بودند. شرکت‌کنندگان به طور

1. Executive functions



تصویر ۱. نمودار بیوریتم آزمودنی در طول یک بازه زمانی (شکل راست) و در یک روز (شکل چپ)

روی صندلی بدون دسته بلند می‌شود و پس از طی کردن یک مسیر سه‌متري بازمی‌گردد و دوباره روی صندلی می‌نشیند [۱۲]

برنامه تمرینی یوگا توسط مریان رسمی و تحت نظر متخصص فیزیولوژی ورزش اجرا شد. تمرینات یوگا به مدت ۸ هفته و ۳ جلسه در هفته انجام شد که شامل تمرینات آسان (حرکات کششی نرم‌شی به صورتی که در تمام عضلات درگیر، کشش تا حد درد ادامه داشت)، تمرینات پرانایاما (حالت نشسته با پشت صاف و همراه با دم و بازدم عمیق با ریتم خاص و هماهنگ همراه با حبس نفس برای مدت کوتاه برای شروع مرحله بعد)، و تمرینات مراقبه (خوابیدن در خلوت، تنفس با ریتم مناسب، انقباضات ایزومتریک عضلات بزرگ، کشش و رها کردن، و انهادگی و تمرکز به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه) مجموعاً به مدت ۶۰ دقیقه بود [۱۴]

در بازه زمانی دو ماهه مداخلات تمرینی، ابتدا بر اساس تاریخ تولد و ورود آن به نرمافزار بیوریتم، وضعیت جسمانی، احساسی، شناختی، و ادراکی آزمودنی‌های گروه اول (تمرینات یوگا مبتنی بر بیوریتم زیستی) استخراج و طراحی تمرین بر این اساس برنامه‌ریزی شد (تصویر شماره ۱). در این گروه تلاش شد تا ۱۶ روزی را که وضعیت‌های چهارگانه زیستی آزمودنی‌ها بالای ۵۰ درصد بود، به عنوان روزهای تمرین طراحی شود.

طرح تحقیق در جدول شماره ۱ قابل مشاهده است. از آنجاکه

تعداد محرك‌های ارائه شده ۶۰ محرك بود. مؤلفه‌های آزمون شامل تعداد انتخاب‌های صحیح^۴، تعداد انصراف‌های صحیح^۵، و میانگین زمان انتخاب صحیح^۶ در آزمون‌ها بود [۱۰].

از آزمون استورک^۷ برای سنجش تعادل ایستا بر حسب ثانیه و صدم ثانیه استفاده شد. در این آزمون سالمند روی کف پای برتر می‌ایستاد و کف پای دیگر خود را روی کناره داخلی زانوی پای اتکا طوری قرار می‌داد که انگشتان کامل‌آ رو به پایین قرار گیرد و دست‌ها در طرفین روی تاج خاصره قرار گیرد. با علامت آزمون‌گر، آزمودنی پاشنه پای برتر را از روی زمین بلند و تا جایی که می‌توانست تعادل خود را حفظ می‌کرد. در مدت حفظ تعادل، سینه پای اتکا به هیچ وجه نباید از موقعیت اصلی جایه‌جا می‌شد. پایایی این آزمون ۰/۸۹ گزارش شده است [۱۱]. به منظور سنجش تعادل پویا از آزمون زمان برخاستن و رفتن^۸ استفاده شد که پایایی آن ۰/۹۹ گزارش شده است [۱۲]. آزمون به این صورت اجرا می‌شود که شرکت‌کننده بدون استفاده از دست‌هایش از

4. Sum hits

5. Sum correct rejection

6. Mean time hits

7. Stork test

8. Timed Up and Go (TUG)

جدول ۱. طرح تحقیق

ساعت ۹ صبح: پس از خوردن سبحانه ایزوکالریک	برنامه تمرین (۸ هفتة)	تمرینات یوگا	آزمون توجه انتخابی	آزمون تعادل	آزمون توجه انتخابی	آزمون تعادل	آزمون تعادل	آزمون
								پیش آزمون ساعت ۹ صبح: پس از خوردن سبحانه ایزوکالریک
/	/			/		/	/	یوگا (بهینگی بیوریتم)
/	/			/		/	/	یوگا
/	/			/		/	/	کنترل

سالند

سالمند

نشد ($P \leq 0.05$). نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مرحله پیش آزمون نشان داد اختلاف معنی داری بین هیچ کدام از متغیرهای توجه انتخابی وجود نداشت ($P \geq 0.05$). در حالی که در تعداد انتخابهای صحیح، تعداد انصرافهای صحیح، و مدت زمان انتخاب صحیح بهبود عملکرد مشهود بود.

نتایج آزمون تعقیبی توکی در تصویر شماره ۲ دیده می شود. همان طور که مشاهده می شود در متغیر تعداد انتخابهای صحیح محركها در آزمون ارزیابی توجه و تمرکز کوتاه مدت وینا، گروه یوگا مبتنی بر بیوریتم زیستی و گروه یوگا در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی داری را پس از مداخله تمرینی داشته اند (به ترتیب $P = 0.005$, $P = 0.005$, $P = 0.005$). از طرف دیگر اختلاف معنی داری بین دو گروه تجربی مشاهده نشد ($P = 0.44$).

همان طور که در تصویر شماره ۳ دیده می شود، متغیر تعداد انصرافهای صحیح محركها در آزمون ارزیابی توجه و تمرکز کوتاه مدت وینا، گروه یوگا مبتنی بر بیوریتم زیستی و گروه یوگا در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی داری را پس از مداخله تمرینی داشته اند (به ترتیب $P = 0.041$, $P = 0.04$, $P = 0.041$). از طرف دیگر اختلاف معنی داری بین دو گروه تجربی مشاهده نشد ($P = 0.61$).

همان طور که در تصویر شماره ۴ دیده می شود، متغیر مدت

تمامی افراد تحت پوشش کلینیک بودند، برنامه غذایی با توجه به سوخت و ساز و وضعیت ترکیب بدن آنها به منظور کاهش وزن داده می شد. در مرحله پیش آزمون، آزمون های هماهنگی دو دست و شناسایی حرکت از هر دو گروه تجربی و کنترل گرفته شد. سپس در مرحله مداخلات تحقیقی، تمرینات ادراکی حرکتی و هوایی برای گروه تجربی و تمرینات هوایی برای گروه کنترل اجرا شد.

این مطالعه پس از کسب مجوز کمیته اخلاق دانشگاه بین المللی به شماره ۱۷۶۲۸ مورخه ۱۳۹۶/۲/۱۶ و گرفتن رضایت نامه از آزمودنی ها انجام شد. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری $P \leq 0.05$ به منظور تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

داده های به دست آمده از آزمون ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در جدول شماره ۲ و ۳ قابل مشاهده است. نتایج آزمون همبسته نشان داد تعداد انتخابهای صحیح، تعداد انصرافهای صحیح، و مدت زمان انتخاب صحیح در مرحله پس آزمون در هر دو گروه تجربی به طور معنی داری بهبود داشت ($P \leq 0.05$). این در حالی بود که در گروه کنترل هیچ گونه تفاوت معنی داری مشاهده

جدول ۲. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در خصوص مقایسه متغیرهای توجه انتخابی در گروه ها

متغیر	گروه / آزمون		تمرین یوگا مبتنی بر بیوریتم (n=۱۳)		تمرین یوگا (n=۱۳)		کنترل (n=۱۳)		میانگین مجذورات آزادی درجه		P	F
	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون		
تعال												
انتخابهای صحیح												
تعال												
اصرافهای توجه صحیح												
مدت زمان انتخاب صحیح (ثانیه)												

$P \leq 0.001^{***}$


سالمند

جدول ۳. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در خصوص تعادل پویا

متغیر	گروه / آزمون		یوگا		تمرین یوگا مبتنی بر بیوریتم		کنترل		میانگین مجذورات آزادی درجه		P	F
	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون		
تعال پویا (ثانیه)												
تعال ایستا (ثانیه)												

$*** P \leq 0.001$

سالمند




سالند

تصویر ۳. توجه انتخابی سالمندان (متغیر تعداد انصراف‌های صحیح) پیش و پس از مداخله تحقیقی

بحث

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرين یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر عملکرد تعادلی و توجه انتخابی زنان سالمند بود. نتایج پژوهش نشان داد توجه انتخابی و تعادل زنان سالمند پس از مداخله تمرينی یوگای مبتنی بر بیوریتم زیستی و همین‌طور یوگا به طور معنی‌داری بهبود یافت. در متغیر توجه انتخابی نشان داده شد گروهی که تحت مداخلات یوگای مبتنی بر بهینگی بیوریتم زیستی و همین‌طور یوگا قرار گرفتند در تعداد انتخاب پاسخ‌های صحیح و همین‌طور تعداد انصراف‌های صحیح در مواجهه با محرك‌های اعمال شده وضعیت بهتری داشتند و در قیاس با گروه کنترل، پاسخ‌های اشتباه آن‌ها در آزمون نیز به طور معنی‌داری کمتر بود. از آنجاکه نسبت پاسخ‌های صحیح به غلط نموداری از میزان دقت افراد است، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص دقت آن‌ها به عنوان عاملی کلیدی در کنترل حرکتی، دستخوش تغییرات مثبت قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند به بهترین وجه توجیه گر بهبود تعادل ایستا و پویای سالمندان پس از اجرای برنامه تمرينی یوگا باشد. به عبارت دیگر، توانایی عکس‌عمل سریع و تصمیم‌گیری مناسب برای اجرای برنامه




سالند

تصویر ۲. توجه انتخابی سالمندان (متغیر تعداد انتخاب‌های صحیح) پیش و پس از مداخله تحقیقی

زمان انتخاب پاسخ صحیح در آزمون ارزیابی توجه و تمرکز کوتاه‌مدت وینا، گروه یوگا مبتنی بر بیوریتم زیستی و گروه یوگا در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی‌داری را پس از مداخله تمرينی داشته‌اند (به ترتیب $P=0.044$, $P=0.02$). از طرف دیگر اختلاف معنی‌داری بین دو گروه تجربی مشاهده نشد ($P=0.64$).


نتایج آزمون توکی در خصوص تفاوت میان گروه‌ها در تعادل ایستا در تصویر شماره ۵ آمده است. گروه یوگا مبتنی بر بیوریتم زیستی و گروه یوگا در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی‌داری را پس از مداخله تمرينی داشته‌اند (به ترتیب $P=0.23$, $P=0.032$). از طرف دیگر اختلاف معنی‌داری بین دو گروه تجربی مشاهده نشد ($P=0.65$).

نتایج آزمون توکی در خصوص تفاوت میان گروه‌ها در تعادل پویا در تصویر شماره ۶ آمده است. گروه یوگا مبتنی بر بیوریتم زیستی و گروه یوگا در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی‌داری را پس از مداخله تمرينی داشته‌اند (به ترتیب $P=0.001$, $P=0.002$). از طرف دیگر اختلاف معنی‌داری بین دو گروه تجربی مشاهده نشد ($P=0.43$).



سالند

تصویر ۵. مقایسه تعادل ایستای زنان سالمند پیش و پس از مداخله تحقیقی



سالند

تصویر ۴. مقایسه توجه انتخابی سالمندان (مدت زمان انتخاب پاسخ صحیح پیش و پس از مداخله تحقیقی

را در سالمندان به همراه خواهد داشت [۱۵].

متوسط زمان عکس‌العمل به عنوان بخش مهمی از عامل توجه انتخابی در این پژوهش اثر داشت. این موضوع در توانایی پردازش اطلاعات و شاخص‌های کنترل قامت بسیار مهم است و به عنوان یکی از کارکردهای زیستی عصبی کلیدی در فعالیت‌های حرکتی انسان به خصوص حفظ تعادل مطرح است. در حالت کلی، کارکردهای اجرایی عصبی شناختی ساختارهای مهمی هستند که در هدایت و کنترل رفتار انسان نقش دارند. ارزیابی دقیق این کارکردها و همین طور ایجاد بستر برای بهبود هر چه بهتر آن‌ها زجمله تمھیداتی است که باید در دستور کار متخصصان رفتارحرکتی قرار گیرد تا زمینه بهزیستی به نحو مقتضی ایجاد شود. از آنجاکه حفظ تعادل و بهبود فرایندهای پردازشی و شناختی در دوران سالمندان بسیار حائز اهمیت است، بنابراین ارزیابی عملکرد تعادلی و همین طور کارکردهای اجرایی سالمندان متعاقب برنامه‌های تمرینی مؤثر توصیه می‌شود.

نتیجه‌گیری نهایی

تحقیقات در حوزه کارکردهای اجرایی سالمندان که عوامل حرکتی شناختی را بررسی می‌کنند محدود است. همان‌طور که در بخش یافته‌های تحقیق عنوان شد، الگوهای تعادلی و توجه انتخابی قابلیت رشد را با تمریناتی همچون یوگا دارند. این موضوع در کنترل حرکتی بسیار حائز اهمیت است، اما در خصوص بررسی اثربخشی بیوریتم به تحقیقات بیشتری نیاز است.

یکی از محدودیت‌های این مطالعه تعداد نسبتاً اندک آزمودنی‌ها و نبود امکان سنجش فیزیولوژیک عوامل عصبی شناختی مؤثر دیگر در فرایندهای شناختی بود. در حالی که در فرایندهای شناختی و ادرارکی نورترانسمیترهای گوناگون و مولکول‌های پروتئینی متفاوت تأثیر دارند، از طرفی، عوامل مؤثر در حفظ تعادل از جمله لحاظ کردن ویژگی‌های کینتیکی و کینماتیکی حرکت نیز از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند به قوت چنین تحقیقاتی بیفزاید.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش


این مطالعه پس از گرفتن مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به شماره ۱۷۶۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ انجام شد.

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

تعارض منافع

بنابر اظهار نظر نویسنده‌گان، تعارض منافع وجود ندارد.



سالمند

تصویر ۶ مقایسه تعادل پویای زنان سالمند پیش و پس از مداخله تحقیقی حرکتی^۹ می‌تواند تعادل بهتری را برای سالمند رقم بزند.

برداشتی که از این نتایج حاصل می‌شود این است که کارکردهای اجرایی^{۱۰} که تعاملی از فرایندهای ادرارکی و حرکتی در سیستم عصبی مرکزی است، متعاقب برنامه تمرین یوگا دستخوش تغییرات مثبت فراینده می‌شود که این عامل می‌تواند مخصوصاً ایجاد استقلال عملکردی در سالمندان شود.

نکته قابل تأمل در یافته‌های این پژوهش، تفاوت نداشتن هیچ یک از شاخص‌های ادرارکی حرکتی بین دو گروه تجربی بود. بدین مفهوم که برنامه‌ریزی یوگا مبتنی بر بیوریتم سالمندان تأثیری بر نتایج نداشت. با توجه به اینکه تلاش شد در این پژوهش همه عوامل احتمالی که می‌تواند بر بیوریتم افراد اثرگذار باشد (تغذیه، خواب، افسردگی) تحت کنترل قرار گیرد، اما مشاهده شد نظم زیستی اثری بر شاخص‌های توجه انتخابی و تعادل نداشت. این نتیجه با نتایج مطالعه رهاوی (۲۰۱۷) و زارعیان (۲۰۱۴) مغایر بود. آن‌ها بیوریتم را به عنوان عاملی مؤثر در اجرا و عملکرد ذکر کرده بودند. از دلایل احتمالی این و اجرایی می‌توان به آزمودنی‌های تحقیق اشاره کرد. در آن دو پژوهش افراد نوجوان و جوان بررسی شده بودند و تکالیف اجرایی مهارت ورزشی را انجام داده بودند، درحالی که در پژوهش حاضر عملکردهای ادرارکی حرکتی بررسی شده است. از آنجاکه در داخل کشور تحقیقاتی در زمینه اثربخشی تمرینات جسمانی مبتنی بر بیوریتم زیستی سالمندان انجام نشده است، تلاش شد تا موارد مرتبه‌تر در مقایسه با نتایج تحقیق حاضر استفاده شود.

نتایج این تحقیق با یافته‌های کیم^{۱۱} و همکاران همخوانی دارد که نشان دادند هر برنامه تمرینی که چالش‌های تصمیم‌گیری را در سالمندان در حین تمرین به همراه داشته باشد، منجر به استقلال عملکردی بهتری در فعالیت‌های روزانه و عملکرد مغز سالمندان می‌شود. بدین شکل که در مغز بر اثر تمرینات ورزشی تغییراتی ساختاری و شناختی اتفاق می‌افتد که درنهایت بهبود اعمال شناختی

9. Motor proram

10. Executive functions

11. Kim

تشکر و قدردانی

ضمن تشکر از همه افرادی که در این پژوهش مشارکت داشتند،
از خانم زهرا دادمهر و مریم ایران‌دوست که در جمع‌آوری اطلاعات
باری رساندند، کمال تشکر را داریم.

Archive of SID

References

- [1] Zareian E, Rabbani V, Saeedi F. The effect of physical biorhythm cycle on some physical fitness factors of adolescent volleyball players. *Annals of Applied Sport Science*. 2014; 2(1):11-20. [DOI:10.18869/acadpub.aassjournal.2.1.11]
- [2] Benza R, Duncan MJ, Frank E, McClung C, Nelson RJ, Vicentic A. Biological rhythms, higher brain function, and behavior: Gaps, opportunities and challenges. *Brain Research Reviews*. 2009; 62(1):57-70. [DOI:10.1016/j.brainresrev.2009.09.005] [PMID] [PMCID]
- [3] Adamantidis A, de Lecea L. Sleep and metabolism: Shared circuits, new connections. *Trends in Endocrinology & Metabolism*. 2008; 19(10):362-70. [DOI:10.1016/j.tem.2008.08.007] [PMID]
- [4] Ma Y, Olendzki BC, Li W, Hafner AR, Chiriboga D, Hebert JR, et al. Seasonal variation in food intake, physical activity, and body weight in a pre-dominantly overweight population. *European Journal of Clinical Nutrition*. 2006; 60(4):519-28. [DOI:10.1038/sj.ejcn.1602346] [PMID] [PMCID]
- [5] Kanikowska D, Sato M, Witkowski J. Contribution of daily and seasonal biorhythms to obesity in humans. *International Journal of Biometeorology*. 2015; 59(4):377-84. [DOI:10.1007/s00484-014-0871-z] [PMID] [PMCID]
- [6] Seidler RD, Bernard JA, Burutolu TB, Fling BW, Gordon MT, Gwin JT, et al. Motor control and aging: Links to age-related brain structural, functional, and biochemical effects. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 2010; 34(5):721-33. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2009.10.005] [PMID] [PMCID]
- [7] Graveson J, Bauermeister S, McKeown D, Bunce D. Intraindividual reaction time variability, falls, and gait in old age: A systematic review. *The Journals of Gerontology Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*. 2016; 71(5):857-64. [DOI:10.1093/geronb/gbv027] [PMID]
- [8] Sato D, Seko C, Hashitomi T, Sengoku Y, Nomura T. Differential effects of water-based exercise on the cognitive function in independent elderly adults. *Aging Clinical and Experimental Research*. 2015; 27 (2):149-59. [DOI:10.1007/s40520-014-0252-9] [PMID]
- [9] Carral JM, Curras DM, Pérez CA, Suárez MH. Effects of two programmes of combined Land-Based and Water-Based exercise on the cognitive function and fitness levels of healthy older adults. *Motriz: Revista de Educação Física*. 2017; 23(2). [DOI: 10.1590/s1980-6574201700020011]
- [10] Dagtekin O, Gerbershagen HJ, Wagner W, Petzke F, Radbruch L, Sabatowski R. Assessing cognitive and psychomotor performance under long-term treatment with transdermal buprenorphine in chronic noncancer pain patients. *Anesthesia & Analgesia*. 2007; 105(5):1442-8. [DOI:10.1213/01.ane.0000281078.65585.1e] [PMID]
- [11] Sadeghi H, Norouzi H, Karimi Asl A, Montazer M. [Functional training program effect on static and dynamic balance in male able-bodied elderly (Persian)]. *Iranian Journal of Ageing*. 2008; 3(2):565-71.
- [12] Lopopolo RB, Greco M, Sullivan D, Craik RL, Mangione KK. Effect of therapeutic exercise on gait speed in community-dwelling elderly people: A meta-analysis. *Physical Therapy*. 2006; 86(4):520-40. [PMID] [PMCID]
- [13] Buchner DM, Cress ME, de Lateur BJ, Esselman PC, Margherita AJ, Price R, et al. The effect of strength and endurance training on gait, balance, fall risk, and health services use in community-living older adults. *The Journals of Gerontology Series A, Biological Sciences and Medical Sciences*. 1997; 52(4):M218-24. [DOI:10.1093/gerona/52A.4.M218] [PMID]
- [14] Irandoost K, Taheri M. [The impact of yoga and pilates exercises on older adults (Persian)]. *Iranian Journal of Ageing*. 2016; 11(1):152-61. [DOI:10.21859/sija-1101152] [DOI:10.21859/sija-1101152]
- [15] Kim BK, Rhim YT, Park IS. Effect of regular aerobic exercise on the prevention of cognitive decline and brain disease in elderly people. *Journal of Korean Society for the Study of Physical Education*. 2013; 18(2):217-29.