

Research Paper**Effect of Pilates Exercises on Motor Performance and Low Back Pain in Elderly Women With Abdominal Obesity***Ali Seghatoleslami¹, Ali Hemmati Afif², Khadijeh Irandoust², Morteza Taheri²

1. Department of Physical Education, Faculty of Physical Education, University of Birjand, Birjand, Iran.

2. Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

**Citation:** Seghatoleslami A, Hemmati Afif A, Irandoust Kh, Taheri M. [Effect of Pilates Exercises on Motor Performance and Low Back Pain in Elderly Women With Abdominal Obesity (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2018; 13(3):396-405. <https://doi.org/10.32598/SIJA.13.3.396> <https://doi.org/10.32598/SIJA.13.3.396>**Funding:** See Page 403 **Copyright:** The Author(s)**Received:** 3 Mar 2018**Accepted:** 19 Jul 2018**Keywords:**Pilates exercise,
Elderly, Body composition,
Low back pain**ABSTRACT****Objectives** This research aimed to investigate the impact of Pilates exercise on motor performance indexes and low back pain of inactive middle-aged women.**Methods & Materials** This was a quasi-experimental study with pretest and posttest design performed on 43 inactive females with mean (SD) age of 44.4 (5.1) year with low activity, body fat percentage above 35%, and Waist Hip Ratio (WHR) of over 0.95. They were assigned into test (n=22) and control (n=21) group. The Pilates or test group did their exercise for 4 months, three times a week while the control group did their daily routines. All body composition variables were measured by body composition analyzer and functional tests were measured by speed and balance tests. Independent and dependent t test were used to analyze the data.**Results** The results suggested that dynamic balance and speed improved significantly and those effective factors on motor control such as obesity variables, including Body Mass Index (BMI), WHR, body fat percentage, visceral fat were also improved ($P \leq 0.05$).**Conclusion** It seems that Pilates exercise may improve motor performance indexes and also a better quality of life due to a mitigating low back pain. Therefore, practicing such an exercise program can be effective in older persons.**Extended Abstract****1. Introduction**

Studies indicate the progressive degeneration of the nervous system and loss of physiological function in elderly people [1]. Since musculoskeletal disorders are one of the most common problems in the elderly, it is important to provide a strategy for its prevention or control. In

this regard, low back pain is more common in people with inactive lifestyle [2], increased body mass index, especially in the abdominal region, and muscle weakness in central areas. With the increase in abdominal obesity, the compensatory curve is created in the lumbar curvature which increases pressure on the intervertebral discs [2]. Due to the increase in the curves of the lumbar region, the center of gravity moves forward and causes changes in how to walk, disturbance in postural control and increased risk of falling, and finally reduction in motor function [3], including a reduction

*** Corresponding Author:**

Ali Seghatoleslami, PhD

Address: Department of Physical Education, Faculty of Physical Education, University of Birjand, Birjand, Iran.**Tel:** +98 (915) 5623745**E-mail:** aseghatoleslami@birjand.ac.ir

Table 1. Results of t test for dynamic balance measurement before and after intervention

Group	Mean±SD		t	Sig.*
	Pretest	Posttest		
Test	8.28±0.40	7.54±0.33	6.55	*0.001
Control	0.41±8.05	7.98±0.29	0.511	0.61

*P<0.005.

IRANIAN JOURNAL of
AGEING

in walking speed and balance that results in reduced functional independence. In this regard, this study aimed to examine the effect of Pilates exercises on motor performance and low back pain in elderly women.

2. Methods and Materials

This study is a quasi-experimental study with control group using pretest and posttest conducted on 43 inactive elderly women with a mean (SD) age of 64.4 (5.1) year. The subjects were randomly divided into groups of test (n=22) and control (n=21). The Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) was used to select samples to enter the study [2]. The test group performed Pilates exercises 3 sessions per week for 4 months. The inclusion criteria were as follows: 60 years or older, with non-specific low back pain in the past year, body fat percentage (BFP) higher than 35%, waist-hip ratio above 0.90, no problem for performing exercises, no medication use, and no history of lower limb injury during the past year. This study was approved by Ethics Committee of Imam Khomeini International University under code No. 17682. The Keele

STarT Back Screening Tool (SBST) (9-item version) was used to measure low back pain which help physicians identify psychological and physical risk factors for pain [3]. The obesity variables (BFP and visceral fat) were measured by inBody 320 Body Composition Analyzer (InBody Co., Korea) [4]. To measure the speed of the subjects, 10-m sprint test, and to predict the risk of falling, Timed Up and Go test (TUG) were applied. Independent and dependent t test were performed to analyze the collected data.

3. Result


The results of this study showed that muscle volume (P=0.03) and abdominal obesity (P=0.001) in subjects with physical activity (test group) significantly improved compared to the control group. Physical (Figure 1a) and psychological symptoms of low back pain (Figure 1b) significantly improved after intervention with Pilates exercises (P=0.001).

The results of dependent t test presented in Table 1, indicate that the dynamic balance of participants in test

Table 2. Results of t test for walking speed measurement before and after the intervention

Group	Mean±SD		t	Sig.*
	Pretest	Posttest		
Test	0.03±1.90	0.04±1.85	5.801	*0.001
Control	0.04±1.91	0.03±1.92	0.054	0.958

*P<0.005.

IRANIAN JOURNAL of
AGEING**Figure 1.** Low back pain measurement resultsIRANIAN JOURNAL of
AGEING

www.SID.ir

group significantly improved ($P=0.001$, $t=6.55$), while there was no significant difference in control group ($t=0.51$, $P=0.616$). According to the walking speed results in Table 2, there was a significant difference in the posttest results of test group ($P=0.001$, $t=5.801$), while no significant difference was found in control group ($P=0.958$, $t=0.054$).

4. Conclusion

The positive effects of Pilates exercises on the variables of body composition, back pain, and walking speed will improve the functional independence of the elderly. It was found out that Pilates exercises can reduce the physical and psychological symptoms of low back pain as well as abdominal and visceral obesity, and improve balance and walking speed. Since there was a direct relationship between abdominal obesity and low back pain; one of the possible causes of improving back pain in the Pilates group is the reduction in abdominal obesity. The mechanism of Pilates exercise training focuses on the development of comprehensive power where strength and endurance of the muscles increase; this improvement in the open-chain movement is effective in controlling the movement of the lower and upper limbs which results in improvement of functional factors [6]. Hence, Pilates exercises can improve the motor function of the elderly and cause a functional independency.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This study was referred to the Ethics and Research Council of Imam Khomeini International University for ethical review, and was performed after obtaining permission from the committee (No. 17682) was taken. Before the study began, the research process including the research objectives, how to measure variables, how to do the research program, and the length of the research period was explained to the participants. All participants volunteered to participate in the study, completing the consent.

Funding

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflict of interest

All authors certify that this manuscript has neither been published in whole nor in part nor being considered for publication elsewhere.

Acknowledgements

Hereby, we appreciate all the participants who helped us in conducting this research.

تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر شاخص‌های عملکرد حرکتی و میزان کمردرد زنان سالمند

* علی ثقیلاسلامی^۱، علی همتی عقیف^۲، خدیجه ایران دوست^۳، مرتضی طاهری^۴

۱- گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

۲- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

تاریخ پذیرش: ۲۸ تیر ۱۳۹۷

اهداف: هدف از انجام مطالعه حاضر، تأثیر تمرینات پیلاتس بر شاخص‌های عملکرد حرکتی و میزان کمردرد زنان سالمند بود. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود که روی ۴۳ زن غیرفعال سالمند با دامنه سنی $64/4 \pm 5/1$ سال انجام گرفت که فعالیت بدنی کم، درد کمر، درصد چربی بدن بیش از ۳۵ درصد داشتند و نسبت دور کمر به لگن آن‌ها بیش از ۰/۹۵ بود. بدین ترتیب، نمونه‌ها به صورت تصادفی به دو گروه تجربی ($n=22$) و کنترل ($n=21$) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات پیلاتس را سه جلسه در هر هفته به مدت چهار ماه انجام دادند، در حالی که گروه کنترل به فعالیت‌های روزمره خود مشغول بودند. تمام متغیرهای ترکیب بدن با استفاده از دستگاه تحلیل ترکیب بدن و متغیرهای کنترل حرکتی نظیر سرعت راه رفتن با کمک آزمون سرعت ۱۰ متر راه رفتن و توانایی حفظ تعادل با آزمون زمان برخاستن و رفتن قبل و بعد از تمرینات آزموده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل و تی وابسته در نرم‌افزار SPSS تحلیل شد ($P \leq 0/05$).

یافته‌ها: بر اساس یافته‌های تحقیق، بهبود معناداری در تعادل پویا ($P=0/001$) و سرعت راه رفتن ($P=0/001$) زنان سالمند مشاهده شد. از طرفی عوامل مؤثر بر کنترل حرکتی همچون متغیرهای چاقی ($P=0/001$) و درد کمر ($P=0/001$) نیز بعد از چهار ماه بهبود معناداری داشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرینات پیلاتس می‌تواند باعث بهبود در سرعت راه رفتن، کیفیت حفظ تعادل و همچنین کاهش درصد چربی بدن و التیام درد کمر در سالمندی می‌شود. از این رو می‌توان برای داشتن کیفیت زندگی بهتر در سال‌های بعد از این دوران، از تمرینات پیلاتس در کنار برنامه‌های تمرینی دیگر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها:

پیلاتس، تعادل، سرعت، درد کمر

مقدمه

ایجاد می‌شود. افزایش وزن بالاتنه نیز به دیسک‌های بین‌مهرهای فشار زیادی می‌آورد و موجب کمردرد می‌شود [۲]. در اثر افزایش قوس ناحیه کمری مرکز ثقل به سمت جلو جابه‌جا می‌شود و سبب تغییرات در نحوه گام برداشتن، اختلال در کنترل پاسچر، افزایش خطر زمین خوردن و کاهش قابلیت جابه‌جایی حرکتی می‌شود [۳].

یکی از روش‌های ورزشی که در سال‌های اخیر متخصصان ورزشی و توان‌بخشی به آن توجه کرده‌اند و در حال فراگیر شدن است، ورزش پیلاتس است. جوزف پیلاتس در سال ۱۸۸۰ این ورزش را برای اولین بار ابداع کرد. این ورزش مجموعه‌ای از تمرینات تخصصی است که با هدف افزایش قدرت، استقامت و انعطاف‌پذیری، بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از طرفی در کنار بهبود شرایط جسمانی به بهبود مسائل روان‌شناختی همچون توجه و تمرکز نیز کمک می‌کند [۴]. کاهش بافت عضله در

امروزه به دلیل اقتضائاتی که در کشور وجود دارد، نسبت جمعیت افراد سالمند به جوان دچار فزونی شده است. با افزایش سن، با وجود ورزش و فعالیت جسمانی، بافت‌های عضلانی تحلیل می‌روند و بافت‌های چربی افزایش می‌یابند؛ از طرفی تغییرات ترکیب بدن می‌تواند زمینه‌ساز افت عملکرد جسمانی و کنترل حرکتی را ایجاد کند. کمردرد یا درد ستون فقرات نیز از شایع‌ترین عوارض عضلانی اسکلتی است که در دوره سالمندی بیشتر در افرادی مشاهده می‌شود که سبک زندگی غیرفعال دارند [۱]. یکی از عواملی که ممکن است باعث درد کمر در دوره سالمندی شود، تغییرات ترکیب بدن اعم از افزایش توده چربی بدن به ویژه در ناحیه شکم و تحلیل رفتن عضلات در نواحی مرکزی بدن است. با افزایش چاقی شکمی، قوسی جبرانی در ناحیه انحنای کمری

* نویسنده مسئول:

دکتر علی ثقیلاسلامی

نشانی: بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

تلفن: ۵۶۲۳۷۴۵ (۹۱۵) ۰۹۸+

پست الکترونیکی: aseghatolaslami@birjand.ac.ir

(PAR-Q) برگه‌ای شامل هفت سؤال بلی و خیر است که برای گزینش افراد هنگام شرکت در فعالیت‌های جسمانی که ممکن است برای آن‌ها شدید باشد، طراحی شده است. PAR-Q به‌عنوان استاندارد کمیت‌ها برای ورود به برنامه‌های تمرینی با شدت متوسط توصیه شده است. سؤالات طراحی شده در این پرسش‌نامه در حیطه سلامت قلب و عروقی، ناراحتی‌های مفصلی و فشارخون افراد است [۹]. گروه تجربی تمرینات پیلاتس را ۳ جلسه در هر هفته به مدت چهار ماه انجام دادند؛ درحالی‌که گروه کنترل به فعالیت‌های روزمره خود مشغول بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل و تی وابسته در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.

معیارهای ورود به مطالعه

تمایل به شرکت در تحقیق (امضای فرم رضایت‌نامه)، محدوده سنی ۴۰ تا ۵۰، دارای تجربه کم‌درد نامعین در یک سال گذشته، درصد چربی بدن بیش از ۳۵ درصد، نسبت دور کمر به لگن بیش از ۹۰ صدم، شرایط ورود به اجرای برنامه تمرینی با پرسش‌نامه تشخیصی PARQ، استفاده نکردن از داروهای اعصاب اثرگذار بر تعادل، نداشتن سابقه آسیب اندام تحتانی در طول یک سال گذشته.

اندازه‌گیری میزان کم‌درد

برای ارزیابی کم‌درد از پرسش‌نامه‌ای ۹ ماده‌ای^۶ برای طبقه‌بندی درد افراد استفاده شد که هم عوامل فیزیکی و هم عوامل روانی درد را مشخص می‌کند. پایایی این آزمون ۰/۷۹ گزارش شده است [۱۰]. برای اندازه‌گیری میزان درد، از مقیاس بصری شدت درد^۷ برحسب درصد استفاده شد. این مقیاس نوار افقی به طول ۱۰۰ میلی‌متر یا ۱۰ سانتی‌متر است که یک انتهای آن صفر یعنی بدون درد و انتهای دیگر آن عدد ۱۰ یعنی شدیدترین درد ممکن در نظر گرفته شده بود. از بیمار خواسته می‌شد تا ضمن نگاه کردن به پیوستار مذکور، میزان دردی را که در آن لحظه احساس می‌کرد، روی آن تعیین کند. پایایی داخلی این مقیاس بر اساس پژوهش‌های قبلی $ICC=0/91$ گزارش شده است [۱۱].

اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی

بعد از توضیحات لازم و آشنا کردن آزمودنی‌ها، میزان فعالیت بدنی از طریق پرسش‌نامه فعالیت بدنی بک^۸ به‌منظور سنجش فعالیت بدنی آزمودنی‌ها استفاده شد. این پرسش‌نامه مشتمل بر ۱۶ سؤال در سه بخش فعالیت بدنی مربوط به اوقات فراغت، فعالیت ورزشی و فعالیت بدنی مربوط به شغل، تنظیم شده است.

قسمت میانی بدن ممکن است موجب افزایش قوس کمری شود، این موضوع می‌تواند در سرعت راه‌رفتن آفتی ایجاد کند. کاهش سرعت راه‌رفتن چنانچه به مقادیر کمتری از ۱ تا ۲/۱ متر بر ثانیه برسد، برای سالمندان مشکلاتی را در پی خواهد داشت [۵]. با وجود تنوع زیاد شیوه‌های ورزش درمانی، هنوز دلایل کافی درباره برتری یک روش بر دیگری وجود ندارد.

کائو^۱ و همکاران در سال ۲۰۰۷ طی تحقیقی عنوان کردند فعالیت و تمرینات بدنی منظم و مداوم می‌تواند به‌طور مؤثری خطر افتادن را کاهش دهد و تحرک و ایمنی حرکت در زنان مسن را ارتقا بخشد [۶]. همچنین آیزر^۲ در سال ۲۰۰۹ نشان داده است می‌توان با انجام فعالیت‌های جسمانی منظم در طول عمر، افت عملکرد حرکتی این افراد را تا حدودی به تأخیر انداخت [۷]. سوزوکی^۳ و همکاران در سال ۲۰۰۹ طی تحقیقی نشان دادند تمرین و فعالیت بدنی باعث بهبود در تعادل، انعطاف‌پذیری، قدرت عضلانی و توانایی راه‌رفتن، در افراد سالمند می‌شود [۸].

با توجه به تحقیقات صورت گرفته، مشخص است درباره ورزش سالمندی تحقیقات متنوعی انجام شده است. این موضوع ضرورتی را ایجاد می‌کند تا در دوره قبلی سالمندی، تمهیداتی صورت پذیرد تا کیفیت زندگی در سالمندی به بهترین شکل تأمین شود. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر شاخص‌های منتخب کنترل حرکتی و عوامل مؤثر در آن در زنان سالمند غیرفعال انجام شد.

روش مطالعه

این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود که روی ۴۳ زن غیرفعال سالمند با دامنه سنی $64/5 \pm 4/1$ سال انجام شد که فعالیت بدنی کم، درد کمر نامعین^۴، درصد چربی بدن بیش از ۳۵ درصد، نسبت دور کمر به لگن بیشتر از ۰/۹۵ داشتند و برای دریافت برنامه ورزشی به مرکز مشاوره ورزشی و سلامت مراجعه کرده بودند. بدین ترتیب، نمونه‌ها به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی ($n=22$) و کنترل ($n=21$) تقسیم شدند. از افراد گروه تجربی ۳ نفر از ادامه کار منصرف شدند.

قبل از شروع دوره تمرینی، برای اطلاع از وضعیت سلامتی و سطح آمادگی افراد، به ترتیب از پرسش‌نامه تاریخچه پزشکی و پرسش‌نامه آمادگی برای فعالیت جسمانی^۵ [۹] استفاده شد که همه آزمودنی‌های گروه تجربی شرایط احراز برای ورود به برنامه تمرینی را داشتند. پرسش‌نامه آمادگی برای فعالی جسمانی

1. Cao
2. Irez
3. Suzuki
4. Non-Specific Low Back Pain
5. Physical Activity Readiness Questionnaire (PARQ)

6. Keele STarT Back

7. Visual Analogue Scale (VAS)

8. Beck Physical Activity Questionnaire

پایایی درونی پرسش‌نامه، با آزمون آلفای کرونباخ ۰/۷۹ گزارش شده است.

برنامه تمرینی

برای گروه تجربی که تحت تمرینات پیلاتس قرار گرفتند، در ابتدای هر جلسه تمرینی درباره چگونگی اجرای حرکات به آزمودنی‌ها توضیحات اولیه‌ای داده می‌شد. ۱۰ دقیقه اول هر جلسه تمرینی به اجرای حرکات تنفسی پیلاتس اختصاص داشت، تمرینات اختصاصی در بازه زمانی ۴۰ دقیقه‌ای و در نهایت بازگشت به حالت اولیه و سرد کردن به مدت پنج دقیقه اجرا شد. هفته اول تمرینی برای افزایش آمادگی عمومی بدن، هفته دوم و سوم با هدف افزایش قدرت (به کمک تمرینات با وزنه)، افزایش انعطاف (با چوب)، تمرینات کششی، هفته چهارم تا هشتم ترکیبی از تمرینات قدرتی، انعطافی و کششی انجام شد. در ماه سوم و چهارم این سیکل به صورت ترکیبی از تمامی حرکات اجرا شده در فازهای قبلی تکرار شد [۴].

تحلیل داده‌ها

در مطالعه حاضر از آزمون آماری شاپیرو-ویلک برای ارزیابی عادی بودن داده‌ها و سپس از آزمون آماری تی مستقل و تی وابسته برای تحلیل آن‌ها استفاده شد. در نهایت، داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ تحلیل شد. $P \leq 0/05$ به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

نتایج آزمون t نشان داد حجم عضله آزمودنی‌هایی که فعالیت بدنی داشتند در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته است ($P=0/03$). از طرف دیگر گروه تمرینی ورزش در آب، بهبود معنی داری در چاقی شکمی در دو متغیر نسبت دور کمر به دور لگن و چربی احشایی داشتند ($P=0/001$) (جدول شماره ۱).

همان‌طور که در تصویر شماره ۱ مشاهده می‌شود، الف) علائم جسمانی و ب) علائم روانی درد متعاقب اعمال برنامه

اندازه‌گیری ترکیب بدنی

متغیرهای چاقی شامل چاقی کلی بدن: شاخص درصد چربی بدن^۹ و چاقی احشایی: نسبت دور کمر به دور لگن^{۱۰}، میزان چربی امعای احشایی^{۱۱} با استفاده از دستگاه تحلیل ترکیب بدن^{۱۲} (ساخت کشور کره جنوبی مدل (In Body 320) اندازه‌گیری شد.

اندازه‌گیری + (متر سرعت راه رفتن

برای اندازه‌گیری سرعت آزمودنی‌ها، از آن‌ها خواسته شد که مسیری ۱۰ متری را با حداکثر سرعت طی کنند. در این پژوهش، هر آزمودنی دومرتبه این آزمون را انجام داد که بهترین امتیاز او محاسبه شد. با تقسیم این عدد بر مسافت مدنظر، سرعت راه رفتن فرد بر حسب متر بر ثانیه به دست آمد.

آزمون تعادل (زمان برخاستن و رفتن^{۱۳})

قبل از شروع تمرینات آزمون زمان برخاستن و رفتن (TUG) با پایایی ۹۹٪ برای پیش‌بینی خطر افتادن اجرا شد تا تعادل پویای شرکت‌کنندگان دو گروه کنترل و تجربی اندازه‌گیری شود [۱۲]. آزمون به این صورت اجرا می‌شود که شرکت‌کننده بدون استفاده از دست‌هایش از روی صندلی بدون دسته برخاسته، پس از طی کردن مسیری سه متری بازمی‌گردد و دوباره روی صندلی می‌نشیند [۱۳].

9. Percentage of Body Fat (PBF)
10. Waist Hip Ratio (WHR)
11. Visceral fat
12. Body composition analyzer
13. Time up and go

جدول ۱. ویژگی‌های عمومی و آنتروپومتریکی آزمودنی‌ها در دو گروه تجربی و کنترل

گروه متغیر	پیلاتس		کنترل	
	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون
قد (سانتی‌متر)	۱۵۹/۲±۴/۳	۱۵۸/۱±۷/۸		
وزن (کیلوگرم)	۷۳/۱±۱/۶	۷۰/۱±۲/۹***	۷۴/۲±۲/۴	۷۳/۲±۲/۲
درصد چربی بدن (%)	۳۷/۲±۲/۴	۳۵/۱±۴/۸***	۳۶/۲±۱/۱	۳۷/۲±۳/۴
بافت عضله (کیلوگرم)	۲۷/۱±۱/۴	۲۹/۱±۳/۱*	۲۷/۱±۳/۲	۲۷/۱±۲/۱
نسبت دور شکم به لگن (متر)	۰/۹۲	۰/۸۸***	۰/۹۴	۰/۹۳

جدول ۲. آزمون t وابسته جهت بررسی میزان تعادل پویا قبل و بعد از مداخله

گروه	پیش آزمون انحراف معیار ± میانگین	مقدار t	سطح معناداری
تجربی	۸/۲۸ ± ۰/۴۰	۶/۵۵	۰/۰۰۱*
کنترل	۸/۰۵ ± ۰/۴۱	۰/۵۱۱	۰/۶۱

* سطح معنی داری $P \leq 0/05$


سالمند

کنترل معنی دار نبود ($t = -0/054$, $P = 0/958$). نتایج نشان داد در پیش آزمون سرعت راه رفتن ۱۰ متر بین گروه تجربی و کنترل، اختلاف معناداری وجود ندارد، ولی در نمرات پس آزمون زمان برخاستن و رفتن بین گروه تجربی و کنترل اختلاف معناداری وجود دارد.

بحث

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر متغیرهایی بود که می‌توانند شاخص‌های کنترل حرکتی را تحت تأثیر قرار دهند؛ عواملی مانند ترکیب بدن، درد کمر و سرعت راه رفتن که همگی قابلیت استقلال عملکردی را در زندگی اغنا می‌کنند. نتایج به دست آمده نشان داد تمرینات پیلاتس باعث کاهش علائم جسمانی و روانی کمردرد نمونه‌ها، کاهش چاقی شکمی WHR و چربی احشایی و همچنین بهبود تعادل و سرعت راه رفتن می‌شود.

چنانکه در میانی نظری تحقیق عنوان شد ارتباط مستقیمی بین چاقی شکمی و درد کمر وجود دارد؛ بنابراین یکی از علل اصلی کاهش درد کمر در گروه پیلاتس را می‌توان کاهش چاقی شکمی آن‌ها دانست. آگاهی از اجزای بدن، استفاده هوشیارانه از عضلات، آگاهی از پیام‌های عضلات و دامنه حرکتی مفاصل که از اصول اساسی تمرینات پیلاتس است، باعث جلوگیری از آسیب‌های پرکاری، کشش و فشار بر عضلات می‌شود. اصل کشش در پیلاتس با تلفیق تمرکز بدن و حفظ راستای مناسب بدن کمک می‌کند تا عضلات در دامنه حرکتی کامل که برای





سالمند

تصویر ۲. تأثیر پیلاتس بر نسبت دور کمر به لگن

تمرینی پیلاتس به‌طور معناداری کاهش یافته است ($P = 0/001$). همان‌طور که در تصویر شماره ۲ مشاهده می‌شود، هر دو عامل چاقی شکمی (نسبت دور کمر به دور لگن و چربی احشایی) متعاقب اعمال برنامه تمرینی ورزش در آب به‌طور معناداری کاهش یافت ($P = 0/001$).

نتایج آزمون t وابسته در جدول شماره ۲ آمده است. تعادل آزمودنی‌های گروه تجربی (آزمون برخاستن و رفتن) در گروه تجربی بهبود معناداری داشت ($t = -6/55$, $P = 0/001$ ، این در حالی بود که اختلاف معناداری در گروه کنترل مشاهده نشد ($t = 0/51$, $P = 0/616$). نتایج آزمون t مستقل نشان داد در پیش آزمون زمان برخاستن و رفتن بین گروه تجربی و کنترل، اختلاف معناداری وجود نداشت ($P = 0/51$ ، ولی در نمرات پس آزمون زمان برخاستن و رفتن بین گروه تجربی و کنترل اختلاف معناداری وجود داشت ($P = 0/001$).

همان‌طور که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، نتایج آزمون t وابسته درون گروهی بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون سرعت راه رفتن ۱۰ متر در گروه تجربی اختلاف معناداری وجود دارد ($t = 5/801$, $P = 0/001$ ، در حالی که این اختلاف برای گروه



سالمند

تصویر ۱. ارزیابی درد کمر در گروه‌های تحقیق

الف: مقایسه علائم جسمانی درد در گروه تجربی و کنترل ب: مقایسه علائم روانی درد در گروه تجربی و کنترل

جدول ۳. آزمون t وابسته جهت بررسی میزان سرعت آزمودنی‌ها قبل و بعد از مداخله

گروه	پیش‌آزمون انحراف معیار ± میانگین	مقدار t	سطح معناداری
تجربی	۱/۹۰±۰/۰۳	۵/۸۰۱	۰/۰۰۱*
کنترل	۱/۹۱±۰/۰۴	۰/۰۵۴	۰/۹۵۸

* سطح معنی‌داری ۰/۰۵ ≤ P

سالمند

پيلاتس به کاهش درصد چربی امعا و احشایی، درد کمر و بهبود در وضعیت تعادل و سرعت راه رفتن در سالمندان منجر می‌شود. از این رو، شرکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی پيلاتس قابلیت کاهش میزان چربی شکمی و بهبود کنترل عصبی عضلانی مرتبط با درد کمر و افزایش کیفیت حفظ تعادل و سرعت راه رفتن در سالمندان را دارد. این تمرینات با تقویت عضلات مرکزی بدن و تقویت عصبی عضلانی خط ثقل را در راستای طبیعی قرار می‌دهد و باعث ایجاد تعادل بدن در وضعیت مطلوبی می‌شود. در نتیجه از این گونه تمرینات در کنار دیگر برنامه‌های توان بخشی سالمندان می‌توان استفاده کرد.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

این مطالعه برای بررسی اخلاقی به شورای اخلاق و پژوهش دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ارجاع داده شد و پس از کسب مجوز از این کمیته به شماره ۱۷۶۸۲ انجام گرفت. قبل از شروع مطالعه، روند تحقیق شامل اهداف تحقیق، چگونگی اندازه‌گیری متغیرها، چگونگی انجام برنامه تمرینی و طول دوره تحقیق برای آزمودنی‌ها توضیح داده شد. تمامی شرکت‌کنندگان داوطلبانه و با تکمیل رضایت‌نامه در تحقیق شرکت کردند.

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

تعارض منافع

بنا بر اظهار نظر نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از زحمات تمامی افرادی که در این مطالعه شرکت کردند و محقق را در اجرای این پژوهش یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی می‌شود.

تعادل عضلانی لازم است، کشیده شوند و هم‌زمان عمل انقباض را انجام دهند، این کار با حمایت بدن انجام می‌شود [۴]. از طرف دیگر کاهش چاقی شکمی که اساسی برای کاهش کمردرد است، در این تحقیق ذکر شد که هم‌راستا با نتایج جیانپولو^{۱۴} و همکاران و اسلنتز و همکاران است [۱۵، ۱۴].

همچنین بهبود در وضعیت حفظ تعادل و سرعت راه رفتن با نتایج کائو و همکاران و ایواماتو^{۱۵} و همکاران همسو بود [۸، ۶]. اما با بخشی از نتایج آیزو و همکاران که عنوان کرد تمرینات استقامتی خشکی اثر معناداری بر سرعت راه رفتن ندارد، با این مطالعه مغایرت داشت [۷]. اگرچه ماهیت برنامه تمرینی به کار برده شده در تحقیقات مشابه است، اما اختلافی که در نتایج به دست آمده وجود دارد، می‌تواند ناشی از نادیده گرفتن عواملی مانند میزان آمادگی آزمودنی‌ها، سطح فعالیت بدنی، میزان انگیزش، جنسیت، سن، قد و وزن باشد. همچنین، تفاوت مشاهده شده در تحقیقات را می‌توان به دو روش تحقیق و متغیرهای دیگر نیز نسبت داد. با وجود اینکه قدرت عضلانی با افزایش سن کاهش می‌یابد [۱۶]، در سالمندان قابل تعدیل است [۱۷]. انجام تمرینات ورزشی، تغییرات عملکردی مرتبط با افزایش سن را جبران می‌کند و استقلال را در سنین سالمندی به مدت طولانی‌تری حفظ می‌کند. یافته‌های مطالعات پیشنهاد می‌کند انجام فعالیت جسمانی منظم، ذخیره چربی بدن را کاهش می‌دهد و سبب افزایش قدرت و استقامت عضلانی و توانایی انجام فعالیت‌های روزمره می‌شود.

آتروفی عضلانی نیز که با افزایش سن همراه است، از طریق انجام تمرینات قدرتی و پيلاتس می‌تواند به تأخیر افتد یا معکوس شود [۱۶]. با توجه به اینکه ورزش پيلاتس در کشور ما ورزشی جدید به شمار می‌آید و از طرف دیگر، امکانات مورد نیاز آن بسیار سهل الوصول است و در هر مکانی قابلیت اجرا دارد، توصیه می‌شود برای افزایش آمادگی عملکردی از جمله سرعت، تعادل و ترکیب بدن و همچنین تقلیل دردهای جسمانی مرتبط با کمردرد استفاده شود.

نتیجه‌گیری نهایی

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می‌توان گفت که تمرینات

14. Giannopoulos

15. Iwamoto

References

- [1] Nachemson A, Waddell G, Norlund A. Epidemiology of neck and low back pain. In: Nachemson A, Jonsson E, editors. Neck and Back Pain: The Scientific Evidence of Causes, Diagnosis and Treatment. Philadelphia, Pennsylvania: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
- [2] Ebenbichler GR, Oddsson LI, Kollmitzer J, Erim Z. Sensory-motor control of the lower back: Implications for rehabilitation. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2001; 33(11):1889-98. [DOI:10.1097/00005768-200111000-00014]
- [3] Wright VJ, Perricelli BC. Age-related rates of decline in performance among elite senior athletes. *The American Journal of Sports Medicine*. 2008; 36(3):443-50. [DOI:10.1177/0363546507309673] [PMID]
- [4] Critchley DJ, Pierson Z, Battersby G. Effect of pilates mat exercises and conventional exercise programmes on transversus abdominis and obliquus internus abdominis activity: Pilot randomised trial. *Manual Therapy*. 2011; 16(2):183-9. [DOI:10.1016/j.math.2010.10.007] [PMID]
- [5] Hoxie RE, Rubenstein LZ. Are older pedestrians allowed enough time to cross intersections safely? *Journal of the American Geriatrics Society*. 1994; 42(3):241-4. [DOI:10.1111/j.1532-5415.1994.tb01745.x]
- [6] Cao ZB, Maeda A, Shima N, Kurata H, Nishizono H. The effect of a 12-week combined exercise intervention program on physical performance and gait kinematics in community-dwelling elderly women. *Journal of Physiological Anthropology*. 2007; 26(3):325-32. [DOI:10.2114/jpa2.26.325]
- [7] Irez B. Pilates exercise positively affects balance, reaction time, muscle strength, number of falls and psychological parameters in 65+ years old women [PhD dissertation]. Ankara: Middle East Technical University; 2009.
- [8] Iwamoto J, Suzuki H, Tanaka K, Kumakubo T, Hirabayashi H, Miyazaki Y, et al. Preventative effect of exercise against falls in the elderly: A randomized controlled trial. *Osteoporosis International*. 2009; 20(7):1233-40. [DOI:10.1007/s00198-008-0794-9] [PMID]
- [9] Thomas S, Reading J, Shephard RJ. Revision of the Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q). *Canadian Journal of Sport Sciences*. 1992; 17(4):338-45. [PMID]
- [10] Hill JC, Dunn KM, Main CJ, Hay EM. Subgrouping low back pain: a comparison of the STarT Back Tool with the Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. *European Journal of Pain*. 2010; 14(1):83-9. [DOI:10.1016/j.ejpain.2009.01.003] [PMID] [PMCID]
- [11] Karimi A. A prospective study of the outcome of treatment of chronic low back pain patients with consistent and inconsistent clinical signs as defined by three screening tests [MSc. thesis]. Norwich: University of East Anglia; 2004.
- [12] Lopopolo RB, Greco M, Sullivan D, Craik RL, Mangione KK. Effect of therapeutic exercise on gait speed in community-dwelling elderly people: A meta-analysis. *Physical Therapy*. 2006; 86(4):520-40. [PMID]
- [13] Buchner DM, Cress ME, De Lateur BJ, Esselman PC, Margherita AJ, Price R, et al. The effect of strength and endurance training on gait, balance, fall risk, and health services use in community-living older adults. *The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*. 1997; 52(4):M218-M24. [DOI:10.1093/gerona/52A.4.M218] [PMID]
- [14] Slentz CA, Duscha BD, Johnson JL, Ketchum K, Aiken LB, Samsa GP, et al. Effects of the amount of exercise on body weight, body composition, and measures of central obesity: STRRIDE – a randomized controlled study. *Archives of internal medicine*. 2004; 164(1):31-9. [DOI:10.1001/archinte.164.1.31] [PMID]
- [15] Giannopoulou I, Ploutz-Snyder L, Carhart R, Weinstock R, Fernhall B, Gouloupoulou S, et al. Exercise is required for visceral fat loss in postmenopausal women with type 2 diabetes. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2005; 90(3):1511-8. [DOI:10.1210/jc.2004-1782] [PMID]
- [16] Md JFB, Kiely DK, Herman S, Leveille SG, Mizer K, Frontera WR, et al. The relationship between leg power and physical performance in mobility-limited older people. *Journal of the American Geriatrics Society*. 2002; 50(3):461-7. [DOI:10.1046/j.1532-5415.2002.50111.x]
- [17] Rogers ME, Rogers NL, Takeshima N, Islam MM. Methods to assess and improve the physical parameters associated with fall risk in older adults. *Preventive Medicine*. 2003; 36(3):255-64. [DOI:10.1016/S0091-7435(02)00028-2]