



## تأثیر پساب تصفیه شده صنایع کاغذسازی پارس (خوزستان) بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی کبد ماهی کولی (*Alburnus mossulensis*)

بهزاد نعمت دوست حقی<sup>\*</sup>، مهدی بنایی

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان

نوع مقاله: چکیده

کوتاه

در این مطالعه تأثیرات پساب تصفیه شده کاغذسازی پارس خوزستان (به نسبت ۰/۵ و ۰/۱٪) بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد ماهی کولی (*Alburnus mossulensis*) طی ۲۱ روز بررسی شد. افزایش معنی دار ( $p < 0/05$ ) سطح آسپارتات آمینوترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز و کراتین فسفوکیناز در کبد ماهی های در معرض پساب در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید. در حالی که سطح آلانین آمینوترانسفراز ماهی های تحت تیمار پساب ۱٪ و همچنین سطح آلکالین فسفاتاز و پروتئین کل بافت به طور معنی داری ( $p < 0/05$ ) کمتر از ماهی های گروه کنترل بود. نتایج نشان داد ورود پساب تصفیه شده کاغذسازی پارس به آب های سطحی می تواند سلامت آبزیان را به خطر اندازد.

تاریخچه مقاله:

دریافت: ۹۳/۱۲/۰۵

اصلاح: ۹۴/۱۰/۷

پذیرش: ۹۴/۰۳/۱۳

كلمات کلیدی:

پساب

کاغذسازی

ماهی کولی

### مقدمه

تخلیه پساب صنایع خمیر کاغذ و کاغذسازی حاوی مقادیر متنابهی مواد آلی و معدنی بالا، مشتقات هالوژن های آلی، شوینده های شیمیایی، ترکیبات اسیدی و بازی، فلزات سنگین، فوران ها، دی اکسین ها، سیانیدها، سولفیدها و همچنین دی کلرو گویکول، تترا کلرو گویکول (Zahrim *et al.*, 2007) به آب های سطحی می تواند سبب مرگ و میر ماهی ها (Pathan *et al.*, 2009)، تغییرات رفتاری (Mishra *et al.*, 2011)، کاهش نرخ تفریخ، تغییرات ریختی در جنین و بچه ماهی ها (Tyor *et al.*, 2012)، کاهش نرخ رشد (Ukagwu *et al.*, 2012)، سرکوب سیستم ایمنی، کم خونی و تغییر شاخص های خون شناسی (Baer *et al.*, 2009)، جهش ژنتیکی و اختلالات کروموزومی (Malik *et al.*, 2009)، ناهنجاری های تولید مثلی و هورمونی (Sepúlveda *et al.*, 2009)، تغییرات آسیب شناسی بافتی (Pathan *et al.*, 2010) و همچنین تغییر فاکتورهای بیوشیمیایی خون (Jeney *et al.*, 2002) گردد. پساب کارخانه کاغذسازی پارس پس از تصفیه اولیه به آب های سطحی منطقه تخلیه می شود. اما سطح تصفیه پساب این کارخانجات اختلاف معنی داری با استانداردهای بین المللی محیط زیست دارد (Kamiab and Hasani, 2012; Babaie *et al.*, 2008). از این رو تخلیه پساب این صنایع تحت چنین شرایطی می تواند صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست به ویژه به جانوران ساکن در

\* نویسنده مسئول، پست الکترونیک: bnematdoost@yahoo.com

اکوسیستم‌های آبی وارد کند. لذا این مطالعه به منظور درک بیشتر آسیب‌های بیوشیمیایی واردہ به یکی از ماهی‌های بومی رودخانه‌های در معرض آلودگی به فاضلاب صنایع چوب و کاغذ انجام شده است. در این تحقیق سطح تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی کبد ماهی کولی (*Alburnus mossulensis*), به عنوان یکی از گونه‌های بومی رودخانه‌های خوزستان، در معرض نسبت‌های مختلف پساب کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

## مواد و روش‌ها

به منظور انجام این تحقیق، ۱۸۰ قطعه ماهی کولی (*A. mossulensis*) با میانگین وزنی  $7/36 \pm 1/60$  گرم از رودخانه مارون صید و در ۹ آکواریوم ۸۰ لیتری مجهز به هوا ده توزیع شدند. پس از سازگاری ماهی‌ها با شرایط آزمایشگاهی (دماهی ۲۴ درجه سانتی‌گراد،  $pH: 7/4 \pm 0/2$ ، دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی و با نرخ تعویض ۴۰ درصد در روز)، ماهی‌ها در قالب ۳ تیمار (هر یک با ۳ تکرار) شامل گروه کنترل، دو گروه آزمایشی که به ترتیب حاوی  $0/05\%$  و  $0/1\%$  (معادل نسبت ۱۰ و ۲۰ درصد دامنه‌ای از  $LC_{50}$  ۹۶ ساعت پساب صنایع خمیر و کاغذ سازی (*Mishra et al., 2011*)) از پساب تصفیه‌شده کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان، به مدت ۲۱ روز تحت آزمایش قرار گرفتند. ماهی‌ها در دوره سازگاری و نیز دوره آزمایش با جیره تجاری مخصوص ماهی‌های آکواریومی و نیز کرم خونی (شیرونومیده) به نسبت برابر و معادل ۲ درصد وزن بدن ماهی‌ها، تغذیه گردیدند. ماهی‌ها در پایان دوره آزمایشی صید شدند و پس از کالبد شکافی کبد آنها خارج گردید. پس از شستشوی کبد ماهی‌ها با سرم فیزیولوژی، نمونه‌ها همراه با بافر فسفات  $0/041$  مول بر لیتر فسفات سدیم و  $0/026$  مول بر لیتر فسفات پتاسیم، با  $pH: 7/4$  به نسبت ۱ به ۱۰ هموژن گردید. سپس نمونه‌های هموژن شده در دماهی ثابت ۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. مایع رویی جهت آنالیز بیوشیمیایی جمع‌آوری و تا زمان آزمایش در دماهی ۲۵-۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد.

## فاکتورهای بیوشیمیایی

اندازه‌گیری فاکتورهای بیوشیمیایی با استفاده از کیت‌های تهیه شده از شرکت پارس آزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتری UV/Vis (مدل ۲۱۰۰ یونیکو آمریکا) صورت گرفت. سطح فعالیت آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز بر اساس مقدار مصرف NADPH و تبدیل آن به NAD<sup>+</sup> در طول موج ۳۴۰ نانومتر، سطح لاكتات دهیدروژناز بر اساس تبدیل پیروات به لاكتات در طول موج ۳۴۰ نانومتر، سطح آلکالین فسفاتاز بر اساس تبدیل نیتروفنیل فسفات به نیتروفنول و فسفات و در طول موج ۴۰۵ نانومتر، سطح کراتین فسفوکیناز نیز بر اساس تبدیل کراتین فسفات به کراتین در طول موج ۳۴۰ نانومتر تعیین و بر اساس میزان جذب نوری OD و فرمول ارائه شده در دستورالعمل کیت‌ها محاسبه گردید (*Moss and Henderson, 1999*). سطح فعالیت آنزیم‌ها در نهایت بر اساس گرم پروتئین بافت بیان شده است. سطح پروتئین تام بر اساس واکنش با یوره و در طول موج ۵۴۰ نانومتر اندازه‌گیری گردید (*Johnson et al., 1999*).

## تجزیه و تحلیل آماری

آزمون نرمال بودن داده‌ها بر اساس آزمون شاپیرو-ولیک با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 انجام شد. تجزیه تحلیل داده‌ها به روش آنالیز واریانس یک‌طرفه (One way ANOVA) انجام گرفت. مقایسه میانگین‌ها بر اساس آزمون دانکن در سطح اطمینان  $\alpha = 0/05$  صورت گرفت.

## نتایج

در طول دوره آزمایش مرگ و میری در بین ماهی‌های تحت تیمار پساب تصفیه‌شده کارخانه کاغذسازی پارس و گروه کنترل مشاهده نگردید؛ اما میل و رغبت ماهی‌های تحت تیمار پساب به سمت غذا کاهش یافت.

در این مطالعه سطح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز و کراتین فسفوکیناز در کبد ماهی های در معرض ۰/۵٪ و ۱٪ پساب به طور معنی داری ( $p < 0.05$ ) افزایش نشان داد. در حالی که سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در ماهی های تحت تیمار ۱٪ پساب تصفیه شده کارخانه کاغذسازی پارس به طور معنی داری ( $p < 0.05$ ) کمتر از سطح این آنزیم در کبد ماهی های گروه کنترل است. تماس ماهی ها با پساب تصفیه شده کارخانه کاغذسازی پارس سبب کاهش معنی دار ( $p < 0.05$ ) سطح آنزیم آکالین فسفاتاز و پروتئین کل بافت کبد گردید (جدول ۱).

جدول ۱. تغییر فاکتورهای بیوشیمیابی کبد ماهی کولی تحت تیمار پساب تصفیه شده کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان

فاکتورهای بیوشیمیابی کبد	گروه های مختلف آزمایشی		
	گروه کنترل	% پساب	% پساب
آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد بین المللی بر گرم پروتئین بافت)	$2/23 \pm 0/29$	$3/90 \pm 1/27^*$	$4/50 \pm 1/38^*$
آنزیم آلانین آمینوترانسفراز (واحد بین المللی بر گرم پروتئین بافت)	$0/66 \pm 0/10$	$0/59 \pm 0/15$	$0/43 \pm 0/09^*$
آنزیم لاکتات دهیدروژناز (واحد بین المللی بر گرم پروتئین بافت)	$2/74 \pm 0/61$	$2/49 \pm 0/58^*$	$2/82 \pm 0/77^*$
آنزیم آکالین فسفاتاز (واحد بین المللی بر گرم پروتئین بافت)	$13/14 \pm 1/85$	$6/72 \pm 2/29^*$	$8/80 \pm 2/97^*$
آنزیم کراتین فسفوکیناز (واحد بین المللی بر گرم پروتئین بافت)	$4/65 \pm 1/02$	$6/36 \pm 1/64^*$	$6/53 \pm 1/23^*$
پروتئین بافت (گرم بر دسی لیتر)	$9/58 \pm 1/26$	$7/86 \pm 1/60^*$	$7/75 \pm 1/45^*$

- اختلاف معنی دار بین گروه های مختلف آزمایشی با گروه کنترل با ستاره (\*) مشخص شده است.

## بحث

افزایش سطح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در کبد ماهی های تحت تیمار غلظت های مختلف پساب تصفیه شده، ممکن است حاکی از افزایش ترانس آمیناسیون و افزایش نرخ تجزیه پروتئین بافت کبد به منظور تأمین انرژی (تولید ATP) جهت مقابله با تأثیرات سمی ترکیبات بازمانده در پساب تصفیه شده باشد. افزایش فعالیت این آنزیم، نقش مؤثری در استفاده از اسیدهای آمینه در فرایند اکسیداسیون یا گلیکوژن بازی می کند (Murray *et al.*, 2003). افزایش سطح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در بافت کبد ماهی *Rutilus rutilus* و پلاسمای *Channa punctatus* کارخانه کاغذسازی گزارش شده است (Jeney *et al.*, 2002; Shahi *et al.*, 2013).

کاهش معنی دار سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در ماهی های در معرض بیشترین سطح پساب ممکن است نشان دهنده کاهش سطح سنتز این آنزیم و نیز افزایش نرخ مرگ سلولی باشد. زیرا در چنین شرایطی در اثر استرس پراکسیداسیون لیپیدی، ممکن است غشای سلولی از بین رفته و بخش اعظم آنزیم های درون سلولی آزاد شده و وارد خون با مایع بین سلولی گردد. از سوی دیگر در اثر مرگ سلول ها نیز ممکن است سطح سنتز آنزیم ها در بافت هدف کاهش چشمگیری یابد. کاهش سطح آکالین فسفاتاز ممکن است بیانگر آسیب وارد به سلول های مجاری صفو راوی باشد. تخریب سلول های مجاری صفو راوی می تواند دفع سوم از طریق صفرا را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این در حالی است که سطح آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز و آکالین فسفاتاز در بافت کبد ماهی

*C. punctatus* و در پلاسمای ماهی *R. rutilus* تحت تیمار آبهای آلوده به پساب کارخانه کاغذسازی به طور معنی‌داری افزایش یافته است (Jeney et al., 2002; Shahi et al., 2013).

افزایش سطح آنزیم لاکتات دهیدروژناز شاخصی از قرار داشتن موجود در شرایط استرس‌زا تلقی است. در چنین شرایطی تنفس هوایی سلولی به تنها ی نمی‌تواند نیاز سلول‌ها به انرژی جهت برقراری هموستازی و تعادل بیوشیمیایی سلولی را مرتفع نماید. به همین دلیل سلول تلاش می‌کند تا از طریق بی‌هوایی روند کاتabolیسم گلیکوژن و گلوکز را به سمت تشکیل لاکتات پیش برد تا از این طریق بخشی از نیاز خود را به انرژی تأمین کند. از این‌رو افزایش لاکتات زمینه را برای افزایش سطح فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز مهیا می‌کند. مشابه این تغییرات در بافت‌های مختلف ماهی‌های *A. mossulensis* نیز مشاهده شده است (Banaee et al., 2014).

افزایش سطح آنزیم کراتین‌فسفوکیناز در ماهی‌های تحت تیمار پساب تصفیه شده یکی دیگر از مکانیسم‌های تأمین انرژی از طریق فسفوریلاسیون کراتین و سنتز کراتین فسفات در پاسخ به افزایش انرژی خواهی سلولی در طی هموستازی است. کراتین‌فسفات نیز نقش بسزایی در سنتز مجدد مولکول پرانرژی آدنوزین تری‌فسفات از آدنوزین دی‌فسفات دارد (Murray et al., 2003).

کاهش سطح پروتئین کل بافت کبد در ماهی‌های تحت تیمار پساب تصفیه شده ممکن است نشان‌دهنده افزایش نرخ تجزیه پروتئین بافت کبد، کاهش نرخ تغذیه و حتی سوءتغذیه به دلیل کاهش کارایی سیستم گوارشی در هضم و بهره‌وری از مواد غذایی و پروتئینی جیره غذایی نیز باشد. کاهش سطح پروتئین بافت کبد در ماهی *C. punctatus* و *Oreochromis mossambicus* و *A. mossulensis* و پروتئین‌تام پلاسمای ماهی *R. rutilus* در مواجهه با آبهای آلوده به پساب کارخانه کاغذسازی و دیگر آلاینده‌ها مشاهده شده است (Jeney et al., 2002; Kumar et al., 2011; Shahi et al., 2013; Banaee et al., 2014).

استفاده از شاخص‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی در ماهی‌ها می‌تواند به عنوان یک شاخص زیستی در ارزیابی سلامت اکوسیستم و کیفیت آب مفید باشد. اگرچه ظاهرآ پساب تصفیه شده کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان قابل تخلیه به آبهای سطحی به نظر می‌رسد، اما نتایج این تحقیق نشان داد که ورود این پساب به آبهای سطحی می‌تواند سلامت آبزیان را به خطر اندازد.

## منابع

- Babaie, F., Chhar Soghi Amin, H., Faraj Pour, A., Maleki, A. 2008. Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of cellulose and pulp industry waste and different methods of treatment. Second Environmental Engineering Conference. (in Persian).
- Baer, K.N., Bankston, C.R., Mosadeghi, S., Schlenk, D. 2009. The effects of pulp and paper mill effluent on physiological and hematological endpoints in fingerling largemouth bass (*Micropterus salmoides*). Drug and Chemical Toxicology. 32(1): 59-67.
- Banaee, M., Sureda, A., Zohiery, F., Nematdoust Hagh, B., Garanzini, D.S. 2014. Alterations in biochemical parameters of the freshwater fish, *Alburnus mossulensis*, exposed to sub-lethal concentrations of Fenpropothrin. International Journal of Aquatic Biology. 2(2): 58-68.
- Jeney, Z., Tellervo-Valtonen, E., Jeney, G., Jokinen, E.L. 2002. Effect of pulp and paper mill effluent (BKME) on physiological parameters of roach, (*Rutilus rutilus*) infected by digenean *Rhipidocotyl fennica*. Folia Parasitologica. 49: 103-108.
- Johnson, A.M., Rohlfs, E.M., Silverman, L.M. 1999. Proteins. In: Burtis, C.A., Ashwood, E.R. (eds). Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3<sup>rd</sup> edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company; pp. 477-540.
- Kamiab Veskeh, A., Hasani, A.H. 2012. Assessment of performance of wastewater treatment systems of wood and paper mill industry of Iran, Chuka. First national conference on water and industrial wastewater treatment. (in Persian).
- Kumar, N., Antony Jesu Prabhu, P., Pal, A.K., Remya, S., Aklakur, M.d., Rana Subodh Gupta, R.S.,

- Raman, R.P., Jadhao, S.B. 2011. Anti-oxidative and immuno-hematological status of Tilapia (*Oreochromis mossambicus*) during acute toxicity test of endosulfan. Pesticide Biochemistry and Physiology. 99: 45-52.
- Malik, M.K., Kumar, P., Seth, R., Rishi, S. 2009. Genotoxic effect of paper mill effluent on chromosomes of fish *Channa punctatus*. Current World Environment. 4(2): 353-357.
- Mishra, A., Tripathi, C.P.M., Dwivedi, A.K., Dubey, V.K. 2011. Acute toxicity and behavioral response of freshwater fish, *Mystus vittatus* exposed to pulp mill effluent. Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 3(6): 167-172.
- Moss, D.V., Henderson, A.R. 1999. Clinical enzymology In: Burtis, C.A., Ashwood, E.R. (eds.). Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3<sup>rd</sup> edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company. pp. 617-721.
- Murray, R.K., Granner, D.K., Mayes, P.A., Rodwell, V.W. 2003. Harper's Illustrated Biochemistry, 26<sup>th</sup> edition. Lange Medical Books/McGraw-Hill (Medical Publishing Division). New York. 402 p.
- Pathan, T.S., Thatte, P.B., Shinde, S.E., Sonawane, D.L. 2010. Histopathological effects of paper mill effluent in liver and kidney of a fresh water fish, *Rasbora daniconius*. Research Journal of Biological Sciences. 5(5): 389-394.
- Pathan, T.S., Sonawane, D.L., Khillare, Y.K. 2009. Toxicity and behavioural changes in freshwater fish *Rasbora daniconius* Exposed to Paper Mill effluent. Journal of Biotechnology Research International. 2(4): 263-266.
- Sepúlveda, M.S., Quinn, B.P., Denslow, N.D., Holm, S.E., Gross, D.S. 2009. Effects of pulp and paper mill effluents on reproductive success of Largemouth Bass. Environmental Toxicology and Chemistry. 22(1): 205-213.
- Shahi, J., Chauhan, S., Singh, A. 2013. Effect of Kraft pulp and paper mill effluents (BKME) on the biochemical and hematological parameters of fish *channa punctatus*. World Journal of Fish and Marine Science. 5(5): 556-662.
- Tyor, A.K., Fulia, A., Sharma, R.K. 2012. Anomalies in *Cyprinus carpio* larvae exposed to papermill effluent. Journal of Biological Sciences. 12(5): 321-326.
- Ukagwu, J.I., Onuoha, G.U.C., Chude, L.A. 2012. Haematological changes in juvenile catfish (*Clarias gariepinus*) exposed to pulp and paper mill effluent under field condition in Imo River Owerrinta, Abia State. Nigerian Journal of Agriculture, Food and Environment. 8(1): 86-93.
- Zahrim, A.Y., Gilbert, M.L., Janaun, J. 2007. Treatment of pulp and paper mill effluent using Photo-fenton's process. Journal of Applied Science. 7(15): 2164-2167.