

ریخت‌شناسی گرده در گونه‌های (*Erodium* (L.) L'Hér (Geraniaceae) در ایران

مریم کشاورزی*، الهام تقی پور و زهرا ناظم بکایی

تهران، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

تاریخ پذیرش: ۹۴/۳/۲

تاریخ دریافت: ۹۳/۶/۱۳

چکیده

از تیره شمعدانی با حدود ۷۵ گونه‌ی علفی یکساله یا دو ساله در تمام قاره‌ها به جز قطب جنوب توزیع شده است. در این مطالعه ریخت‌شناسی دانه‌های گرده‌ی ۸ گونه از جنس *Erodium* در ایران با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) بررسی شده است. در مطالعه حاضر با بررسی ۱۴ صفت کمی و کیفی مشخص شد که کلیه دانه‌های گرده گونه‌های ارزیابی شده، منفرد، متقاضان، دوکی، کروی تا پهن - کروی هستند. از نظر وضعیت منفذ، دانه‌های گرده سه شیار- منفذی (Tricolporate) یا سه شیاری (Tricolporate) هستند. الگوی تزئینات در گونه‌های مورد بررسی از مشبک - مخطوط (reticulate striate or rugulate) تا مخطوط و جوانه دار (reticulate-gemmata or clavata) متغیر است. با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری چند متغیره بر روی داده‌های دانه‌های گرده می‌توان به روشنی گونه‌های مورد بررسی را از یکدیگر تفکیک نمود. برپایه مطالعات انجام شده بر روی دانه‌های گرده، نتایج گروه بندی با تقسیمات سطح زیر جنس تطابق دارد. به طور کلی می‌توان گفت صفات مربوط به دانه‌های گرده قادرند گونه‌های *Erodium* را در ایران به درستی از یکدیگر تفکیک نمایند.

واژه‌های کلیدی: Geraniaceae, *Erodium*, ریخت‌شناسی گرده، ایران

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۲۱۸۰۴۴۰۵۱، پست الکترونیکی: m.keshavarzi@alzahra.ac.ir

مقدمه

دانه‌های گرده گیاهان این تیره را مطالعه نمود (۴). Shehata و Verhoeven (۱۹۸۷)، Venter (۱۹۸۱)، (۱۵)، (۱۹۹۹)، (۱۰)، (۲۰۰۸)، (۱۲)، Gaiser و Perveen (۱۹۹۱)، (۱۴)، دانه‌های گرده تیره Stafforad و Blackmore (۱۹۹۱)، دانه‌های گرده شمعدانی را مورد بررسی قرار دادند. در این تیره نوع منفذ و تزئینات اگرین دارای ارزش تشخیصی در حد جنس است (۱۲).

Gaiser و Perveen (۱۹۹۹) دریافتند که دانه‌های گرده در تیره شمعدانی کروی - پهن و ندرتاً کروی - دوکی است. گونه‌های مورد مطالعه این محققان مشتمل بر *E. malacoides*، *E. oxyrrhynchum* و *E. laciniatum* (Cav.) Willd بود (۱۰).

تیره شمعدانی با ۵ جنس و ۷۵۰ گونه یکساله یا چند ساله در دنیا شناخته می‌شود (۸). *Erodium* (L.) L'Hér یکی از جنسهای طایفه Geranieae با پراکنش نسبتاً وسیع و ۱۵ گونه در ایران است (۳). Schonbeck-Temesy در فلورا ایرانیکا (۱۹۷۰) گونه‌های جنس *Erodium* در ایران را به دو بخش *Erodium* و *Plumosa* Boiss و چهار زیربخش و سه زیرگونه طبقه بندی می‌کند (۱۳). در طبقه بندی جدیدتر (جدول ۱) بر مبنای مطالعات (1990) *Erodium* دو زیرجنس *Plumosa* Boiss (Plumosa Boiss) و *Guittonneae* برای جنس *Erodium* پیشنهاد شد (۹). *Barbata* دانه‌های گرده در تیره شمعدانی دارای تنوع هستند (اوری پالینوس) (۷). Bortenschlager (1967) برای اولین بار

جدول ۱- طبقه‌بندی سطح زیر جنس *Erodium* برای گونه‌های حاضر در این بررسی، بر مبنای طبقه‌بندی Guittonneae (1990).

<i>Erodium</i> subg. <i>Erodium</i> (<i>Plumosa</i> Boiss)	
-	Sect. <i>Erodium</i>
-	Sect. <i>Oxyrrhynchea</i> El-Oqlah. <i>E. oxyrrhynchum</i> M.Bieb.
<i>Erodium</i> subg. <i>Barbata</i>	
-	Sect. <i>Absinthioidea</i> subsect. <i>Absinthioidea</i> <i>E. hoeffianum</i> C.A. Mey. <i>E. gruinum</i> (L.) L'Hér. <i>E. ciconium</i>
-	Sect. <i>Absinthioidea</i> subsect. <i>Petraea</i> Brumh.
-	Sect. <i>Malacoidea</i> <i>E. malacoides</i> (L.) Willd. <i>E. neuradifolium</i> Del. ex Godr.
-	Sect. <i>Cicutaria</i> <i>E. cicutarium</i> <i>E. moschatum</i> (L.) L'Hér.

مواد و روشها

نمونه‌های مورد استفاده در این بررسی از جمعیت‌های طبیعی و نمونه‌های هرباریومی دانشگاه الزهرا (س) بدست آمد (جدول ۲). در تحقیق حاضر ۷ گونه از زیر جنس *Barbata* Boiss. و تنها یک گونه از زیر جنس *E. oxyrhynchum* *Erodium* (*Plumosa* Boiss) بررسی شده‌اند.

مشاهدات با استفاده از میکروسکوپ نوری دوربین دار Olympus Dp12 بدون استولیز انجام شد. اندازه گیری‌ها بر مبنای حداقل ۲۰ عدد دانه گرده برای یک تا دو جمعیت از هر گونه بود. برای مطالعات میکروسکوپ الکترونی دانه‌ای گرده در یک قطره آب شناور شدند و با پیتی ظرفی مستقیماً به روی استتاب فلزی واحد نوار چسب دوطرفه Sputter Coater منتقل شدند. سپس نمونه‌ها با استفاده از BAL-TEC, SCDOOS پوشش دهی شدند. عکسبرداری الکترونی با کمک میکروسکوپ نگاره از نوع Philips XL30 انجام شد.

به منظور انجام تاکسونومی عددی، ۱۴ صفت کمی و کیفی (جدول ۳) مورد اندازه گیری و ارزیابی واقع شدند. برای تعیین شکل دانه گرده از نسبت بین طول محور قطبی به

Shehata (۲۰۰۸) به بررسی ریخت‌شناسی دانه‌های گرده در گونه‌های تیره شمعدانی در کشور مصر پرداخت و ارزش تاکسونومیکی آنها را مشخص ساخت. گونه‌های بررسی شده مربوط به جنس *Erodium* شامل *E. crassifolium* L Hér *E. ciconium* *E. cicutarium* *E. laciniatum* *E. gruinum* ، *glaucophyllum* (L.)Hér است که اکثر آنها غیر *E. moschatum* و *E. malacoides* از گونه‌های *E. crassifolium* و *E. glaucophyllum* در مطالعه حاضر نیز وجود دارند. وی *E. laciniatum* مشخص ساخت که جبهه در این تیره مخطط - مشبک (Reticulate- striate) است که جبهه دارای (Reticulate) یا مشبک (reticulate) خصوصیات کلید شناسایی برای این تیره تدوین نمود. او نهایتاً مشخص ساخت که صفاتی چون شکل گرده، اندازه و خصوصیات منافذ و تریئنات اگزین در سطح جنس و گونه دارای ارزش تشخیصی است (۱۲). Aedo و همکاران (۲۰۰۷) از صفات گرده شناسی و ریخت‌شناسی برای مطالعه روی جنس *Geranium* L استفاده نمودند (۳). هدف از این بررسی تعیین ارزش تشخیصی خصوصیات ریخت‌شناسی دانه‌های گرده در برخی از گونه‌های *Erodium* در ایران می‌باشد.

ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی (PCA) استفاده شد. در این روش متوسط صفات کمی مورد استفاده قرار گرفت و صفات کیفی به صورت دو یا چند حالته کد گذاری شد.

طول محور استوایی بر مبنای Erdtman (1943) استفاده شد (۶). برای واژه‌های مربوط به دانه‌های گرده از Punt و همکاران (1994) پیروی شد (۱۱).

به منظور تعیین روابط بین گونه‌های مورد بررسی، از روش‌های تجزیه و تحلیل چند متغیره شامل تجزیه خوش

جدول ۲- لیست گیاهان مورد مطالعه به همراه مشخصات واحدهای جمعیتی آنها

شماره هرباریومی	ارتفاع از سطح دریا (متر)	نشانی و نام جمع آوری کننده	نام تاکسون
۹۱۱	۱۴۳۹ m	تهران، ونک، نجفیان- تقی پور.	
۹۱۸	۱۲۷۰ m	تهران، باغ گیاهشناسی، تقی پور.	<i>Erodium cicutarium</i> L'Hér.
۹۱۳	۱۲۷۰ m	تهران، باغ گیاهشناسی، تقی پور.	
۹۱۹	۱۲۶۱ m	تهران، پیکان شهر، تقی پور.	<i>E. ciconium</i> (L. & Jusl.) L'Hér.
۹۱۲	۱۲۶۱ m	تهران، پیکان شهر، تقی پور.	<i>E.oxyrrhynchum</i> M.Bieb
۹۰۲	۸۵۲ m	فارس، کازرون، بهتاش.	
۹۲۷	۹۲۰ m	کرمانشاه، گیلانغرب، ویژنان، نجفیان.	<i>E.malacoides</i> (L.) Willd.
۸۵۱	۷۷ m	خراسان، هفت تپه، کشاورزی.	
۹۲۱۱	۹۵۷ m	کرمانشاه، گیلانغرب، نیان و قیلان، نجفیان.	<i>E.moschatum</i> (L.) L'Hér
۸۲۴	۷۹۹ m	قم، دریاچه حوض سلطان، کاظم زاده.	<i>E.neuradifolium</i> Del. ex Godr
۹۲۱۵	۱۸۹۷ m	البرز، کرج، کندر، تقی پور.	<i>E.hoefftianum</i> A. Mey
۹۲۶	۹۱۵ m	کرمانشاه، گیلانغرب، ویژنان، نجفیان.	<i>E.gruinum</i> (L.) L'Hér

جدول ۳- صفات کمی و کیفی مورد ارزیابی در دانه‌های گرده.

صفات کمی	طول محور استوایی
	طول محور قطبی
نسبت طول محور قطبی به استوایی e/p	
طول مزوکلپیوم (فضای بین دو شیار در منظر استوایی)	
طول آپوکلپیوم (فضای بین دو شیار در منظر قطبی)	طول شیار
	قطر متوسط لومن
	قطر متوسط موری
	عرض شیار
	تعداد منفذ

حالات صفت	صفات کیفی
مثلثی (۱)، کروی (۰)	شکل دانه گرده در منظر قطبی
تقریباً پهن شده در قطبین (۰)، نیمه کروی (۱)، بیضوی-کروی (۲)، کروی (۳)، کروی-دوکی (۴)	شکل دانه گرده در منظر استوایی
صف (۰)، دارای تزئینات چماقی شکل (۱) (clavate)	سطح موری
مشبک- مخطط موازی یا ناموازی (۰) مشبک- با برجستگی های کروی یا چماقی (۱) مشبک - مخطط موازی (۲) مشبک - دارای برجستگی های کروی (۳) مشبک - مخطط ناموازی (۴)	الگوی تزئینات

سه شیار- منفذی هستند. تفاوت‌های اصلی در تزئینات سطح اگرین مشخص تر می‌باشد.

در بررسی های به عمل آمده و با کاربرد روش های آماری چند متغیره به منظور تعیین میزان دوری و نزدیکی بین گونه های مورد بررسی، تجزیه خوشه ای به روش WARD، بر اساس صفات ریختی صورت گرفت و فنورگرام مربوط به آن رسم شد(شکل ۳).

مشاهده شد که بر اساس خصوصیات گرده شناسی دناروگرام حاصل شامل دو خوشه اصلی ۱ و ۲ است که خوشه اصلی ۱ به دو زیرخوشه ۳ و ۴ تقسیم می‌شود که این زیرخوشه ها خود به زیرخوشه های دیگر تقسیم می‌شوند. در خوشه اصلی ۱ گونه های *E. malacoides* و *E. moschatum* در زیر خوشه ۳ نزدیک به هم و گونه های *E. neuradifolium* و *E. cicutarium* و *E. ciconium* و *E. hoefftianum* و ۶ نزدیک به یکدیگر قرار دارند. گونه *E. ciconium* از زیرخوشه ۵، در فاصله ۲ مشابه با گونه های *E. hoefftianum* و *E. cicutarium* از زیرخوشه ۶ است و گونه *E. neuradifolium* از زیرخوشه ۴، در فاصله ۵ مشابه

در تجزیه و تحلیل از متغیرهای استاندارد شده بهره گرفته شد. فاصله متوسط تاکسونومیکی و مربع فاصله اقلیدسی به عنوان ضریب عدم شباهت در ارزیابی صفات مورد توجه واقع شد. تجزیه و تحلیل های آماری با کمک نرم افزار SPSS ver. 18 صورت گرفت.


نتایج

دانه های گرده در تمام گونه های مورد بررسی متقارن، دوکی، کروی تا پهن - کروی بودند. دانه های گرده سه شیار- منفذی اند. الگوی تزئینات در گونه های مورد بررسی از مشبک - مخطط تا مخطط و جوانه دار متغیر بود (شکل های ۱ و ۲، جدول ۴).

اطلاعات حاصل از بررسی دانه های گرده به صورت تفصیلی در جدول ۳ آمده است. ویژگیهای عمومی دانه های گرده ای در ۸ گونه مورد بررسی از *Erodium* عبارتند از: دانه های گرده جور قطب، با اندازه ای بزرگ (۱۰۰-۵۱ میکرون) تا خیلی بزرگ (>۱۰۰)، شکل گرده ها در منظر قطبی حد بواسطه کروی تا سه گوش و در منظر استوایی کروی تا چهارگوش و گاهی کمی لوب دار. منافذ گرده

در خوشه اصلی ۲ نیز گونه های *E. oxyrrhynchum* و *E. gruinum* قرار دارند.

گونه های *E. hoeftianum* و *E. cicutarium* و *E. ciconium* از زیرخوشه های ۵ و ۶ می باشد. همچنین





شکل ۱ تصویر میکروسکوپ نوری برخی گونه های مورد مطالعه جنس *Erodium* نمای قطبی و *B* و *G* نمای استوایی. (A) . (*E. (A,C,D,E,F,H .Erodium* .*E. neuradifolium* (F) . *E. malacoides*(E) . *E. cicutarium* (D) . *E. cicutarium* (C) . *E. ciconium* (B) .*ciconium* .*E. oxyrrhynchum* (H) . *E. oxyrrhynchum* (G)

جدول ۴- صفات کمی و کیفی دانه گرده مورود استفاده در برخی گونه های جشن *Erodium* در ایران


نام و نام علمی		گونه		توصیف		مکانیزم انتقال		جهات پراکنش		پیشنهاد شرایط ایجاد	
ردیف	نام	نام علمی	نام	جنس	گونه	مقدار	مکان	جهات	جهات	جهات	جهات
۱۱۴	نکوند	<i>Erodium ciconium</i>	نکوند	مشک	-	مشک - مخطط موازی	مشک - مخطط موازی با	مشک -	مشک -	مشک -	مشک -
۱۱۵	نکوند	<i>E. cicutarium</i>	نکوند	مشک	-	مشک - مخطط موازی	مشک - مخطط موازی با	مشک -	مشک -	مشک -	مشک -
۱۱۶	نکوند	<i>E. oxyrhynchum</i> subsp. <i>oxyrhynchum</i>	نکوند	مشک	-	مشک - مخطط موازی	مشک - مخطط موازی با	مشک -	مشک -	مشک -	مشک -
۱۱۷	نکوند	<i>E. oxyrhynchum</i> subsp. <i>axillare</i>	نکوند	مشک	-	مشک - مخطط موازی	مشک - مخطط موازی با	مشک -	مشک -	مشک -	مشک -
۱۱۸	نکوند	<i>E. malacoides</i>	نکوند	مشک	-	مشک - مخطط موازی	مشک - مخطط موازی با	مشک -	مشک -	مشک -	مشک -
۱۱۹	نکوند	<i>E. neurolifolium</i>	نکوند	مشک	-	مشک - مخطط موازی	مشک - مخطط موازی با	مشک -	مشک -	مشک -	مشک -
۱۲۰	نکوند	<i>E. moschatum</i>	نکوند	مشک	-	مشک - مخطط موازی	مشک - مخطط موازی با	مشک -	مشک -	مشک -	مشک -
۱۲۱	نکوند	<i>E. graminum</i>	نکوند	مشک	-	مشک - مخطط موازی	مشک - مخطط موازی با	مشک -	مشک -	مشک -	مشک -

* مبنظر در تبیه گرده ای است که در بخش بحث مقاله تشخیص داده شده است.






شکل ۲- عکس الکترونی گونه های مورد بررسی *Erodium* به ترتیب ستون اول سمت چپ نمای قطبی، ستون وسط الگوی تریئنات سطحی و *E. malacoides* (J-L) *E. oxyrrhynchum* (G-I) *E. ciconium* (D-F) *E. cicutarium* (A-C) *E. hoefftianum* (V-X) *E. gruinum* (S-U) (P-R) *E. neuradifolium* (M-O) ستون سمت راست نمای استوایی:



شکل ۳- نمودار خوش بندی به روشن Ward بر اساس صفات گرده گونه های *Erodium*



شکل ۴- نمودار PCA برای گونه‌های مورد بررسی *Erodium* بر اساس داده‌های گرده شناسی

علاوه بر ویژگی‌هایی که در بخش نتایج برای دانه‌های گرده مورد بررسی ذکر شد، دو تیپ تزئینات سطح اگزین مشبک مخطط موازی (reticulate striate) یا دارای خطوط (Heterobrochate –reticulate- rugulate) و شبکه نامنظم (reticulate-gemmata or clavata) تعیین شد که با نیز بر جستگی‌های چماقی و کروی روی بستر مشبک (El oqlah ۱۹۸۳) در خصوص ریخت شناسی مطالعات *Erodium* در پاکستان تطابق دارد. در بررسی دانه گرده جنس *Erodium* در خاورمیانه و نیز بررسی های گرده شناسی Parveen-Gaiser (۱۹۹۹) درباره برخی از گونه‌های *Erodium* در پاکستان تطابق دارد. در بررسی آنها ویژگی عمومی دانه‌های گرده تیره شمعدانی که شامل جنس *Erodium* نیز می‌شود قید شده است. این صفات مشتمل بر وجود تقارن شعاعی، جور قطبی، شکل بیضوی – کروی، وجود سه شیار-منفذی، کولپ کوچک با جبه مشبک یا مخطط می‌باشند. از جمله صفات بررسی شده شکل دانه‌های گرده است که در مطالعه Parveen-Gaiser (۱۹۹۹) در مورد گونه‌های مشابه با گونه‌های ایران

نمودار PCA نیز بر اساس داده‌های گرده شناسی و فاکتور اول و دوم و سوم رسم شد (شکل ۴). فاکتور اول که ۵۵٪ از کل میزان تنوع را نشان می‌دهد صفاتی مانند طول محور قطبی، طول محور استوایی، عرض شیار منفذ و ضخامت دیواره متغیر ترین صفات هستند و در فاکتور دوم که ۲۲٪ از کل تنوع را به خود اختصاص داده است نسبت طول محور قطبی به استوایی بالاترین ضریب تغییرات را دارد و در فاکتور سوم با ۱۵٪ از کل تنوع، نوع تزئینات سطح بالاترین تنوع را نشان می‌دهد. در نمودار رسته بندی، گونه‌ها به روشنی از یکدیگر جدا شدند. دو گونه‌ی *E. gruinum* و *E. oxyrrhynchum* موقعیت جدا گانه‌ای را احراز کرده‌اند.

بحث

در این پژوهش که برای اولین بار در ایران انجام گرفت،

شامل گونه‌های *E. cicutarium*، *Erodium ciconium*،
E. gruinum، *E. neuradifolium*، *E. malacoides*
E. hoefftianum، *E. moschatum*

شكل: کروی، تقریباً پهن در قطبین، نیمه کروی، کروی -
 بیضوی

تزئینات اگزین گرده: در این گونه‌ها اگزین مشبك و
 موری‌ها دارای سطح صاف هستند و آرایش آنها در برخی
 نقاط به صورت موازی و یا نامنظم بوده و تزئینات از نوع
 ناجورشیکه هستند. کولپوره‌ها کوچک (brevicorporate)
 و دارای تزئینات یکنواخت و غشای منفذ صاف هستند.

تیپ ۲ - دارای تزئینات کروی یا چماقی (-Reticulate-) یا
 (gemmate or clavate) بر روی بستر مشبك

Erodium subsp. *oxyrrhynchum*
oxyrrhynchum

شكل: دوکی - کروی (Prolate-spheroidal)

تزئینات اگزین: در این گونه اگزین مشبك و موری‌ها
 دارای برجستگی‌های چماقی شکل و کروی با قطر بیش از
 یک میکرون که در اندازه‌ی آنها در همه جا یکسان نیست
 می‌باشد.

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و دندروگرام‌های
 بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که جدایی گونه
E. oxyrrhynchum از سایر گونه‌ها به دلیل تعلق این
 گونه به زیرجنس مجزای (*plumosa* Boiss) *Erodium* است. لازم به ذکر است که گونه *E. gruinum* هرچند
 متعلق به زیرجنس *Barbata* است لیکن به دلیل تفاوت
 فاحش در برخی صفات از جمله اندازه گرده خیلی بزرگ
 و همچنین تفاوت در فاصله آپوکلپیوم، مزوکلپیوم، قطر
 لومن، ضخامت شیار و عرض شیار-منفذ موقعیتی مجزا از
 سایر گونه‌های زیر جنس مخصوص به خود را احرار
 نموده است.

مشتمل بر *E. cicutarium*، *E. malacoides* و *E. oxyrrhynchum* به صورت کروی - دوکی تا ندرتاً
 تقریباً پهن در قطبین ذکر شده که مشابه نتایج حاصل از
 این تحقیق (جدول ۴) می‌باشد. صفات مورد استفاده در
 ارزیابی دانه‌های گرده پیشتر توسط قرشی الحسني (۱۳۷۵)
 در مطالعه چند گونه از خانواده گاوزبان و پاکروان
 و همکاران (۱۳۸۹) در مورد گونه‌های آلاله به کار رفته
 بود. با توجه به مطالعه Shehata (۲۰۰۸) در مورد گونه‌های
Erodium در مصر، ویژگی عمومی گونه‌های *E. gruinum*، *E. ciconium*، *E. cicutarium*،
E. moschatum و *E. malacoides* (که در لیست گونه‌های مورد بررسی ایران نیز هست) حاکی از وجود شکل
 کروی - دوکی و تزئینات اگزین مشبك - مخطط موازی و
 نیز سه شیارمنفذ در تمام گونه‌ها است که این خصوصیات
 با نتایج حاصل از بررسی حاضر (جدول ۴) تطابق دارند.

در توافق با مطالعات پیشین مشتمل بر بررسی‌های (2008) در خصوص گونه‌های *Erodium* در مصر، در Shehata تزئینات سطح اگزین دانه‌های گرده است. البته برخلاف نظر آنها که تنها یک تیپ گرده برای جنس *Erodium* در نظر گرفته‌اند، در بررسی حاضر دو تیپ گرده کاملاً متفاوت از نظر تزئینات سطحی قابل تشخیص است که نمی‌توان از تفاوت آنها چشم پوشی کرد. این تزئینات متفاوت در نهایت در تجزیه و تحلیل‌های آماری انجام شده منجر به جدایی گونه‌ها به شکلی گردید که با طبقه‌بندی فروجنس مطابقت نشان می‌دهد.

در این مطالعه بر اساس تزئینات سطحی دانه گرده دو تیپ مشخص گردید:

تیپ ۱ - دارای تزئینات مشبك - مخطط موازی یا دارای خطوط و شبکه نامنظم (Reticulate- Heterobrochate) (striate or regulate

نتیجه گیری

برپایه مطالعات انجام شده، برای اولین بار روی گونه های *Erodium* در ایران، داده های گرده شناسی حاضر در این مطالعه تقریبا با تقسیمات زیر جنس تطابق دارد، به استثناء گونه *E. gruinum* که به دلیل تفاوت در برخی صفات از جمله دارا بودن اندازه بسیار بزرگ دانه گرده در مقایسه با سایر گونه های متعلق به زیر جنس *Barbata* و نیز داشتن مقادیر بیشتر در صفات فاصله آپوکلپیوم، مزوکلپیوم، قطر لومن، ضخامت شیار و عرض کولپوره، از سایر گونه های هم زیر جنس خود جدا افتاده است. با این حال، به طور کلی می توان گفت صفات گرده ای توانستند تا حدودی گونه های *Erodium* ایران را به درستی از هم تفکیک کنند.

همچنین در نمودار خوش بندی به روش Ward بر اساس صفات گرده گونه *Erodium* مشاهده می شود که دو خوش اصلی ایجاد شده منطبق با طبقه بندی زیر جنس های *Guittonneae* (۱۹۹۰) و نیز با طبقه بندی بخش های *Schonbeck-Temesy* (۱۹۷۰) می باشد، به این صورت که ۶ گونه از ۷ گونه ای متعلق به زیر جنس *Barbata* (بخش *Erodium*)، از تنها گونه مورد بررسی متعلق به زیر جنس *E. oxyrrhynchum* (*Plumosa*) یعنی *Erodium* فاصله ۲۵ جدا شده اند. لذا با توجه به موقعیت جداگانه *E. oxyrrhynchum* نسبت به سایر گونه های مورد بررسی، نتایج دنдрوگرام در تأیید تقسیم بندی فروجنس در *Erodium* می باشد. گونه *E. gruinum* از زیر بخش *Gruina* متعلق به بخش *Erodium* استثنایا در فاصله نزدیکی در حدود ۹ با *E. oxyrrhynchum* در یک زیر خوشی قرار گرفته است که البته این فاصله بسیار بیشتر از فاصله گونه های نزدیک به هم دیگر در سایر زیر خوشی ها است.

منابع

- ۱- جانلی قربان، م. ۱۳۸۴. فلور ایران تیره شمعدانی (Geraniaceae). جلد ۶۲، چاپ اول، ۱۳۶ ص، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران.
- ۲- قرشی الحسینی، ج. ۱۳۷۵. مطالعه ریخت شناسی گرده های چند گونه از خانواده گاوزبان در خراسان. مجله زیست شناس ایران، ۱۲(۱): ۱۵۰-۱۳۶.
- ۳- Aedo, C., Garcia, M., Maria, A. L., Aldasoro, J. and Navarro, C. (2007). Taxonomy revision of *Geranium* Subsect. *Mediterranea* (Geraniaceae). Systematic Botany, 32(1): 93-128.
- ۴- Bortenschlager, S. (1967). Vorläufige Mitteilungen zur Pollen morphologie in der Familie der Geraniaceae und ihre systematische Bedeutung. Grana Palynol, 7: 400-468.
- ۵- El-Oqlah, A. A. (1983). Pollen morphology of the genus *Erodium* L' Herit. in the Middle East. Pollen et Spores, 25: 383-394.
- ۶- Erdtman, G. (1943). An Introduction to Pollen Analysis. (A new series of plant science books, vol. 12). Waltham, Mass.: Chronica Botany Company. p. 239. 2nd ed. (1992) edited by Siwert Nilsson and Joseph Praglowski. Copenhagen, Munksgaard.
- ۷- Fiz, O., Vargas, P., Alarcon, M. and Aldasoro, J. J. (2006). Phylogenetic relationships and evolution in *Erodium* (Geraniaceae) based on trnL-trnF sequences. Systematic Botany, 31: 739-763.
- ۸- Guittenneau, G. G. (1990). Taxonomy, Ecology and Phylogeny of genus *Erodium* L' Her. in the Mediterranean region. Pp. 71-91 in Proceedings of the International Geraniaceae Symposium, (ed.) Vorster, P. Stellenbosch, South Africa: Univ. Stellenbosch.

- 11- Perveen, A. and Gaiser, M. (1999). Pollen Flora of Pakistan -XV Geraniaceae. Turk. Journal of Botany, 23: 263-269.
- 12- Punt, W., Blackmore, S., Nilsson, S. and Thomas, L. E. (1994). Glossary of Pollen and Spore terminology. Lab. Paleobot. Palynol., 10: 39-60.
- 13- Shehata, A. A. (2008). Pollen Morphology of Egyptian Geraniaceae: An Assessment of Taxonomic Value. International Journal of Botany, 4(1): 67- 76.
- 14- Schonbeck - Temesy, E. (1970). Geraniaceae, in: Flora Iranica, Rechinger, K.H. (ed.), Vol 69, 30-58, Akad.Druck- und Verlagsanstalt.
- 15- Stafford, P. J. and Blackmore, S. (1991). The Northwest European pollen flora, 46. Geraniaceae. Review of Palaeobotany and Palynology, 69: 49- 78.
- 16- Verhoeven, R.L. and H.J.T. Venter, (1986). Pollen morphology of *Erodium* in South Africa. South Africa Journal of Botany, 53 (4): 279-283.

Pollen Morphology in *Erodium* (L.) l'Hér (Geraniaceae) species in Iran

Keshavarzi M. and Taghipour E. and Nazem Bokae Z.

Biology Dept., Faculty of Science, Alzahra University, Tehran, I.R. of Iran

Abstract

Erodium is a genus of Geraniaceae with about 75 annual and biennial species which are distributed in almost all continents except Antarctica. In this project pollen morphology of 8 *Erodium* species of Iran investigated by light and scanning electron microscope. 14 qualitative and quantitative features considered. All studied species showed monad, isopolar, prolate, spheroidal to oblate – spheroidal pollen grains with tricolporate apertures. Exine sculpture was of reticulate – striate to striate and gemmate types. Multivariate statistical analysis revealed the diagnostic value of pollen morphological features in species separation. Based on present study on pollen morphology, grouping result is in concordance with sub-generic classification. Pollen features are capable of Species separation in *Erdodium* species of Iran.

Key words: *Erodium*, Geraniaceae, Iran, Pollen Morphology.