

## مطالعهٔ تشریحی دو گونهٔ تنگرس و *Rhamnus cathartica* L. از تیرهٔ عناییان در شمال ایران

سامانهٔ مهدی یانی<sup>۱</sup>، علی ستاریان<sup>۲\*</sup>، میثم حبیبی<sup>۳</sup> و طیبه امینی<sup>۴</sup>

دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ / پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

<sup>۱</sup>گروه زیست‌شناسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

<sup>۲</sup>دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

<sup>۳</sup>دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

<sup>۴</sup>مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نوشهر، نوشهر

مسئول مکاتبات: sattarian@gonbad.ac.ir

**چکیده.** جنس تنگرس *Rhamnus* L. از تیرهٔ عناییان است و تاکنون هشت گونه از تنگرس در ایران گزارش شده است. در این تحقیق ساختار تشریحی برگ، اپiderم، دمبرگ و شاخه‌های جوان نه جمعیت از دو گونه *Rhamnus cathartica* و *Rhamnus pallasii* با استفاده از نمونه‌های جمع‌آوری شده از طبعت در مناطق مختلف شمال ایران و نمونه‌های هرbarیومی تحت بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سلول‌های اپiderمی برگ در دو شکل چندوجهی و نامنظم وجود دارند. الگوی دیواره آنتی-کلینالی راست تا کمانی و موج دار بودند. در هر دو گونه هر دو سطح برگ دارای تیپ روزنه‌ای آنوموسيتیک و دو زیر گونه *R. pallasii* و *R. pallasii* subsp. *sintenisii* دو نوع تیپ روزنه آنوموسيتیک و پاراسیتیک مشاهده شد. صفات شکل سطح مقطع، نوع کرک، تعداد لایه‌های کلانتیم و پارانشیم در برگ و دمبرگ و شاخه جوان در بین تاکسون‌های تحت بررسی بسیار مشابه است. در مجموع مطالعات تشریحی انجام شده، تشابه این تاکسون‌ها را در صفات آناتومی نشان می‌دهد.

**واژه‌های کلیدی.** ساختار تشریحی، روزنه، آنوموسيتیک، پاراسیتیک، ایران

## An anatomical study of *Rhamnus cathartica* L. and *Rhamnus pallasii* Fisch. & C.A.Mey. (Rhamnaceae) in north of Iran

Received 06.01.2016/ Accepted 05.03.2016

Samaneh Mahdiyani<sup>1</sup>, Ali Sattarian<sup>2\*</sup>, Meisam Habibi<sup>3</sup> and Tayebeh Amini<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Department of Biology, Faculty of Science, University of Gonbad-e- Kavous, Gonbad-e- Kavous, Iran

<sup>2</sup>Department of Natural Resources, University of Gonbad-e- Kavous, Gonbad-e- Kavous, Iran

<sup>3</sup>Department of Biology, Faculty of Science, University of Gonbad-e- Kavous, Gonbad-e- Kavous, Iran

<sup>4</sup>Noushahr Research Center of Agriculture and Environment, Noushahr, Iran

Correspondent author: sattarian@gonbad.ac.ir

**Abstract.** *Rhamnus* L. is the genus of Rhamnaceae in Iran with nearly eight species. These species are used as valuable shrubs. This research was carried out in order to investigate the anatomical leaf. Samples from nine populations of *Rhamnus pallasii* and *Rhamnus cathartica* were taken. Treatment specimen cover various habitats from north of Iran, moreover herbarium samples were taken into account. The results presented two forms of epidermal cells such as Polygonal and irregular cells in addition, waved and straight anti-clinical walls were observed in *R. pallasii* subsp. *pallasii* and *R. pallasii* subsp. *sintensis*. Two types of stomata were demonstrated like anemocytic and parasitic in two main species. Some characters e.g. trichome, parenchyma, collenchyma layers were determined to finding some similarity among treatment specimen.

**Keywords.** anatomical study, stomata, anemocytic, paracytic, Iran

گونه‌ها برخوردار است (Cutler, 1978; Metcalfe & Chalk, 1979; Azizian, 1996) ریخت‌شناسی جزو نخستین و پرکاربردترین نشان‌گرهایی هستند که از دیرباز در کانون توجه گیاه‌شناسان بوده‌اند که در این میان صفات ریختی برگ دارای جایگاه ویژه‌ای در رده‌بندی گیاهان است (Wang et al., 2001). یکی از صفات برگ که در رده‌بندی گیاهان مورد توجه قرار می‌گیرد، روزنها هستند (Miskin et al., 1972). محققان معتقدند که تعداد و تراکم روزنها در واحد سطح در بین جنس‌ها، گونه‌ها و واریته‌ها دارای تفاوت و قابل بررسی و مطالعه است. تیپ روزنه بر اساس تعداد سلول‌های همراه اطراف آن مشخص می‌شود که این سلول‌ها نقش بسیار موثری در باز و بسته شدن روزنها دارد (Oyeleke et al., 2004). قرارگیری روزنه نسبت به سلول‌های همراه، از دیگر موارد همسان شدن با شرایط اکولوژیک است (Cutler, 1982). از طرفی در بررسی تفاوت بین گونه‌ها قابل بررسی هستند (Blunden & Jewers, 1973). از دیگر صفات مهم در تاکسونومی گیاهان، کرک‌های سطح برگ و دمبرگ است (Dennert, 1884). کرک‌ها اجزای مهمی در برابر تنش‌های محيطی، از قبیل خشکی و تابش اشعه‌های مضر هستند که می‌توان از ساختار و نوع آن‌ها در مطالعات تاکسونومی نیز استفاده کرد (Agrawal & Fishbein, 2006). این درحالی است که مطالعات ساختار تشریحی در مورد جنس *Rhamnus* انجام نشده و فقط تعداد محدودی از گونه‌ها و جنس‌های تیره عنبیان بررسی شده‌اند. بنابراین، هدف از این تحقیق مطالعه مقایسه‌ای صفات تشریحی آرایه‌های فروگونه‌ای در دو گونه نامبرده است.

## مواد و روش‌ها

بررسی‌های تشریحی بر روی ۹ جمعیت از دو گونه *R. pallasii* و *R. cathartica* انجام گرفت. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری از رویشگاه‌های طبیعی در هرباریوم داشتگاه گبدکاووس (GKUH) نگهداری شدند. از نمونه‌های موجود در هرباریوم ایستگاه تحقیقات اکولوژیک نوشهر نیز جهت مطالعه استفاده

جنس تنگرس *Rhamnus* L. یکی از بزرگ‌ترین جنس‌های تیره عنبیان (Rhamnaceae) است. این جنس تقریباً شامل ۱۰۰–۱۲۵ گونه است که به‌ویژه در نواحی معتدل و نیمه‌حاره‌ای نیم‌کره شمالی پراکنش دارند (Kurylo, 2007). گونه‌های این جنس از لحاظ شکل رویشی به صورت درختی یا درختچه‌ای خاردار و به‌ندرت علفی است. بررسی منابع فلورهای ایران از اختلاف نظر میان گیاه‌شناسان در تعیین روابط بین گونه‌ای و تعداد گونه‌های این تاکسون است؛ به‌طوری‌که در فلورا اورینتالیس (فلور شرق) این جنس را در ۲۵ گونه (۵ گونه برای ایران)، (Boissier, 1872)، در فلور شوروی این جنس در ۱۹ گونه (۵ گونه در ایران)، (Shishkin & Bobrov, 1974)، در Browicz & Zielinski, 1977 مجموعه فلورا ایرانیکا در ۶ گونه و یک واریته (Zielinski, 1977) و در فلور ایران در ۸ گونه (صوفیان و دیناروند، ۱۳۸۶) طبقه‌بندی کرده‌اند. در گونه‌های *Rhamnus* اختلاف بین گونه‌ها اغلب جزئی و تشخیص آنها مشکل است. گونه‌ها اغلب شیوه هم و تفاوت آن‌ها در ابعاد برگ‌ها، شکل و تراکم کرک‌ها است. از میان گونه‌های این جنس *R. pallasii* Fisch. & C.A.Mey. و *cathartica* L. پراکنش جغرافیایی وسیع و تنوع درون گونه‌ای پیچیده‌ای در ایران دارند که دو واریته برای گونه *R. cathartica* شامل *R. cathartica* var. *cathartica* و *R. pallasii* var. *caucasica* Kusn., Bull. شامل *R. pallasii* subsp. *R. pallasii* subsp. *pallasii* و *R. sintenisii* (Rech. f.) Browicz & J. Zielinski. *pallasii* subsp. *iranica* (Hausskn, in Bornm.) در مجموعه فلور ایران و فلور ایرانیکا تشخیص داده شده است. *R. pallasii* subsp. *sintenisii* در فلور شوروی به عنوان گونه‌ای مجزا ذکر شد و *R. pallasii* subsp. *iranica* این‌حصاری ایران می‌باشد. همچنین در فلور ایران و فلور ایرانیکا به هیبرید *R. spathulifolia* × *R. cathartica* ماحصل دو گونه مذکور است (صوفیان و دیناروند، ۱۳۸۶؛ Browicz & Zielinski, 1977). صفات مربوط به ساختار تشریحی گیاهان از اهمیت زیادی در رده‌بندی و جداسازی

۷۲ ساعت در محلول کاربونی (الکل اتیلیک و اسید استیک گلاسیال به نسبت ۳ به ۱) قرار گرفتند. از نمونه‌های تثیت شده برش‌های بسیار نازک از مقطع عرضی به روش دستی با تیغ تهیه شد؛ سپس نمونه‌های برش خورده پس از شفاف‌سازی با محلول هیپوکلریت سدیم با روش رنگ آمیزی مضاعف کارمن زاجی و سبز متیل رنگ آمیزی شدنده و سپس اسلامیدهای تهیه شده مربوط به مطالعات اپیدرمی و آناتومی با میکروسکوپ نوری Nikon مدل E100 با دوربین دیجیتال Canon (مدل 63a و ۸ مگا-پیکسل) عکس برداری شدند و برای اندازه گیری صفات از نرم-افزار MINITAB 14، Image Tools ver 3.0، Axio vision Rel. 4.8 استفاده شد.

گردید (جدول ۱). شناسایی نمونه‌ها با مراجعه به منابع فلور اورینتالیس (Boissier, 1872)، فلور شوروی (Shishkin & Browicz & Zielinski, 1974)، فلور ایرانیکا (Bobrov, 1974) و فلور ایران (صوفیان و دیناروند، ۱۳۸۶) انجام شد. جهت آماده‌سازی، به منظور دست‌یابی به صفات همسان و دارای شرایط برابر، قسمت‌های میانی از پهنک برگ، ناحیه رگبرگ میانی برگ، دمبرگ و سرشارخه هر نمونه انتخاب شد و سعی شد که این قسمت‌ها از نظر اندازه در همه نمونه‌ها یکسان باشند؛ به طوری که تقریباً از یک ناحیه مشابه تهیه شدند. از هر جمعیت تعداد ۱۰ برگ مورد مطالعه قرار گرفت و نمونه‌ها به مدت ۲۰-۱۵ دقیقه جوشانده شدند تا نرم شوند. پس از نرم شدن به مدت

جدول ۱- نمونه‌های مورد مطالعه گونه‌های جنس *Rhamnus*

Table 1. List of treatment species.

ردیف	گونه	محل جمع‌آوری و کد هرباریوی	ارتفاع(متر)	جمع آوری کننده	طول و عرض جغرافیایی
۱	<i>R. pallasii</i> subsp. <i>pallasii</i>	گلستان، لوشن به حیر نه، روستای بیورزین، تزدیک (802592-GKUH) امازاده حفیه (802592-GKUH)	۱۰۰۵-۱۰۲۰	مهدی یانی، حبیبی	N36° 40' 56.9" E049° 34' 51.1"
۲	<i>R. pallasii</i> subsp. <i>pallasii</i>	گلستان، زرین گل (802643-GKUH)	۶۶۷	مهدی یانی، حبیبی، کسلخه	N36° 49' 01.9" E055° 01 34.4"
۳	<i>R. pallasii</i> subsp. <i>sintenisii</i>	گلستان، محور آزادشهر به شهرود، ۳۵ کیلومتری خوش یلاق (802628-GKUH)	۵۷۱	مهدی یانی، حبیبی، کسلخه	N36° 48' 30.2" E055° 01' 34.3"
۴	<i>R. pallasii</i> subsp. <i>sintenisii</i>	مازندران، ۳۲ کیلومتری چالوس، ۵ کیلومتری مرزن آباد (802511-GKUH)	۷۲۵	مهدی یانی، حبیبی، کسلخه	N36° 24' 06.1" E051° 16' 34.1"
۵	<i>R. pallasii</i> subsp. <i>iranica</i>	مازندران، رویان، ۲۰ کیلومتری گلند رود (802613)	۵۲۸	مهدی یانی، حبیبی	-
۶	<i>R. pallasii</i> subsp. <i>iranica</i>	گلستان، ۹۰ کیلومتری گنبد کاووس، اطراف زیارتگاه خالدی (802537-GKUH)	۷۰۰	حبیبی	N37° 44' 01.9" E055° 23' 56.0"
۷	<i>R. × spathulifolia</i>	مازندران، بالسر، روستای میرود (802618)	-۶	مهدی یانی، حبیبی، کسلخه	N 36° 43' 01.9" E052° 43' 44.0"
۸	<i>R. cathartica</i> var. <i>cathartica</i>	مازندران، چالوس (3640) مازندران، نوشیر، منطقه کجور بعد از کندلوس - نیچکوه	-	امینی، زارع	-
۹	<i>R. cathartica</i> var. <i>caucasica</i>	مازندران، رامسر، اشکوارات (3641)	۱۷۰۰-۱۹۰۰	امینی، زارع	-

*R. pallasii* بوده است (تصویرهای ۱E-H). سطح تحتانی گونه ۱E-*H* جمعیت ۱ شکل سلول چندوجهی و الگوی دیواره راست تا خمیده دارد و جمعیت ۲ دارای شکل سلول نامنظم و الگوی دیواره راست تا خمیده است و در سطح فوقانی جمعیت ۱ شکل سلول نامنظم و الگوی دیواره تا حدودی موج-دار دیده می‌شود؛ جمعیت ۲ دارای شکل سلول چندوجهی و الگوی دیواره راست تا خمیده می‌باشد (تصویرهای ۱I-L). در هر دو سطح تحتانی و فوقانی *R. pallasii* × *spathulifolia* شکل سلول چندوجهی با الگوی دیواره راست تا خمیده است (*R. cathartica* var. *cathartica* ۱M-N). در *R. cathartica* var. *cathartica* دو سطح تحتانی و فوقانی شکل سلول نامنظم با الگوی دیواره موج‌دار یا سینوسی دیده می‌شوند (تصویرهای ۱O-R).

کوک. در تمام آرایه‌های بررسی شده نوع کرک مشابه و از نوع کرک‌های ساده و تکسلولی است. اما تراکم کرک‌ها در سطح برگ‌ها بین آرایه‌ها متفاوت است به طوری که در زیرگونه *R. pallasii* subsp. *iranica* *R. pallasii* زیرگونه *R. pallasii* subsp. *iranica* دارای پوشش کرکی متراکم است.

آناتومی برگ. در تاکسون‌های فروگونه‌ای *R. pallasii*, *R. pallasii* × *spathulifolia* تیپ برگ درسی و نترال؛ دارای سطوح پشتی و شکمی متفاوت است، یعنی در یک سطح برگ مزوپیل نرdbanی و در سطح دیگر مزوپیل اسفنجی وجود دارد. برگ‌ها دارای دو لایه پارانشیم نرده‌ای هستند، بافت نرdbanی در سطح فوقانی برگ و بافت اسفنجی در سطح تحتانی برگ قرار دارد. اپیدرم به صورت یک لایه از سلول‌های چندوجهی است. کرک‌ها ساده و تکسلولی هستند و غالباً در سطح تحتانی حضور دارند، اما *R. pallasii* × *spathulifolia* فاقد کرک مشاهده شد. مطالعات ریخت-شناسی سطح فوقانی و تحتانی کل برگ تأیید کننده این موضوع است. کوتیکول نسبتاً ضخیم در دیواره سلول‌های اپیدرمی قابل مشاهده است. دیواره سلول‌های مزوپیل عموماً مواج است. کریستال‌های اگزالات کلسیم به شکل منشوری و چندوجهی است که در رگبرگ میانی و پهنک مشاهده شد. شکل مقطع رگبرگ در سطح تحتانی گرد است.

## نتایج


روزنگار. نتایج حاصل از مطالعه (جدول ۲ و شکل ۱) نشان داد که برگ‌های گونه مورد مطالعه در هر دو سطح اپیدرم فوقانی و *R. cathartica* var. *cathartica* که سطح فوقانی فاقد روزنه بوده است. دو *R. pallasii* subsp. *pallasii* و *R. pallasii* subsp. *sintenisii* دارای دو نوع تیپ روزنه آنمومیتیک و *R. pallasii* subsp. پاراسیتیک هستند. در دو جمعیت از *R. cathartica* var. *iranica* و همچنین واریته‌های گونه *R. cathartica* روزنه آنمومیتیک مشاهده شده است. تیپ روزنه‌ها از نظر پراکنش روزنه از نوع آمفی استوماتیک است؛ یعنی هر دو سطح برگ دارای روزنه است، ولی در سطح تحتانی روزنه متراکم‌تر از سطح فوقانی است. فقط در *R. cathartica* var. *cathartica* تیپ روزنه از نوع هیپواستوماتیک است که فقط سطح زیرین برگ روزنه دارد. میانگین بزرگ‌ترین نسبت طول به عرض روزنه در سطح تحتانی و فوقانی مربوط به زیرگونه *R. pallasii* subsp. *pallasii*-۱ و میانگین کوچک‌ترین نسبت طول به عرض روزنه در سطح تحتانی و فوقانی مربوط به زیرگونه *R. pallasii* × *spathulifolia* بوده است؛ همچنین در سطح تحتانی *R. pallasii* × *spathulifolia* بیشترین شاخص و تراکم روزنه و گونه *R. pallasii* subsp. *pallasii*-۱ کمترین شاخص و تراکم روزنه‌ای را در ۱mm<sup>2</sup> نشان می‌دهند.

سلول‌های اپیدرمی. سلول‌های اپیدرمی به اشکال چندوجهی، نامنظم و نوع دیواره آنتی‌کلینالی راست تا خمیده و مواج دار مشاهده شدند؛ به طوری که سطح تحتانی برگ گونه *R. pallasii* subsp. *pallasii* ۱-۲ نامنظم با الگوی دیواره آنتی‌کلینالی راست تا خمیده، و در سطح فوقانی شکل سلول نامنظم و الگوی دیواره تا حدودی موج‌دار *R. pallasii* (تصویرهای ۱A-D). سطح تحتانی گونه *R. pallasii* subsp. *sintenisii* ۱-۲ دیواره راست تا خمیده دارد و سطح فوقانی جمعیت ۱ دارای شکل سلول نامنظم با الگوی دیواره راست تا خمیده است و جمعیت ۲ دارای شکل سلول نامنظم و الگوی دیواره مواج دارد.

جدول - ۲ - صفات اندازه گیری شده اپیلرم برگ، اعداد بصورت میانگین داده ها می باشد.

Table 2. Measured-epidermal characteristics of treated species. (Data are average)

	سطح تختانی (Abaxial)						سطح فوقانی (Adaxial)					
	نامکون	تیپ روزنه	شکل سلول	شاخص روزنه	نیسبت	نیسبت	شاخص روزنه	نیسبت	نیسبت	نیسبت	نیسبت	نیسبت
				ترکم ( $1\text{mm}^2$ )								
۱	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>pallasi</i> -1	راست تا	نمنظم	باراپتیک و آموسیتیک	۰/۰۱۰۳	۰/۰۱۰۳	۰/۰۱۰۳	۰/۰۱۰۳	۰/۰۱۰۳	۰/۰۱۰۳	۰/۰۱۰۳	۰/۰۱۰۳
۲	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>pallasi</i> -2	راست تا	نمنظم	آموسیتیک	۰/۰۱۰۰	۰/۰۱۰۰	۰/۰۱۰۰	۰/۰۱۰۰	۰/۰۱۰۰	۰/۰۱۰۰	۰/۰۱۰۰	۰/۰۱۰۰
۳	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>sintensis</i> -1	راست	نمطی	آموسیتیک	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱
۴	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>sintensis</i> -2	راست تا	نمطی	آموسیتیک	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲
۵	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>iranica</i> -1	راست تا	نمطی	آموسیتیک	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱
۶	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>iranica</i> -2	راست تا	نمطی	آموسیتیک	۰/۰۱۰۵	۰/۰۱۰۵	۰/۰۱۰۵	۰/۰۱۰۵	۰/۰۱۰۵	۰/۰۱۰۵	۰/۰۱۰۵	۰/۰۱۰۵
۷	<i>Rh. × spathulifolia</i>	راست تا	نمطی	آموسیتیک	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱	۰/۰۱۰۱
۸	<i>Rh. cathartica</i> var. <i>cathartica</i>	موج دار	نمطی	آموسیتیک	۰/۰۱۰۴	۰/۰۱۰۴	۰/۰۱۰۴	۰/۰۱۰۴	۰/۰۱۰۴	۰/۰۱۰۴	۰/۰۱۰۴	۰/۰۱۰۴
۹	<i>Rh. cathartica</i> var. <i>caucasica</i>	موج دار	نمطی	آموسیتیک	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲	۰/۰۱۰۲



شکل ۱- اشکال سلول‌های اپیدرمی گونه *Rhamnus cathartica* و *Rhamnus pallasii* (×۴۰).


A: Abaxial, B: Adaxial, *R. pallasii* subsp. *pallasii*-1, C: Abaxial, D: Adaxial, *R. pallasii* subsp. *pallasii*-2, E: Abaxial, F: Adaxial, *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-1, G: Abaxial, H: Adaxial, *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-2, I: Abaxial, *R. pallasii* subsp. *iranica*-1, J: Adaxial *R. pallasii* subsp. *iranica*-1, K: Abaxial, L: Adaxial *R. pallasii* subsp. *iranica*-2, M: Abaxial, N: Adaxial, *R. × spathulifolia*, O: Abaxial, P: Adaxial, *R. cathartica* var. *cathartica*, Q: Abaxial, R: Adaxial, *R. cathartica* var. *caucasica*.

Fig. 1. Forms of epidermal cells of *Rhamnus pallasii* and *Rhamnus cathartica*, (×40).

A: Abaxial, B: Adaxial, *R. pallasii* subsp. *pallasii*-1, C: Abaxial, D: Adaxial, *R. pallasii* subsp. *pallasii*-2, E: Abaxial, F: Adaxial, *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-1, G: Abaxial, H: Adaxial, *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-2, I: Abaxial, *R. pallasii* subsp. *iranica*-1, J: Adaxial *R. pallasii* subsp. *iranica*-1, K: Abaxial, L: Adaxial *R. pallasii* subsp. *iranica*-2, M: Abaxial, N: Adaxial, *R. × spathulifolia*, O: Abaxial, P: Adaxial, *R. cathartica* var. *cathartica*, Q: Abaxial, R: Adaxial, *R. cathartica* var. *caucasica*.

لایه کلاتشیم ۶۷ میکرون است. تعداد لایه‌های کلاتشیم واریته‌های گونه *R. cathartica* در ناحیه رگبرگ میانی ۳ تا ۴ لایه است و ضخامت لایه کلاتشیم ۹۲-۹۵ میکرون است. دستجات آوندی از نوع کولاترال هستند (جدول ۳ و شکل ۲).

تعداد لایه‌های کلاتشیم زیرگونه‌های *R. pallasii* در ناحیه رگبرگ میانی بین ۲ تا ۳ لایه متغیر است و ضخامت لایه کلاتشیم ۶۰-۷۶ میکرون است. تعداد لایه‌های کلاتشیم *R. spathulifolia* در ناحیه رگبرگ میانی ۲ لایه است و ضخامت



شکل ۲- مقاطع عرضی برگ گونه Rhamnus cathartica و Rhamnus pallasii

A-B: R. pallasii subsp. sintenisii-1, C-D: R. pallasii subsp. pallasii-2, E-F: R. pallasii subsp. sintenisii-1, G-H: R. pallasii subsp. sintenisii-2, I: R. pallasii subsp. iranica-1, J: R. pallasii subsp. iranica-1, K-L: R. pallasii subsp. iranica-2, M-N: R. × spathulifolia, O-P: R. cathartica var. cathartica, Q-R: R. cathartica var. caucasica. le: لایه اپیدرم زیرین، ue: لایه اپیدرم آبدار، pa: پارانشیم، pp: لایه پارانشیم ترد ای، sp: لایه پارانشیم اسفنجی، co: کلاتشیم، xl: آوند چوب، hy: هیودرم، mr: رگبرگ میانی، cr: کریستال، tr: رگبرگ میانی و پهنک برگ ۱-2، R. pallasii subsp. pallasii-2: رگبرگ میانی و پهنک برگ ۱-2، R. pallasii subsp. sintenisii-1: رگبرگ میانی و پهنک برگ ۱-2، R. pallasii subsp. iranica-1: رگبرگ میانی و پهنک برگ ۱-2، R. pallasii subsp. iranica-2: رگبرگ میانی و پهنک برگ ۱-2، R. × spathulifolia: رگبرگ میانی و پهنک برگ ۱-2، R. cathartica var. cathartica: رگبرگ میانی و پهنک برگ ۱-2، R. cathartica var. caucasica: رگبرگ میانی و پهنک برگ ۱-2.

Fig. 2. Leaf cross-section of *Rhamnus pallasii* and *Rhamnus cathartica*.

A-B: Midrib & Blade leaf *R. pallasii* subsp. *pallasii*-1, C-D: Midrib & Blade leaf *R. pallasii* subsp. *pallasii*-2, E-F: Midrib & Blade leaf *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-1, G-H: Midrib & Blade leaf *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-2, I: Midrib leaf *R. pallasii* subsp. *iranica*-1, J: Blade leaf *R. pallasii* subsp. *iranica*-1, K-L: Midrib & Blade leaf *R. pallasii* subsp. *iranica*-2, M-N: Midrib & Blade leaf *R. × spathulifolia*, O-P: Midrib & Blade leaf *R. cathartica* var. *cathartica*, Q-R: Midrib & Blade leaf *R. cathartica* var. *caucasica*. (le: lower epidermis, ue: upper epidermis, pa: parenchyma, pp: palisade parenchyma layer, sp: spongy parenchyma layer, co: collenchyma, ph: phloem, xl: xylem, hy: hypodermis, mr: midrib, cr: crystal, tr: trichome).


جدول ۳- لیست صفات تشریحی برگ ناکرون های ملالعه شده - *Rhamnus* - براساس واحد میکرومتر، +: حضور - عدم حضور.

Table 3. List of anatomical leaf characteristics of treated species; (μm), +: presence, -: absence

عنوان	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>pallasi</i> -1	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>pallasi</i> -2	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>simenisi</i> -1	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>iranica</i> -2	<i>Rh. pallasi</i> subsp. <i>iranica</i> -1	<i>Rh. × spathulifol</i> <i>ia</i>	<i>Rh. cathartica</i> var. <i>cathartica</i>
نوع کرک	ساده تک سلولی	ساده تک سلولی	ساده تک سلولی	ساده تک سلولی	ساده تک سلولی	ساده تک سلولی	ساده تک سلولی
ترکیم کرک	متوسط	کم	خوبی کم	خوبی کم	خوبی کم	بدون کرک	بدون کرک
کرسنال	+	+	+	+	+	+	+
تمدداد لایه ابیدرم	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تمدداد لایه کلانشیم	۲-۳	۲-۳	۲	۲	۲	۲	۲
رگبرگ	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴-۵
تمدداد پارانشیم	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴
رگبرگ	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴
ضخامت لایه	۶۰/۵۵±۷/۱۰	۶۵/۵۵±۷/۱۰	۶۰/۵۵±۷/۱۰	۶۰/۵۵±۷/۱۰	۶۰/۵۵±۷/۱۰	۶۰/۵۵±۷/۱۰	۶۰/۵۵±۷/۱۰
کلانشیم رگبرگ	۸۷/۱۵±۷/۱۰	۸۷/۱۵±۷/۱۰	۸۷/۱۵±۷/۱۰	۸۷/۱۵±۷/۱۰	۸۷/۱۵±۷/۱۰	۸۷/۱۵±۷/۱۰	۸۷/۱۵±۷/۱۰
ضخامت لایه	۹۷/۴۸±۴/۴۸	۸۵/۱۵±۱/۵۷	۸۹/۱۵±۱/۵۷	۸۹/۱۵±۱/۵۷	۸۹/۱۵±۱/۵۷	۷۷/۱۲/۳±۱/۴۷	۷۷/۱۲/۳±۱/۴۷
پارانشیم رگبرگ	۹۰/۴۹±۹/۴۹	۸۹/۳۱±۹/۴۵	۹۱/۵۹±۹/۴۵	۹۱/۵۹±۹/۴۵	۹۱/۵۹±۹/۴۵	۹۲/۳۸/۳±۸/۶۲	۹۲/۳۸/۳±۸/۶۲
پارانشیم رگبرگ	۹۰/۴۹±۹/۴۹	۸۹/۳۱±۹/۴۵	۹۱/۵۹±۹/۴۵	۹۱/۵۹±۹/۴۵	۹۱/۵۹±۹/۴۵	۹۸/۱۱/۱۳±۱/۹۵	۹۸/۱۱/۱۳±۱/۹۵
اندازه آند آکشن	۸۵/۲۲/۲۱±۲/۲۱	۱۱۲/۸۱/۱۱±۱۲/۸۱	۷۵/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۷۵/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۷۵/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۷۶/۱۳/۱۳±۱/۷۰	۷۶/۱۳/۱۳±۱/۷۰
اندازه آند چوب	۸۵/۲۲/۲۱±۲/۲۱	۱۱۲/۸۱/۱۱±۱۲/۸۱	۷۵/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۷۵/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۷۵/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۷۶/۱۲/۶۵	۷۶/۱۲/۶۵
ضخامت مژوفل	۲۱/۱۳/۱۳±۱/۱۳	۱۷/۸/۸/۸±۸/۸/۸	۱۲/۸/۸/۸±۸/۸/۸	۱۲/۸/۸/۸±۸/۸/۸	۱۲/۸/۸/۸±۸/۸/۸	۱۳/۹/۵۹±۱/۲۴	۱۳/۹/۵۹±۱/۲۴
زندگی	۱۷/۸/۸/۸±۸/۸/۸	۱۱۲/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۱۱۲/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۱۱۲/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۱۱۲/۱۰/۱۰±۱۰/۱۰	۱۳/۲/۲۳/۸/۸±۸/۸/۸	۱۳/۲/۲۳/۸/۸±۸/۸/۸
ضخامت مروفل	۱۴۷/۳۷/۳۷±۳۷/۳۷	۱۲۴/۲۸/۲۸±۲۸/۲۸	۱۲۴/۲۸/۲۸±۲۸/۲۸	۱۲۴/۲۸/۲۸±۲۸/۲۸	۱۲۴/۲۸/۲۸±۲۸/۲۸	۱۰۲/۲۵/۲۵±۱۰/۲۵	۱۰۲/۲۵/۲۵±۱۰/۲۵
اسفنجی						۹۹/۵۳±۹/۰	۹۹/۵۳±۹/۰

دیده می شود و بافت پارانشیم پوستی مشتمل بر ۴ تا ۵ لایه است و در واریته های گونه *R. cathartica* در زیر اپiderم ۳-۴ لایه بافت کلانشیم گوشه دار دیده می شود و بافت پارانشیم پوستی مشتمل بر ۲ تا ۳ لایه بوده است. کریستال های اگزالات کلسیم روزنی شکل به صورت پراکنده در بافت کلانشیم، بافت پارانشیم و آوند آبکش وجود دارد. همه تاکسون های فرو گونه ای یک دسته آوندی بزرگ و پیوسته در مرکز دارند (جدول ۴) و شکل (۳)

آناتومی دمبرگ. دمبرگ در برش عرضی به حالت نیم دایره با دو زایده جانبی است؛ کوتیکول نسبتاً ضخیمی دارد و دارای کرکهایی از نوع ساده و تک سلولی است. شکل سلول‌های اپیدرمی در زیر گونه‌های *R. pallasii* مستطیلی بوده و در  $\times R.$  واریته‌های گونه *R. cathartica* سلول‌های اپیدرمی به شکل مربع است. زیر گونه‌های *R. pallasii* در زیر ۵-۶ لایه بافت کلانشیم گوشه‌دار دیده می‌شود و بافت پارانشیم پوستی مشتمل بر ۳ تا ۴ لایه است. در  $\times R.$  در زیر اپیدرم ۵-۶ لایه بافت کلانشیم گوشه‌دار *spathulifolia*



شكل ٣- مقاطع عرضی دمیرگ گونه *Rhamnus cathartica* و *Rhamnus pallasii*

A-B: *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-1 C: *R. pallasii* subsp. *pallasii*-1 D: *R. pallasii* subsp. *pallasii*-2 E: دمیرگ *R. pallasii* subsp. *pallasii*-2 F: دمیرگ *R. pallasii* subsp. *iranica*-1 G: دمیرگ *R. pallasii* subsp. *iranica*-2 H: *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-2 I-J: دمیرگ *R. cathartica* var. *cathartica* K-L: *R. cathartica* var. *cathartica* spathulifolia ph: کلاشیم، پاراشیم، co: اپیدرم، pa: آوند، آوند چوبی، XI: آوند آبکش، tr: کریستال، k: کرک).

Fig. 3. Petiole cross-section of *Rhamnus pallasii* and *Rhamnus cathartica*.


A-B: Petiole *R. pallasii* subsp. *pallasii*-1, C: Petiole *R. pallasii* subsp. *pallasii*-2, D: Petiole *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-1, E: Petiole *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-2, F: Petiole *R. pallasii* subsp. *iranica*-1, G: Petiole *R. pallasii* subsp. *iranica*-2, H: Petiole *R. × spathulifolia*, I-J: Petiole *R. cathartica* var. *cathartica*, K-L: Petiole *R. cathartica* var. *caucasica*. (ep: epiderm, pa: parenchyma, co: collenchyma, ph: phloem, xl: xylem, cr: crystal, tr: trichome).

جدول ۴- لیست صفات ترمیمی و مرگ تاکسون های مطالعه شده - *Rhamnus* : براساس واحد مکرر، +: حضور -: عدم حضور، +: عدم حضور

Table 4. List of anatomical netiole characteristics of treated species: (im) +: presence -: absence

بیضوی شکل است. ضخیم ترین بافت آبکش و بافت چوب به *R. pallasii* subsp. *sintenisii* و *R. pallasii* subsp. *iranica* ترتیب در گونه *pallasii* و کمترین ضخامت بافت آبکش و *R. pallasii* subsp. *pallasii* و *R. × spathulifolia* (جدول ۵). در مرکز شاخه، بافت پارانشیمی مغز با سلول‌های چندضلعی وجود دارد که بزرگ‌ترین قطر مربوط به *R. × spathulifolia* می‌باشد. کریستال‌های اگزالت کلسیم روزتی شکل در زیر بافت کلانشیم و آوند آبکش به صورت پراکنده در تمام زیر گونه‌ها وجود دارد (جدول ۵ و شکل ۴).

**آناتومی شاخه جوان.** نتایج مطالعات نشان داد نوع شکل سطح مقطع در زیر گونه‌های مختلف *R. pallasii* یکسان بوده و دارای سطح مقطع مدور می‌باشند. یک لایه سلول اپیدرمی در تمام زیر گونه‌ها وجود دارد. نوع کرک تک‌سلولی ساده می‌باشد، به طوری که زیر گونه *iranica* کرک دیگر می‌باشد دارای تراکم کرک بیشتری نسبت به دو زیر گونه دیگر می‌باشد (تصویرهای ۴E-F). اما در *R. × spathulifolia* کرکی مشاهده نشده است (تصویرهای ۴G-H). بافت کلانشیم با سلول‌های مستطیلی تا بیضوی بوده و دارای ۵-۷ لایه می‌باشند. تعداد لایه‌های بافت اسکرانشیم بین ۱-۳ لایه متغیر با سلول‌های



شکل ۴- مقاطع عرضی سرشاخه‌های جوان گونه *Rhamnus pallasii*

A-B: شاخه جوان ۱-*R. pallasii* subsp. *iranica*-۱. C-D: شاخه جوان ۲-*R. pallasii* subsp. *sintenisii*-۲. E-F: شاخه جوان ۱-*R. pallasii* subsp. *iranica*-۱. G-H: شاخه جوان *R. × spathulifolia*. (ep: epiderm, c:cortex, scl: sclerenchyma, co: collenchyma, ph: phloem, xl: xylem, p:pith, cr: crystal, tr: trichome).

Fig. 4. Cross-section of fresh branches of *Rhamnus pallasii*.

A-B: Fresh branch *R. pallasii* subsp. *pallasii*-1, C-D: Fresh branch *R. pallasii* subsp. *sintenisii*-2, E-F: Fresh branch *R. pallasii* subsp. *iranica*-1, G-H: Fresh branch *R. × spathulifolia*. (ep: epiderm, c:cortex, scl: sclerenchyma, co: collenchyma, ph: phloem, xl: xylem, p:pith, cr: crystal, tr: trichome).

جدول ۵- لیست خصایق تشریحی سرشاره‌های جوان گونه *Rhamnus pallasii* - برلسک واحد مکرر، +: حضور -: عدم حضور

ردیف	نام اسوسون	Rh. pallasii subsp. pallasii - I	Rh. pallasii subsp. sintenisi - 2	Rh. pallasii subsp. iranica - I	Rh. × spathulifolia
۱	شکل سطح مقطع	مدور	مدور	مدور	مدور
۲	ضخامت کوپنکول	ضخیم	ضخیم	ضخیم	ضخیم
۳	نوع کرک	ساده تک سلولی	ساده تک سلولی	ساده تک سلولی	ساده تک سلولی
۴	تراسک کرک	کم	کم	-	-
۵	گریپستال	+	+	+	+
۶	قطر سطح مقطع	۰.۵۹/۰.۹±۰.۷/۱.۵	۰.۵۹/۰.۹±۰.۷/۱.۵	۰.۱۰±۰.۱۲/۰.۳۳/۰.۷۵	۰.۱۰±۰.۱۲/۰.۳۳/۰.۷۵
۷	تعداد لايه اپیدرم	۱	۱	۱	۱
۸	تعداد لايه کالاشنیم	۶	۶	۶	۶
۹	تعداد لايه اسکرل اششم	۱-۲	۱-۲	۱-۲	۱-۲
۱۰	ضخامت لايه کالاشنیم	۰.۳/۰.۵±۰.۵/۰.۸۹	۰.۳/۰.۵±۰.۵/۰.۹۵	۰.۱۷/۰.۹۱±۰.۴/۰.۹۹	۰.۹۹/۰.۱۰±۰.۱۲/۰.۹۹
۱۱	ضخامت لايه اسکرل اششم	۰.۴/۰.۲±۰.۴/۰.۴	۰.۴/۰.۲±۰.۴/۰.۴	۰.۴/۰.۲±۰.۴/۰.۴	۰.۴/۰.۲±۰.۴/۰.۴
۱۲	ضخامت کورتکس	۰.۷/۰.۱۱±۰.۷/۰.۱۱	۰.۱/۰.۱۱±۰.۱/۰.۱۱	۰.۱/۰.۱۵±۰.۱/۰.۱۵	۰.۱/۰.۱۵±۰.۱/۰.۱۵
۱۳	اندازه آوند آبکش	۰.۹۶/۰.۹±۰.۹۶/۰.۹	۰.۹۶/۰.۹±۰.۹۶/۰.۹	۰.۷۳/۰.۷۳±۰.۷۳/۰.۷۳	۰.۷۳/۰.۷۳±۰.۷۳/۰.۷۳
۱۴	اندازه آوند چوب	۰.۳۰/۰.۱۵±۰.۳۰/۰.۱۵	۰.۲۷/۰.۱۵±۰.۲۷/۰.۱۵	۰.۲۹/۰.۲۹±۰.۲۹/۰.۲۹	۰.۲۹/۰.۲۹±۰.۲۹/۰.۲۹
۱۵	اندازه پارانشیم غرز	۰.۷۷/۰.۶۱±۰.۷۷/۰.۶۱	۰.۷۷/۰.۶۱±۰.۷۷/۰.۶۱	۰.۷۷/۰.۶۱±۰.۷۷/۰.۶۱	۰.۷۷/۰.۶۱±۰.۷۷/۰.۶۱

با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه *cathartica* قرار گرفت. تا به حال بررسی علمی جامعی درباره جمعیت‌های گونه‌های جنس *Rhamnus* در ایران انجام نشده است. نتایج مطالعات نشان داد سلول‌های اپیدرمی در دو شکل چندوجهی و نامنظم وجود دارند. الگوی دیواره آنتی کلینالی راست تا کمانی

بحث و نتیجه‌گیری

در این تحقیق، صفات ریختارشناسی شامل اپیدرم، روزنه، کرک و صفات تشریحی برگ، دمبرگ و سرشاره‌های جوان ۹ جمعیت زیرگونه‌های گونه *R. pallasii* و واریته‌های گونه *R.*

شاخه‌های مسن آرایه‌های درون گونه‌ای تشخیص داده شده است. *subsp. pallasii* به واسطه داشتن برگ‌های خطی تا نیزه‌ای باریک که طول برگ شش برابر عرض آن است قابل تشخیص از سایر آرایه‌های گونه است و *subsp. sintenisii* براساس شکل پهنک متعدد، بیضوی تا نیزه‌ای و یا بیضوی تا فاشقی و *subsp. iranica* براساس شکل پهنک قاشقی و نوک پهنک کند، قابل تشخیص و آرایه *R. × spathulifolia* به راحتی با شکل پهنک بیضوی پهن، رنگ شاخه‌های جوان تر قرمز متمایل به قهوه‌ای، قابل تشخیص است (صوفیان و دیناروند، ۱۳۸۶؛ مبین، ۱۳۷۴). در این مطالعه همان طور که در نتایج بیان شد، اختلافات و شباهت‌های در صفات مربوط به اپیدرم در آرایه‌های فروگونه‌ای این دو گونه مشاهده شد، که می‌تواند همراه با صفات دیگر در حل وضعیت این آرایه‌ها و مرزبندی بین آن‌ها موثر باشد. نتایج مطالعات آنatomی برگ، دمبرگ و شاخه جوان ثبات صفات ساختار تشريحی را در بین گونه‌ها و آرایه‌های درون گونه‌ای نشان می‌دهد. از این لحاظ شواهد اندکی در جدایی تاکسون‌های تحت مطالعه به دست آمد. تنها شکل سطح مقطع دمبرگ ویژگی متمایز‌کننده بین گونه‌ها می‌باشد، به طوری که زیر گونه *subsp. sintenisii* و *subsp. pallasii* شکل سطح مقطع نیم‌دایره با زایده جانبی و *subsp. iranica* به صورت نیم‌دایره با حاشیه مواج و *var. spathulifolia* به شکل کلیوی مشاهده شده است که در مجموع، تشابه این تاکسون‌ها را در صفات آنatomی نشان می‌دهد.

و موج دار بودند. در هر دو سطح برگ تیپ روزنه‌ای آنوموستیک مشاهده شد و دو زیر گونه *R. pallasii subsp. sintenisii* و *R. pallasii subsp. pallasii* دارای دو نوع روزنه‌ای آنوموستیک و پاراسیتیک بودند. در تاکسون فرو-گونه‌ای بررسی شده نوع کرک مشابه و از نوع کرک‌های ساده تک‌سلولی می‌باشد. در واقع نوع کرک یک صفت تاکسونومیک است که در گونه‌های مختلف تفاوتی از این لحاظ مشاهده نشد. اما تراکم کرک‌ها در سطح برگ، دمبرگ و سرشاخه بین آرایه‌ها متفاوت است به طوری که در زیر گونه‌ای *R. pallasii subsp. iranica* *R. pallasii* زیر گونه *R. × spathulifolia* دارای پوشش کرکی متراکم است. در سطح برگ و سرشاخه فاقد کرک بوده است، که از این لحاظ از بقیه آرایه‌ها متمایز می‌شود. نداشتن کرک می‌تواند به جغرافیای پراکنش این هیبرید وابسته باشد. این تنها آرایه‌ای است که در نزدیکی سواحل دریای خزر و در تپه‌های ماسه‌ای و ساحلی و در ارتفاعی پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد پراکنش دارد. برخی گیاه‌شناسان معتقدند که اختلافات جزئی و قابل تغییری که در تمیز این تاکسون‌های فروگونه‌ای گونه *R. pallasii* ذکر شده است از قبیل رنگ شاخه‌ها و برگ‌ها و اختلاف ناچیز طول دمبرگ از آن جهت که اولاً این اختلافات قابل تمیز نبوده و ثانیاً در میان اندام‌های متعلق به یک زیر گونه نیز ممکن است پیش بیاید. بهتر بود که این سه زیر گونه تحت یک گونه شناخته می‌شدند و به این سهولت به سه واحد زیر گونه‌ای تقسیم نمی‌شدند (مبین، ۱۳۷۴). در مقابل در فلور ایران و فلور ایرانیکا تعیین حدود سنتی گونه پذیرفته نشده است و براساس تنوع در شکل و اندازه برگ‌ها و همچنین رنگ

## منابع / References

صوفیان، خ. دیناروند، م. ۱۳۸۶. فلور گیاهان آوندی، جلد چهارم. – انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۲۹۸-۲۸۵.

**Agrawal, A.A. and Fishbein, M.** 2006. Plant defense syndromes. – *Ecology* 87:132-149.

**Azizian, D.** 1996. Anatomical studies of *Mentha mozzaffarianii* (Labiatae) and a related species. – *Iranian Journal of Botany* 7: 63-71.

صوفیان، خ. دیناروند، م. ۱۳۸۶. فلور ایران، ش. ۵۵: تیره عناب (Rhamnaceae). – انتشارات سازمان جنگل‌ها و مراتع، صفحه ۵۲-۱.

**Blunden, G. and Jewers, K.** 1973. The comparative leaf anatomy of *Agave*, *Beschornertia*, *Doryanthes* and *Furcraea* species (Agavaceae: Agaveae). – *Botanical Journal of the Linnean Society* 66: 157-179.

**Boissier, E.** 1872. Flora Orientalis. Vol II. – A. Asher & Co, pp: 11-22.

**Browicz, K., Zielinski, J.** 1977. Flora Iranica, Academische Druck-u. – Verlagsanstalt graz- printed in Austria, pp: 1-27.

**Cutler, D.F.** 1978. Applied Plant Anatomy. – Royal Botanical Garden Press, London. pp: 1-538.

**Cutler, D.F.** 1982. Cuticular sculpturing and habitat in certain Aloe species (Liliaceae) from southern Africa. In: The plant cuticle (eds. Cutler, D. F., Alvin, K. L. and Price, C. E) 2: 425-44. – Academic Press, London.

**Dennert, E.** 1884. Contributions to the comparative anatomy of the leaf stem of Cruciferae Marburg. pp: 1-22.

**Kurylo, J.S., Knight, K.S., Stewart, J.R. and Endress, A.G.** 2007. *Rhamnus cathartica*: Native and naturalized distribution and habitat preferences. – Journal of the Torrey Botanical Society 134: 420-430.

**Metcalfe, C.R. and Chalk, L.** 1979. Anatomy of the dicotyledones. Vol. I. – Oxford Science Publications, Oxford. pp: 222-249.

**Miskin, K.E., Rasmusson D.C. and Moss, A.C.** 1972. Inheritance and physiological effects of stomata frequence in barley. Crop Science 12: 780-783.

**Oyeleke, M.O., AbdulRahaman, A.A. and Oladele, F.A.** 2004. Stomatal anatomy and transpiration rate in some afforestation tree species. – Nigerian Society for Experimental Biology Journal (NISEB) 4: 83-90.

**Shishkin, B.K. and Bobrov, E.G.** 1974. Flora of the U.S.S.R, Vol XIV. – Academy of Sciences of the U.S.S.R, pp: 494-516.

**Wang, Y.F., Ferguson, K.D., Zetter, R., Denk, T. and Garfi, G.** 2001. Leaf architecture and epidermal characters in *Zelkova*, Ulmaceae. – Botanical Journal of the Linnean Society 136: 255-265.

\*\*\*\*\*

Mahdiyani, S., Sattarian, A., Habibi, M. and Amini, T. 2016. An anatomical study of *Rhamnus cathartica* L. and *Rhamnus pallasii* Fisch. & C.A.Mey. (Rhamnaceae) in north of Iran – Nova Biologica Reperta 2: 272-285.

مهدی‌یانی، س.، ستاریان، ع.، حبیبی، م. و امینی، ط. ۱۳۹۴. مطالعه تشریحی دو گونه تنگرس. از تیره عنبیان در شمال ایران. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۲: ۲۷۲-۲۸۵. C.A.Mey.