

تأثیر سطوح چربی اکسیدشده چیره بر هورمون‌های تیروئیدی در تاسماهی هیبرید

سید امیر تیموری^۱، امیر پریز سلطانی^{۱*}، عبدالعلی موحدی نیا^{۲،۳}، حسین پاشا زانوosi^۴ و سلیمان حسن پور^۵

دریافت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ / پذیرش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ / چاپ: ۱۳۹۶/۹/۳۰

^۱گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

^۲گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

^۳گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

^۴گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

^۵گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

*مسئول مکاتبات: apsalati@kmsu.ac.ir

چکیده. روغن ماهی موجود در چیره ماهی پیوسته در معرض خطر اکسیداسیون است. در مطالعه حاضر، اثرات تغذیه تاسماهی هیبرید (*Huso huso ♂ × Acipenser ruthenus ♀*) جوان با جیره حاوی سطوح مختلف چربی اکسیدشده بر سطوح هورمون‌های تیروئیدی به عنوان هورمون‌های اصلی دخیل در متabolیسم تحت بررسی قرار گرفت. جهت انجام این آزمایش ^۳ رژیم غذایی مختلف با جایگزینی صفر (گروه شاهد)، ۵۰ و ۱۰۰ درصد روغن ماهی اکسیدشده طراحی شد. ^{۹۰} قطعه تاسماهی هیبرید با میانگین وزن اولیه 212.6 ± 0.7 گرم، پس از ۲ هفته سازگاری با جیره غذایی طراحی شده و شرایط آزمایشی، به صورت تصادفی در ^۹ مخزن فایرگلاس با ابعاد ^۲ متر مکعب، در ^۳ تکرار ذخیره سازی شدند. غذاهی سه بار در روز (ساعات ۸، ۱۴، ۲۰ و ^{۲۰}) و تا حد سیری به مدت ^۶ ماهه انجام شد. در پایان دوره آزمایش، از ماهی‌ها نمونه خون تهیه و سرم جداسازی شد. هورمون‌های تیروکسین و تری‌یدوتیرونین سرم به روش رادیوایمunoاسی اندازه‌گیری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که تیروکسین، تری‌یدوتیرونین و نسبت تیروکسین به تری‌یدوتیرونین سرم تغییر معنی‌داری در پاسخ به سطوح مختلف چربی اکسیدشده رژیم غذایی نشان نمی‌دهند. با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گرفت که تغذیه با چربی اکسیدشده اثری بر سطح سرمی هورمون‌های تیروئیدی در تاس ماهی هیبرید ندارد.

واژه‌های کلیدی. ماهی، جایگزینی، ترایدوتیرونین، تری‌یدوتیرونین

Effects of dietary oxidized fish oil on thyroid hormones in Sturgeon hybrid

Seyed Amir Teymourī¹, Amir Parviz Salati^{1*}, Abdolali Movahedinia^{2,3}, Hossein Pasha Zanoosi⁴ & Soleiman Hasanzadeh⁵

Received 09.05.2016/ Accepted 10.06.2017/ Published 21.12.2017

¹Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran

²Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

³Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran

⁴Department of Oceanography, Faculty of Marine Sciences, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology, Khorramshahr, Iran

⁵Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran

*Correspondent author: apsalati@kmsu.ac.ir

Abstract. Fish oil in the diet of fish is constantly at the risk of oxidation. In this study, the effects of feeding sturgeon hybrid (*Huso huso ♂ × Acipenser ruthenus ♀*) with different levels of oxidized fish oil (OFO) on thyroid hormones were investigated. Three experimental diets were made by replacing 0 (control), 50 and 100% OFO were made. Ninety hybrid sturgeon, with the initial weights of 212.6 ± 0.7 g were distributed in 9 fiberglass tanks (2 m^3) randomly after 2 weeks of adaptation with experimental conditions. Feeding was done three times daily (08:00, 14:00 and 20:00) for 6 weeks for satisfaction. At the end of the period, blood samples were taken and their serum was separated. Serum thyroxine and triiodothyronine were measured by radioimmunoassay in blood samples. Serum thyroxine, triiodothyronine and thyroxine/triiodothyronine level showed no significant changes related to dietary OFO. Our findings showed that dietary-OFO had no effect on blood thyroid hormones levels.

Keywords. fish, replacement, tetraiodothyronine, triiodothyronine

مقدمه

رادیکال آزاد کاملاً به پراکسیداسیون خود به خودی برای تبدیل به هیدروپراکسیدهای چربی سمتی و ناپایدار (محصولات اولیه اکسیداسیون) حساس هستند (Chen et al., 2012). در ادامه، هیدروپراکسیدهای ناپایدار چربی می‌توانند به آسانی به رادیکال‌های آلکوکسی اسیدهای چرب تجزیه شوند یا با شکسته شدن بیشتر، مجموعه‌ای از محصولات ثانویه اکسیداسیونی مانند آلدیدها، کتون‌ها، الکل‌ها و کربوکسیلیک اسیدها را آزاد کنند (Howell et al., 1998) که منبع اصلی طعم و بوی ناخوشایند جیره‌حاوی چربی اکسیدشده هستند (Hamre et al., 2001). اثر چربی اکسیدشده جیره بر رشد، اینمنی، دفاع آنتی‌اکسیدانی و تکامل اسکلتی عضلانی در *Hippoglossus hippoglossus* مشخص شده است (Lewis-McCrea and Lall, 2007). از دیگر آثار وجود چربی اکسیدشده در جیره می‌توان به اثر آنها بر متابولیسم اشاره کرد. هورمون‌های تیروئیدی یکی از مهم‌ترین هورمون‌های دخیل در تنظیم متابولیسم در ماهیان هستند. متابولیسم لیپیدها، پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها تحت تأثیر عمل کرد غده تیروئید است (Clark, 2000) و همکاران (Engberg, 1996) نشان دادند که تغذیه موش با رژیم‌های غذایی حاوی چربی اکسید شده، غلظت تیروکسین در پلاسمای خون آنها را افزایش می‌دهد. همچنین Eder و Stangl (2000)، با مطالعه تیروکسین و کلسترول پلاسمای در خونک‌های تغذیه شده با چربی‌های اکسیدشده نشان دادند که رابطه نزدیکی بین تغییرات هورمون‌های تیروئیدی و سوخت‌وساز کلسترول وجود دارد.

از آنجا که دورگه‌گیری از روش‌های مؤثر در معرفی گونه‌های جدید برای افزایش تولید، افزایش درصد بازنده‌گی، مقاومت به بیماری، سازگاری با محیط‌های پرورشی و تغییر در ساختار تولید مثل است، از این رو هیبرید تحت بررسی در این تحقیق که از تلاقی بین فیل ماهی نر و استریلاد ماده حاصل شده است، علاوه بر ویژگی‌های فوق دارای دهان بزرگتر و صفحات جانبی بیشتر در قیاس با نمونه‌های والد است و همچنین تمايل دارد مدت بیشتری را در رودخانه سپری کند. در سال 1952، دانشمندان روس برای اولین بار موفق به تولید هیبرید از فیل ماهی ماده و استریلاد نر شدند. در نتیجه، هیبرید نسل F1، بستر نامیده شد. مطالعات بعدی مشخص کرد که این گونه برای پرورش مناسب است (Hasanpour, 1972). با توجه به مطالعه Burtsseve (1972)

تغذیه مناسب در سیستم‌های پرورشی به منظور حفظ سلامتی و در نتیجه افزایش تولید با کیفیت بالا ضروری است. علم تغذیه ماهی در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی به خود دیده و از جیره‌های غذایی تجاری که، باعث افزایش رشد و سلامتی ماهی می‌شود، استفاده کرده است (Watanabe, 1981). ویژگی‌های تغذیه‌ای و فیزیکی جیره‌های غذایی می‌تواند توانایی ماهیان را برای مقاومت در برابر بیماری‌های عفونی تغییر دهد. شیوع بیماری‌ها در ماهیان معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که ماهیان در اثر تغییر فاکتورهایی مثل تغذیه تحت استرس قرار می‌گیرند. رژیم غذایی مناسب مثل حضور ماکرو‌نوتروینت‌ها و میکرونوتروینت‌ها شامل اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب PUFA، ویتامین‌ها، عناصر کمیاب، برای بهبود سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها در محیط‌های پرورش آبزیان ضروری است (Lall, 2000). براساس مطالعات انجام شده، اهمیت چربی‌ها در روند رشد ماهی به خوبی ثابت شده و انواع زیادی از منابع چربی حیوانی و گیاهی به طور وسیع در ساخت Nasopoulou & Zabetakis (2012). چربی رژیم غذایی، نقش مهمی در فرایند های تولید انرژی در بافت‌های حیوانات دارد و منبع اسیدهای چرب ضروری (Essential Fatty Acids: EFA) به حساب می‌آید. علاوه بر این، چربی رژیم غذایی، نقش حامل مواد مغذی محلول در چربی، به ویژه ویتامین‌های محلول در چربی از قبیل A, D, E و K عمل می‌کند (Watanabe, 1981). یکی از چربی‌هایی که به مثابه منبع تأمین انرژی در جیره ماهیان، تولید چربی خوراکی، تهییه غذای جانوران خشکی و آبزی و تولیدات صنعتی استفاده می‌شود، روغن ماهی است که از استخراج روغن کل بدن ماهی یا از ضایعات ماهی به دست می‌آید و از اجزای غذایی اصلی در ترکیبات جیره غذایی ماهیان به حساب می‌آید (Karalazos, 2007). روغن ماهی بسیار هضم‌پذیر است و منبع غنی اسیدهای چرب ضروری، به ویژه اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیر سری n-3، یا PUFA مانند ایکوزاپتانوئیک اسید، دکوزاگرگانوئیک اسید و آراشیدونوئیک اسید است (Karalazos, 2007; Nasopoulou & Zabetakis, 2012). از سوی دیگر، هنگامی که این چربی‌ها در معرض اکسیژن اتمسفر، عناصر کمیاب، نور یا گرمای قرار گیرند، از طریق واکنش‌های زنجیره‌ای

پودر گل میخک با غلظت ۲۰۰ ppm بیهوش و با استفاده از سرنگ ۲/۵ میلی لیتر فاقد ماده ضد انعقاد، از سیاهرگ ساقه دمی نمونه‌گیری انجام شد (سه عدد ماهی از هر تکرار). سپس سرم نمونه‌های خون با استفاده از سانتریفیوژ با دور ۳۰۰۰ به مدت ۱۰ دقیقه، جدا شد و تا زمان انجام آزمایش‌های مورد نظر در دمای ۲۰-درجه سانتی گراد نگهداری شد. غلظت هورمون‌های T₃ و T₄ سرم به روش (RIA) (radioimmunoassay) RIA و با استفاده از کیت تجاری ایمونوتک (Immunotech, Radiová, Prague, Czech Republic) و بر طبق دستورالعمل کارخانه سازنده اندازه گیری شد (Alijani Ardeshir et al., 2016).

برای این کار، ابتداء نمونه‌ها و مواد کیت یک ساعت قبل از شروع کار از یخچال خارج شدند تا به دمای اتاق برسند. پس از اضافه کردن نمونه و معرفه‌ها، تیوب‌ها ورتكس و به مدت ۴۵ دقیقه در دمای اتاق آنکوبه شدند. سپس، محتواهای تیوب‌ها حالی و با قرار دادن آنها به صورت سروته بر روی کاغذ خشک کن به مدت ۲ دقیقه، مایع درون آنها کاملاً خارج شد. پس از خشک شدن تیوب‌ها، مقدار تشушعات گامای آنها در دستگاه شمارنده گاما LKB2 (فنلاند) اندازه گیری شد.

طرح کلی این تحقیق در قالب کاملاً تصادفی برنامه‌ریزی و اجرا شد. کلیه داده‌های مربوط به این تحقیق به صورت SE Mean \pm معنی‌دار بین تیمارها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) استفاده شد و سپس آزمون دانکن مورد استفاده قرار گرفت و مقادیر <0.05 معنی‌دار تلقی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و رسم نمودارها به وسیله نرم‌افزار EXCEL انجام گرفت.

نتایج


نتایج اندازه گیری میزان هورمون T₃ در تاسماهیان دورگه تغذیه شده با سطوح مختلف چربی اکسیدشده در شکل ۱ آمده است. با توجه به شکل، میزان هورمون T₃ در سرم تاسماهیان، با افزایش سطح چربی اکسیدشده جیره غذایی نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرد، بهطوری که بیشترین میزان این هورمون در گروه‌های تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی ۱۰۰ درصد چربی اکسیدشده مشاهده شد، اما این تغییرات در بین تیمارهای مختلف

و همکاران (2016) و اثبات تغییرات پروفایل لیپیدی در تاسماهی هیرید، این مطالعه با هدف بررسی اثر سطوح مختلف چربی اکسیدشده جیره در تاسماهی هیرید (*Huso huso*) (♂ × ♀ *Acipenser ruthenus*) بر تغییرات هورمون‌های تیروپیدی مؤثر در سوخت و ساز انجام شد.

مواد و روش‌ها


مطالعه حاضر در سالن و نیروی مجتمع تکییر و پرورش ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی واقع در سد سنگر انجام گرفت. ماهیان مورد استفاده در این آزمایش، از همین کارگاه تهیه و تعداد ۹۰ عدد تاسماهی هیرید جوان با میانگین وزنی 212.8 ± 0.7 گرم به صورت تصادفی در ۹ مخزن فایبر گلاس (۱۰ = ۱)، با حجم ۲ متر مکعب و حجم آبگیری ۷۰۰ لیتر توزیع شده و به مدت دو هفته جهت سازگاری با محیط آزمایشی با جیره پایه (جدول ۱) تغذیه شدند. سیستم آبرسانی به صورت آبشار با دبی 10 ± 2 لیتر بر دقیقه وارد هر مخزن می‌شد و از خروجی مرکزی خارج می‌شد. سیستم خروجی مخازن طوری طراحی شده بود که ارتفاع آب در تمام مخزن‌ها یکسان باشد. روشنایی دائمی (۲۴ ساعت نور) با استفاده از نور مصنوعی در محیط کارگاه تأمین شده بود. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در طول دوره به صورت روزانه تحت سنجش قرار گرفتند. دمای آب 0.29 ± 0.02 درجه سانتی گراد و pH آب 7.13 ± 0.11 و میزان اکسیژن محلول 0.07 ± 0.03 میلی گرم در لیتر بود. گروه‌های آزمایشی در مطالعه حاضر به صورت ۳ تیمار (۵۰، ۱۰۰ و ۱۰۰ درصد روغن اکسیدشده جیره) و هر تیمار سه تکرار بررسی شدند. بدین صورت که اقلام غذایی تهیه شد و پس از تنظیم فرمول غذایی (جدول ۱)، ابتدا اجزای غذایی غربال و با هم مخلوط شدند. سپس روغن ماهی به مخلوط اضافه شد. جهت اکسید کردن روغن ماهی مورد استفاده در مطالعه حاضر، روغن ماهی کیلکای خالص (شرکت قائم ساحل پودر، رشت، ایران) در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت در معرض هوادهی شدید قرار گرفت (Koshio et al., 1994) تا عدد پراکسید آن به بیش از ۴۰۰ meq/kg افزایش یابد.

طول دوره آزمایش شش هفته بود و غذادهی به صورت روزانه، سه نوبت بر حسب اشتها (ساعات ۸:۰۰، ۱۴:۰۰ و ۲۰:۰۰) انجام گرفت. جهت خون گیری، تاسماهیان هیرید با استفاده از




شکل ۱- تغییرات سطح هورمون (Huso huso ♂ × Acipenser ruthenus ♀) در سرم ماهی دور گه (Juvenile serum sturgeon hybrid (*Huso huso* ♂ × *Acipenser ruthenus* ♀)) جوان تغذیه شده با سطوح مختلف چربی اکسیدشده به مدت ۶ هفته.

Fig. 1. Changes in serum T3 levels (ng/ml) in juvenile serum sturgeon hybrid (*Huso huso* ♂ × *Acipenser ruthenus* ♀) fed by different oxidized oil levels for 6 weeks.



شکل ۲- تغییرات سطح هورمون (Huso huso ♂ × Acipenser ruthenus ♀) در سرم ماهی دور گه (Juvenile serum sturgeon hybrid (*Huso huso* ♂ × *Acipenser ruthenus* ♀)) جوان تغذیه شده با سطوح مختلف چربی اکسیدشده به مدت ۶ هفته.

Fig. 2. Changes in serum T4 levels (ng/ml) in juvenile serum sturgeon hybrid (*Huso huso* ♂ × *Acipenser ruthenus* ♀) fed by different oxidized oil levels for 6 weeks.



شکل ۳- تغییرات نسبت سطح هورمون T4 به T3 در سرم تاسماهیان دور گه (Juvenile serum sturgeon hybrid (*Huso huso* ♂ × *Acipenser ruthenus* ♀)) جوان تغذیه شده با سطوح مختلف چربی اکسیدشده به مدت ۶ هفته.

Fig. 3. Changes in serum T4/T3 ratio in juvenile serum sturgeon hybrid (*Huso huso* ♂ × *Acipenser ruthenus* ♀) fed by different oxidized oil levels for 6 weeks.

Eder & Strangle, 2000; Eder & Kirchgessner, 1997.

اگر چه اثر چربی اکسیده روی سوخت و ساز بدن حیوانات به خوبی مشخص شده است، اما مطالعات در باب اثر بالقوه چربی اکسیدشده روی متابولیسم هورمون‌های تیروپیدی در حیوانات اندک است. Eder و Stangl (2000) نشان دادند که رابطه ای تزدیک بین تغیرات هورمون‌های تیروپیدی و سوخت و ساز کلسترول در خوک‌های تغذیه شده با روغن اکسیدشده به‌وسیله حرارت وجود دارد و چربی اکسیدشده جیره غذایی می‌تواند موجب افزایش غلظت هورمون‌های تیروپیدی در خون شود. به این صورت که تغذیه با رژیم غذایی حاوی چربی اکسیدشده به‌وسیله حرارت، غلظت تیروکسین آزاد و کل در پلاسمما را افزایش می‌دهد (Eder & Strangle, 2000; Eder 1999). غلظت هورمون‌های تیروپیدی پلاسمما، غلظت کلسترول پلاسمما و قطعات لیپوپروتئینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Field *et al.*, 1986; Tanis *et al.*, 1996).

افزایش غلظت هورمون T₄ در خوک‌های تغذیه شده با چربی اکسیدشده با کاهش غلظت کلسترول پلاسمای آنها در ارتباط بود. بنابراین، مطالعه آنها نشان داد که رابطه تزدیکی بین تغیرات هورمون تیروپیدی و متابولیسم کلسترول در خوک-

های تغذیه شده با چربی اکسیدشده وجود دارد. اما با توجه به فقدان تغیرات معنی‌دار در میزان کلسترول سرم در تاسماهی هیبرید تغذیه شده با چربی اکسیدشده (Hasanpour *et al.*, 2016)، به نظر می‌رسد در ماهیان عوامل دیگری نیز بر کلسترول خون و در نتیجه بر متابولیسم چربی تأثیرگذار باشد. از جمله این عوامل می‌توان تغییر در فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز را پیشنهاد کرد. از طرف دیگر، وضعیت تغذیه حیوانات و مصرف انرژی، به‌طور ویژه دارای اثر قابل توجهی روی آزادسازی هورمون‌های تیروپیدی از غده تیروپید و میزان دیدنیاسیون کبدی است (Katzeff *et al.*, 1990). در مطالعه قبلی بر روی این ماهی مشخص شد که تغذیه تاسماهی هیبرید با جیره حاوی چربی اکسیدشده اثری بر میزان دریافت غذا و بازدهی آن ندارد که می‌تواند توجیهی برای عدم تغییر سطوح هورمون‌های تیروپیدی در این مطالعه باشد (Hasanpour *et al.*, 2016).

مواد مغذی، افزایش هورمون‌های تیروپیدی و به دنبال آن کاهش

معنی‌دار نبود ($p > 0.05$). نتایج اندازه گیری میزان هورمون T₄ در تاسماهیان دور گه تغذیه شده با سطوح مختلف چربی اکسیدشده در شکل ۲ نمایش داده شده است. همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود، مصرف سطوح مختلف چربی اکسیدشده رژیم غذایی باعث افزایش سطح هورمون T₄ سرم تاسماهیان نسبت به گروه شاهد شده است. به‌طوری که بیشترین میزان این هورمون در تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی ۱۰۰ درصد چربی اکسیدشده نسبت به گروه شاهد مشاهده شد، اما افزایش میزان این هورمون در بین گروه‌های تغذیه‌ای گوناگون اختلاف معنی‌داری نشان نداد ($p > 0.05$). نتایج اندازه گیری نسبت هورمون T₄ به T₃ در تاسماهیان دور گه تغذیه شده با سطوح مختلف چربی اکسیدشده در شکل ۳ نمایش داده شده است. با توجه به شکل ۳، نسبت هورمون T₃ به T₄، با افزایش سطح چربی اکسیدشده جیره غذایی نسبت به گروه شاهد کاهش پیدا کرد که کمترین میزان این نسبت، مربوط به گروه تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی ۵۰ درصد چربی اکسیدشده بود، ولی اختلاف معنی‌داری بین گروه‌های تغذیه‌ای مختلف مشاهده نشد ($p > 0.05$).

بحث

متabolیسم هورمون‌های تیروپیدی تحت تأثیر چندین عامل مغذی مانند تأمین انرژی، پروتئین یا برخی از عناصر ضروری قرار می‌گیرد. مطالعات اخیر نشان داده است که ترکیب اسیدهای رژیم غذایی نیز غلظت هورمون‌های تیروپیدی در گردش پلاسمما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چربی با سطح بالایی از اسیدهای چرب Takeuchi *et al.*, 1995 و خوک (Eder & Kirchgessner, 1997) به ایجاد غلظت‌های بالای تری‌یدوتیرونین (T₃) پلاسمما در مقایسه با چربی‌های با محتوای عده اسیدهای چرب اشباع خوک یا گاو منجر شد. این مطالعات نشان دادند که چربی اکسیدشده رژیم غذایی غلظت‌های هورمون T₄ کل و آزاد در پلاسمما را افزایش می‌دهد. این اثر ممکن است به دلیل افزایش آزادسازی آن هورمون از غده تیروپید باشد. به نظر می‌رسد که احتمالاً اثر چربی‌های اکسیدشده به عواملی مانند مقدار چربی، غلظت محصولات اولیه و ثانویه پراکسیداسیون چربی‌ها، شرایط آنتی اکسیدانی بدن حیوانات دوره

REFERENCES

- Alijani Ardesir, R., Rastgar, S., Movahedinia, A., Yarahmadi, Z.** 2016. Alterations in the plasma thyroid and cortisol hormones in Yellowfin Sea bream, *Acanthopagrus latus*, following exposure to Benzo(a)Pyrene. – *Pollut.* 2: 77-82.
- Borsting, C.F., Engberg, R.M., Jakobsen, K., Jensen, S.K. and Andersen, J.O.** 1994. Inclusion of oxidized fish oil in mink diets: the influence on nutrient digestibility and fatty-acid accumulation in tissues. – *J. Anim. Physiol. Anim. Nutr.* 72: 132-145.
- Burtsev, I.A.** 1972. Progeny of an intergeneric hybrid of beluga and sterlet. In genetics, selection and hybridization (Sobel, Y., ed.). – Keter Press, pp 211-220.
- Chen, Z., Guo, L., Amarnath, V. and Davies, S.** 2012. Identification of novel bioactive aldehyde-modified phosphatidylethanolamines formed by lipid peroxidation. – *Free Radic. Biol. Med.* 53: 1226-1238.
- Corcos Benedetti, P., Di Aquino, M., Di Felice, M., Gentili, V., Tagliamonte, B. and Tomassi, G.** 1987. Effects of a fraction of thermally oxidized soy bean oil on growing rats. – *Nutr. Rep. Int.* 36: 387-401.
- Eder, K. and Kirchgessner, M.** 1997. Zinc deficiency and vitamin E status in rats fed olive oil or linseed oil. – *Anim. Physiol. Anim. Nutr.* 77: 66-76.
- Eder, K.** 1999. The effect of an oxidized dietary oil on plasma cholesterol and thyroid hormone concentrations in miniature pigs fed on a hyperlipidemic diet. – *Anim. Physiol. Anim. Nutr.* 82: 271-281.
- Eder, K. and Stangle, G.I.** 2000. Plasma thyroxine and cholesterol concentrations of miniature pigs are influenced by thermally oxidized dietary lipids. – *J. Nutr.* 130: 116-121.
- Engberg, R.M., Lauridsen, C., Jensen, S.K. and Jacobsen, K.** 1996. Inclusion of oxidized vegetable oil in broiler diets: its influence on nutrient balanceand the antioxidant status of broilers. – *Poult. Sci.* 75: 1003-1011.
- Field, F.J., Albright, E. and Mathur, S.N.** 1986. The effect of hypothyroidism andthyroxine replacement on hepatic and intestinal HMG-CoA reductase and ACAT activities and biliary lipids in the rat. – *Metab.* 35: 1085-1089.
- Gupta, R.P., Verma, P.C. and Garg, S.L.** 1997. Effect of experimental Zinc deficiency on thyroid gland in Guinea-Pigs. – *Ann. Nutr. Metab.* 41: 376-381.
- Hamre, K., Kolas, K., Sandnes, K., Julshamm, K. and Kiessling, A.** 2001. Feed intake and absorption of lipid oxidation products in Atlantic salmon (*Salmo salar*) fed diets coated with oxidized fish oil. – *Fish Physiol. Biochem.* 25: 209-219.
- Hasanpour, S., Salati, A.P., Falahatkar, B. and Mohammadi Azarm, H.** 2016. Effects of dietary oxidized fish oil on growth and lipid metabolism in hybrid sturgeon (*Huso huso ♂×Acipenser ruthenus ♀*). – *J. Mar. Sci. Technol.* 15: 78-88.
- Howell, B.R., Day, O.J., Ellis, T. and Baynes, S.M.** 1998. Early life stages of farmed fish. In: Black, K.D., Pickering, A.D. (eds.) *Biology of farmed fish*. – Sheffield Academic Press, Sheffield, pp 27-

رشد حیوانات، متعاقب تغذیه با رژیم‌های غذایی حاوی روغن اکسیدشده گزارش شده است (Yoshida & Kajimoto, 1989; Engberg et al., 1996; Borsting et al., 1994; Corcos et al., 1987). این افزایش سطوح هormون‌های تیروئیدی تیروئیدی با هدف تأمین انرژی لازم متابولیسم پایه رخ می دهد. اثر چربی‌های اکسیدشده روی سوخت و ساز هormون‌های تیروئیدی، می‌تواند ناشی از استرس اکسیداتیو باشد. در نتیجه مصرف بالای آنتی اکسیدان‌ها مانند ویتامین E ممکن است از بروز این پامدها جلوگیری کند. مطالعات حاکی از آن است که استرس اکسیداتیو می‌تواند سوخت و ساز هormون‌های تیروئیدی را تحت تأثیر قرار دهد (Gupta et al. 1997). در مطالعه حاضر، عدم تفاوت معنی‌دار در مقادیر هormون‌های تیروئیدی در بین ماهیان تغذیه‌شده با چربه‌های غذایی حاوی نسبت‌های مختلف چربی اکسید شده، نشان‌دهنده فقدان تأثیر چربی اکسیدشده خوراکی بر سطوح هormون‌های تیروئیدی و درنتیجه سطح متابولیسم پایه در تاسماهیان دور گه است. این موضوع می‌تواند به‌واسطه عدم افزایش کاتابولیسم، و عدم حساسیت به چربی اکسیدشده در جیره غذایی برای رشد صورت پذیرد.

سپاسگزاری

از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای تأمین هزینه‌های مالی این مطالعه تشکر می‌گردد.

66.

- Karalazos, V.** 2007. Sustainable alternative to fish meal and fish oil in fish nutrition: effects on growth, tissue fatty acid composition and lipid metabolism. – Ph.D Thesis. Institute of Aquaculture, University of Stirling, Scotland, pp 205.
- Katzeff, H.L., Yang, M.U., Presta, E., Leibel, R., Hirsh, J. and Van Itallie, T.** 1990. Calorie restriction and iopanoic effects of thyroid hormone metabolism. – Am. J. Clin. Nutr. 52: 263- 266.
- Koshio, S., Ackman, R.G. and Lall, S.P.** 1994. Effects of oxidized herring and canola oils in diets on growth, survival, and flavor of Atlantic salmon, (*Salmo salar*). – J. Agric. Food Chem. 42: 1164- 1169.
- Lall, S.P. 2000.** Nutrition and health of fish. In: Cruz-Suárez, L.E., Ricque-Marie, D., Tapia-Salazar, M. Olvera-Novoa, M.A. and Civera-Cerecedo, R. 2000. Avances en Nutrición Acuícola V. Memorias del V Simposium Internacional de Nutrición Acuícola. 19-22 Noviembre,
- Lewis-McCrea, L.M. and Lall, S.P.** 2007. Effects of moderately oxidized dietary lipid and the role of vitamin E on the development of skeletal abnormalities in juvenile Atlantic halibut (*Hippoglossus hippoglossus*). – Aquaculture 262: 142-155.
- Nasopoulou, C. and Zabetakis, I.** 2012. Benefits of fish oil replacement by plant originated oils in compounded fish feeds, a review. – LWT-Food Sci. Technol. 47: 217-224.
- Tanis, B.C., Westendorp, G.J. and Smelt, H.M.** 1996. Effect of thyroid substitution on hypocholesterolemia in patients with subclinical hypothyroidism: a reanalysis of intervention studies. – Clin. Endocrinol. 44: 643-649.
- Takeuchi, H., Matuso, T., Tokuyama, K., Shimomura, Y. and Suzuki, M.** 1995. Diet induced thermogenesis is lower in rats fed a lard diet than in those fed a high oleic acid safflower oil diet, a safflower oil diet or a linseed oil diet. – J. Nutr. 125: 920-925.
- Watanabe, T.** 1981. Lipid nutrition in fish. – Comp. Biochem. Physiol. 73B: 3-15.
- Yoshida, H. and Kajimoto, G.** 1989. Effect of dietary vitamin E on the toxicity of autoxidized oil to Rats. – Ann. Nut. Metab. 33: 153-161.

How to cite this article:

Teymouri, S.A., Salati, A.P., Movahedinia, A., Zanoosi, H.P. and Hasanzadeh, S. 2017. Effects of dietary oxidized fish oil on thyroid hormones in Sturgeon hybrid. – Nova Biologica Rep. 4: 281-287.

تیموری، س.ا.، سالاتی، ا.پ.، مovahedinia، ا.، زانویی، ح.پ. و حسن پور، س. ۱۳۹۶. تأثیر سطوح چربی اکسیدشده چیره بر هormون‌های تیروئیدی در تاسماهی هیبرید. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۴: ۲۸۱-۲۸۷.