

## گروه خودریختی گروه‌های ناآبلی از مرتبه $p^4$

رضا عرفی؛ دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

پذیرش ۹۷/۰۶/۲۶

دریافت ۹۶/۰۳/۰۷

### چکیده

فرض کنیم  $G$  یک گروه ناآبلی از مرتبه  $p^4$  باشد در این مقاله یک ساختار برای  $p$ -زیرگروه سیلوی گروه خودریختی‌های  $G$  معرفی می‌شود.

واژه‌های کلیدی: گروه خودریختی، خودریختی‌های مرکزی و  $p$ -گروه متناهی

### مقدمه

مشخص کردن مرتبه و ساختار گروه خودریختی‌های  $p$ -گروه‌های متناهی یکی از مسائل مهم و کاربردی در نظریه گروه‌ها است. در این زمینه مقاله‌های زیادی به چاپ رسیده است که بیش‌تر این مقالات مربوط به بررسی مرتبه گروه خودریختی‌های  $p$ -گروه‌های متناهی است. به‌عنوان مثال می‌توان به مراجع [۱] و [۱۰] اشاره کرد. قابل ذکر است که تلاش‌های فراوانی برای مشخص کردن یک ساختار برای گروه خودریختی‌های  $p$ -گروه‌های متناهی انجام شده است که در این رابطه می‌توان به‌عنوان مثال به مقالات [۴] و [۹] مراجعه کرد.

جیمز به رده‌بندی گروه‌هایی از مرتبه  $p^n$  که در آن  $n \leq 6$  بر حسب خانواده‌های همبر<sup>۱</sup> است، پرداخته است [۵]. با توجه به [2, §29] دو گروه را همبر گویند در صورتی که زیرگروه‌های مشتق آن‌ها با یکدیگر و هم‌چنین گروه‌های خارج قسمتی آن‌ها با یکدیگر یکریخت باشند و به‌علاوه روابط جابه‌جاگرها در آن‌ها اساساً هم‌شکل باشند. با استفاده از مقاله جیمز معلوم می‌شود که تعداد ۱۰ گروه ناآبلی دو به دو غیر یکریخت از مرتبه  $p^4$  موجود است که در خانواده‌های غیرهمبر قرار دارند.

فرض کنیم  $G$  یک گروه ناآبلی از مرتبه  $p^4$  باشد گروه خودریختی‌های  $G$  و  $p$ -زیرگروه سیلوی گروه خودریختی‌های  $G$  را به ترتیب با علائم  $Aut(G)$  و  $Aut_p(G)$  نشان می‌دهیم. اگر  $\phi = \phi(G)$  بیان‌کننده زیرگروه فراتینی گروه باشد مجموعه  $Aut^\phi(G)$  را بدین صورت تعریف می‌کنیم:

$$Aut^\phi(G) = \{ \alpha \in Aut(G) \mid g^{-1} g^\alpha \in \phi(G), \quad \forall g \in G \}.$$

با توجه (Satz III. ۳.۱۷ از [۷]) داریم  $Aut^\phi(G)$  یک  $p$ -زیرگروه نرمال گروه  $Aut(G)$  است. هدف اصلی این مقاله بررسی یک ساختار برای  $Aut_p(G)$  است. در این مقاله نشان می‌دهیم اگر  $G$  پوچتوان از ردهٔ ماکزیمال باشد آن‌گاه  $Aut_p(G)$  برابر با  $Aut^\phi(G)$  و یا توسیع شکافته شده  $Aut^\phi(G)$  با یک گروه دوری از مرتبه  $p$  است (قضیهٔ ۸). به‌علاوه اگر  $G$  پوچتوان از ردهٔ ۲ باشد با استفاده از ساختار خودریختی‌های مرکزی گروه یک ساختار برای  $Aut_p(G)$  ارائه می‌شود.

1. Isoclinism

در این مقاله از علامتها و قراردادهای مرجع [۲] استفاده می‌شود. گروه خودریختی‌های مرکزی گروه  $G$  را با علامت  $Aut_c(G)$  و مجموعه تمام اعضای  $Aut_c(G)$  که مرکز گروه را نقطه به نقطه ثابت نگه می‌دارد را با علامت  $Aut_c^Z(G)$  نشان می‌دهیم. فرض کنیم  $G$  یک گروه،  $H$  و  $K$  زیرگروه‌های  $G$  باشند به طوری که  $K$  نرمال در  $G$  باشد. حاصل ضرب نیم‌مستقیم  $H$  در  $K$  را با علامت  $K \rtimes H$  نشان می‌دهیم. گروه دوری از مرتبه  $n$  را با علامت  $\mathbb{Z}_n$  و حاصل ضرب مستقیم  $\Gamma$  بار گروه  $\mathbb{Z}_n$  را به صورت  $(\mathbb{Z}_n)^r$  نشان می‌دهیم. اثر خودریختی  $\alpha$  روی عضو  $x$  را با علامت  $x^\alpha$  نشان می‌دهیم. هم‌چنین گروه  $G$  را ناآبلی محض<sup>۱</sup> گوئیم در صورتی که عامل مستقیم آبدی نابدیهی نداشته باشد.

### پیش‌نیازها

در این بخش ابتدا به بیان برخی نتایج بنیادی و اساسی می‌پردازیم که برای نتایج اصلی این مقاله مورد نیاز است. با توجه به مقاله جیمز [۵] تعداد ۱۰ گروه ناآبلی از مرتبه  $p^4$  داریم ( $p > 2$ ). در ذیل نمایش گروه‌های ذکر شده را برای حالت  $p \geq 5$  می‌آوریم قابل ذکر است برای حالت ۳ یا  $p = 2$  نمایش گروه با نمایش در حالت  $p \geq 5$  متفاوت است از این‌رو، با استفاده از نرم‌افزار GAP می‌توانیم نتایج را برای ۳ یا  $p = 2$  به راحتی مشاهده کنیم. برای خلاصه‌نویسی روابطی که به صورت  $[a, b] = 1$  در آن  $a$  و  $b$  مولد گروه هستند از نمایش حذف شده است و روابط جابه‌جاگرهای مولدها در صورتی که نابدیهی باشند فقط در نمایش ذکر می‌شود.

$$G_1 = \langle a, a_1, a_2, a_3 \mid [a_1, a] = a_2, a^p = a_2, a_1^p = a_2^p = a_3^p = 1 \rangle,$$

$$G_2 = \langle a, a_1, a_2, a_3 \mid [a_1, a] = a_2, a^p = a_1^p = a_2^p = a_3^p = 1 \rangle,$$

$$G_3 = \langle a, a_1, a_2 \mid [a_1, a] = a^{p^2} = a_2, a_1^p = a_2^p = 1 \rangle,$$

$$G_4 = \langle a, a_1, a_2 \mid [a_1, a] = a^p = a_2, a_1^{p^2} = a_2^p = 1 \rangle,$$

$$G_5 = \langle a, a_1, a_2, \gamma \mid [a_1, a] = \gamma^p = a_2, a^p = a_1^p = a_2^p = 1 \rangle,$$

$$G_6 = \langle a, a_1, a_2 \mid [a_1, a] = a_2, a^{p^2} = a_1^p = a_2^p = 1 \rangle,$$

$$G_7 = \langle a, a_1, a_2, a_3 \mid [a_1, a] = a_2, [a_2, a] = a^p = a_3, a_1^p = a_2^p = a_3^p = 1 \rangle,$$

$$G_8 = \langle a, a_1, a_2, a_3 \mid [a_1, a] = a_2, [a_2, a] = a_1^p = a_3, a^p = a_2^p = a_3^p = 1 \rangle,$$

$$G_9 = \langle a, a_1, a_2, a_3 \mid [a_1, a] = a_2, [a_2, a]^\nu = a_1^p = a_3^\nu, a^p = a_2^p = a_3^p = 1 \rangle,$$

که در آن  $\nu$  کوچک‌ترین نامانده مربعی به پیمانه  $p$  است.

$$G_{10} = \langle a, a_1, a_2, a_3 \mid [a_1, a] = a_2, [a_2, a] = a_3, a^p = a_1^p = a_2^p = a_3^p = 1 \rangle.$$

با در نظر گرفتن مقاله جیمز [۵] برای  $1 \leq i \leq 2$  دیده می‌شود  $G_i \cong \mathbb{Z}_p \times H_i$  که در آن  $H_i$  گروه ناآبلی از مرتبه  $p^3$  است به طوری که  $\exp(H_1) = p^2$  و  $\exp(H_2) = p$  قابل ذکر است که فقط گروه‌های  $G_1$  و  $G_2$  به صورت حاصل ضرب مستقیم دو زیر گروه خودشان هستند. هم‌چنین برای  $7 \leq i \leq 10$  گروه  $G_i$  از رده پوچتوانی ماکزیمال است و برای  $1 \leq i \leq 6$  گروه  $G_i$  دارای این خواص و ویژگی‌ها است:

1. purely non-abelian

جدول ۱.

Group	$Z(G)$	$\frac{G}{G'}$	$cl(G)$	$\frac{G}{Z(G)}$	$\phi(G)$
$G_1$	$\langle a_2, a_3 \rangle \cong (\mathbb{Z}_p)^2$	$(\mathbb{Z}_p)^3$	2	$(\mathbb{Z}_p)^2$	$G'_1$
$G_2$	$\langle a_2, a_3 \rangle \cong (\mathbb{Z}_p)^2$	$(\mathbb{Z}_p)^3$	2	$(\mathbb{Z}_p)^2$	$G'_2$
$G_3$	$\langle a^p \rangle \cong \mathbb{Z}_{p^2}$	$\mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p$	2	$(\mathbb{Z}_p)^2$	$Z(G_3)$
$G_4$	$\langle a_2, a_1^p \rangle \cong (\mathbb{Z}_p)^2$	$\mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p$	2	$(\mathbb{Z}_p)^2$	$Z(G_4)$
$G_5$	$\langle \gamma \rangle \cong \mathbb{Z}_{p^2}$	$(\mathbb{Z}_p)^3$	2	$(\mathbb{Z}_p)^2$	$G'_5$
$G_6$	$\langle a_2, a^p \rangle \cong (\mathbb{Z}_p)^2$	$\mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p$	2	$(\mathbb{Z}_p)^2$	$Z(G_6)$

تعریف:  $p$ -گروه  $G$  را منظم<sup>۱</sup> می‌گویند در صورتی که به‌ازای هر  $x, y$  از گروه  $G$ ، وجود داشته باشد عضوی مانند

$$x^p y^p = (xy)^p c \quad c \in U_1(\langle x, y \rangle)$$

لم ۱. فرض کنیم  $G$  یک گروه نآبلی از مرتبه  $p^4$  باشد به‌طوری‌که  $p \geq 5$  در این صورت

۱.  $G$  منظم است،

۲.  $G$  گروه فرآبلی است،

۳. اگر  $G$  پوچتوان از ردهٔ ماکزیمال باشد در این صورت  $|Z(G)| = p$ ،  $G' = \langle a_2, a_3 \rangle$ ،  $\exp(G') = p$ .

$$\exp\left(\frac{G}{Z(G)}\right) = p \quad \text{و} \quad Z(G) = \langle a_3 \rangle$$

۴. اگر  $G$  پوچتوان از ردهٔ ماکزیمال باشد در این صورت  $C_G(G') = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ .

۵. به‌ازای هر  $x, y$  از  $G$  داریم  $x^p y^p = (xy)^p$  و به‌علاوه  $x^p \in Z(G)$ .

برهان: ۱. به [۷], Satz III. 10.2(b) مراجعه شود.

۲. با توجه به این‌که  $|G'|$  عدد  $p^2$  را عادی می‌کند معلوم می‌شود زیرگروه مشتق آبلی است.

۳ و ۴. می‌دانیم که گروه‌های  $G_i$  که  $7 \leq i \leq 10$  پوچتوان از ردهٔ ماکزیمال هستند با استفاده از نمایش گروه‌ها

به‌راحتی نتایج مورد نظر به‌دست می‌آید.

۵. با توجه به مرتبهٔ زیرگروه مشتق در گروه‌های پوچتوان از ردهٔ ۲ طبق جدول ۱ و قسمت سوم لم ۱ داریم

$$\exp(G') = p \quad \text{لذا} \quad x^p y^p = (xy)^p \quad \text{هم‌چنین با استفاده از ساختار} \quad \frac{G}{Z(G)} \quad \text{از جدول ۱ و قسمت سوم لم ۱}$$

نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

لم ۲. فرض کنیم  $G = G_i$  که در آن  $3 \leq i \leq 6$  در این صورت

۱.  $G$  نآبلی محض است،

۲.  $|Aut_p(G)|$  عدد  $|Aut_c(G)|$  را عادی می‌کند.

برهان: ۱. فرض کنیم چنین نباشد از این‌رو، زیرگروه آبلی نابدهی مانند  $A$  و زیرگروه نآبلی محض مانند  $B$  موجود

است به‌طوری‌که  $G = A \times B$  با توجه به مرتبهٔ گروه نتیجه می‌شود  $A \cong \mathbb{Z}_p$  و  $B$  گروه نآبلی از مرتبهٔ  $p^3$  است. با

توجه به بحث انجام شده در ابتدای بخش پیش‌نیازها نتیجه می‌شود  $G \cong G_i$  که در آن  $1 \leq i \leq 2$ ، که این تناقض

است.

۲. با توجه به جدول ۱ داریم  $\frac{G}{Z(G)} \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$  بنابراین

$$\frac{Aut(G)}{Aut_c(G)} \hookrightarrow Aut\left(\frac{G}{Z(G)}\right) \cong Gl(2, p)$$

از این‌رو، نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

$$Aut_Z^Z(G) \cong Hom\left(\frac{G}{Z(G)}, Z(G)\right) \quad \text{قضیه ۳.}$$

برهان: به [۷], Satz I. 17.1 یا [۱۱], Result 1.1 مراجعه شود.

قضیه ۴. فرض کنیم  $G$  یک  $p$ -گروه فرآبلی متناهی از ردهٔ ماکزیمال از مرتبهٔ  $p^n$  باشد به طوری که  $G = \langle s, s_1 \rangle$  در این صورت  $|Aut_p(G) : Aut^\phi(G)| = p$  اگر و تنها اگر  $G$  دارای خودریختی مانند  $\alpha$  باشد به طوری که  $s_1^\alpha = s_1$  و  $s^\alpha = ss_1$ .

برهان: به [۴], Theorem 3.7 مراجعه شود.

قضیه ۵. [۳] Corollary ۳.۳ از [۳] فرض کنیم  $G = H \times K$  به طوری که  $H$  و  $K$  فاقد عامل مشترک در تجزیه به زیرگروه‌ها باشند. در این صورت

$$|Aut_c(G)| = |Aut_c(H)||Aut_c(K)||Hom(H, Z(K))||Hom(K, Z(H))|$$

### نتایج اصلی

در این فصل یک ساختار برای  $p$ -زیرگروه سیلوی  $Aut(G)$  معرفی می‌شود که در آن  $G$  یک  $p$ -گروه ناآبلی از مرتبهٔ  $p^4$  است. ابتدا  $p$ -گروه‌های از ردهٔ ماکزیمال از مرتبهٔ  $p^4$  را بررسی می‌کنیم.

لم ۶. فرض کنیم  $G$  یک  $p$ -گروه از ردهٔ ماکزیمال از مرتبهٔ  $p^4$  باشد در این صورت

$$1. \quad Inn(G) \text{ زیرگروه ناآبلی از مرتبهٔ } p^3 \text{ و نمای } p \text{ است،}$$

$$2. \quad |Aut^\phi(G)| = p^4 \text{ و } |Aut_p(G)| \text{ عدد } p^5 \text{ را عا د می‌کند،}$$

$$3. \quad Aut^\phi(G) = Inn(G) \rtimes \mathbb{Z}_p.$$

برهان: ۱. از قسمت سوم لم ۱ نتیجه می‌شود.

۲. با استفاده قسمت دوم لم ۱ و Theorem ۴.۳ از [۴] نتیجه می‌شود  $|Aut^\phi(G)| = p^4$ . همچنین چون  $G$  از ردهٔ

ماکزیمال است از این‌رو، دو مولدی است بنابراین  $\frac{G}{\phi(G)} \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ . حال با در نظر گرفتن این مطلب که

$$\frac{Aut(G)}{Aut^\phi(G)} \hookrightarrow Aut\left(\frac{G}{\phi(G)}\right) \cong Gl(2, p)$$

نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

۳. تابع  $\gamma$  را به صورت  $a^\gamma = a$  و  $a_1^\gamma = a_1 a_3$  تعریف می‌کنیم با توجه به لم ۱،  $Z(G) = \langle a_3 \rangle$  و با به کار بردن Proposition ۳, p۴۴ از [۶] نتیجه می‌شود  $\gamma$  یک خودریختی از مرتبهٔ  $p$  متعلق به  $Aut^\phi(G)$  است.

ادعا می‌کنیم  $\gamma \notin InnG$ . فرض کنیم چنین نباشد بنابراین  $\exists g \in G \setminus Z(G)$  به طوری که  $\gamma = i_g$ . با توجه به این که  $\langle Z(G)a, Z(G)a_1 \rangle = \frac{G}{Z(G)}$  و  $Z(G) = \langle a_3 \rangle$  نتیجه می‌گیریم که  $[a_1, g] = a_3$  و

$[a, g] = 1$ . بنابراین  $Z_2(G) = G'$  با توجه به این که  $Z(G)g \in Z\left(\frac{G}{Z(G)}\right) = \frac{Z_2(G)}{Z(G)}$  و  $Z(G)g \in G'$  می‌توانیم نتیجه بگیریم

اما با به کار بردن لم ۱ قسمت چهارم داریم  $[g, a_1] = 1$  که این یک تناقض است. بنابراین  $Aut^\phi(G) = Inn(G) \rtimes \langle \gamma \rangle$

لم ۷. فرض کنیم  $i \in \{7, 10\}$  در این صورت تابع  $\theta$  با ضابطه  $a^\theta = a_1$  و  $a_1^\theta = a a_1$  یک خودریختی از مرتبه  $p$  از گروه  $G_i$  است به طوری که  $\theta \notin \text{Aut}^\phi(G_i)$ .

برهان: با استفاده از قسمت‌های چهارم و پنجم لم ۱ و (Proposition ۳, p۴۴ از [۶]) برهان کامل می‌شود. فرض کنیم  $G$  یک  $p$ -گروه از ردهٔ ماکزیمال از مرتبه  $p^4$  باشد در قضیهٔ ۸، ما یک ساختار برای  $\text{Aut}_p(G)$  معرفی می‌کنیم.

قضیه ۸. فرض کنیم  $G_i$  یک  $p$ -گروه از ردهٔ ماکزیمال از مرتبه  $p^4$  باشد، که در آن  $7 \leq i \leq 10$ . در این صورت

$$۱. \text{ اگر } i \in \{7, 10\} \text{ آنگاه } \text{Aut}_p(G_i) \cong \text{Aut}^\phi(G_i) \rtimes \mathbb{Z}_p,$$

$$۲. \text{ اگر } i \in \{8, 9\} \text{ آنگاه } \text{Aut}_p(G_i) = \text{Aut}^\phi(G_i).$$

برهان: ۱. با به کار بردن لم ۷ و قضیهٔ ۴ نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

۲. با توجه به این که تابع  $\theta$  معرفی شده در لم ۷ برای گروه  $G_i$  که در آن  $8 \leq i \leq 9$  خودریختی نیست از

$$\text{این‌رو، با به کار بردن قضیهٔ ۴ نتیجه می‌شود } \text{Aut}^\phi(G_i) = \text{Aut}_p(G_i)$$

فرض کنیم  $G$  یک  $p$ -گروه از ردهٔ پوچتوانی ۲ و از مرتبه  $p^4$  باشد. در ادامهٔ این مقاله یک ساختار برای  $\text{Aut}_p(G)$  با استفاده از ساختار زیرگروه‌های  $\text{Aut}_c(G)$  و  $\text{Aut}_Z^Z(G)$  معرفی می‌شود. به راحتی دیده می‌شود که  $\text{Aut}_c(G)$  و  $\text{Aut}_Z^Z(G)$  زیرگروه‌های نرمال گروه  $\text{Aut}(G)$  هستند و به علاوه داریم  $\text{Aut}_c(G)$  برابر است با  $\mathcal{C}_{\text{Aut}(G)}(\text{Inn}(G))$ . در ([۱], Theorem) نویسندگان ثابت کردند اگر  $G$  یک گروه ناآبلی محض متناهی باشد آنگاه  $|\text{Aut}_c(G)| = |\text{Hom}\left(\frac{G}{Z(G)}, Z(G)\right)|$ . حال با توجه به مطالب ذکر شده به بررسی یک ساختار از  $\text{Aut}_p(G)$  می‌پردازیم.

لم ۹. فرض کنیم  $i \in \{1, 2, 3, 5, 6\}$  در این صورت تابع  $\delta$  با ضابطه  $a^\delta = a a_1$  که اثر آن روی سایر مولدها، همانی است، یک خودریختی از مرتبه  $p$  از گروه  $G_i$  است، به طوری که  $\delta \notin \text{Aut}_c(G_i)$ .

برهان: با توجه به این که  $G_i$  از ردهٔ پوچتوانی ۲ است داریم  $G_i' \leq Z(G_i)$  هم‌چنین با توجه به جدول ۱ داریم  $a_1 \notin Z(G_i)$ . حال با به کار بردن قسمت پنجم لم ۱ و (Proposition ۳, p۴۴ از [۶]) نتیجهٔ مطلوب حاصل می‌شود.

قضیهٔ ۱۰. فرض کنیم  $G = G_i$  که در آن  $1 \leq i \leq 2$  در این صورت

$$۱. |\text{Aut}_c(G)| = p^5(p-1)$$

$$۲. \text{Aut}_Z^Z(G) \cong (\mathbb{Z}_p)^4$$

$$۳. \text{Aut}_c(G) \cong (\text{Aut}_Z^Z(G) \rtimes \mathbb{Z}_p) \rtimes \mathbb{Z}_{p-1}$$

$$۴. \text{Aut}_p(G) \cong (\text{Aut}_Z^Z(G) \rtimes \mathbb{Z}_p) \rtimes \mathbb{Z}_p$$

برهان: ۱. با توجه به این که  $G \cong \mathbb{Z}_p \times H$  که در آن  $H$  گروه ناآبلی از مرتبه  $p^3$  است و با استفاده از قضیهٔ ۵ نتیجهٔ مطلوب حاصل می‌شود.

۲. با استفاده از جدول ۱ و قضیهٔ ۳ نتیجه مورد نظر به آسانی به دست می‌آید.

۳. با توجه به نمایش داریم  $G = \langle a, a_1, a_3 \rangle$  زیرا  $G = \Phi(G)$  زیرا  $a_2 \in G' \leq \Phi(G)$ . با توجه به قضیه جای‌گذاری به آسانی دیده می‌شود تابع  $\theta$  با ضابطه  $a^\theta = a$ ،  $a_1^\theta = a_1$  و  $a_3^\theta = a_3 a_2$  یک خودریختی مرکزی از مرتبه  $p$  است به طوری که  $\theta \notin \text{Aut}_Z^Z(G)$ . با توجه به این‌که  $\text{Aut}_Z^Z(G)$  زیرگروه نرمال  $\text{Aut}(G)$  است و با در نظر گرفتن قسمت اول همین قضیه داریم  $P = \text{Aut}_Z^Z(G) \rtimes \langle \theta \rangle$  زیرگروه  $p$ -سیلوی  $\text{Aut}_c(G)$  است. با قراردادن  $\mathbb{Z}_p = \langle x \rangle$  و  $\text{Aut}(\mathbb{Z}_p) = \langle \beta \rangle$  می‌توانیم خودریختی مرکزی  $\beta^*$  برای گروه  $G \cong \mathbb{Z}_p \times H$  از مرتبه  $p-1$  را به صورت  $(hx^i)^{\beta^*} = h(x^i)^\beta$  برای هر  $h$  عضو  $H$  و هر  $i$  عضو  $\mathbb{Z}$  تعریف کنیم. با در نظر گرفتن این مطلب که  $P \leq \text{Aut}_c(G)$  و قسمت اول همین قضیه نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

۴. با به کار بردن Proposition ۳.p۴۴ از [۶]، و قسمت پنجم لم ۱ تابع  $\psi$  با ضابطه  $a^\psi = aa_1$ ،  $a_1^\psi = a_1$  و  $a_3^\psi = a_3$  خودریختی غیرمرکزی از مرتبه  $p$  است. با توجه به جدول ۱ داریم  $\frac{G}{Z(G)} \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$  بنابراین  $\frac{\text{Aut}(G)}{\text{Aut}_c(G)} \hookrightarrow \text{Aut}\left(\frac{G}{Z(G)}\right) \cong \text{Gl}(2, p)$ .

از این‌رو، با توجه به وجود خودریختی غیرمرکزی از مرتبه  $p$  داریم  $|\text{Aut}_p(G)| = p^6$ . بنابراین نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

قضیه ۱۱. فرض کنیم  $G = G_i$  که در آن  $i \in \{3, 5\}$  در این صورت

$$1. |\text{Aut}_c(G)| = p^3$$

$$2. \text{Aut}_Z^Z(G) = \text{Inn}(G) \cong (\mathbb{Z}_p)^2$$

$$3. \text{Aut}_c(G_5) \cong (\mathbb{Z}_p)^3 \text{ و } \text{Aut}_c(G_3) \cong \mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p$$

$$4. \text{Aut}_p(G) \cong \text{Aut}_c(G) \rtimes \mathbb{Z}_p$$

برهان: قسمت اول و دوم با توجه به جدول ۱ و لم ۲ قسمت اول و قضیه ۳ به راحتی محاسبه می‌شود.

۳) با توجه به این‌که  $\text{Inn}(G)$  آبدلی است داریم  $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}_c(G) = C_{\text{Aut}(G)}(\text{Inn}(G))$ . بنابراین  $\text{Inn}(G) \leq Z(\text{Aut}_c(G))$ . از این‌رو،  $\text{Aut}_c(G)$  آبدلی است و نمای آن حداکثر  $p^2$  است. تابع  $\theta$  با ضابطه  $a^\theta = a^{1+p}$  و  $a_1^\theta = a_1 a^{p^2}$  خودریختی مرکزی از مرتبه  $p^2$  برای گروه  $G_3$  است که با توجه به قسمت اول لم ۲ نتیجه می‌شود  $\text{Aut}_c(G_3) \cong \mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p$  هم‌چنین تابع  $\omega$  با ضابطه  $\gamma^\omega = \gamma^{1+p}$  که بقیه مولدها را ثابت نگه دارد، یک خودریختی مرکزی از مرتبه  $p$  برای گروه  $G_5$  است که مرکز گروه را حرکت می‌دهد بنابراین

$$\text{Aut}_c(G_5) = \text{Aut}_Z^Z(G_5) \times \langle \omega \rangle \cong (\mathbb{Z}_p)^3$$

۴. با به کار بردن لم ۹ و قسمت دوم لم ۲ برهان کامل می‌شود.

قضیه ۱۲. فرض کنیم  $G = G_i$  که در آن  $i \in \{4, 6\}$  در این صورت

$$1. \text{Aut}_c(G) = \text{Aut}_Z^Z(G) \cong (\mathbb{Z}_p)^4$$

$$2. \text{Aut}_p(G_6) \cong \text{Aut}_c(G_6) \rtimes \mathbb{Z}_p$$

$$3. \text{Aut}_p(G_4) \cong ((\mathbb{Z}_p^2 \times \mathbb{Z}_p) \rtimes \mathbb{Z}_p) \rtimes \mathbb{Z}_p$$

برهان: ۱. با توجه به جدول ۱ و قضیه ۳ نتیجه می‌شود  $Aut_Z^Z(G) \cong (\mathbb{Z}_p)^4$ . با به کار گرفتن قسمت نخست لم ۱ داریم  $|Aut_c(G)| = p^4$  که مطلب اخیر برهان را کامل می‌کند.

۲. با استفاده از قسمت دوم لم‌های ۹ و ۱ نتیجه مطلوب به دست می‌آید.

۳. تابع  $\sigma$  با ضابطه  $a^\sigma = a$  و  $a_1^\sigma = a_1 a$  یک خودریختی غیر مرکزی از مرتبه  $p^2$  است. بنابراین با در نظر گرفتن قسمت نخست لم فوق و لم ۱ داریم  $|Aut_p(G_4)| = p^5$  از این رو، با در نظر گرفتن مرتبه خودریختی  $\sigma$  داریم:

$$Aut_Z^Z(G_4) = U_1(Aut_p(G_4)) < Aut_p(G_4)$$

بنابراین  $Aut_p(G_4)$  نمی‌تواند به صورت حاصل ضرب نیم‌مستقیم  $Aut_c(G)$  با  $\mathbb{Z}_p$  باشد.

ساختاری برای  $Aut_p(G_4)$  معرفی کنیم. برای این منظور توابع  $\psi, \gamma, \delta$  را به ضابطه زیر تعریف می‌کنیم:

$$a^\psi = a^{1+p}, a_1^\psi = a_1^{1+p}, \quad a^\gamma = a^{1+p}, a_1^\gamma = a_1, \quad a^\delta = a^{1+p} a_1^p, a_1^\delta = a_1$$

به سهولت دیده می‌شود این توابع خودریختی‌های مرکزی از مرتبه  $p$  هستند و به علاوه روابط  $\sigma\psi = \psi\sigma$ ,  $\gamma^{-1}\sigma\gamma = \sigma^{1+p}$  و  $\psi\gamma = \gamma\psi$  نیز برقرار است بنابراین  $H = \langle \sigma, \psi \rangle \cong \mathbb{Z}_p^2 \times \mathbb{Z}_p$  با توجه به آبلی بودن  $H$  و این که  $[\sigma, \gamma] \neq 1$  نتیجه می‌گیریم که  $\gamma \notin H$ . هم‌چنین با استفاده از روابط ذکر شده در مورد خودریختی‌ها داریم  $\gamma \in N_{G_4}(H)$ . با قرار دادن  $K = \langle \sigma, \psi, \gamma \rangle$  نتیجه می‌گیریم  $K \cong (\mathbb{Z}_p^2 \times \mathbb{Z}_p) \rtimes \mathbb{Z}_p$  هم‌چنین با در نظر گرفتن نمایش گروه  $G_4$  داریم  $\langle a \rangle \trianglelefteq G_4$  و  $a_1^p \notin \langle a \rangle$  زیرا در غیر این صورت  $|G_4 / \langle a \rangle| = p$  که این یک تناقض است. ادعا می‌کنیم  $\delta \notin K$  زیرا در غیر این صورت اعداد صحیح  $i, j, \ell$  موجود است به طوری که  $\delta = \sigma^i \psi^j \gamma^\ell$  در نتیجه باید داشته باشیم  $a^\delta = a^{\sigma^i \psi^j \gamma^\ell} \in \langle a \rangle$  که این یک تناقض است. بنابراین  $Aut_p(G_4) = K \rtimes \langle \delta \rangle$ .

### منابع

- 1 Adney J. E., Yen T., "Automorphisms of a p-group, Illinois Journal of Mathematics 9", (1965) 137-143.
- 2 Berkovich Y., "Groups of Prime Power Order", Vol. 1, Walter de Gruyter, Berlin (2008).
- 3 Bidwell J. N. S., Curran M. J., McCaughan D. J., "Automorphisms of direct products of finite groups", Arch. Math. 86 (2006) 481-489.
- 4 Fouladi S., Orfi R., "Automorphisms of metabelian prime power order groups of maximal class", Bull. Austral. Math. Soc. 77 (2008) 261-276.
- 5 Rodney James, "The Groups of Order  $p^6$  ( $p$  an Odd Prime)", Math. Comp., 34, No.150 (1980) 613-637.
- 6 Johnson D. L., "Presentation of groups", 2nd ed., LMS Stud. texts, Cambridge University press (1997).
- 7 Huppert B., "Endliche Gruppen", Vol. 1, Springer-Verlage (1967).

- 8 The GAP Group, GAP-Groups, "Algorithms, and Programming", Version 4.4.10 (2007) (<http://www.gap-system.org>).
- 9 Juhász A., "The group of automorphisms of a class of finite  $p$ -groups", *Trans. Amer. Math. Soc.* Vol. 270, No. 2 (1982) 469-481.
- 10 Menegazzo F., "Automorphisms of  $p$ -groups with cyclic commutator subgroup", *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova*, Vol. 90 (1993) 81-101.
- 11 Schmid P., "Normal  $p$ -subgroups in the group of outer automorphisms of a finite  $p$ -group", *Math. Z.* 147 (1976) 271-277.