



## Screening and Isolation of Extracellular Lipase Producing Halophilic Bacteria *Marinobacter* sp. S-14 Isolated from Badab-e Surt Hypersaline Spring

### ARTICLE INFO

#### Article Type

Original Research

#### Authors

Satari Faghihi L.<sup>1</sup> MSc,  
Ahmady-Asbchin S.<sup>\*1</sup> PhD,  
Seyedalipour B.<sup>1</sup> PhD,  
Riazi Gh.H.<sup>2</sup> PhD

#### How to cite this article

Satari Faghihi L, Ahmady-Asbchin S, Seyedalipour B, Riazi Gh H. Screening and Isolation of Extracellular Lipase Producing Halophilic Bacteria *Marinobacter* sp. S-14 Isolated from Badab-e Surt Hypersaline Spring. Modares Journal of Biotechnology. 2018;9(3):441-449.

<sup>1</sup>Molecular & Cell Biology Department, Basic Sciences Faculty, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

<sup>2</sup>Institute of Biochemistry & Biophysics (IBB), University of Tehran, Tehran, Iran

#### \*Correspondence

Address: Central Organization, Pasdaran Street, Babolsar, Mazandaran, Iran. Postal Code: 4741613534  
Phone: +98 (11) 35302000  
Fax: -  
sahmadyas@yahoo.fr

#### Article History

Received: May 15, 2018

Accepted: July 16, 2018

ePublished: September 22, 2018

### ABSTRACT

**Aims** Today, the ability to produce hydrolases enzyme that are active in high salt concentrations is considered a new approach to the use of halophilic bacteria in biotechnology. The aim of this study was the screening and isolation of extracellular lipase producing halophilic bacteria *Marinobacter* sp. S-14 isolated from Badab-e Surt Hypersaline spring.

**Materials & Methods** In this experimental study, 42 pure bacterial colonies were isolated from different samples of water, soil, sediment, and sludge from a hypersaline spring with a screening technique on the specific culture medium of halophilic bacteria. The isolate S-14, which showed the highest lipase activity, was selected for the identification by biochemical methods and 16S rRNA gene analysis. In order to optimize the growth conditions of the isolate, considering the maximum time of bacterial growth (72 hours), temperature, salt concentration, pH, carbohydrate, and amino acid intake were examined. The results were edited by Chromas pro 2.1.1 software, and compared with EzTaxon database. Strains that were more similar to the isolate were identified. Sequence analysis of 16S rRNA were performed by BioEdit 7.1.9, Clustal-2X 2.1, and MEGA 6, and the phylogenetic tree was drawn by the neighbor joining algorithm.

**Findings** The isolate S-14 had 99% similarity to *Marinobacter flavimaris* and *Marinobacter adhaerens*. The isolate had optimum growth in 5% NaCl concentration, 35°C, and 7.0 acidity.

**Conclusion** The isolate S-14 can be an appropriate candidate to produce extracellular lipase enzyme and can utilize Fructose and Phenylalanine as a sole source of carbon and energy.

**Keywords** Halophilic Bacteria; *Marinobacter* sp.; Lipase; Hydrolysis enzymes; Badab-e Surt

### CITATION LINKS

[1] Biotechnological applications and potentialities of halophilic ... [2] Halophilic hydrolases as a new tool for the biotechnological ... [3] Proteins from halophilic bacteria ... [4] A novel halophilic lipase, LipBL, showing high efficiency in the ... [5] Biotechnological applications of halophilic lipases ... [6] Bacterial lipases: An overview of production ... [7] Comparison of lipases and phospholipases in the ... [8] A systematic strain selection approach for halotolerant ... [9] Isolation and identification of moderately ... [10] Study on the role of cultural, social activities urban ... [11] Production of extracellular enzymes by halophilic ... [12] Biodiversity of moderately halophilic ... [13] Current protocols in ... [14] Isolation and characterization of extreme halophilic bacterium ... [15] Purification and characterization of an extracellular haloalkaline ... [16] Isolation of moderately halophilic pseudoalteromonas producing extracellular hydrolytic ... [17] Rapid method for determining the activity of microorganisms ... [18] Isolation and characterization of bacterial ... [19] Chitinolytic enzymes: Their contribution to basic ... [20] Isolation of hydrolase producing bacteria from Sua pan solar salterns and the production of endo-1, 4-bxylanase from a newly isolated haloalkaliphilic ... [21] Introducing EzTaxon-e: A prokaryotic 16S rRNA gene sequence database with ... [22] MEGA6: Molecular evolutionary genetics ... [23] Numerical taxonomy of moderately halophilic gram-negative ... [24] Isolation of moderately halophilic indigenous bacterial strains producing salt-tolerant ... [25] Extremozymes [26] Production of an extracellular thermohalophilic lipase from a moderately halophilic ... [27] Isolation of typical marine bacteria by dilution culture: Growth, maintenance, and characteristics of isolates under ... [28] Viability and isolation of marine bacteria by dilution culture: Theory, procedures ... [29] Diversity of culturable moderate halophilic and halotolerant bacteria in ... [30] Biodiversity of moderately halophilic bacteria in hypersaline habitats in ... [31] *Marinobacter persicus* sp. nov., a moderately halophilic bacterium from a saline ... [32] *Marinobacter halophilus* sp. nov., a halophilic bacterium isolated from a salt ... [33] *Marinobacter lutaoensis* sp. nov., a thermotolerant marine bacterium isolated from a ... [34] *Marinobacter antarcticus* sp. nov., a halotolerant ... [35] *Marinobacter salarius* sp. nov. and *Marinobacter* ...

## غریبالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولیدکننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت

لیلا ستاری فقیهی MSc

گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

سلمان احمدی اسپچین PhD\*

گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

باقر سیدعلیپور PhD

گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

غلامحسین ریاضی PhD

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

### چکیده

**اهداف:** امروزه توانایی تولید آنزیم‌های هیدرولازی که در غلظت‌های بالای نمک فعال هستند، به‌عنوان رویکرد تازه‌ای در استفاده از باکتری‌های هالوفیل در بیوتکنولوژی مطرح است. هدف این پژوهش، غریبالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولیدکننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت بود.

**مواد و روش‌ها:** در پژوهش تجربی حاضر، ۴۲ کلنی خالص باکتری، از نمونه‌های مختلف آب، خاک، رسوب و لجن یکی از چشمه‌های آب شور باداب سورت با تکنیک غریبالگری روی محیط کشت اختصاصی باکتری‌های هالوفیل جداسازی شدند. جدایه S-14 که بیشترین فعالیت لیپازی را از خود نشان داد، برای شناسایی توسط روش‌های بیوشیمیایی و آنالیز ژن *16S rRNA* انتخاب شد. به‌منظور بهینه‌سازی شرایط رشد جدایه با در نظر گرفتن بیشینه زمان رشد باکتری (۷۲ ساعت)، دما، غلظت نمک، pH، میزان مصرف کربوهیدرات و آسیدامینه بررسی شدند. نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزار Chromas pro 2.1.1 ویرایش و با اطلاعات بانک اطلاعاتی EzTaxon مقایسه شد. سویه‌هایی که تشابه بیشتری با جدایه منتخب داشتند، مشخص شدند. آنالیز توالی *16S rRNA* توسط نرم‌افزارهای BioEdit 7.1.9، Clustal-2X 2.1 و MEGA 6 انجام و درخت فیلولوژی توسط الگوریتم اتصال-همسایگی ترسیم شد.

**یافته‌ها:** جدایه S-14 با تشابه بیش از ۹۹٪ با دو گونه مارینوباکتر *Flavimarinobacter* (*Marinobacter flavimaris*) و مارینوباکتر *adhaerens* (*Marinobacter adhaerens*) تجانس داشت. جدایه S-14 بیشترین میزان رشد را در غلظت نمک ۵٪، دمای ۳۵°C و میزان آسیدیتته ۷/۰ نشان داد.

**نتیجه‌گیری:** جدایه S-14، تولیدکننده مناسبی برای آنزیم خارج سلولی لیپاز است و می‌تواند از فروکتوز و آسیدامینه فیل‌آلنین به‌عنوان تنها منبع کربن و انرژی استفاده کند.

**کلیدواژه‌ها:** باکتری هالوفیل، مارینوباکتر، آنزیم لیپاز، آنزیم‌های هیدرولازی، باداب سورت

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

\* نویسنده مسئول: sahmadyas@yahoo.fr

### مقدمه

باکتری‌های هالوفیل در اکثر زیستگاه‌های طبیعی و محیط‌های شور پراکنده شده‌اند. هالوفیل‌ها زیرشاخه‌ای از باکتری‌های اکستروفیل محسوب می‌شوند که توانایی رشد در غلظت‌های بالای نمک را دارند<sup>[1]</sup>. امروزه توانایی تولید آنزیم‌های هیدرولازی که در غلظت‌های بالای نمک فعال هستند و دنا توره نمی‌شوند، به‌عنوان رویکرد تازه‌ای در استفاده از باکتری‌های هالوفیل در بیوتکنولوژی مطرح است<sup>[2, 3]</sup>، لذا با شناسایی باکتری‌های تولیدکننده این آنزیم‌ها و بهینه‌سازی شرایط تولید آنزیم می‌توان نیاز بازارهای داخلی را به واردات، تولید و مصرف این آنزیم‌ها مرتفع ساخت.

زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس

آنزیم لیپاز (E.C.3.1.1.1) و کربوکسیلاستراز (E.C.3.1.1.3) به‌صورت گسترده در طبیعت توسط باکتری‌ها و یوکاریوت‌های آلی‌تر تولید می‌شوند. تری‌آسیل‌گلیسرول‌های کم‌محلول در آب، سوبسترای اصلی آنزیم لیپاز را تشکیل می‌دهند. لیپازها به‌طور اختصاصی توانایی هیدرولیز پیوند استری میان کربن ۱ و ۳ گلیسرول را دارند. در واقع لیپازها می‌توانند زنجیره‌های بلند کربنی آسیل‌گلیسرول‌ها را هیدرولیز کنند، در حالی که استرازاها تنها می‌توانند اسیدهای چرب کوتاه زنجیره را هیدرولیز نمایند<sup>[4, 5]</sup>. این آنزیم‌ها به‌واسطه فعالیت بالا، دامنه گسترده سوبسترای و پایداری در شرایط سخت فرآیندهای صنعتی، کاربردهای بسیار وسیعی در بیوتکنولوژی دارند<sup>[6, 5]</sup>. لیپازها، بیوکاتالیست‌های ارزشمندی هستند که در محیط‌های آبی و غیرآبی، فعال و همچنین در pHهایی غیر از pH خنثی و دماهای بالا مقاوم هستند، لذا این قابلیت‌ها موجب استفاده وسیع آنها در صنایع تولید شوینده، صنایع غذایی و دارویی، صنایع چرم‌سازی، تولید سوخت زیستی و سنتز انواع ترکیبات چرب شده است<sup>[6-8]</sup>.

ایران کشوری گرم و خشک با پراکندگی وسیع از محیط‌های شور دائمی و فصلی است<sup>[9]</sup>. باداب سورت یکی از چشمه‌های شور دائمی است که پس از کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان دومین اثر ملی طبیعی ایران به ثبت رسیده است<sup>[10]</sup> و دارای منبع غنی از میکروارگانیزم‌های نمک‌دوست با قابلیت تولید آنزیم‌های خارج سلولی بوده، لذا شناسایی این میکروارگانیزم‌های بومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش، غریبالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولیدکننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت بود.

### مواد و روش‌ها

در پژوهش تجربی حاضر، توئین ۸۰، اینولین، پکتین و کیتین (Sigma-Aldrich؛ آلمان)، محیط کشت نوترینت برات و تست فعالیت داکسی‌ریبونوکلاز (DNase آگار) و باقی محیط کشت‌های تست‌های بیوشیمیایی (Qlab؛ کانادا) و باقی مواد ذکر شده در پژوهش (Merck؛ آلمان) تهیه شد.

**نمونه‌گیری و غریبالگری باکتری‌های نمک‌دوست و تحمل‌کننده نمک:** در این پژوهش نمونه‌های مختلف آب، خاک، رسوب و لجن یکی از چشمه‌های آب شور باداب سورت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک غریبالگری روی محیط کشت اختصاصی باکتری‌های هالوفیل جداسازی شدند. نمونه‌ها در بطری‌های سترون با رعایت زنجیره سرد کمتر از ۲۴ ساعت به آزمایشگاه منتقل و بلافاصله pH نمونه‌های آب (با نمونه‌گیری از دو نقطه چشمه آب شور) توسط دستگاه pH متر مدل ۳۵۱۰ (Jenway؛ انگلستان) به ترتیب ۷ و ۷/۱ اندازه‌گیری شدند. به‌منظور جداسازی بهتر باکتری‌های نمک‌دوست و تحمل‌کننده نمک، زمان نمونه‌گیری در فصل خشک سال در نظر گرفته شد. لذا نمونه‌گیری در اواسط مهر ۱۳۹۴ از چشمه آب شور باداب سورت (شکل ۱) واقع در کیاسر استان مازندران در موقعیت جغرافیایی N362119 E535123 و ارتفاع ۱۸۴۱ متری از سطح دریا و در محدوده روستای اروست انجام شد<sup>[10]</sup>. برای جداسازی بهتر باکتری‌های هالوفیل و هالوتولرنت از محیط کشت اختصاصی جداسازی باکتری‌های نمک‌دوست متوسط (MH) و محیط کشت آگار و مواد مغذی آب دریا (SWN) با pHهای مختلف استفاده شد. محیط کشت MH شامل ۱۰ گرم بر لیتر سدیم کلرید (NaCl)، ۹/۶ گرم بر لیتر منیزیم کلرید ۷آبه (MgCl<sub>2</sub>·7H<sub>2</sub>O)، ۷ گرم بر لیتر منیزیم کلرید ۶آبه

اکسیدسازی و کاتالازی جدایه‌ها با استفاده از کشت ۲۴ ساعته باکتری‌ها به ترتیب از تترامتیل پارافینیلین دی‌آمین دی‌هیدروکلراید ( $C_6H_8N_2$ ) و پراکسید هیدروژن ( $H_2O_2$ ) به عنوان معرف استفاده شد. بررسی فعالیت اکسیدسازی با ایجاد رنگ آبی در حداقل زمان و بررسی فعالیت کاتالازی با تولید حباب اکسیژن، مثبت گزارش شد. برای آزمون‌های بیوشیمیایی، هر یک از جدایه‌ها به محیط‌های کشت سیمون سیترات، سولفید ایندول موتیلیتی (SIM)، تریپل شوگر آبیرون آگار (TSI) و متیل‌رد- و گزپروسکوئر (MR-VP) تلقیح شدند و نتایج پس از ۲۴ ساعت گرمخانه‌گذاری بررسی شد.

**تفکیک سویه‌های نمک‌دوست از سویه‌های تحمل‌کننده نمک:** برای تفکیک میان باکتری‌های نمک‌دوست و تحمل‌کننده نمک، غلظت کلی نمک موجود در محیط کشت مطرح است. بنابراین برای تفکیک جدایه‌ها از نظر نمک‌دوست بودن یا تحمل‌پذیری نمک، محیط کشت نوترینت آگار با صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵٪ نمک تهیه شد و پس از تهیه سوسپانسیون نیم‌مک‌فارلندی از هر جدایه، تلقیح روی محیط کشت‌های فوق صورت گرفت و در دمای  $37^\circ C$  گرمخانه‌گذاری شدند و نتایج به مدت یک هفته هر ۲۴ ساعت یکبار بررسی شد. جدایه‌هایی که بتوانند روی محیط کشت فاقد نمک به خوبی محیط کشت حاوی نمک رشد کنند، به عنوان سویه‌های هالوتولرنت در نظر گرفته می‌شوند [9]. همچنین به منظور بررسی رشد هالوفیل‌ها، محیط کشت نوترینت آگار با درصدهای مختلفی از نمک سدیم کلراید صفر، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵٪ تهیه شد و جدایه‌ها پس از تهیه سوسپانسیون نیم‌مک‌فارلندی به محیط‌های کشت، القا و در دمای  $37^\circ C$  گرمخانه‌گذاری شدند و نهایتاً رشد آنها توسط کدورت‌سنجی با جذب در  $600$  نانومتر توسط اسپکتروفتومتر مدل Spectrum SP-2100UV (Shanghai Spectrum؛ چین) بررسی شد. براساس تفاوت مورفولوژیک و خصوصیات بیوشیمیایی باکتری‌ها، تنها تعدادی از جدایه‌ها برای بررسی تولید آنزیم انتخاب شدند.

**فعالیت آنزیم‌های هیدرولازی:** این بررسی روی دسته‌ای از جدایه‌ها که تفاوت آنها از لحاظ خصوصیات و صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفته بود، انجام شد. در این مرحله سنجش به روش پلیت و روی دو درصد متفاوت از غلظت نمک سدیم کلراید (۵ و ۱۰٪) صورت گرفت.

**تولید خارج سلولی آنزیم لیپاز:** به منظور بررسی تولید خارج سلولی آنزیم لیپاز با توجه به هیدرولیز توئین ۸۰ از محیط کشت شامل ۱۰ گرم بر لیتر پپتون، ۱۰ گرم بر لیتر کلسیم کلراید یک‌آبه ( $CaCl_2 \cdot 1H_2O$ )، ۱۵ گرم بر لیتر آگار و ۱٪ توئین ۸۰ استفاده شد. پس از تلقیح باکتری و گرمخانه‌گذاری در  $37^\circ C$  به مدت چهار روز ایجاد هاله رسوبی مات و کدر در اطراف کلنی‌ها نشانه هیدرولیز توئین ۸۰ و تولید آنزیم خارج سلولی لیپاز [14] است. گسترده‌گی محدوده رسوب براساس ضعف و قدرت آنزیم لیپاز تولید شده توسط باکتری است.


به منظور بررسی تولید خارج سلولی آنزیم‌های هیدرولازی دیگر، آزمایش‌های تکمیلی زیر برای تعدادی از جدایه‌ها انجام شد:

۱- **تولید خارج سلولی آنزیم پروتئاز:** برای بررسی تولید خارج سلولی پروتئاز از یک محیط کشت با ترکیب ۱۰ گرم بر لیتر اسکیم‌میلک (Skim Milk)، ۳ گرم بر لیتر پپتون، ۵ گرم بر لیتر عصاره مخمر و ۱۵ گرم بر لیتر آگار استفاده شد. پس از دو هفته گرمخانه‌گذاری، ایجاد هاله روشن و شفاف در اطراف کلنی‌ها به دلیل هیدرولیز پروتئین کازئین، به عنوان جواب مثبت در نظر گرفته شد [15].

۲- **تولید خارج سلولی آنزیم آمیلاز:** برای بررسی تولید آمیلاز

( $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ )، ۳۶ گرم بر لیتر کلسیم کلراید ۲ آبه ( $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ )، ۲ گرم پتاسیم کلراید (KCl)، ۰/۰۶ گرم بر لیتر سدیم بی‌کربنات ( $NaHCO_3$ )، ۰/۰۲۶ گرم بر لیتر سدیم بروماید (NaBr)، ۱۰ گرم بر لیتر عصاره مخمر، ۵ گرم بر لیتر پپتون، یک گرم بر لیتر گلوکز و ۱۵ گرم بر لیتر آگار با pH برابر با  $7.5 \pm 0.5$  بود [11]. محیط کشت SWN نیز شامل ۲۰ گرم بر لیتر سدیم کلراید، ۵ گرم بر لیتر منیزیم کلراید ۷ آبه، ۳ گرم بر لیتر منیزیم کلراید ۶ آبه، ۰/۰۵ گرم بر لیتر کلسیم کلراید ۲ آبه، ۰/۵ گرم بر لیتر پتاسیم کلراید، یک گرم بر لیتر عصاره مخمر، ۲ گرم بر لیتر عصاره گوشت، ۵ گرم بر لیتر پپتون و ۱۵ گرم بر لیتر آگار با pH برابر با  $9.0 \pm 0.5$  بود [12].

نمونه‌های آب، سانتزیفیوژ و از رسوب آن به صورت مستقیم برای کشت روی محیط کشت استفاده شد. در نمونه‌های خاک و رسوب، پس از تهیه رقت‌های متوالی تا رقت  $10^{-6}$  از سوسپانسیون میکروبی حاصل استفاده و نمونه لجن به صورت مستقیم به محیط کشت تلقیح شد. محیط‌های تلقیح شده در دمای  $37^\circ C$  به مدت یک هفته گرمخانه‌گذاری شدند. به منظور جداسازی و خالص‌سازی باکتری‌های تندرشد و کندرشد در فواصل زمانی ۲۴ ساعته از کلنی‌های جدید تشکیل شده بر بستر آگار، کشت مجدد صورت پذیرفت.



شکل ۱) منطقه نمونه‌گیری چشمه آب شور باداب سورت

**خالص‌سازی، نگهداری و نام‌گذاری جدایه‌ها:** برای خالص‌سازی سویه‌ها پس از چندین مرحله کشت هر جدایه با ایجاد تک‌کلنی، احراز خلوص آن و مشاهده تثبیت خصوصیات میکروسکوپی و مورفولوژیک، جدایه‌ها نام‌گذاری شدند و از نظر ریخت‌شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور نگهداری طولانی‌مدت جدایه‌ها پس از تلقیح تک‌کلنی‌ها به محلول ۱۵٪ گلیسرول، جدایه‌ها در فریزر  $80^\circ C$  - به عنوان استوک فریز شدند.

**بررسی صفات و خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی جدایه‌ها:** به منظور بررسی خصوصیات ظاهری و ماکروسکوپی، از محیط جامد حاوی غلظت بالاتری از آگار استفاده شد و شکل، رنگ، حاشیه، سطح و ارتفاع کلنی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جدایه‌ها از نقطه نظر معطر بودن بررسی شدند. شکل میکروسکوپی جدایه‌ها پس از رنگ‌آمیزی گرم توسط میکروسکوپ نوری و بزرگ‌نمایی ۱۰۰۰ مشاهده شد [13].

**بررسی خصوصیات بیوشیمیایی جدایه‌ها:** به منظور بررسی فعالیت

*16S rRNA* و رسم درخت فیلوژنی انتخاب شد. در واقع از میان جدایه‌هایی که قادر به تولید آنزیم خارج‌سلولی لیباز بودند، جدایه S-14 براساس مقایسه اندازه قطر هاله نمکی تشکیل‌شده از هیدرولیز توئین ۸۰ با دیگر جدایه‌ها، به‌عنوان جدایه منتخب برای تعیین توالی و آنالیز ژن *16S rDNA* پس از انجام واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمرازی و تایید صحت انجام واکنش توسط الکتروفورز (Macrogen؛ کره جنوبی) ارسال شد. جدایه S-14، باسیل نازک و رشته‌ای گرم‌منفی، خمیده، با کلنی‌های نقطه‌ای بسیار کوچک است. این جدایه از نظر پیگمان‌زایی، گرم‌رنگ، سطح کلنی آن نیمه‌شفاف و از نظر برجستگی کلنی برآمده و دارای بوی مطبوعی است. این جدایه با شماره دستیابی KX954612 در سایت NCBI ثبت شد.

**استخراج DNA ژنومی و آنالیز ژن *16S rRNA*:** برای استخراج DNA ژنومی ابتدا یک کشت ۲۴ ساعته از جدایه منتخب تهیه شد. استخراج DNA ژنومی با استفاده از کیت مخصوص استخراج (Thermo Scientific؛ ایالات متحده) انجام شد. پس از اطمینان از استخراج DNA ژنومی با انجام الکتروفورز و مشاهده باند استخراج ژنوم، با استفاده از پرایمرهای یونیورسال ژن *16S rDNA*، 27F و 1492R واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) انجام شد (جدول ۱). واکنش PCR در ۳۵ سیکل با دمای ذوب اولیه  $95^{\circ}\text{C}$  (۵ دقیقه)، دمای ذوب  $95^{\circ}\text{C}$  (۶۰ ثانیه)، دمای اتصال  $58/15^{\circ}\text{C}$  (۴۵ ثانیه)، دمای سنتز دو رشته  $72^{\circ}\text{C}$  (۶۰ ثانیه) و نهایتاً دمای سنتز نهایی  $72^{\circ}\text{C}$  (۱۰ دقیقه) انجام شد.

جدول ۱) توالی و خصوصیات پرایمرهای یونیورسال رفت و برگشت

پرایمر	توالی (3'→5')	درصد GC	دمای ذوب	محصول PCR
27F	AGAGTTTGATCMTGGCTCAG	۴۷%	$49^{\circ}\text{C}$	۱۵۰۰ جفت‌بازی
1492R	GGTTACCTTGTACGACTT	۴۲%	$47^{\circ}\text{C}$	۱۵۰۰ جفت‌بازی

نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزار Chromas pro 2.1.1 ویرایش و با اطلاعات بانک اطلاعاتی EzTaxon مقایسه شد [21]. سویه‌هایی که تشابه بیشتری با جدایه منتخب داشتند، مشخص شدند و توالی ژن *16S rDNA* آنها از سایت NCBI دریافت شد. آنالیز توالی *16S rRNA* توسط نرم‌افزارهای BioEdit 7.1.9، Clustal-2X 2.1 و MEGA 6 انجام شد [22]. درخت فیلوژنی توسط الگوریتم اتصال-همسایگی و بررسی اعتبار شاخه‌های درخت با کمک الگوریتم تحلیل بوت‌استرپ با ۱۰۰۰ بار نمونه‌گیری ترسیم شد.

#### بررسی شرایط بهینه رشد جدایه S-14

به‌منظور بهینه‌سازی شرایط رشد جدایه با در نظر گرفتن بیشینه زمان رشد باکتری (۷۲ ساعت)، دما، غلظت نمک، pH، میزان مصرف کربوهیدرات و آسیدامینه بررسی شدند.

**دمای بهینه رشد:** جدایه S-14 به محیط کشت نوترینت آگار حاوی ۵% سدیم کلراید، تلقیح و در دماهای ۱۵، ۲۵، ۳۵، ۴۵ و  $55^{\circ}\text{C}$  به مدت ۷۲ ساعت گرمخانه‌گذاری شد. از محیط کشت حاوی باکتری هر ۲۴ ساعت مقداری به‌عنوان نمونه برداشته و جذب آن در ۶۰۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده و میزان رشد باکتری براساس دمای بهینه رشد بررسی شد. همچنین جدایه به محیط کشت نوترینت آگار حاوی ۵% نمک تلقیح و در دمای  $5^{\circ}\text{C}$ ، انکوبه و در مدت سه روز رشد باکتری روی محیط کشت جامد بررسی شد.

خارج‌سلولی توسط جدایه‌ها از محیط کشت نشاسته آگار با ترکیبات ۱۵ گرم بر لیتر نشاسته، ۳ گرم بر لیتر پیتون، ۵ گرم بر لیتر عصاره مخمر و ۱۵ گرم بر لیتر آگار استفاده شد. پس از یک هفته گرمخانه‌گذاری جدایه‌ها در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  انکوباتور، با افزودن دیدیتاسیم ( $\text{I}_2/\text{KI}$ ) یا لوگل به پلیت، ظهور هاله شفاف در اطراف کلنی‌ها، نشانه هیدرولیز نشاسته بود [16].

**۳- تولید خارج‌سلولی آنزیم داکسی‌ریبونوکلازها (DNase):** برای مطالعه تولید خارج‌سلولی آنزیم DNase از محیط کشت DNase تست آگار با افزودن ۰/۸ میلی‌گرم تولوئیدین‌بلو به‌عنوان معرف استفاده شد. پس از یک هفته گرمخانه‌گذاری در صورتی که باکتری قادر به تولید آنزیم DNase می‌شد، رنگ محیط کشت اطراف کلنی از سبز به زرد تغییر می‌یافت [17].

**۴- تولید خارج‌سلولی آنزیم اینولیناز:** اینولین از طریق صاف کردن به ترکیبات محیط کشت شامل ۳ گرم بر لیتر اینولین، ۰/۲ گرم بر لیتر مونوپتاسیم فسفات ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ )، ۲ گرم بر لیتر آمونیوم سولفات با نام شیمیایی  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ، ۰/۵ گرم بر لیتر منیزیم سولفات ۷ آبه و ۲۰ گرم بر لیتر آگار پس از اتوکلاو کردن افزوده شد. پس از یک هفته رشد باکتری‌ها در سطح پلیت، نشانه توانایی جدایه‌ها برای تولید آنزیم خارج‌سلولی اینولیناز بود [18].

**۵- تولید خارج‌سلولی آنزیم پکتیناز:** محیط کشت آنزیم پکتیناز، یک محیط کشت کمپلکس از ترکیبات یک‌گرم بر لیتر پکتین، ۰/۰۲ گرم بر لیتر منیزیم سولفات ۷ آبه، ۱/۶ گرم بر لیتر منیزیم سولفات یک‌آبه، ۰/۱۴ گرم بر لیتر آمونیوم سولفات، ۱/۴ گرم بر لیتر زینک سولفات ۷ آبه ( $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ )، ۰/۲ گرم بر لیتر دی‌پتاسیم فسفات ( $\text{K}_2\text{HPO}_4$ )، ۵ گرم بر لیتر سولفات آهن (II) ۷ آبه ( $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ )، ۲ گرم بر لیتر کلسیم کلرید و ۲۰ گرم بر لیتر آگار بود. پکتین از طریق صاف کردن به محیط فوق پس از اتوکلاو افزوده شد [9].

**۶- تولید خارج‌سلولی آنزیم کیتیناز:** محیط کشت شامل ۳۰ گرم بر لیتر تریپتیک سوی براث (TSB)، ۰/۱ گرم بر لیتر کیتین کلئوئیدال و ۱۲ گرم بر لیتر آگار بود. کیتین جدا از ترکیبات دیگر محیط کشت در  $105^{\circ}\text{C}$  به مدت ۵ دقیقه جداگانه اتوکلاو شد. برای تولید کیتیناز خارج‌سلولی پس از گرمخانه‌گذاری، روی محیط کشت در اطراف کلنی باکتریایی هاله‌ای شفاف مشاهده می‌شود [19].

**۷- تولید خارج‌سلولی آنزیم زایلاناز:** محیط کشت آنزیم زایلاناز با ترکیبات ۰/۲ گرم بر لیتر پیتون، ۰/۱ گرم بر لیتر عصاره مخمر، ۰/۰۵ گرم بر لیتر کلسیم کلرید، ۰/۵ گرم بر لیتر منیزیم سولفات و ۲۰ گرم بر لیتر آگار، اتوکلاو شد. سپس میزان ۱% زایلان به‌وسیله صاف کردن به آن افزوده شد. پس از یک هفته گرمخانه‌گذاری با افزودن کنگورد ۰/۱% و نمک یک‌مولار به محیط کشت (به‌عنوان معرف)، اگر در اطراف کلنی‌ها هاله شفاف ایجاد می‌شد، تاییدی بر تولید آنزیم زایلان توسط جدایه بود [20].

**۸- تولید خارج‌سلولی آنزیم ژلاتیناز:** برای تولید ژلاتین از محیط کشت شامل ۱۲۰ گرم بر لیتر ژلاتین، ۵ گرم بر لیتر پیتون و ۳ گرم بر لیتر عصاره گوشت استفاده شد. پس از یک هفته گرمخانه‌گذاری، محیط کشت از انکوباتور خارج و به مدت ۱۰ دقیقه در یخچال در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  قرار داده شد. در صورت تولید آنزیم ژلاتیناز توسط باکتری، پس از خروج لوله آزمایش از یخچال، اگر محیط کشت همچنان به‌صورت مایع باقی بماند، جواب تست مثبت است [14].

از میان جدایه‌هایی که برای تولید آنزیم‌های هیدرولازی خارج‌سلولی انتخاب شده بودند، یک جدایه با توانایی تولید آنزیم خارج‌سلولی لیباز به‌عنوان جدایه منتخب برای توالی‌یابی، آنالیز ژن

جدول ۲) بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی جدایه‌های تولیدکننده آنزیم خارج سلولی لیپاز

خصوصیات	S-3	S-10	S-11	S-14	S-18
<b>مورفولوژیک</b>					
شکل	نقطه‌ای	نقطه‌ای	نقطه‌ای	نقطه‌ای	نقطه‌ای
پیگمان زایی	شیری	کرم	شیری	کرم	گلبهی
سطح کلنی	مات	نیمه شفاف	مات	نیمه شفاف	نیمه شفاف
حاشیه کلنی	صاف و کامل	-	صاف و کامل	-	-
برجستگی کلنی	محدب	برآمده	برآمده	برآمده	محدب
معطربودن کلنی	-	معطر	-	معطر	معطر
رنگ آمیزی گرم	گرم منفی	گرم منفی	گرم منفی	گرم منفی	گرم منفی
شکل یاخته‌ای	باسیل	باسیل	باسیل	باسیل	کوکوباسیل
فرم باکتری	رشته‌ای	رشته‌ای	دییلوئید	رشته‌ای	تکی و رشته‌ای
اندازه	نازک	بسیار نازک	-	-	بسیار کوچک
رشد بر غلظت‌های مختلف سدیم کلرید	%۵/۰-۱۰/۰	%۵/۰-۱۰/۰	%۵/۰-۱۰/۰	%۵/۰-۱۰/۰	%۵/۰-۱۰/۰
کاتالاز	+	+	+	+	+
اکسیداز	+	+	+	+	+
<b>حساسیت آنتی‌بیوتیک</b>					
باسیتراسین	حساس	مقاوم	مقاوم	مقاوم	مقاوم
نتراسایکلین	حساس	حساس	مقاوم	حساس	حساس
جنتامیسین	حساس	حساس	مقاوم	مقاوم	مقاوم
کلرامفنیکل	حساس	حساس	حساس	حساس	حساس
پنی‌سیلین	حساس	حساس	مقاوم	حساس	حساس
<b>تست‌های مورد استفاده</b>					
سیمون سیترات (MR)	-	*w	+	-	-
متیل رد (VP)	-	-	-	+	-
وژس پروسکوئر	-	-	+	-	-
احیای نیترات	-	w	+	-	+
تولید گاز	-	-	-	-	-
حرکت	-	-	-	-	-
تست ایندول	-	-	-	-	-

\*w نشان‌دهنده ضعیف بودن آن ویژگی است

جدول ۳) بررسی تولید آنزیم‌های هیدرولازی توسط پنج جدایه تولیدکننده آنزیم خارج سلولی لیپاز

ایزوله	لیپاز	DNase	پروتئاز	آمیلز	اینولیناز	پکتیناز	آزایلاناز	کیتیناز	ژلاتیناز
S-3	+	-	-	-	-	-	-	-	w*
S-10	+	-	-	-	-	-	-	-	+
S-11	+	+	+	+	+	+	+	+	w
S-14	+	-	-	-	-	-	-	-	w
S-18	+	-	-	w	-	-	-	-	+

\*w نشان‌دهنده ضعیف بودن آن ویژگی است

شبهات‌ها و تفاوت‌های جدایه S-14 با شش گونه باکتریایی جنس مارینوباکتر شامل مارینوباکتر هالوفیلوس (*Marinobacter halophilus*) سویه XCD-X12، مارینوباکتر پرسیکوس (*Marinobacter persicus*) سویه M9B، مارینوباکتر لوتاؤنسیس (*Marinobacter lutaensis*) سویه T5054، مارینوباکتر آنتارکتیکوس (*Marinobacter antarcticus*) سویه ZS2-30، مارینوباکتر سالاریس (*Marinobacter salaries*) سویه R9SW1 و مارینوباکتر سیمیلیس (*Marinobacter similis*) سویه A3d10 استخراج شد (جدول ۴).

**غلظت بهینه نمک:** با توجه به رشد جدایه S-14 در آزمایشاتی که برای بررسی میزان تحمل‌پذیری نمک و نمک‌دوستی انجام شده بود، باکتری به محیط کشت حاوی صفر، ۲/۵، ۵، ۷/۵ و ۱۰٪ نمک، تلقیح و در دمای بهینه رشد گرمخانه‌گذاری شد. به مدت سه روز، هر ۲۴ ساعت یک‌بار از محیط کشت‌های حاوی غلظت‌های مختلف نمک، مقداری نمونه برداشته و جذب آن در ۶۰۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده و نمودار مربوط به رشد باکتری در غلظت‌های مختلف نمک رسم شد. غلظت بهینه رشد جدایه به دست آمد.

**pH بهینه رشد جدایه:** جدایه S-14 به محیط کشت‌هایی با غلظت بهینه نمک با میزان اسیدیته‌های متفاوت (pH‌های ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱) در دمای بهینه رشد به مدت سه روز گرمخانه‌گذاری شد و با نمونه‌برداری از محیط‌های کشت به روش کدورت‌سنجی، رشد باکتری در ۶۰۰ نانومتر مورد بررسی قرار گرفت.

**مصرف کربوهیدرات توسط جدایه:** برای بررسی مصرف کربوهیدرات توسط جدایه از گلوکز، فروکتوز، مالتوز و ساکارز در محیط کشت شامل ترکیبات ۵۰ گرم بر لیتر سدیم کلرید، ۲ گرم بر لیتر پتاسیم کلرید، ۲ گرم بر لیتر پتاسیم نیترات (KNO<sub>3</sub>)، ۱ گرم بر لیتر دی‌آمونیم فسفات با نام شیمیایی (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>، ۰/۵ گرم بر لیتر مونوپتاسیم فسفات (KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) و ۵/۵ گرم بر لیتر کربوهیدرات (pH برابر با ۷/۵±۰/۱) استفاده شد و پس از ۷۲ ساعت گرمخانه‌گذاری، رشد باکتری به وسیله اسپکتروفتومتر در ۶۰۰ نانومتر مورد بررسی قرار گرفت [23].


**مصرف اسید آمینه به عنوان تنها منبع کربن و نیتروژن:** برای بررسی مصرف اسید آمینه، یک بافر نمکی با افزودن اسید آمینه مورد نظر با ترکیبات ۵۰ گرم بر لیتر سدیم کلرید، ۲ گرم بر لیتر پتاسیم کلرید، ۲ گرم بر لیتر منیزیم سولفات ۷/۵، ۰/۵ گرم بر لیتر مونوپتاسیم سولفات و ۱/۰ گرم بر لیتر آمینواسید (pH برابر با ۷/۵±۰/۱) تهیه شد. اسیدهای آمینه سیستئین، آرژنین و فنیل آلانین به این بافر نمکی افزوده شدند. باکتری پس از رشد در محیط کشت نوترینت‌براث، به سه لوله آزمایش حاوی هر یک از اسیدهای آمینه و یک لوله آزمایش حاوی بافر به عنوان نمونه کنترل منفی تلقیح و پس از ۷۲ ساعت گرمخانه‌گذاری رشد باکتری توسط روش نورسنجی با استفاده از اسپکتروفتومتر در ۶۰۰ نانومتر بررسی شد [23].

## یافته‌ها


۴۲ کلنی خالص باکتری با استفاده از تکنیک غریبالگری روی محیط کشت اختصاصی باکتری‌های هالوفیل مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین تعداد جدایه‌ها روی محیط کشت MH با اسیدیته ۷/۵ جداسازی شدند. براساس رنگ‌آمیزی گرم، ۴۲٪ باکتری‌ها گرم‌مثبت (۷٪ باسیل گرم‌مثبت میله‌ای و ۹۳٪ کوکسی گرم‌مثبت) و ۵۸٪ جدایه‌ها به صورت باسیل گرم‌منفی گزارش شدند. براساس آزمون تحمل‌پذیری نمک، ۴۷٪ جدایه‌ها توانستند هم روی محیط کشت حاوی نمک و هم روی محیط کشت فاقد نمک به خوبی رشد کنند. از میان ۴۲ کلنی باکتریایی براساس تفاوت در تست‌های بیوشیمیایی و عدم تشابه در خصوصیات ظاهری و مورفولوژیک، ۱۴ جدایه به منظور بررسی تولید آنزیم‌های هیدرولازی خارج سلولی انتخاب شدند. خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیک ۵ جدایه تولیدکننده آنزیم لیپاز تعیین شد (جدول ۲). همچنین حدود ۳۶٪ جدایه‌ها قادر به تولید آنزیم خارج سلولی لیپاز روی محیط کشت حاوی ۱۰ و ۵٪ نمک بودند (جدول ۳).

متغیرها	باکتری شماره ۱	باکتری شماره ۲	باکتری شماره ۳	باکتری شماره ۴	باکتری شماره ۵	باکتری شماره ۶	باکتری شماره ۷
رنگ آمیزی گرم	گرم منفی	گرم منفی	گرم منفی	گرم منفی	گرم منفی	گرم منفی	گرم منفی
شکل سولوی	میله‌ای	میله‌ای	میله‌ای	میله‌ای	میله‌ای	میله‌ای	میله‌ای
حرکت	غیرمتحرک	متحرک	متحرک	متحرک	متحرک	متحرک	متحرک
پیگمان زایی	کرم	-	زرد- نارنجی	-	کرم- قهوه‌ای	-	-
تحمل پذیری نمک	%۰-۱۰/۰	%۰-۲۰/۰	%۵/۰-۲۰/۰	%۰/۵-۱۲/۰	%۰-۲۵/۰	%۰/۵-۲۵/۰	%۰/۵-۲۵/۰
غلظت نمک بهینه رشد	%۲/۵-۵/۰	%۴/۰-۸/۰	%۷/۵-۱۰/۰	%۳/۰-۵/۰	%۳/۰-۴/۰	%۳/۰-۴/۰	%۳/۰-۴/۰
تحمل پذیری pH	%۵/۰-۹/۰	%۶/۵-۱۰/۵	%۶/۰-۸/۰	%۵/۰-۹/۰	%۵/۰-۱۰/۵	%۶/۰-۹/۰	%۶/۰-۹/۰
pH بهینه رشد	۷/۰	۸/۵	۷/۰	۷/۰	۷/۰	۷/۵	۷/۵
رشد در دامنه دمایی مختلف	۱۵-۴۵°C	۴-۳۵°C	۲۵-۴۵°C	۲۵-۵۰°C	۴-۳۵°C	۴-۴۰°C	۴-۴۰°C
دمای بهینه رشد	۳۵°C	۳۰°C	۳۵°C	۴۵°C	۲۵°C	۲۵-۳۰°C	۲۵-۳۰°C
هیدرولیز توئین ۸۰	مثبت	مثبت	منفی	مثبت	مثبت	مثبت	مثبت
احیای نیترات	منفی	مثبت	منفی	منفی	مثبت	منفی	مثبت
مصرف کربوهیدرات	دی- فروکتوز	دی- گلوکز	دی- فروکتوز دی- مالتوز	دی- گلوکز	دی- گلوکز دی- مالتوز	-	دی- گلوکز <sup>w</sup>
مصرف اسید آمینه	ال- فنیل آلانین	ال- آرژنین	ال- هیستیدین ال- پرولین	ال- آلانین ال- آسپاراتات ال- گلوتامات ال- فنیل آلانین	ال- آلانین ال- سرین	ال- گلوتامیک اسید ال- سرین	ال- گلوتامیک اسید
تست کاتالاز	مثبت	مثبت	مثبت	مثبت	مثبت	مثبت	مثبت
تست اکسیداز	مثبت	مثبت	مثبت	مثبت	مثبت	مثبت	مثبت

باکتری شماره ۱: جدایه S-14 نمونه انتخاب شده مطالعه حاضر، باکتری شماره ۲: ماریوباکتر *هالوفیلوس* سویه XCD-X12، باکتری شماره ۳: ماریوباکتر *پرسیکوس* سویه M9B، باکتری شماره ۴: ماریوباکتر *لوتانوسیس* سویه T5054، باکتری شماره ۵: ماریوباکتر *آنتارکتیکوس* سویه ZS2-30، باکتری شماره ۶: ماریوباکتر *سالاریس* سویه R9SW1 و باکتری شماره ۷: ماریوباکتر *سیمیلیس* سویه A3d10 است؛ \*w نشان دهنده ضعف مصرف کربوهیدرات است




**نمودار (۲)** رشد جدایه S-14 در غلظت‌های مختلف نمک به منظور تعیین غلظت نمک بهینه (۳ تکرار): دما و pH برای تعیین غلظت بهینه نمک به ترتیب ۳۵°C و ۷/۵ ثابت در نظر گرفته شدند




**نمودار (۳)** رشد جدایه S-14 در pH مختلف برای تعیین بهترین میزان اسیدیته محیط کشت برای رشد باکتری (سه تکرار): غلظت نمک سدیم کلرید و دما به ترتیب ۵% و ۷/۵ ثابت در نظر گرفته شدند

بر اساس توالی ژن *16S rDNA* برای جدایه S-14 و آنالیز نتایج در پایگاه اطلاعاتی EzTaxon، این جدایه با تشابه بیش از ۹۹% با دو گونه ماریوباکتر *فلاویماریس* (*Marinobacter flavimaris*) و ماریوباکتر *ادهارنس* (*Marinobacter adhaerens*) تجانس داشت. درخت فیلوژنتیک بر اساس توالی *16S rRNA* برای مقایسه وضعیت سویه مورد بررسی رسم شد (شکل ۲).

بر اساس زمان بهینه رشد باکتری (۷۲ ساعت)، جدایه S-14 در دمای ۳۵°C، غلظت ۵% نمک سدیم کلرید و همچنین اسیدیته خنثی (pH برابر با ۷)، بیشترین میزان رشد بر اساس جذب در ۶۰۰ نانومتر را از خود نشان داد. در آزمایش مصرف منابع مختلف کربوهیدرات و اسیدهای آمینه، جدایه S-14 بیشترین میزان رشد را با بالاترین جذب نوری در ۶۰۰ نانومتر با مصرف دی- فروکتوز و ال- فنیل آلانین به عنوان تنها منبع کربن و انرژی داشت (نمودارهای ۱-۳).



**نمودار (۱)** بررسی رشد جدایه S-14 در دماهای مختلف برای تعیین بهترین دمای رشد باکتری (سه تکرار): متغیرهای دیگر آزمایش از جمله غلظت نمک و pH به ترتیب ۵% و ۷/۵ ثابت در نظر گرفته شدند



شکل ۲) دندروگرام 16S rRNA باکتری ترادف یابی شده S-14 با قرابت نزدیکی به مارینوباکتر فلاویماریس (*Marinobacter flavimaris*) و تعیین توالی به روش اتصال - همسایگی و با استفاده از معیار بوت استرپ

## بحث

پژوهش حاضر با هدف غربالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولیدکننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت انجام شد. چشمه های اسرارآمیز باداب سورت اروست مشتمل بر سه چشمه با آب های کاملاً متفاوت از لحاظ رنگ، بو و مزه هستند. یکی از این چشمه ها دارای آبی بسیار شور است که به علت شوری زیاد و دارا بودن املاح و مواد معدنی فراوان به هیچ عنوان در فصل زمستان یخ نمی زند. این چشمه از نظر زمین شناختی از نوع ژئوپارک محسوب می شود<sup>[10]</sup> و تاکنون هیچ پژوهشی از فلور میکروبی این منطقه با توانایی تولید آنزیم های هیدرولازی گزارش نشده است.

پژوهش حاضر براساس روش های مبتنی بر کشت باکتری ها انجام گرفت و با توجه به سهم کوچک میکروارگانیزم های قابل کشت در جوامع میکروبی، بررسی نتایج تنها به میکروارگانیزم های هوازی و بی هوازی اختیاری قابل کشت محدود می شود. همان گونه که اشاره شد، باکتری های نمک دوست و تحمل کننده نمک، به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص و رشد در شرایط نامتعارف، اهمیت زیادی در فرآیندهای صنعتی و زیست فناوری دارند<sup>[1, 5]</sup>. اگر چه مطالعات بسیار محدودی روی تولید آنزیم های خارج سلولی باکتری های هالوفیل انجام شده است، اما عموماً این آنزیم ها به دلیل محتوای بالای اسیدهای آمینه، در شرایط سخت و غلظت های بالای نمک، فعال و قادر به کاتالیز واکنش های شیمیایی هستند<sup>[24, 25]</sup>. آنزیم لیپاز از جمله آنزیم های صنعتی است که امروزه جایگاه ویژه ای در

تجارت جهانی آنزیم ها به عنوان بیوکاتالیست به خود اختصاص داده است. شرایط ویژه راکتورهای صنعتی نظیر غلظت های نمک بالا، pH اسیدی یا قلیایی و دمای زیاد موجب می شود تا کاتالیست ها ساختار و عملکرد خود را از دست بدهند. تجدید دوباره بیوکاتالیست ها در این فرآیندها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، لذا جداسازی میکروارگانیزم هایی که قادر به رشد و تولید آنزیم های هیدرولازی خارج سلولی هستند، از منابع نامحدود طبیعی با اهمیت است<sup>[4, 26]</sup>.

برای جداسازی بیشترین تنوع گونه های باکتریایی در روش های مبتنی بر کشت از محیط های کشت متنوع، رقت های متوالی و همچنین گرمخانه گذاری های طولانی مدت استفاده می شود. در پژوهش حاضر از دو محیط کشت MH و SWN با قدرت اسیدیته متفاوت به منظور جداسازی تنوع وسیع تری از میکروارگانیزم های هوازی و بی هوازی اختیاری استفاده شد که نتایج حاصل از غربالگری این پژوهش با نتایج پژوهش های قبلی در جداسازی تنوع گسترده تر جنس های مختلف همسویی داشت<sup>[27, 28]</sup>. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، درصد بالایی از سویه ها دارای شکل میکروسکوپی میله ای و گرم منفی بودند که با نتایج حاصل از پژوهش های مشابه روی دریاچه ارومیه، اینچه برون و آران و بیدگل تفاوت داشت. این تفاوت ها را می توان به ویژگی های متفاوت زیستگاه ها نسبت داد که در تعیین و میزان عیار زیستی هر منطقه تاثیرگذار بوده است و تنوع زیستی هر منطقه را منحصر به فرد می کند<sup>[9, 12, 29]</sup>. همچنین باسیل های گرم منفی مطالعه شده در این

تحقیق عموماً به شکل سلول‌های ویبریوفرم و مارپیچی بودند که این نتایج از نظر فراوانی و اشکال خمیده با نتایج مطالعه مشابهی که توسط گوزلان و همکاران در مصر صورت گرفته است، همخوانی داشت [30].

براساس هیدرولیز توئین ۸۰، از پنج جدایه تولیدکننده آنزیم خارج سلولی لیپاز، جدایه S-14 به عنوان جدایه منتخب برای PCR انتخاب شد که پس از آنالیز ژن *16S rDNA* مشخص شد که این جدایه متعلق به جنس *مارینوباکتر* بود. براساس مقایسه جدایه S-14 با پژوهش باقری و همکاران روی باکتری *مارینوباکتر پرسیکوس* سویه M9B از دریاچه نمک آران و بیدگل، این جنس از نظر مورفولوژیک، گرم منفی، میله‌ای، هوازی و جزء باکتری‌های هالوفیل میانه‌دوست بوده است [31] که منطبق بر یافته‌های پژوهش حاضر بود.

جدایه S-14 با گونه‌های جنس *مارینوباکتر* شامل *مارینوباکتر هالوفیلوسوس* سویه XCD-X12 [32]، *مارینوباکتر پرسیکوس* سویه M9B [31]، *مارینوباکتر لوتائونسس* سویه T5054 [33]، *مارینوباکتر آنتارکتیکوس* سویه ZS2-30 [34]، *مارینوباکتر سالاریس* سویه R9SW1 و *مارینوباکتر سیمیلیس* مقایسه شدند. با توجه به یافته‌های نگ و همکاران که روی *مارینوباکتر سلاریوس (Marinobacter slarius)* سویه R9SW1 و *مارینوباکتر سیمیلیس* سویه A3d10 انجام داده‌اند، این سویه‌ها متحرک، دارای یک فیلاژل قطبی و کلنی‌های آنها فاقد پیگمان‌های رنگی بوده و از نظر تست‌های بیوشیمیایی کاتالاز و اکسیداز، مثبت و همچنین قادر به هیدرولیز توئین ۸۰ بوده‌اند [35] که در مقایسه، جدایه S-14 فاقد حرکت، دارای کلنی‌هایی با پیگمان کرم‌رنگ، کاتالاز و اکسیداز مثبت و قادر به هیدرولیز توئین ۸۰ بود که تفاوت‌های جزئی موجود در این دو پژوهش را می‌توان با توجه به تفاوت موجود در گونه‌های مختلف باکتری‌های جنس *مارینوباکتر* تفسیر نمود. پژوهشی روی جداسازی باکتری *مارینوباکتر لوتائونسس* سویه T5054 در تایوان، شرایط بهینه رشد شامل غلظت نمک، pH و دمای بهینه رشد با شرایط بهینه رشد را برای جدایه S-14 نشان داده است. جدایه فوق از نظر غلظت بهینه نمک مورد نیاز و pH بهینه به ترتیب با ۵-۲/۵٪ غلظت سدیم کلرید و اسیدیته ۷ با پژوهش شیبه و همکاران همخوانی داشت. همچنین دمای بهینه رشد جدایه S-14، ۳۵°C گزارش شد که با نتایج حاصل از پژوهش فوق [33] مغایرت داشت و این مساله را می‌توان به تفاوت در شرایط مکان جداسازی نسبت داد.

از جمله محدودیت‌های مطالعه پیش رو می‌توان به عدم در دسترس بودن منابع کربن و پساب‌های روغنی مختلف برای تجزیه آنزیمی توسط جدایه S-14 اشاره کرد.

پیشنهاد می‌شود آنزیم لیپاز جدایه مورد نظر تخلیص شود و شرایط بهینه فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ژن کدکننده این آنزیم برای انتقال از طریق مهندسی ژنتیک به یک میزبان مناسب مطالعه شود. پیشنهاد می‌شود تثبیت سلول و آنزیم تخلیص شده از این جدایه به منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیم در شرایط بهینه مورد مطالعه قرار گیرد.

## نتیجه‌گیری

جدایه S-14، تولیدکننده مناسبی برای آنزیم خارج سلولی لیپاز است و می‌تواند از فروکتوز و اسیدآمینه فنیل‌آلانین به عنوان تنها منبع کربن و انرژی استفاده کند.

**تشکر و قدردانی:** نگارندگان این مقاله از انستیتو پاستور ایران مرکز تحقیقات شمال کشور، جناب آقای دکتر جعفری، جناب آقای دکتر *آشکاران* و جناب آقای دکتر محسنی (دانشگاه مازندران) برای کمک‌های فنی و اجرایی تشکر و قدردانی می‌نمایند. همچنین از جناب آقای عباس‌زاده، صفری و خانم دهقان برای حمایت‌های بی‌دریغشان نهایت تشکر و قدردانی را دارند.

**تاییدیه اخلاقی:** پژوهش حاضر حاصل مطالعه روی باکتری‌ها بود که نیازی به تاییدیه اخلاقی ندارد.

**تعارض منافع:** در انتشار این مقاله هیچ تعارض منافع میان نویسندگان وجود ندارد.

**سهم نویسندگان:** لیلا ستاری فقیهی (نویسنده اول)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (۳۰٪)؛ سلمان احمدی اسب‌چین (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (۳۰٪)؛ باقر سیدعلیپور (نویسنده سوم)، روش‌شناس/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (۳۰٪)؛ غلامحسین ریاضی (نویسنده چهارم)، پژوهشگر کمکی (۱۰٪)

**منابع مالی:** این پژوهش هیچ حمایت مالی از نهاد یا موسسه خاصی دریافت نکرده است.

## منابع

- 1- Ventosa A, Nieto JJ. Biotechnological applications and potentialities of halophilic microorganisms. *World J Microbiol Biotechnol.* 1995;11(1):85-94.
- 2- Delgado-García M, Valdivia-Urdiales B, Aguilar-González CN, Contreras-Esquivel JC, Rodríguez-Herrera R. Halophilic hydrolases as a new tool for the biotechnological industries. *J Sci Food Agric.* 2012;92(13):2575-80.
- 3- Çalmlıoğlu B, Arga KY. Proteins from halophilic bacteria: Purification and their applications. In: *Iconcept Press. Protein purification: Principles and trends.* Hong Kong: iConcept Press; 2014.
- 4- Pérez D, Martín S, Fernández-Lorente G, Filice M, Guisán JM, Ventosa A, et al. A novel halophilic lipase, LipBL, showing high efficiency in the production of eicosapentaenoic acid (EPA). *PLoS One.* 2011;6(8):e23325.
- 5- Schreck SD, Grunden AM. Biotechnological applications of halophilic lipases and thioesterases. *Appl Microbiol Biotechnol.* 2014;98(3):1011-21.
- 6- Gupta R, Gupta N, Rathi P. Bacterial lipases: An overview of production, purification and biochemical properties. *Appl Microbiol Biotechnol.* 2004;64(6):763-81.
- 7- Mustranta A, Forssell P, Poutanen K. Comparison of lipases and phospholipases in the hydrolysis of phospholipids. *Process Biochem.* 1995;30(5):393-401.
- 8- Uratani JM, Kumaraswamy R, Rodríguez J. A systematic strain selection approach for halotolerant and halophilic bioprocess development: A review. *Extremophiles.* 2014;18(4):629-39.
- 9- Babavalian H, Amoozgar MA, Pourbabaee AA, Moosazadeh Moghaddam M, Shakeri F. Isolation and identification of moderately halophilic bacteria producing hydrolytic enzymes from the largest hypersaline playa in Iran. *Microbiology.* 2013;82(4):466-74.
- 10- Abdolmalaki AY. Study on the role of cultural, social activities urban tourism developmonet (Case study of tourism in Sari city). 1<sup>st</sup> National Conference of



- taxonomy of moderately halophilic gram-negative rods. *J Gen Microbiol.* 1982;128:1959-68.
- 24- Zanjirband M, Kasra Kermanshahi R, Golbang N. Isolation of moderately halophilic indigenous bacterial strains producing salt-tolerant extracellular hydrolytic enzymes, the effect of NaCl salt on enzyme production. *Iran J Biol.* 2009;22(3):490-7. [Persian]
- 25- Hough DW, Danson MJ. Extremozymes. *Curr Opin Chem Boil.* 1999;3(1):39-46.
- 26- Amoozegar MA, Salehghamari E, Khajeh K, Kabiri M, Naddaf S. Production of an extracellular thermohalophilic lipase from a moderately halophilic bacterium, *Salinivibrio* sp. strain SA-2. *J Basic Microbiol.* 2008;48(3):160-7.
- 27- Schut F, De Vries EJ, Gottschal JC, Robertson BR, Harder W, Prins RA, et al. Isolation of typical marine bacteria by dilution culture: Growth, maintenance, and characteristics of isolates under laboratory conditions. *Appl Environ Microbiol.* 1993;59(7):2150-60.
- 28- Button DK, Schut F, Quang P, Martin R, Robertson BR. Viability and isolation of marine bacteria by dilution culture: Theory, procedures, and initial results. *Appl Environ Microbiol.* 1993;59(3):881-91.
- 29- Zarparvar P, Amoozegar MA, Fallahian MR. Diversity of culturable moderate halophilic and halotolerant bacteria in Incheh Boroun hyper saline wetland in Iran. *J Cell Mol Res.* 2014;27(1):44-56. [Persian]
- 30- Ghozlan H, Deif H, Kandil RA, Sabry S. Biodiversity of moderately halophilic bacteria in hypersaline habitats in Egypt. *J Gen Appl Microbiol.* 2006;52(2):63-72.
- 31- Bagheri M, Amoozegar MA, Didari M, Makhdoumi Kakhki A, Schumann P, Spröer C, et al. *Marinobacter persicus* sp. nov., a moderately halophilic bacterium from a saline lake in Iran. *Antonie Van Leeuwenhoek.* 2013;104(1):47-54.
- 32- Zhong ZP, Liu Y, Liu HC, Wang F, Zhou YG, Liu ZP. *Marinobacter halophilus* sp. nov., a halophilic bacterium isolated from a salt lake. *Int J Syst Evol Microbiol.* 2015;65(9):2838-45.
- 33- Shieh WY, Jean WD, Lin YT, Tseng M. *Marinobacter lutoensis* sp. nov., a thermotolerant marine bacterium isolated from a coastal hot spring in Luta, Taiwan. *Can J Microbiol.* 2003;49(4):244-52.
- 34- Liu C, Chen CX, Zhang XY, Yu Y, Liu A, Li GW, et al. *Marinobacter antarcticus* sp. nov., a halotolerant bacterium isolated from Antarctic intertidal sandy sediment. *Int J Syst Evol Microbiol.* 2012;62(Pt 8):1838-44.
- 35- Ng HJ, López-Pérez M, Webb HK, Gomez D, Sawabe T, Ryan J, et al. *Marinobacter salarius* sp. nov. and *Marinobacter similis* sp. nov., isolated from sea water. *PLoS One.* 2014;9(9):e106514.
- Urbanism, Urban Management and Sustainable Development. Tehran: Iranian Architecture Center; 2015. [Persian]
- 11- Biswas J, Paul AK. Production of extracellular enzymes by halophilic bacteria isolated from solar salterns. *Int J Appl Biol Pharm Technol.* 2013;4(4):30-6.
- 12- Mehrshad M, Amoozegar MA, Yakhchali B, Shahzadeh Fazeli SA. Biodiversity of moderately halophilic and halotolerant bacteria in the Western coastal line of Urmia lake. *Biol J Microorg.* 2012;1(2):49-70. [Persian]
- 13- Coico R. Emerging Technologies. *Curr Protoc Microbiol.* 2008;11(1):1.0.1-1.0.4
- 14- Jayachandra SY, Anil Kumar S, Merley DP, Sulochana MB. Isolation and characterization of extreme halophilic bacterium *Salinicoccus* sp. JAS4 producing extracellular hydrolytic enzymes. *Recent Res Sci Technol.* 2012;4(4):46-9.
- 15- Karbalaei Heidari HR, Ziaee AA, Schaller J, Amoozegar MA. Purification and characterization of an extracellular haloalkaline protease produced by the moderately halophilic bacterium, *Salinivibrio* sp. strain AF-2004. *Enzyme Microb Technol.* 2007;40(4):266-72.
- 16- Ardakani MR, Poshtkouhian A, Amoozegar MA, Zolgharnein H. Isolation of moderately halophilic pseudoalteromonas producing extracellular hydrolytic enzymes from Persian Gulf. *Indian J Microbiol.* 2012;52(1):94-8.
- 17- Jeffries CD, Holtman DF, Guse DG. Rapid method for determining the activity of microorganisms on nucleic acids. *J Bacteriol.* 1957;73(4):590-1.
- 18- Allais JJ, Kammoun S, Blanc P, Girard C, Baratti JC. Isolation and characterization of bacterial strains with inulinase activity. *Appl Environ Microbiol.* 1986;52(5):1086-90.
- 19- Shaikh SA, Deshpande MV. Chitinolytic enzymes: Their contribution to basic and applied research. *World J Microbiol Biotechnol.* 1993;9(4):468-75.
- 20- Govender L, Naidoo L, Setati ME. Isolation of hydrolase producing bacteria from Sua pan solar salterns and the production of endo-1, 4-bxylanase from a newly isolated haloalkaliphilic *Nesterenkonia* sp.. *Afr J Biotechnol.* 2009;8(20):5458-66.
- 21- Kim OS, Cho YJ, Lee K, Yoon SH, Kim M, Na H, et al. Introducing EzTaxon-e: A prokaryotic 16S rRNA gene sequence database with phylotypes that represent uncultured species. *Int J Syst Evol Microbiol.* 2012;62(Pt 3):716-21.
- 22- Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipinski A, Kumar S. MEGA6: Molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. *Mol Biol Evol.* 2013;30(12):2725-9.
- 23- Ventosa A, Quesada E, Rodriguez-Valera F, Ruiz-Berraquero F, Ramos-Cormenzana A. Numerical