

BRIEF REPORT***The Role of Strogen Receptor β Expression and its Relationship with Tumor Characteristics in Patients with Breast Cancer***Mohammad Zangooei¹Mitra Rafiee²Atena Mansouri³¹ Assistant Professor, Department of Biochemistry, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran² Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Cellular and Molecular Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran³ Assistant Professor, Cellular and Molecular Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

(Received January 6, 2024; Accepted May 13, 2024)

Abstract

Background and purpose: Breast cancer is the 1st most common cancer in the female population and the third leading cause of cancer mortality in Ladies. Given the importance of early detection of cancer, it is necessary to find biomarkers related to this disease that are essential for the prognosis and early diagnosis of breast cancer. The estrogen receptor gene for beta, whose full name is Estrogen Receptor- β (ESR β). Our main aim in this study was to investigate the expression changes of this gene in cancer tissue tumor samples compared to normal tissue samples to obtain a biomarker to predict the risk of cancer.

Materials and methods: In this research, in 2023 samples were obtained from 30 patients diagnosed with breast cancer who underwent surgery at Omid Hospital in Mashhad. Both tumor tissue and adjacent healthy tissue were collected from each patient. The diagnosis of breast cancer was confirmed by a specialist doctor, and none of the patients had received any prior treatment such as chemotherapy or radiation therapy. Tissue samples were collected immediately after surgery and stored at -70°C. RNA extraction and synthesis were performed, followed by analysis of the expression of the ESR gene along with the GAPDH gene as an internal control, using real-time PCR.

Results: In this study, 30 cancer patients were examined, with ages ranging from 32 to 62 years old and a mean age of 47.5 ± 9.38 . Among them, one person had tumor grade 1, 16 had grade 2 tumors, and 8 had grade 3 tumors. Metastasis was observed in 11 patients (36.7%), while 19 patients (63.3%) had no metastasis. Regarding tumor size distribution, 5 patients (16.7%) had tumors smaller than 1 cm, and 25 patients (83.3%) had tumors sized between 1 and 2 cm. The study focused on changes in the expression of the ESR β gene in both tumor and adjacent healthy tissues of breast cancer patients. It was found that the gene expression was higher in tumor samples compared to the adjacent healthy tissues. Using SPSS software, the analysis revealed a significant relationship between gene expression intensity and tumor grade across all three groups. Additionally, a significant difference was observed between patients with and without tumor metastasis.

Conclusion: Overall, the findings of this study indicate a significant correlation between gene expression intensity and tumor grade across all three groups. Moreover, there is a significant distinction between patients with and without tumor metastasis. Notably, a considerable expression difference was observed between healthy and tumor samples. Hence, this gene could serve as a potential biomarker for cancer diagnosis.

Keywords: Breast cancer, Estrogen Receptor- β , Biomarker, Gene expression, Real-Time PCR

J Mazandaran Univ Med Sci 2024; 34 (233): 213-218 (Persian).

Corresponding Author: Atena Mansouri - Cellular and Molecular Research Center, Faculty of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. (E-mail: mansouri_atena@yahoo.com)

نقش بیان گیرنده استروژن β و ارتباط آن با ویژگی‌های تومور در بیماران مبتلا به سرطان پستان

محمد زنگوبی^۱

میترا رفیعی^۲

آتنا منصوری^۳

چکیده

سابقه و هدف: سرطان پستان رایج‌ترین را در جمعیت زنان و سومین عامل مرگ و میر مربوط به سرطان بانوان است. با توجه به اهمیت تشخیص زود هنگام سرطان، لزوم یافتن بیومارکرهای مرتبط با این بیماری به منظور پیش‌آگهی و تشخیص زود هنگام سرطان پستان امری ضروریست. ژن گیرنده استروژن بتا که نام کامل آن Estrogen Receptor- β می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات بیانی گیرنده استروژن β در نمونه‌های توموری بافت سرطان در مقایسه با نمونه بافت نرمال به منظور دستیابی به یک بیومارکر برای پیش‌آگهی احتمال ابتلا به سرطان، انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، در سال ۱۴۰۲ بر روی ۳۰ بافت توموری و سالم اطراف تومور از بیماران مبتلا به سرطان سینه که در بیمارستان امید مشهد تحت عمل جراحی قرار گرفتند و توسط پژوهشک متخصص تایید شده بودند و هنوز هیچ درمان‌های شیمی درمانی و پرتو درمانی برای آن‌ها انجام نشده بود؛ انجام گرفت. نمونه‌ها پس از عمل جراحی از بیماران مبتلا به سرطان پستان جمع‌آوری گردید و بلا فاصله به فریزر -70°C منتقل شد. پس از اخراج RNA و سنتر، cDNA با روش Real-Time PCR یان ژن *ESR1* و ژن *GAPDH* به عنوان ژن خانه‌دار کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه تعداد ۳۰ بیمار مبتلا به سرطان مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه کمترین سن بیماران ۳۲ سال و بیشترین بیماران سن ۶۲ سال بوده است و میانگین سن شرکت کنندگان نیز $۴۷/۵ \pm ۹/۳۸$ بود. ۶ نفر دارای گردید توموری یک، ۱۶ نفر دارای گردید توموری دو و ۸ نفر دارای گردید توموری سه بوده‌اند. توزیع متاستاز را در بیماران ۱۱ نفر معادل $۳۶/۷$ درصد از بیماران دارای متاستاز و ۱۹ نفر معادل $۶۳/۳$ درصد بیماران فاقد متاستاز بوده‌اند. توزیع اندازه تومور، بیمار دارای اندازه تومور کمتر از ۱ سانتی‌متر یعنی معادل معادل $۱۶/۷$ درصد و ۲۵ بیمار دارای اندازه تومور بین ۱ تا ۲ سانتی‌متر یعنی معادل $۸۳/۳$ درصد داشتند. تغییرات در بیان ژن $ESR\beta$ در بافت تومور و سالم مجاور تومور در بیماران مبتلا به سرطان پستان بررسی شد. بیان افزایشی این ژن در نمونه‌های توموری نسبت به بافت سالم مجاور تومور مشاهده شد. هم‌چنین تحلیل این نتایج با کمک نرم‌افزار SPSS نشان داد که شدت بیان ژن با درجه تومور ارتباط معنی‌داری بین هر سه گروه وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد که بین دو گروه از از بیماران براساس وجود یا عدم وجود متاستاز تومور شان اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

استنتاج: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که شدت بیان ژن با درجه تومور ارتباط معنی‌داری بین هر سه گروه وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد که بین دو گروه از از بیماران براساس وجود یا عدم وجود متاستاز تومور شان اختلاف معنی‌داری وجود دارد. تغییر بیان معنی‌داری بین نمونه‌های سالم و تومور مشاهده شد. از این رو این ژن می‌تواند به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، استروژن ریپتور بتا، بیومارکر، بیان ژن، Real-Time PCR

E-mail: mansouri_atena@yahoo.com

مؤلف مسئول: آتنا منصوری-برجنده، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

۱. استادیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

۲. استادیار، گروه ایمunoپریزوژنی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

۳. استادیار، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۲/۲۴ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

در حال حاضر از $ER.\beta$ در تشخیص یا درمان این سرطان استفاده نمی‌شود^(۱۱). تاکنون مطالعات کمی برای بررسی بیان $ER.\beta$ و پیشرفت سرطان پستان و متاستاز و این که سطوح بالای $ER.\beta$ با پروگنوز ضعیف بیماری ارتباط دارد، انجام شده است^(۱۲). مطالعات زیادی نشان داده است که $ER.\beta$ یک فعالیت ضد انکوژنیک در سرطان پستان دارد^(۱۳). بنابراین $ER.\beta$ ممکن است یک هدف درمانی بلقوه در سرطان پستان باشد. با این وجود مکانیسم‌های مولکولی و نقش احتمال مهارکنندگی آن ناشناخته باقی مانده است و نیاز به بررسی‌های بیشتر مولکولی وجود دارد. این تحقیق با هدف بررسی شدت بیان β در بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه با گروه کنترل، بیماران را این β را بر اساس معیارهای پاتولوژیک شدت بیان را این β را بر اساس معیارهای پاتولوژیک انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

جمع‌آوری نمونه‌ها

در این مطالعه مقطعی^(۱۴۰۲)، ۳۰ بافت توموری و سالم اطراف تومور از بیماران مبتلا به سرطان سینه که در بیمارستان امید مشهد تحت عمل جراحی قرار گرفتند و توسط پزشک متخصص تایید شده بودند و هنوز هیچ درمانی شامل درمان‌های شیمی درمانی و پرتو درمانی برای آن‌ها انجام نشده بود، مورد بررسی قرار گرفت (جدول شماره ۱). این مطالعه در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و مطابق با قوانین کمیته اخلاق این مرکز (با کد IR.BUMS.REC.1402.417) تصویب و انجام شد. نمونه‌ها بلافاصله داخل RNA Later قرار گرفته و در فریزر -80°C نگه‌داری شدند.

cDNA و سنتر

در این آزمایش استخراج RNA با استفاده از ترایزول انجام شده است. محلول ترایزول محلول شیمیایی است

مقدمه

سرطان پستان شایع‌ترین بیماری زنان در سراسر جهان می‌باشد و براساس اطلاعات مرکز بین‌المللی تحقیقات سرطان، سرطان پستان دومین علت مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه می‌باشد^(۲). سرطان معمولاً با پیشرفت نابه جای چرخه سلولی و آپوپتوز ناقص، به دلیل فعل شدن پروتئین‌کوژن‌ها و غیرفعال شدن ژن‌های سرکوب‌کننده تومور ایجاد می‌شود^(۴،۵). شیوع سرطان پستان در میان زنان ایالات متحده آمریکا به عنوان دومین علت شایع مرگ و میر توسط سرطان بیان شده است^(۵). بافت‌شناسی سرطان سینه براساس طبقه‌بندی TNM توسط کمیته سرطان آمریکا و اتحادیه بین‌المللی کنترل سرطان می‌باشد. سیستم ایمنی ذاتی نقش مهمی را در گسترش سرطان‌ها ایفا می‌کند و در سالیان اخیر شواهد جمع‌آوری شده، رابطه همسویی بین سرطان سینه و سیستم ایمنی بیان داشته است^(۶). تقریباً ۷۰ درصد از سرطان‌های پستان گیرنده‌های استروژنی را بیان می‌کنند که به وسیله استروژن بیان می‌شود. در حالی که تخدمان‌ها منبع اصلی استروژن در زنان پیش از منوپوز هستند، اکثر سرطان‌های پستان به دنبال منوپوز تشخیص داده می‌شوند که سطح سیستمیک این هورمون کاهش یافته است. و استروژن از پیش‌سازهای آندروروژنی تولید می‌شود^(۷). استروژن نقش مهمی را پیشرفت و متاستاز کانسر پستان وابسته به هورمون بازی می‌کند. اثر استروژن عمده‌ای طریق گیرنده استروژن (ER. α) و (ER. β) که دو نوع آلفا (ERs) و بتای (ER. β) آن شناخته شده، انجام می‌گردد^(۸). استروژن رسپتور الفا در سطح تقریباً ۱۰ درصد از سلول‌های اپی‌تیلیال سلول‌های پستان نرمал بیان می‌شود. اما در سرطان پستان ۵۰-۸۰ درصد افزایش بیان نشان می‌دهد^(۱۰،۹). گیرنده استروژن نوع بتا (ER. β) از نظر ساختمانی شبیه به دومین‌های نوع α می‌باشد، اما عملکرد آن متفاوت است به طوری که نقش در سرطان پستان ناشناخته باقی مانده است و ER. β

آزمایش از GAPDH استفاده شده است، می‌توان تغییرات fold change را طبق فرمول محاسبه کرد. برای نمونه‌های نرمال میانگین از ΔCt منظور گردیده و fold change هر کدام از نمونه‌های توموری نسبت به میانگین نمونه‌های نرمال محاسبه شد(۱۴).

یافته‌ها و بحث

در این مطالعه تعداد ۳۰ بیمار مبتلا به سرطان مورد بررسی قرار گرفتند، جدول شماره ۱، بر اساس اطلاعات بیماران تنظیم شده است. در این تحقیق بررسی بیان رسپتور استروئن بتا در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت. نتایج این بخش از مطالعه حاصل با نتایج Anestis و همکاران همخوانی داشت. آن‌ها در ۲۰۱۹ از دانشگاه Kapodistrian یونان در تحقیقی با عنوان "حساسیت گیرندهای استروئن بتا به enzalutamide در سرطان پستان با گیرندهای مثبت و منفی" عنوان کردند که رسپتور استروئن بتا به عنوان یک فاکتور جدید و بیومارکر پیشگویی کننده در بیماران مبتلا به سرطان پستان با نقشی که مهار کردن تکثیر سلول‌های سرطانی به عهده دارد، مطرح است. هم‌چنین آن‌ها گزارش کردند که در شرایط Invitro، گیرنده رسپتور استروئن بتا موجب مهار تکثیر سلول‌های سرطان پستان از طریق سرکوب نسخه برداری ژنی می‌شود، به علاوه نتایج آن‌ها نشان داد که یک مکانیسم جدید به وسیله رسپتور استروئن بتا با یک اثر انکوساپرسیو اعمال می‌شود(۱۵). نتایج آنالیز آماری نشان داد فرضیه نرمال بودن (آزمون شاپیرو-ویکس) بیان ژن رسپتور استروئن بتا قبول گردید ($P > 0.05$). اختلاف معنی داری (آزمون استیوونت) بین دو گروه از نظر شدت بیان ژن رسپتور استروئن بتا مشاهده نمی‌شود ($P = 0.968$). گزارشاتی وجود دارد که نشان می‌دهند تقریباً ۷ درصد از تومورهای پستان در زنان در سن زیر ۴۰ سال تشخیص داده می‌شوند. با تشخیص زود هنگام بیماری و اقدام به درمان زود هنگام بیماری در زنان جوانتر بقای بیماران بیشتر

که ماده اصلی آن گوانیدین تیوسیانات می‌باشد و برای استخراج RNA از انواع نمونه‌ها استفاده شد. نمونه‌هایی برای Real Time PCR انتخاب شد که RNA آن از RNA کیفیت مناسب برخوردار بود. ۱ میکرولیتر از RNA برداشته و جذب آن در طول موج‌های 260/280 نانومتر به خوانده شد و نمونه‌هایی با جذب ۱/۵ تا ۲ انتخاب شدند. برای سنتز cDNA از تمام نمونه‌ها غلظت یکسانی از mRNA برداشته شد و با استفاده از کیت سنتز cDNA پارس طوس از روی آن نسخه برداری معکوس انجام گرفت.

طراحی پرایمر

پرایمرها توسط نرم افزار AlleleID version ۷/۵ طراحی گردید (جدول شماره ۲).

جدول شماره ۱: مشخصات بیماران


فاکتور	من
تعداد (درصد)	بیماران
یک	گردید تومور
دو	(۵۳.۳) ۱۶
سه	(۲۶.۷) ۸
متaszاز دارد	(۲۰) ۶
متaszاز ندارد	(۳۶.۷) ۱۱
متaszاز ندارد	(۴۳.۳) ۱۴
کم تراز ۱ سانتی متر	(۱۶.۷) ۵
بین ۱ تا ۲ سانتی متر	(۸۳.۳) ۲۵

جدول شماره ۲: توالی پرایمرها


Amplicon Size(bp)	Sequence (5' → 3')	ژن ها
۱۲ bp	F: CTCATCCCTGCTCCTGGTCT R: AATCCCTTGAATGTTGCTG	Estrogen Receptor-β
۱۰ bp	F: GGAAGGTGAAGTCGGAGT R: GTCATTGATGCCAACATA	GAPDH

واکنش Real Time PCR


برای اندازه گیری بیان ژن ER-β تکثیر ژن توسط واکنش Real time PCR با استفاده از کیت Syber Green شرکت پارس طوس انجام شد. تعیین کیت نسی به وسیله اندازه گیری افزایش تشعشع فلورسنس در نتیجه اتصال رنگ سایبر گرین انجام گرفت با داشتن Ct هر ژن و هم‌چنین Ct ژن نرمال‌ایز که در این




نمودار شماره ۱: بیان ژن استروژن بتا در بافت سالم نسبت به بافت نرمال



نمودار شماره ۲: ارتباط متاستاز با شدت بیان ژن در بیماران مبتلا به سرطان



نمودار شماره ۳: ارتباط اندازه تومور با شدت بیان ژن در بیماران مبتلا به سرطان



نمودار شماره ۴: ارتباط گرید تومور با شدت بیان ژن در بیماران مبتلا به سرطان

خواهد بود. بنابراین یکی از معیارهای مهم در بررسی‌های ژنتیکی ارزیابی بیان ژن در ارتباط با سن بیماران است. همان‌طور که نمودار شماره ۱، نشان می‌دهد میزان بیان ژن استروژن بتا در بافت توموری نسبت به بافت نرمال به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته که از نظر آماری معنی دار می‌باشد ($P=0.0001$). هم‌چنین Tan و همکاران از دانشگاه Sun Yat-Sen چین در سال ۲۰۱۶ در یک مطالعه سیستماتیک مربوطی با عنوان "گیرنده استروژن بتا به عنوان یک فاکتور پیش‌آگه‌ی دهنده در سرطان پستان" عنوان کرد نقش گیرنده رسپتور استروژن بتا در مراحل اولیه سرطان پستان ناشناخته است (۱۶).

اختلاف معنی‌داری (آزمون استیودنت) بین دو گروه از نظر شدت بیان ژن (ER β) و متاستاز مشاهده می‌شود ($P=0.0001^{**}$) (نمودار شماره ۲).

اختلاف معنی‌داری (آزمون استیودنت) بین دو گروه از نظر شدت بیان ژن ER β و اندازه تومور مشاهده نمی‌شود ($P=0.108$) (نمودار شماره ۳). اختلاف معنی‌داری (آنالیز واریانس) بین سه گروه از نظر شدت بیان ژن ER β و گرید تومور مشاهده می‌شود ($P=0.0001^{***}$) (نمودار شماره ۴).

جهت بررسی کلی ارتباط بین متغیرها با بیان ژن ER β از یک مدل خطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که متاستاز و گرید تومور ارتباط معنی‌داری با شدت بیان ژن ER β دارد ($P<0.05^*$). به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که شدت بیان ژن با درجه تومور ارتباط معنی‌داری بین هر سه گروه وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد که بین دو گروه از ایام بیماران براساس وجود یا عدم وجود متاستاز تومورشان اختلاف معنی‌داری وجود دارد. تغییر بیان معنی‌داری بین نمونه‌های سالم و تومور مشاهده شد. از این رو این ژن می‌تواند به عنوان یک بیومار که برای تشخیص سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

References

1. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. *Int J Cancer* 2015; 136(5): E359-E386.
2. Ye F, Dewanjee S, Li Y, Jha NK, Chen Z-S, Kumar A, et al. Advancements in clinical aspects of targeted therapy and immunotherapy in breast cancer. *Mol Cancer* 2023; 22(1): 105.
3. Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. *Cell* 2000; 100(1): 57-70.
4. Seksenyan A, Kadavallore A, Walts AE, de la Torre B, Berel D, Strom SP, et al. TOX3 is expressed in mammary ER+ epithelial cells and regulates ER target genes in luminal breast cancer. *BMC Cancer* 2015; 15(1): 22.
5. Tabariès S, Ouellet V, Hsu BE, Annis MG, Rose AA, Meunier L, et al. Granulocytic immune infiltrates are essential for the efficient formation of breast cancer liver metastases. *Breast Cancer Res* 2015; 17(1): 45.
6. Hamidinia M, Boroujerdnia MG, Talaiezadeh A, Solgi G, Roshani R, Iranprast S, et al. Increased P-35, EBI3 transcripts and other treg markers in peripheral blood mononuclear cells of breast cancer patients with different clinical stages. *Adv Pharm Bull* 2015; 5(2): 261-267.
7. Amanatullah DF, Tamaresis JS, Chu P, Bachmann MH, Hoang NM, Collyar D, et al. Local estrogen axis in the human bone microenvironment regulates estrogen receptor-positive breast cancer cells. *Breast Cancer Res* 2017; 19(1): 121.
8. Heldring N, Pike A, Andersson S, Matthews J, Cheng G, Hartman J, et al. Estrogen receptors: how do they signal and what are their targets. *Physiol Rev* 2007; 87(3): 905-931.
9. Huang B, Omoto Y, Iwase H, Yamashita H, Toyama T, Coombes RC, et al. Differential expression of estrogen receptor α , β 1, and β 2 in lobular and ductal breast cancer. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2014; 111(5): 1933-1938.
10. Kiliti AJ, Sharif GM, Martin MB, Wellstein A, Riegel AT. AIB1/SRC-3/NCOA3 function in estrogen receptor alpha positive breast cancer. *Front Endocrinol* 2023; 14: 120218.
11. Song P, Li Y, Dong Y, Liang Y, Qu H, Qi D, et al. Estrogen receptor β inhibits breast cancer cells migration and invasion through CLDN6-mediated autophagy. *J Exp Clin Cancer Res* 2019; 38(1): 354.
12. Piperigkou Z, Bouris P, Onisto M, Franchi M, Kletsas D, Theocharis AD, et al. Estrogen receptor beta modulates breast cancer cells functional properties, signaling and expression of matrix molecules. *Matrix Biol* 2016; 56: 4-23.
13. Shen K, Yu H, Xie B, Meng Q, Dong C, Shen K, et al. Anticancer or carcinogenic? The role of estrogen receptor β in breast cancer progression. *Pharmacol Ther* 2023; 242: 108350.
14. Mahmoudian RA, Gharai ML, Abbaszadegan MR, Alasti A, Forghanifard MM, Mansouri A, et al. Crosstalk between MMP-13, CD44, and TWIST1 and its role in regulation of EMT in patients with esophageal squamous cell carcinoma. *Mol Cell Biochem* 2021; 476: 2465-2478.
15. Anestis A, Sarantis P, Theocharis S, Zoi I, Tryfonopoulos D, Korogiannos A, et al. Estrogen receptor beta increases sensitivity to enzalutamide in androgen receptor-positive triple-negative breast cancer. *J Cancer Res Clin Oncol* 2019; 145(5): 1221-1233.
16. Tan W, Li Q, Chen K, Su F, Song E, Gong C. Estrogen receptor beta as a prognostic factor in breast cancer patients: A systematic review and meta-analysis. *Oncotarget* 2016; 7(9): 10373-10385.