

بررسی آسیب شناختی نوچه در *Linguatula serrata* (Frohlich, ۱۷۸۹) گره های لنفاوی روده بندی گاویش

• محمد یخچالی

دانشیار بخش انگل شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، (نویسنده مسئول)

• علی اصغر تهرانی

استادیار بخش آسیب شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه-ایران.

تاریخ دریافت: مرداد ماه ۱۳۸۹ تاریخ پذیرش: آبان ماه ۱۳۸۹

تلفن تماس نویسنده مسئول: ۰۹۱۴۴۶۳۹۵۹

Email: m.yakhchali@urmia.ac.ir

چکیده

عوامل بیماری های مشترک انسان و دام می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی ضایعات آسیب شناسی این انگل در گره های لنفاوی روده بندی گاویش بوده است. به منظور مطالعه ضایعات آسیب شناسی نوچه این بندپا در گره های لنفاوی روده بندی گاویش، پس از کشتار، گره های لنفاوی روده بندی متورم و بزرگ شده از لشه جدا شدند و از نظر آلوودگی به انگل *L. serrata* بررسی گردیدند. از گره های لنفاوی روده بندی آلووده به نوچه این انگل لینگواتولا سراتا، مقاطع بافتی با ضخامت ۴-۵ میکرون تهیه شد و به روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند. از نظر ظاهری، گره های لنفاوی روده بندی گاویش متورم، خیزدار و سطح صافی داشتند. در بخش مرکزی گره های لنفاوی روده بندی کیست های متعدد مشاهده گردید. لنفوسيت ها کم و به طور عمده دچار آپوپتوز بودند. ماکروفازها جایگزین لنفوسيت های کاهش یافته شده بودند. در قشر گره لنفاوی روده بندی، ترشحات فیبرینی وجود داشت. نواحی نکروزه در فولیکول های گره های لنفاوی روده بندی به همراه التهاب عروقی و التهاب اطراف عروقی در بخش قشر گره لنفاوی روده بندی نیز مشاهده گردید.

کلمات کلیدی: نوچه، گاویش، آسیب شناسی، *Linguatula serrata*

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 88 pp: 45-51

Pathologic study of *Linguatula serrata* (Frohlich, 1789) nymph in mesenteric lymph nodes of water buffalo

By: Yakhchali, M. Associated Professor of Parasitology division, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia –Iran (Corresponding Author; Tel: +989144463959). and Tehrani, A.A. Assistant Professor of Pathology Division, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia –Iran.

Linguatula serrata is a zoonotic parasite with global expansion, particularly in tropical and subtropical areas. The aim of this study was to evaluate the pathological lesions caused by *L. serrata* in mesenteric lymph nodes (MLN) of water buffalo. To study the pathological lesions of nymphal stage in water buffaloes, enlarged and swollen MLN were collected and examined. Grossly, the MLN were swollen, edematous with smooth surface. In cut section of the lymph nodes, multiple cysts were observed in the medulla. Histological slides from MLN infected with *L. serrata* nymph were prepared and stained by Hematoxyline–Eosin (H&E). The lymphocytes reduced in number and were mainly apoptotic. The diminished lymphocytes were replaced with macrophages. There were fibrinous secretions in cortex of MLN. In the cortex of MLN, necrotic areas accompanied with vasculitis and prevascular cuffing was observed.

Key words: *Linguatula serrata*, Nymph, Buffalo, Pathology.

مقدمه

(۲۲). گستردگی دامنه شیوع آلودگی در این قبیل دام‌ها می‌تواند به دلیل وضعیت جغرافیایی، آب و هوایی و دسترسی میزبان نهایی به احشاء آلوده نشخوارکنندگان باشد (۲۸). به طوری که میزان آلودگی گزارش شده *L.serrata* بالغ در سگ از شهر کرد ۶۲/۲ درصد (۲۲)، مرند ۵۵ درصد (۲۸) و شیراز ۷۶/۴۷ درصد (۶) بوده است. آلودگی به مراحل نوزادی و نوچه انگل در گاو (۳۳، ۳۱)، گامویش (۷) گوسفند (۱)، بز (۲۹، ۲۷)، شتر (۳۴، ۳۰، ۲۵، ۱۵) گزارش گردیده است. لینگواتولوزیس احشایی انسان در اثر آلودگی میزبان به *L.serrata* به دلیل مصرف آب و مواد غذایی آلوده به مدفوع حاوی تخم انگل و یا ترشحات تنفسی گوشتخواران متلاطه و پریه سگ بروز می‌نماید. در این بیماری نوزاد در روده از تخم خارج شده و به اندام‌های مختلف از جمله کبد، ریه، گره‌های لنفاوی روده بند و ندرتاً مغز، ریه و پروسات مهاصرت می‌نماید. ورود انگل به این اعضا منجر به بروز ضایعات آسیب شناسی و علایم مرتبط با آن در عضو آلوده می‌گردد. در نهایت نوزاد در این محل به صورت نوچه در آمده و یک تا چند سال در محل باقی می‌ماند تا آهکی شود (۲۰). نوع دیگر لینگواتولوزیس انسان، سندروم هالزوون-مرارا است که در انسان مدت کوتاهی پس از مصرف کبد خام یا نیم پخته آلوده و یا گره‌های لنفاوی احشایی آلوده علخواران به پریه بز اتفاق می‌افتد. علایم آن به صورت عطسه، تورم و قرمزی صورت، افزایش ترشحات بینی و چشم و خارش شدید در محل گلو و دهان به واسطه تحریکات مخاط تنفسی و یا حساسیت احتمالی در برابر نوزاد انگل می‌باشد (۲۰، ۲۸). تاکنون موارد درمانگاهی متعدد این بیماری مشترک انسان و دام از نقاط مختلف دنیا (۲۰، ۱۴، ۱۳، ۸) و ایران گزارش شده است (۴، ۲۱، ۳۲). گزارش وقوع آلودگی نوچه انگل *L. serrata* در گامویش محدود به گزارش‌هایی از پاکستان (۹)، مصر (۱۸)، هندوستان (۳۳) و ایران (۷) بوده است. اطلاعات زیادی در مورد آسیب شناسی ضایعات

گامویش یکی از مهمترین انواع دام‌های شیری مناطق روستایی با سیستم پرورشی سنتی است که در کشورهای آسیایی و آفریقایی در اقصاد کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. در کشورهای آسیایی گامویش به دلیل سازگاری با آب و هوای مناطق گرم‌سیری و توانایی آن به انجام کار در شرایط به نسبت متغیر آب و هوایی بر گاو ترجیح دارد. با این وجود، مطالعات کمی در زمینه بیماری‌های انگلی آن که دارای اهمیت از لحاظ بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است، صورت گرفته است (۳۳). انگلی با گسترش جهانی به پریه در نواحی گرم‌سیری و نیمه گرم‌سیری است (۱۱) که در سال ۱۷۷۹ میلادی گزارش شده است (۳۳). در سال ۱۹۵۰ میلادی بیماری لینگواتولوزیس نیز توسط سازمان بهداشت جهانی در فهرست عوامل بیماری زای مشترک انسان و دام قرار گرفت (۱۱). در دسته پنستاتومیدا و خانواده لینگواتولیله قرار دارد. در مراحل نوچه ای و بالغ ضمایم حرکتی ندارند و دارای چند ردیف خار ریز می‌باشند. البته در مرحله نوزادی دو زوج پای مفصلی دیده می‌شود که به واسطه آن در طبقه بندی جزو بندپایان قرار می‌گیرند. ضمایم دهانی آن پنج قسمتی بوده و از منفذ دهانی و دو زوج قلاب تشکیل می‌گردد (۲۸). نوزاد این پنستاتومید در گره‌های لنفاوی علخواران از جمله نشخوارکنندگان (گاو، گامویش، گوسفند، بز) رشد نموده تا به شکل عقونت زا تبدیل شود. انگل بالغ پس از بلعیده شدن احشاء آم آلوده توسط سگ سانان تولید می‌شود (۱۱). در ایران برای نخستین بار *L.serrata* از گوسفند جدا شد (۲۶) Rak (۲۶) از سگ و توسط گربه‌های ارجاعی به بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نیز گزارش گردید. میزان شیوع آلودگی به *L.serrata* در کشورهای مختلف در سگ ۲۵/۵ درصد و در گوسفند ۱۵/۳-۳۷ درصد است.

نتایج

مشاهدات درشت بینی

انگل شناسی

در این مطالعه، نوچه انگل به رنگ شیری مایل به خاکستری، دراز و زبانی شکل با خطوط عرضی بود به طوری که در سطح شکمی- قدامی دو زوج چنگال در اطراف حفره دهانی داشت. نوچه ها دارای میانگین طول ۴ میلی متر و عرض تقریباً ۱ میلی متر بودند.

آسیب شناسی

گره های لنفاوی روده بندی گاویش آلوده به نوچه انگل لینگواتولا سراتا متورم، خیزدار و دارای سطح صافی بودند (تصویر ۱).

مشاهدات ریزبینی

در مشاهدات ریزبینی گره های لنفاوی مزانتریک گاویش، ضایعات به دو شکل حاد و مزمن بود.

ضایعات شکل حاد

در بخش مرکزی گره های لنفاوی روده بندی حفره هایی به صورت کیست مشاهده گردید که بیانگرِ ضایعات مکانیکی ناشی از مهاجرت انگل *L.serrata* بودند. ضایعات عمده به صورت واکنش های التهابی به همراه ضایعات نکروتیک بود. گرچه آثار مهاجرت نوچه در برش های بافتی مشاهده شد اما نوچه *L.serrata* در محل ضایعات گره لنفاوی حضور نداشت. هیپرپلازی لنفوبلاستی موجود به هم خوردگی ساختار طبیعی فولیکول های لنفاوی شده بود و در برخی از فولیکول های لنفاوی تخریب آنها با تشکیل فضاهای بینابینی همراه بود. در بخش قشری گره لنفاوی روده بندی، ترشحات فیبرینی وجود داشت. در بخش مرکزی نیز افزایش لنفوبلاست ها در لابلای طباب های لنفاوی دیده می شد. نواحی نکروزه در

حاصل از نوچه *L.serrata* در گره های لنفاوی روده بندی گاویش بجز گزارش Sivakumar و همکاران (۳۳) در دسترس نمی باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر به منظور بررسی ضایعات آسیب شناسی انگل *L.serrata* در گره های لنفاوی روده بندی گاویش انجام شد.


مواد و روش کار

۱- نمونه برداری و جستجوی نوچه های انگل *L.serrata* در گره های لنفاوی روده بندی- در زمان کشtar گاویش ها در کشtar گاه ارومیه، گره های لنفاوی روده بندی از لشه جدا شدند. سپس نمونه های جمع آوری شده در داخل طروف پلاستیکی درب دار حاوی کيسه نایلونی و يخ به آزمایشگاه انگل شناسی جهت ارزیابی های اولیه منتقل گردیدند. در طی ۳-۷ ساعت نمونه ها از داخل ظرف حاوی يخ خارج شدند و تغییر شکل يافته جدا شدند. نمونه ها در طروف پتري برش داده شدند. پس از افزودن ۵ میلی لیتر سرم فیزیولوژی (۰/۸۵ درصد) و هم زدن آنها، نوچه های انگل پس از ۳۰ دقیقه به وسیله لوب جستجو شدند. از نوچه های *L.serrata* لام تهیه شد و از نظر ابعاد و ریخت شناسی ارزیابی ریزبینی گردیدند (۳۵). گره های لنفاوی آلوده نیز به آزمایشگاه آسیب شناسی منتقال یافتند.


۲- تهیه برش های آسیب شناسی- ابتدا گره های لنفاوی روده بندی آلوده از نظر ضایعات درشت بینی *L.serrata* مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس برش های بافتی از گره های لنفاوی روده بندی آلوده تهیه گردید و در فرمالین ۱۰ درصد قرار داده شدند. سپس گره های لنفاوی روده بندی در پارافین ثابت شدند و برش های بافتی به ضخامت ۴-۵ میکرون از آنها تهیه گردید. برش های بافتی تهیه شده از گره های لنفاوی روده بندی به روش هماتوکسیلین-ائوزین (H&E) رنگ آمیزی شدند و با بزرگ نمایی ۴۰۰× مورد ارزیابی ریزبینی قرار گرفتند (۲۳، ۳).




شکل ۱- گره لنفاوی روده بندی گاویش آلوده به *L.serrata*



شکل ۲- نکروز و کیستی شدن در ناحیه قشری گره لنفاوی روده بندی و کاهش لنفوسيتی ناشی از آلودگی *L.serrata* H&E بزرگنمایی $\times 400$.



شکل ۳- التهاب اطراف عروقی حاصل از آلودگی به *L.serrata*, H&E، بزرگنمایی $\times 400$.



شکل ۴- حضور ماکروفازها (M) و لنفوسيت های آپوپتوتيك (La) در بافت گره لنفاوی روده بندی آلوده به نوچه انگل *L.serrata* H&E بزرگنمایی $\times 400$.

می گردد (۵). در این مطالعه نیز در داخل بافت گره لنفاوی ساختار کیست مشاهده گردید که با مشاهدات Sivakumar و همکاران (۳۳) همخوانی داشت.

ضایعات آسیب شناسی ناشی از پنتاستومیدا در گره های لنفاوی روده بندی به سه شکل توصیف شده است. نوع اول به صورت گرانولوم نکروتیک که شکل شایع در ضایعات آسیب شناختی پنتاستومیدی بوده و در آن نوچه انگل به صورت خرد شده دیده می شود. شکل دوم گرانولوم جوان است که نوزاد انگل به صورت هلالی شکل و زنده دیده می شود. نوع سوم ضایعه که به ندرت رخ می دهد به صورت گرانولوم کوتیکولی است که در آن باقیمانده پوسته های نوزادی حضور دارد (۱۱). در این تحقیق، ضایعات عمدتاً از نوع اول بود که واکنش های التهابی به همراه ضایعات نکروتیک بود. گرچه اثار مهاجرت نوچه در مقاطع بافتی مشاهده شد ولی نوزاد انگل *L.serrata* در محل ضایعات گره لنفاوی حضور نداشت.

در این مطالعه، برخلاف یافته های Choudhary و Dewan (۹) در داخل اشکال دانه ای ناحیه شفاف بهمراه نفوذ اوزنوفیل در حاشیه ضایعه مشاهده نشد. البته واکنش التهابی به همراه نفوذ سلول های تک هسته ای و تغییرات دانه ای شکل مزمن که Sivakumar و همکاران (۳۳) نیز به آن اشاره کرده بودند، مشاهده شد اما آثاری از خونریزی در ضایعات وجود نداشت. البته وجود ضایعات دانه ای شکل گره های لنفاوی روده بندی ناشی از نوچه *L.serrata* بیانگر وقوع همزمان این آودگی با سایر عوامل عفنونی در آن است (۱۵، ۲۰، ۲۹). در مقاطع آسیب شناسی تهیه شده از گره لنفاوی روده بندی گاویمیش، در بخش مرکزی آن کروماتولیز در هسته لنفوسيت ها مشاهده گردید. گرچه باور بر این است که میکروسکوپ الکترونی بهترین راه برای شناخت سلول های آپوپتوئیک است ولی در اغلب مطالعات این روش در مورد نمونه های بافتی عملی نمی باشد (۱۶). به علاوه تشخیص یاخته های آپوپتوئیک در مقاطع بافتی ثابت شده در فرمالین میسر است از جمله در مقاطعی که با روش های معمول نظیر هماتوکسیلین- آئوژن تهیه شده باشند (۱۰، ۱۷). نتایج بدست آمده از ریخت شناسی مقاطع بافتی و یافته های حاصل از آن مشابه با روش اینموهیستوشیمی در شناسایی اجسام آپوپتوئیک گزارش شده است. بنابراین گرچه یافته های ریخت شناسی به تنهایی از حساسیت کمتری برخوردار است ولی قابل اعتماد می باشد (۱۲).

تشکر و قدردانی

بدینوسیله نویسندها مقاله از آقای اسماعیل آقاپور کارشناس بخش انگل شناسی و آقای اصغر مرواریدی کارشناس بخش آسیب شناسی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه که در این مطالعه با ما همکاری داشتند، تشکر و قدردانی می نمایند.

منابع مورد استفاده

- ۱- اسماعیل نیا، ک.، حیدرزاده، م، درخشان فر، م، (۱۳۷۹) مطالعه شیع در نشخوارکنندگان کوچک کشتر شده در کشتارگاه شهرستان بابل در استان مازندران. مجله پژوهش و سازندگی، جلد ۴، شماره ۴۵: ص ۹۴-۹۵
- ۲- ایلمازیان، م، راهنما، ن.، (۱۳۵۴) مشاهده یک مورد گوسفند مبتلا به *L.serrata* مجله جامعه دامپزشکان ایران. سال دوم، شماره ۸: ص ۳۷-۳۸

فولیکول های گره های لنفاوی روده بندی به علت حضور انگل *L.serrata* مشاهده گردید (شکل ۲). التهاب عروقی و التهاب اطراف عروقی در بخش قشری گره های لنفاوی روده بندی نیز دیده شد (شکل ۳).

به واسطه جابجا شدن نوچه انگل، تراکم سلولی لنفوسيت ها کم و بطور عمده به صورت لنفوبلاست یا لنفوسيت های در حال تقسیم بودند. ماکروفازها نیز جایگزین لنفوسيت ها شده بودند (شکل ۴). در بخش مرکزی گره های لنفاوی روده بندی، کروماتولیز در هسته لنفوسيت ها (یاخته های آپوپتوئیک) به علت ضایعات مکانیکی ناشی از حضور انگل مشاهده گردید. البته آپوپتوزیس در مقاطع بافتی به صورت متراکم و حاشیه نشین شدن کروماتین در مجاورت جدار هسته و کروماتولیز بود (شکل ۴).

ضایعات مزمن

در سینوزیت گره های لنفاوی روده بندی تراکم لنفوبلاست و هیستوسیت ها به نسبت کمتر از لنفوسيت ها منجر به هیپرپلازی مرکزی گردیده بود (شکل ۴).

بحث

در مطالعه حاضر، میانگین طول نوچه ها ۴ میلی متر بود. این یافته اندازه گیری های ریزینی با سایر گزارشات که در آنها نیز طول نوچه *L.serrata* ۴-۶ میلی متر گزارش شده است، همخوانی داشت (۲۷، ۲۵، ۳۳). البته اندازه طول انگل در مرحله لاروی تا ۵۰۰ میکرون می باشد (۳۷) و بالغ آن در جنس نر و ماده به ترتیب ۱/۸-۲ و ۸-۱۳ متر باشد (۳۵). در مشاهده گره های لنفاوی روده بندی گاویمیش آلووده به نوچه *L.serrata*، این گره ها متورم، خیزدار و دارای سطح صافی بودند. در صورتی که در مطالعه گره های لنفاوی گواهای آلووده به نوچه *Tajik* و همکاران (۳۵) ضایعات در این گره ها به صورت بزرگ شدگی، پرخونی و تخریب بافتی گزارش گردیده است. این تغییرات در رنگ و قوام گره های لنفاوی امکان تشخیص آلوودگی را ممکن می سازد. بنابراین آزمایش گره های لنفاوی لاشه دام نشخوارکننده در کشتارگاه احتمالاً راهنمای خوبی می تواند باشد. تغییرات در اندازه، رنگ و قوام گره های لنفاوی آلووده نیز می توانند شاخص های خوبی برای تشخیص و تفرقی آلوودگی در میزبان علفخوار کشتار شده باشند. البته، ضایعات درشت بینی انگل *L.serrata* در ریه بز به صورت ندول های خونی در زیر پرده جنب به رنگ قرمز با بخش مرکزی روشن گزارش گردیده است. گزارش ضایعات در سطح کبد نیز به شکل نقاط خونریزی ته سنجاقی حاوی انگل بوده است. گرچه در زیر کپسول گره های لنفاوی روده بند و کبد وجود انگل گزارش شده است ولی هیچ گونه تغییرات آسیب شناسی ثبت نگردیده است (۲۹). انگل بالغ *L.serrata* در میزبان گوشتخوار ایجاد تحریکات موضوعی و آماسی در بخش بینی-حلقی ایجاد می نماید ولی نوزاد آن در احشا میزبان واسط از جمله گاو، گاویمیش، گوسفند، بز و شتر موجب بروز ضایعات آسیب شناسی می شود (۳۳). در احشا یا به دور نوزاد کیست تولید می گردد و یا نوزاد در بدن میزبان مهاجرت کرده و در داخل بافت به شکل دانه هایی به قطر یک سانتی متر مشاهده می شود (۹). در اکثر موارد ضایعات پس از ۲ سال آهکی

126

19. Lapage, G., (1965) *Linguatula serrata*. In: Lapage, G., (ed.), *Monning's Veterinary Helminthology and Entomology*, Fifth edition, Bailliere Tindall and Casell, London, pp. 530
20. Lazo, R.F.; Hidalgo, E.; Lazo, J.E.; Bermeo, A.; Llaguno, M.; Murillo, J.; Teixeira, V.P.A., (1999) Ocular linguatuliasis in Ecuador: case report and morphometric study of the larva of *Linguatula serrata*. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 60(3): 405-409
21. Maleky, F., (2001) A case report of *Linguatula serrata* in human throat from Tehran, central Iran. *Ind. J. Med. Sci.* 55: 439-441
22. Meshki, B. and Asgarian, O., (2003) Prevalence of *Linguatula serrata* infestation in stray dogs of Shahrekord, Iran. *J. Vet. Med.* 50: 466-467
23. Miclăuș, V.; Mihalca, A.D.; Negrea, O.; Oană, L., (2008) Histological evidence for inoculative action of immature *Linguatula serrata* in lymph nodes of intermediate host. *Parasitol. Res.* 102:1385-1387
24. Muraleedharan, K. and Zaki, S., (1975) Occurrence of *Linguatula serrata* (Frolich, 1789) in cattle. *Curr. Sci.* 44: 430
25. Oryan, A.; Moghaddar, N.; Hanifpour, M.R., (1993) Arthropods recovered from the viscera organs of camel with special reference to their incidence and pathogenesis in Fars province of Iran. *Indian J. Anim. Sci.* 63(3): 290-293
26. Rak, H., (1972) *Ectoparasites of dogs and cats in Iran*. Entomologist monthly magazine. 108: 1298-1300
27. Razavi, S.M.; Shekarforoush, S.S.; Izadi, M., (2004) Prevalence of *Linguatula serrata* nymphs in goats in Shiraz, Iran. *Small Rumin. Res.* 54: 213-217
28. Razmaraii, N; Ameghi-Roodsary, A; Ebrahimi, M.; Karimi, G.R., (2007) A study of the infection rate of *Linguatula serrata* in stray dogs in Marand, Iran. *Iranian Vet. J.* 3: 100-105
29. Saiyari, M.; Mohammadian, B.; Sharma, R.N., (2005) *Linguatula serrata* (frolich 1789) nymphs in lungs of goats in Iran. *Trop. Anim. Health Prod.* 28: 312-314
30. Shakerian, A.; Shekarforoush, S.S.; Ghafarirad, H., (2008) Prevalence of *Linguatula serrata* nymphs in one-humped camel (*Camelus dromedarius*) in Najaf-Abad, Iran. *Res Vet Sci.* 84(2):243-245
31. Shekarforoush, S.S. and Arzani, P., (2001) The study of prevalence rate of *Linguatula serrata* nymphs in liver of sheep, goat and cattle in Shahre-kord, Iran. *Iran. J. Vet. Res.* 2: 57-62
32. Siavashi, M.R.; Assmar, M.; Vatankhah, A., (2002) Nasopharyngeal pentostomiasis (Halzoun): Report of three cases. *Iran J. Med. Sci.* 27(4): 191-192
- ۳- بهادری, م. (۱۳۶۹) فن آسیب شناسی و روش های رنگ آمیزی. انتشارات دانشگاه تهران, ص ۱۸۹، ۸۱
- ۴- حجتی, م, نقیلی, ح. (۱۳۶۸) گزارش یک مورد نازوفارنزیال پنتاستومیازیس از آذربایجان غربی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. شماره ۶, جلد ۲۳: ص ۴۲-۵۰
- ۵- ذوقی, ا. (۱۳۶۸) زئونوزها و بیماری های قابل انتقال مشترک انسان و حیوان. انتشارات انتستیتو رازی حصارک. ص ۹۸۰-۹۸۴
- ۶- عریان, ا, سجادی, س, رضایی, م, مهربانی, د. (۱۳۷۶) میزان شیوع *L.serrata* در سگ های ولگرد شهرستان شیراز. دومین کنگره ملی بیماری های انگلی, تهران, ص ۱۷۹
- ۷- یخچالی, م, اطهاری, ش, حاجی محمدی, ب, رئیسی, م. (۱۳۸۸) مطالعه شیوع *L.serrata* در نشخوارکنندگان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. جلد ۶, شماره ۴: ص ۳۳۲-۳۲۹
۸. Baird, J.K.; Kasseebaum, L.J.; Ludwig, G.K., (1988) Hepatic granuloma in a man from North America caused by a nymph of *Linguatula serrata*. *Pathol. Biol.* 20:198-199
9. Choudhary, M.U.A. and Dewan, M.L., (1967) Immature linguatuliasis in a murrah buffalo. *Pak. J. Vet. Sci.* 1: 73-75
10. Cummings, M.C.; Winterford, C.M.; Walker, N.I., (1997) Apoptosis. *Am. J. Surg. Pathol.* 21:88-101
11. Drabick, J.J., (1987) Pentastomiasis. *Rev. Infect. Dis.* 9: 1087-1094
12. Drachenberg, C.B.; Loffe, O.B.; Papadimitriou, J.C., (1997) Progressive increase of apoptosis in prostatic intraepithelial neoplasia and carcinoma: Comparison between insitu end labeling of fragmented DNA and detection by routine hematoxylin-eosin staining. *Arch. Pathol. Lab. Med.* 121:54-58
13. El-Hassan, A.M.; Eltoun, I.A.; El-Asha, B.M.A., (1991) The Marrara syndrome: isolation of *Linguatula serrata* nymphs from a patient and the viscera of goats. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 85: 309
14. El-Khawads, F.D.S., (1978) *Linguatula serrata* nymph in a goat in the Sudan. *Vet. Rec.* 25: 171
15. Hadadzadeh, H.; Shamsadin Athari S.; Hajimohammadi B., (2008) The first record of *Linguatula serrata* inflection of two-humped camel in Iran. *Iranian J. Parasitol.* 4(1): 59-61
16. Harrison, D.J., (1996) Counting apoptosis - why and how? *J. Clin. Pathol.* 49:42-54
17. Kerr, J.F.R.; Wyllie, A.H.; Currier, A.R., (1972) Apoptosis: A basic biological phenomenon with wide-ranging implications in tissue kinetics. *Br. J. Cancer* 26:239-257
18. Khalil, G.M., (1976) Prevalence of *Linguatula serrata* infection in animals from the Cairo abattoir. *J. Parasitol.* 62:

of intestines and mesenteric lymph nodes of camels (*Camelus dromedaries*) slaughtered in Iran. *Camel Pract. Res.* 8: 209-213
35. Tajik, H.; Tavassoli, M.; Dalirnaghadeh, B.; Danehloipour, M., (2006) Mesenteric lymph nodes infection with *Linguatula serrata* nymphs in cattle. *Iranian J. Vet. Res.* 7(4): 82-85

33. Sivakumar, P.; Sankar, M.; Nambi, P.A.; Praveena, P.E.; Singh, N., (2005) The occurrence of nymphal stage of *Linguatula serrata* in water buffaloes (*Bubalus bubalis*): Nymphal morphometry and lymph node pathology. *J Physiol. Pathol. Clin. Med.* 52:506-509
34. Tafti, A.K.; Maleki, M.; Oryan, A., (2001) Pathological study

Archive of SID