

غربالگری مواد سرم مثبت سارکوسيستيس (آپي کمپلکسا: سارکوسيستيده) (Lankester ۱۸۸۲) گوسفند به روش کانترايمونوالكتروفورزيس و مقایسه آن با يافته هاي کشتار گاهی

• محمد يخچالي

دانشيار بخش انگل شناسى، گروه پاتوبیولوژى، دانشكده دامپرشكى دانشگاه اروميه (نويسنده مسئول)

• احمد مرشدی

دانشيار بخش ايمني شناسى، گروه ميكروبیولوژى، دانشكده دامپرشكى دانشگاه اروميه

• فريين ملكى فرد

دانش آموخته دانشكده دامپرشكى دانشگاه اروميه

تاریخ دریافت: اسفند ماه ۱۳۸۸ تاریخ پذیرش: آبان ماه ۱۳۸۹

تلفن تماس نويسنده مسئول: ۰۹۱۴۴۴۶۳۹۵۹

Email : m.yakhchali@urmia.ac.ir

چكیده

بيماري سارکوسيستيزيس در اکثر نقاط جهان گزارش شده است و در ايران نيز در دامهای نشخوارکننده شیوع دارد. بنابراین در مطالعه حاضر الگوی ايمونوالكتروفورزی سارکوسيستيس سرم گوسفند و مقایسه نتایج با يافته هاي کشتار گاهی برای تعیین حساسیت و ویژگی آزمون کانترايمونوالكتروفورزیس به عنوان یک آزمون غربالگری انجام شد. برای تهیه سرم ۱۰۰ نمونه خون گوسفندان قبل از کشتار تهیه و سرم جدا گردید. پادگن محلول از کیست های بافتی از مری، دیافراگم، عضله رانی و بین دنده ای آلوده به کیست سارکوسيستيس تهیه شدند. آزمون کانترايمونوالكتروفورزیس نیز با سرم های شاهد منفی و مثبت انجام شد. در کانترايمونوالكتروفورزیس از ۱۰۰ نمونه سرم ۲۷ درصد سرم ها مثبت بودند. حساسیت آزمون کانترايمونوالكتروفورزیس در حدود ۱۰۰ درصد و ویژگی آن ۸۳ درصد بود. بنابراین آزمون کانترايمونوالكتروفورزیس برای شناسایی و جدا کردن حیوانات آلوده به سارکوسيستيس از حیوانات سالم گله آزمون قابل پیشنهاد است.

كلمات کلیدی: گوسفند، سارکوسيستيس، کانترايمونوالكتروفورزیس

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 89 pp: 28-32

Screening of seropositive sarcocystis (Apicomplexa: Sarcocystidae, Lankester 1882) in sheep using counterimmunoelctrophoresis.

By: Yakhchali, M, Department of Pathobiology, Parasitology Division, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University (Corresponding Author; Tel: +989144463959) Morshedi, A Department of Microbiology, Immunology division, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University and Malekifard, F. Educated of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University.

Sarcocystosis has been reported from most parts of the world, including ruminant animals in Iran. Based on this, immunoelectrophoresis profile of Sarcocystis and comparison between serum and necropsy findings to determine sensitivity and specificity of counterimmunoelctrophoresis (CIE) was undertaken. For this purpose, serum was collected from a total number of 100 sheep. Soluble antigen provided using infected tissues, as well. CIE analysis was conducted using negative and positive controls. Results indicated that seropositive sheep sample was 27%. Data analysis showed that specificity and sensitivity of this test were 100% and 83%, respectively. It is concluded that CIE is a reliable test to screen infected animals by Sarcocystis spp.

Key words: Sarcocystis, Sheep, Counterimmunoelctrophoresis.

گردید.

تهیه پادگن - برای تهیه پادگن سارکوستیس طی مراجعات کشتارگاهی اقدام به بازرگی لاشهای نموده و نمونه برداری بافتی از مری، دیافراگم، عضله رانی و بین دندنای آلوده به کیست سارکوستیس انجام شد. به کیست‌های جدا شده انگل از بافت آلوده با فر PBS به همراه ترکیب آنتی پروتئاز فنیل متیل سولفونیل فلوراید (۵/۰ میلی‌مول) افزوده ۱۲ بار فریز-ذوب شدند. مخلوط حاصل سانتریفیوژ گردید (۸۰۰ دور در ۱۰ دقیقه) و مایع رویی به عنوان پادگن محلول جدا گردید.

برای استاندارد کردن غلظت پادگن با استفاده از روش غلظت لوله شماره سه مکفارلان استفاده شد. به این منظور مقدار ۲ میلی‌لتر اسید تری‌کلرواستیک سه درصد را در لوله آزمایش ریخته و دو قطره سرم انسانی حاوی ۶-۸ میلی‌گرم پروتئین در هر دسی لیتر نیز اضافه گردید. مشاهده کدورت معرف غلظت آن بود که با افودن سرم فیزیولوژی کدورت در محلول کمتر گردید. در اسپیکتوفوتومتری که قبله عاری از حباب هوا بود، آب مقطر اضافه شد و در ۴۵۰ نانومتر تنظیم گردید. در ۴۰ نانومتر، جذب نوری معادل ۱۸۸ نشان داد (غلظت معادل غلظت لوله شماره ۳ مک‌فارلان). مقدار نرمال پروتئین پادگن برای این آزمایش در ۲-۲/۵ میلی‌گرم در میلی‌لتر تنظیم شد (۱۵).

کانترایمنو الکتروفورزیس - برای انجام کانترایمنو الکتروفورزیس، از بافر باربیتال که بر اساس روش گراندبوک تهیه می‌شد استفاده گردید (pH ۸/۹-۹/۲)، روی صفحات شبشهای مخصوص به ضخامت ۴ میلی‌لیتر ژل آگاروز یک درصد ریخته شد تا معنقد گردد (۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد). سپس توسط پانچر چاکهای به قطر ۳/۵ میلی‌متر روی ژل ایجاد گردید. فاصله ردیفهای افقی ۱/۵ سانتی‌متر و فاصله حفره‌های پادگن-پادتن ۵ میلی‌متر بود. مطلوبترین کمان رسویی

مقدمه

انگل سارکوستیس به عنوان یکی از تک یاخته‌های انگلی کوکسیدیایی ایجاد‌کننده کیست در حیوانات اهلی به شمار می‌رود. از این انگل تاکنون بیش از ۱۳۰ گونه شناسایی شده است و از تک یاخته‌های شایع در بسیاری از چهارپایان اهلی و وحشی، پرندگان، جانوران خونسرد و نیز انسان می‌باشد (۱۱). تاکنون ۴ گونه آن در گوسفند شناسایی شده است. کیست انگل در عضلات و سیستم اعصاب مرکزی حیوانات خونگرم و خونسرد یافت می‌شود (۶).

در ایران، شیوع سارکوستیزیس گوسفند برای اولین بار توسط افشار و همکاران در سال ۱۳۵۱ بررسی گردید (۵). مطالعات بعدی نشان داد که شیوع آلودگی سارکوستیزیس در گاو ۷۳/۷۹ درصد، گوسفند ۶۰/۹۳ درصد، بز ۷۰/۴۵ درصد و گاوی مشیش ۴۰/۹ درصد بود (۴). در همدان ۵۴ نفر سرم مثبت نیز به دلیل مصرف گوشت گوسفندان آلوده به سارکوستیزیس گزارش شده اند (۷). از اهداف این مطالعه ارزیابی آزمون کانترایمنو الکتروفورزیس به عنوان یک آزمون غربالگری سرم شناسی، تخمین میزان آلودگی گوسفندان به انگل سارکوستیزیس بر اساس روش کانترایمنو الکتروفورزیس و یافته‌های کشتارگاهی و مقایسه آن با میزان آلودگی‌های قبلی با توجه به عدم اقدام کنترلی در مورد انگل و نیز بررسی میزان حساسیت و ویژگی آزمون کانترایمنو الکتروفورزیس بود.

مواد و روش‌ها

تهیه سرم - ۱۰۰ نمونه خون از گوسفندان قبل از کشتار تهیه و علامت‌گذاری شدند. هر نمونه خون در ۲۵۰۰ دور به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ و سرم جدا شده در دمای ۷۰-درجه سانتی‌گراد نگهداری

نتایج

در کانترایمنو الکتروفورزیس از ۱۰۰ نمونه سرم گوسفندی، ۲۷ درصد سرم‌ها مثبت بودند. ۱۵ درصد از دام‌های بدون کیست انگل، سرم مثبت بودند (جدول ۱). به طوری که دوازده نمونه با عیار ۲، نه نمونه با عیار ۴، چهار نمونه با عیار ۸ و دو نمونه با عیار ۱۶ بودند (جدول ۲). چنانچه ۱۵ مورد سرم مثبت و فاقد کیست، مثبت مشکوک در نظر گرفته شوند، حساسیت و ویژگی آزمون به ترتیب در حدود ۱۰۰ درصد و ۸۳ درصد بودت آمد.

بیشترین فراوانی موارد سرم مثبت مربوط به رقت ۱ به ۲ (با عیار ۲) در ۱۲ نمونه بود. کمترین تعداد موارد سرم مثبت در رقت ۱ به ۱۶ (با عیار ۱۶) در ۲ نمونه ثبت شد. در این مطالعه میزان آلوگی عضلات مختلف به ماکروکیست سارکوسیستیس نشان داد که بیشترین میزان آلوگی در دیافراگم (۱۴ درصد) و کمترین میزان آلوگی در عضله چهارسران (۶ درصد) می‌باشد (جدول ۳).

در فاصله‌ی ۳ میلی‌متر از دو حفره مشاهده شد. برای انجام آزمایش نمونه‌های سرمی در دمای آزمایشگاه ذوب می‌گردید و از رقت‌های ۱/۲ تا ۱/۶ نمونه‌های سرم ۵ میکرولیتر به هر حفره ستون عمودی اضافه شد. برای مشخص شدن خط رسوی پادگن-پادتن از رنگ بروموفل بلو (۲۰ میلی‌گرم در ۱۰۰ سی سی با فر باریتال) به نسبت دو قسمت سرم و یک قسمت رنگ استفاده گردید. در داخل هر کدام از حفره‌های مربوط به پادگن و پادتن مقدار ۵ میکرولیتر سرم و در حفره مقابله آن ۵ میکرولیتر پادگن تهیه شده از کیست ریخته شد. برای هر سری از سرم‌های نمونه که در یک نوبت آزمایش می‌شد، یک سرم شاهد منفی و یک سرم شاهد مثبت (تهیه شده از بخش انگل‌شناسی موسسه رازی حصارک) نیز جهت کنترل پادگن گذاشته شد. سپس اسلامید شیشه‌ای نمونه‌گذاری شده در تانک الکتروفورزیس قرار داده و در دو مرحله، ابتدا با ۲۵۰ ولت و ۳۰ میلی‌آمپر در ۱۵ دقیقه و سپس ۱۰۰ ولت و ۲۰ میلی‌آمپر به مدت ۷۵ دقیقه الکتروفورز انجام شد. برای نمایان شدن بهتر خط رسوی ژل رنگ آمیزی گردید (۱۰).

جدول ۱—موارد سرم مثبت گوسفندان آلوگه به سارکوسیستیس در آزمون کانترایمنو الکتروفورزیس

موارد سرم مثبت			تعداد سرم	آزمون
جمع کل	فاقد کیست	دارای کیست		
۲۷	۱۵	۱۲	۱۰۰	کانترایمنو الکتروفورزیس

جدول ۲—عیار تعداد موارد سرم مثبت گوسفندان در رقت‌های مختلف در آزمون کانترایمنو الکتروفورزیس

رقت‌های سرم				
۱/۱۶	۱/۸	۱/۴	۱/۲	
۱	۲	۴	۵	موارد سرم مثبت با کیست
۱	۲	۵	۷	موارد سرم مثبت بدون کیست

جدول ۳—درصد فراوانی یافته‌های کشتارگاهی آلوگی به کیست سارکوسیستیس در اندام‌های مختلف گوسفند در کشتارگاه شهرستان

موارد سرم مثبت				تعداد دام	یافته‌ها
عضله بین دندنه‌ای	عضله چهارسران	دیافراگم	مری		
۸	۶	۱۲	۱۰	۱۰۰	کانترایمنو الکتروفورزیس

بحث

آزمون‌های سرم‌شناسی از روش‌های آزمایشگاهی تشخیص سارکوسیستوزیس می‌باشد که موفقیت آنها به در دسترس بودن پادگان اختصاصی انگل بستگی دارد (کاظمی و همکاران، ۱۳۸۵). از روش‌های کروماتوفوکوسینگ (۱۷) و ژل کروماتوگرافی برای جداسازی پروتئین‌های سارکوسیستیس استفاده کرده‌اند (۱۲، ۱۳). به طوری که از سارکوسیستیس جدا شده از سیستوزیت‌های عضلات گاو به عنوان پادگان در تست الیزا استفاده گردیده است (۱۴).

در مطالعه حاضر با استفاده از پادگان کیست سارکوسیستیس بافتی ۲۷ درصد سرم گوسفندان تحت مطالعه به روش کانترايمونالکتروفورزیس سرم مثبت بودند. از آنجایی که در هیچ یک از مناطق کشور کنترلی در مورد انگل سارکوسیستیس نمی‌شود، حضور ۲۷ درصد آلدگی سرمی بیانگر کاهش میزان آلدگی نسبت به گزارش‌های قبلی است (۶، ۴، ۳، ۲). این کاهش به دلیل نقش عوامل زیست محیطی نظیر تغییرات دوره ای دما در تابستان و زمستان و وضعیت نگهداری گوسفندان از جمله استفاده بیشتر از مراعت و یا نگهداری در آغل، از بین بردن سگ‌های ولگرد در مناطق شهری و روستاهای باشد. بنابراین برای آگاهی از وضعیت آلدگی سارکوسیستیس در گله‌های گوسفندان کشور مطالعات کشتارگاهی و سرولوژیک پیشنهاد می‌شود. سگ و گربه از میزان قطعی برای گونه‌های شناخته شده سارکوسیستیس گوسفندی می‌باشند. بنابراین، یکی از علل وقوع آلدگی شدید در میزان واسطه به این علت نسبت داده می‌شود که حیوانات مزرعه در ارتباط نزدیکی با سگ‌های نگهبان گله هستند و سگ‌ها چراگاه‌ها را با اسپروسیستهای سارکوسیستیس آلدگی می‌کنند (۸).

آزمون‌هایی نظیر الیزا، اینونفلورسانس و برخی از آزمون‌های رسوب در ژل در سرولوژی سارکوسیستوزیس کار برد دارند ولی هیچ یک آزمون گلداستن‌دار محسوب نمی‌شوند. از این‌دو در مطالعه حاضر، بی‌بردن به موارد مثبت حقیقی و یا منفی حقیقی بر اساس بررسی‌های کشتارگاهی و مشاهده کیست بافتی طراحی گردید. بنابراین نمونه‌های سرم مثبت فاقد کیست بافتی که مثبت مشکوک در نظر گرفته شدند، احتمالاً در صدی از آنها می‌تواند مربوط به مرحله میکروکیست باشد. در این تحقیق به دلیل عدم انجام آزمایش میکروسکوپی بافت جهت یافتن میکروکیست انجام نگردید، از این‌رو جزو خطای آزمایش در نظر گرفته شدند از آنجایی که برای تعیین حساسیت آزمون کانترايمونالکتروفورزیس در تشخیص سارکوسیستوزیس نیاز به تعداد مثبت حقیقی و منفی بود، فقط نمونه‌های سرم مثبتی که ماکروکیست داشتند، مثبت حقیقی برای آزمون در نظر گرفته شدند. بنابراین نمونه‌های سرم مثبت فاقد ماکروکیست نیز به دلیل عدم انجام هیستوپاتولوژی برای یافتن میکروکیست، منفی در نظر گرفته شدند. با این وجود برای رفع هرگونه ابهام به جای مثبت کاذب موارد مثبت مشکوک در نظر گرفته شدند و در ارزیابی‌ها تعداد مثبت‌های حقیقی محاسبه شدند. محاسبات به این روش فقط در تعیین میزان حساسیت و ویژگی آزمون کانترايمونالکتروفورزیس با پادگان سارکوسیستیس کاربرد دارد و در تعیین میزان شیوع آلدگی گوسفندان به سارکوسیستیس، کلیه حیوانات سرم مثبت با عیار ۱ به ۲ و بالاتر اعم از دارای ماکروکیست و بدون ماکروکیست، آلدگی به حساب آمدند.

حیوانات سرم منفی فاقد کیست نیز غیر آلدگی در نظر گرفته شدند. در این مطالعه از سرم‌های مورد آزمایش که همراه با کیست در بافت‌ها بودند، همگی در آزمون کانترايمونالکتروفورزیس مثبت شدند و نمونه منفی کاذب مشاهده نگردید. از این رو حساسیت آزمون در تشخیص سرمی سارکوسیستوزیس ۱۰۰ درصد به دست آمد که از این جهت با آزمون الیزا برایرسی می‌کند. در حالی که از ۸۸ نمونه فاقد کیست ماقرتوسکوپی، ۱۵ نمونه در آزمون کانترايمونالکتروفورزیس مثبت شدند که ۱۲ نمونه مثبت دارای خط رسوبی نازک و کوتاه بودند (مثبت مشکوک). در این رابطه، درصدی از مثبت‌های مشکوک را می‌توان مرتبط با موارد آلدگی در مرحله میکروکیست و واکنش‌های متقاطع با سایر تک یاخته‌های آپی کمپلکسا دانست که باستی به عنوان بخشی از خطای آزمایش مدنظر قرار گیرد. بنابراین ویژگی آزمون کانترايمونالکتروفورزیس ۸۳ درصد بدست آمد. البته در یک بررسی حساسیت آزمون کانترايمونالکتروفورزیس برای تشخیص سارکوسیستیس لوینی ۹۰ درصد گزارش شده بود (۱۶).

نتایج این تحقیق نشان داد که آزمون کانترايمونالکتروفورزیس از حساسیت و ویژگی مناسبی برخوردار بوده و می‌تواند یک روش غربالگری مناسب برای تشخیص موارد سارکوسیستوزیس در گله‌های گوسفند به دلیل سادگی در اجرا و ارزانی انجام آن باشد.

منابع مورد استفاده

- ۱- آغاز، ع. (۱۳۷۹). بررسی کشتارگاهی سارکوسیستیس در گاومیش‌های ذبح شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه، پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیه. شماره ۵۶۵: ص ۲۹ و ۱۴.
- ۲- ارشد، م.، دلیمی اصل، ع. و غفاری فر، ف. (۱۳۸۶). مطالعه مقایسه ای تشخیص سارکوسیستیس در لشه گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه تبریز، مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۷۵: ص ۶۸-۷۲.
- ۳- رزمی، غ. (۱۳۶۶). فراوانی سارکوسیستیس در نشخوارکنندگان اهلی ایران. پایان نامه دوره جهت اخذ درجه دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره ۱۶۴۴، ص ۱۶-۱۹.
- ۴- رزمی، غ. و رهبری، ص. (۱۳۷۹). بررسی سارکوسیستیس در نشخوارکنندگان اهلی در استان‌های تهران و گلستان، مجله علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ۳ شماره ۴: ص ۴۶-۳۹.
- ۵- رفیعی، ع. (۱۳۵۷). تک یاخته‌شناسی دامپزشکی و مقایسه ای. انتشارات دبیر خانه شورای پژوهش‌های علمی کشور. ص ۷۴۸-۷۶۰.
- ۶- شکر فروش، س.، ش. و علیخانی، ر. (۱۳۸۲). میزان آلدگی لشه گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه اصفهان به سارکوسیستیس، مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۸، ص ۶۸-۷۲.
- ۷- قراگوزلو، م.، ج. سجادی، م. و سماواتی، م. (۱۳۷۴). مطالعه حضور آنتی‌بادی ضد سارکوسیستیس گوسفند در پنجاه و چهار نفر از اهالی همدان. هفتمنی کنگره بین‌المللی پژوهش‌کی جغرافیایی و سومین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
- ۸- کاظمی، ب.، خزان، د.، عظیم‌زاده، ا.، صفری، خ.، تحويل دار بیدرونی، ف. و قجری، ع. (۱۳۸۵). خالص سازی و شناسایی باند پروتئینی از سارکوسیستیس گوسفند، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، جلد پنجم، شماره دوم، ص ۸۸-۸۰.

12(9):1050-1056.

13- Koudela, B., (1985) Purification of cystozoites of *Sarcocystis* spp. by the chromatographic gel. *Folia Parasitologica*, 32(4): 295-302.

14- Morsy, T.A., Abdle Mawla, M.M. and Hamidi, K.N., (1994) Assessment of intact *Sarcocystis* cystozoites as an ELIZ Aantigen. *Journal of the Egyptian Society of Parasitology*, 24(1): 295-302.

15- Pagana, T.J. and Pagana, K.D., (2009) *Mosby's Manual of Diagnostic and laboratory Tests*. 4th edition, Mosby publisher, pp. 498-499, 559-560.

16-Rohini, K. and Hafeez, M.,(1985) Serodiagnosis of sarcocystosis in buffaloes. *Indian Veterinary Journal*, 40: 314-318.

17- Tenter, A.M., Zimmerman, G.L. and Johonson, A.M., (1991) Separation of antigens from *Sarcocystis* species using chromatofocusing. *Journal of Parasitology*, 77(5):727-736.

۸۵

۹- گرامی نیا، ا. (۱۳۷۵) بررسی سرو迪اگنوتیک سارکوستیس با استفاده از تست ایمونوالکتروفورز در گوسفند در ارومیه، پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران، شماره ۲۴۸۰، ص ۴۱-۴۳.

10- Deka, D.K. and Gaur, S.N.S., (1990) Countercurrent immunoelectrophoresis in the diagnosis of *Taenia hydatigena* cysticercosis in goats. *Veterinary Parasitology*, 37: 223-228.

11- Dubey, J.P., (1976) A review of *Sarcocystis* of domestic animal and of other coccidia of cats and dog. *Journal of American Veterinary Medical Association*, 169(10): 1067-1078.

12-Hoana, J.S., Morrow, J.K., Saville, W.J., Dubey, J.P., Granstrom, D.E. and Howe, D.K.,(2005) Enzyme-Linked Immunosorbent assay for detection of equine antibodies specific to *Sarcocystis neorona* surface antigen. *Clinical Diagnostic Laboratory Immunology*,