

مطالعه آناتومی و بافت‌شناسی روده بزرگ در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)

• جلیل پور حاجی موتاب (نویسنده مسئول)

استادیار دانشکده دامپرورشی، واحد گرم‌سار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرم‌سار، ایران.

• سید رشید توئی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴-۰۷-۱۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵-۰۱-۰۲

Email: j.pourhaji.m@gmail.com



چکیده

مرغان مروارید متعلق به رده پرنده‌گان قرقاوی هستند. روده بزرگ بدليل جذب آب، هضم، فعالیت میکروبی و تولید ایمونوگولوبولین و آنتی‌بادی در بدن پرنده‌گان دارای اهمیت می‌باشد. از آنجایی که تفاوت‌هایی در بعضی گونه‌ها در این اعضا مشاهده می‌شود و نیز بدليل اینکه بر روی بعضی از پرنده‌گان خانواده قرقاوی مانند مرغ مروارید تاکنون تحقیقات انجام نشده است، این مطالعه صورت پذیرفت. بدین منظور ۲۰ عدد مرغ مروارید بالغ نر و ماده انتخاب شدند و روده بزرگ آن‌ها مورد مطالعه آناتومی قرار گرفت، سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه‌ها به روش هماتوکسیلین و ائوزین (H & E) رنگ آمیزی شدند. یافته‌های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک در اساس مشابه سایر ماقیان بود. نتایج آزمون‌های آماری در روده بزرگ نشان داد تفاوت معناداری بین اندازه این اعضا در دو جنس وجود ندارد. ویژگی قابل ذکر در روده کور مشاهده شد. پرز ایلئومی در روده کور مرغ مروارید برخلاف ماقیان ناواضح بود. همچنین برخلاف سایر پرنده‌گان قرقاوی روده کور در مرغ مروارید ساختار لوله‌ای داشت. در مطالعه بافتی نیز لوزه سکومی در مرغ مروارید فقط در یک سمت دیواره قرار داشت.

کلمات کلیدی: آناتومی، بافت‌شناسی، روده بزرگ، مرغ مروارید

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 114 pp: 40-50

Anatomical and histological study of large intestine in quinea fowl

By: Pourhaji Motab, J., (Corresponding Author) Assistant professor of Department of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran and Touri, S.R, Young Researchers and Elite Club, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

Received: 2015-10-09 Accepted: 2017-01-17

Email: j.pourhaji.m@gmail.com

Guinea fowls belong to the pheasant's category. Owing to the functions of the large intestine in the physiology of digestion, like incorporation in water absorption, microbial and immunologic activities, it has a significant role in bird's body. As there are some differences in these organs in different species, and also due to the lack of research on pheasant's category like guinea fowl in these aspects, this study was performed. For this study 20 adult male and female guinea fowl were selected and their large intestines were grossly studied, then tissue samples were taken, and processed through routine paraffin sectioning and stained by Haematoxylin and Eosin method. The macroscopic and microscopic results did not reveal basic differences with other birds such as *Gallus domesticus*. The statistical analyses did not reveal significant differences regarding sizes of this organ in male and female species. Special features were seen in the cecum. In contrast to other birds, cecal villi was unclear. Also this organ was tubular shape in contrast to other pheasant's category. Histological study showed that the cecal tonsils were located on one side of the cecum wall.

Keywords: Guinea fowl, Large intestine, Anatomy, Histology

مقدمة

اهمیت پرتدگان در محیط زیست و زندگی انسان‌ها، یهودیه نقش آن‌ها در تولید گوشت و تخم برکسی پوئیده تیست. امروزه پرورش مرغان مروارید بدلیل دارای بودن گوشتی لذیذ، مطبوع و یا پرتوتین بالا افزایش یافته است. مرغان مروارید چزء خاتوانده پرتدگان قراول به حساب آورده می‌شوند و از نظر کلی تغیر مرغان زینتی و مرغان تاج دار همانند قرقاوی، طاووس و بوقلمون هستند. تام اولیه آن‌ها مرغ گینه‌ای بوده که معرف منشاء و موطن اصلی آن‌ها است. زائده‌ای قرمز رنگ در منقار این پرتده وجود دارد که در جنس تر بلند و پرجسته است و بدلیل وجود همین زائده به این پرتده مرغ شاخدار نیز گفته می‌شود (۲۵، ۲۶، ۳۰). روده یزگ در پرتدگان محلی برای چذب آب، هضم سلولز، فعالیت میکروبی و تولید ایمونوگلوبولین و آنتی‌بادی است. روده یزگ از یک چفت روده کور (Cecum) و یک روده کوتاه مستقیم به نام راست‌روده (Rectum) تشکیل می‌شود. روده کور در پرتدگان به شکل دو لوله تهییه انجشته شکل است که سطح خارجی آن صاف بوده و از دو سمت راست‌روده در محل اتصال با اینکوم منشاء می‌گیرند. روده کور به صورت زوائد روده‌ای می‌باشد که در طرفین انتهای اینکوم و ابتدای قولون قرار دارد. روده کور در هر دو قسمت دارای یک روده‌ی مجزا از سمت جانبی (Lateral) یا تحاتی جانبی (Ventrolateral) به داخل کولون یا راست‌روده است. شبکه‌ای از پرزهای به هم پیوسته در ورودی روده کور به عنوان فیلتر عمل کرده و اجازه ورود مایعات و ذرات کوچک را به روده کور داده و از ورود ذرات یزگ چلوگیری می‌کند. چذب آب و هضم سلولز نیز در روده کور انجام می‌گیرد. هر روده کور دارای یک اسفنکتر کوکومی (Cecal sphincter) بوده که یک

لوزه سکومی (Cecal tonsil) متورم نیز در مجاورت آن قرار دارد. چین های مخاطی روده کور دارای کرک یا پر زهایی است که به سمت انتهای بسته‌ی روده کور کوتاه تر شده و مبدل به چین های طولی می‌گردند. در ابتدای روده کور کرک هایی به صورت کوتاه و ضخیم با تعداد فراوانی سلول جامی حضور داشته که به طرف انتهای ته کیسه ای از بین می‌روند. راست روده دارای مسیر مستقیمی است که توسط یک روده بند از سقف حقره عمومی روده ای آویزان است و بالا قابل اتساع به داخل کلاوک یا زای می-گردد. در تمام طول روده، کرپت های لیپر کوهن یا غدد مخاطی روده ای (Intestine mucosal glands) وجود دارند. راست روده در ماکیان حاوی کرک ها یا پر زهای کوتاه و ضخیم و تعداد فراوانی سلول جامی است، و به غیر از این خصوصیت سایر مشخصات راست روده مشابه روده پاریک می‌باشد (۳۱، ۲۹، ۲۷، ۲۴، ۲۲، ۱۲، ۶، ۵). تحقیقات آناتومیکی و یافتن شناسی برروی روده بزرگ در شمار زیادی از پرندگان انجام شده است و علیرغم مشابهت هایی با ماکیان، تقاضت-هایی نیز گزارش شده است. Mitchell (۱۹۰۱) روده کور را در شترمرغ همانند ماکیان بصورت زوج گزارش گرد (۲۲). Dominic و Naik (۱۹۶۲) گزارش کردند در طوطی، دارکوب، چند، پرندگان زیبور خوار، پرندگان یادخور ک روده کور وجود ندارد (۲۳). Mattocks (۱۹۷۱) راست روده را در غاز پرخلاف ماکیان بزرگ و پیچ خورده گزارش کرد (۱۸). Fowler (۱۹۹۱) و Herd (۱۹۸۵) و Potter (۲۰۰۶) و همکاران (۲۰۰۸) بیان داشتند در شترمرغ و سایر سینه پنهان مانند امو، کاسوواری، رنا و مرغ کیوی سطح خارجی کولون حالت تاصاف و کیسکدار (Saccular) می‌باشد (۱۱، ۸، ۲۸). Potter و همکاران (۲۰۰۶) نیز عنوان کردند در مرغ کیوی لوزه سکومی وجود ندارد (۲۸). با مطالعه تحقیقات صورت گرفته مشاهده

جنس نر و ماده محاسبه شد و اتحراف معیار نیز تعیین شد. در نهایت آزمون آماری برای میانگین طول و عرض هر عضودر دو جنس انجام شد و این کار توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ صورت پذیرفت و آزمون T student مورد استفاده قرار گرفت و سطح ۰/۰۵ p برای معنی دار بودن اختلاف بین داده ها در تظر گرفته شد.

نتایج

آناتومی

آناتومی روده بزرگ مرغ مروارید از نظر ساختار و موقعیت در هر دو جنس مشابه و در اساس همانند ماقیان بود.
روده کور: روده کور در یخش پشتی دوازدهه قرار داشت، بطوریکه در موقعیت پشتی شکمی لائش سکوم بیشتر توسط یخش صعودی و نزولی دوازدهه و پانکراس پوشیده می شد. روده کور در مرغان مروارید در هر دو جنس نر و ماده به شکل دو زائد روده ای به شکل لوله های تپیسته در طرقین راست و چپ انتهای ایلنوم و ابتدای راست روده در مقابل هم قرار گرفته بود. هر دو روده کور سمت راست و چپ در انتهای خلفی حقره کبدی راست و یخش قدامی سمت راست حقره روده ای قرار داشت. به دلیل طول زیاد دو روده کور، انتهای خلفی هر دو یا همان رأس تانزدیکی کلواک ادامه یافته و یک خمیدگی چزئی به سمت چپ داشت. سطح خارجی هر دو روده کور صاف و یک دست مشاهده شد. بین ایلنوم و دو روده کور لیگامنٹ ایلنومی سکومی (Ilocecal Ligament) قرار داشت. در سطح داخلی مجرای (لومن) روده کور نیز چین حلقوی یا طولی به صورت ماکروسکوپی دیده شد. مجرای داخلی دو روده کور راست و چپ با دو سوراخ مجزا از دو سمت جانبه چپ و راست به داخل راست روده باز می شد. یخش پایه روده کور لوله ای شکل، ضخیم با جداری مشخص و به رنگ کرم تا صورتی روشن مشاهده گردید. یخش میانی با جداری نازک و به رنگ خاکستری تا سیز دیده شد و قسمت رأس نیز دارای جدار ضخیم تر و روشن تر از پایه و به رنگ کرم متمایل به سیز مشاهده گردید. بطور کلی پایه و رأس روده کور دیواره ای ضخیم تر و روشن تر از پایه داشت. ظاهر پایه روده کور شبیه به انتهای ایلنوم و عرض آن کمتر از انتهای ایلنوم و ابتدای کولون دیده شد. بیشترین عرض در یخش پایه روده کور مشاهده گردید (شکل های ۱ و ۲).

راست روده: راست روده در مرغان مروارید به شکل لوله ای مستقیم، صاف و یک دست و به رنگ کرم متمایل به صورتی بین انتهای ایلنوم و کوپرودئوم کلواک قرار داشت که در خط میانی در حقره عمومی روده ای (The Intestinal celomic cavity) مشاهده شد. پر ز ایلنومی (Ileal papilla) که انتهای پرجسته ایلنوم به داخل ابتدای راست روده می باشد قابل تشخیص نبود. به جز بند راست روده (Mesorectum) که سطح پشتی راست روده را به سقف حقره عمومی روده ای متصل می کرد، هیچ اتصال مژانتری دیگری بین راست روده و دیگر اندامها وجود نداشت. در سطح خارجی، راست روده صاف و یک دست مشاهده شد. سطح داخلی لومن نیز قادر هر گونه چین مکروسکوپی بود (شکل های ۱ و ۲).

نتایج اندازه گیری و آزمون آماری

نتایج محاسبات نشان داد میانگین طول و عرض روده کور و راست

می شود که پرندگان بدليل تنوع گونه ای دارای تقاضه های آناتومیکی و بافت شناسی در اندام های بدن مانند روده بزرگ می باشند. بنابراین مرغ مروارید که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته بود، انتخاب شد و آناتومی و بافت شناسی روده بزرگ آن در هر دو جنس مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها

جمع آوری نمونه

برای لین مطالعه ۲۰ قطعه مرغ مروارید بالغ نر و ماده (۱۰ نر و ۱۰ ماده) از چهار پرنده فروشی مختلف شهرستان قم از هر دو جنس نر و ماده به تعداد یکسان و یا میانگین سنی ۲۳ تا ۲۵ هفته خریداری شد. سپس مرغان مروارید به یخش نگهداری پرندگان دانشکده دامپژوهشی انتقال داده شدند.

کالبدگشایی

پرندگان برای کالبدگشایی و انجام مطالعات آناتومیکی به سالن تشریح منتقل شدند. ابتدا تمامی پرنده ها تک تک به روشن شرعی ذبح شده و از سطح پشتی روی سینی کالبد شناسی خوابانده شدند. پس از کنار زدن پوست از روی حقره بطنی، عضلات شکمی از جوانب پریده شد تا تمام اعضاء حقره بطنی نمایان گردد.

مطالعه آناتومیکی

پس از انجام کالبدگشایی بررسی اولیه از نظر اندازه، مجاورات، رنگ و شکل روده بزرگ در محل اصلی آن ها در حقره بطنی صورت گرفت و تصاویر لازم گرفته شد. در مرحله بعد روده های بزرگ همراه با روده کوچک و کلواک از محل اتصال خود جدا و از محوطه بطنی پرنده خارج گردید. بعد از گسترش در سینی بدليل تقاضه در اندازه و ضخامت یخش های مختلف اندام ها، اندازه گیری طول و عرض در دو جنس از قسمت های قدام، میان و خلف این اعضا یوسپیله کویلیس صورت گرفت و اندازه توانی مختلف هر عضو در جدول مربوطه یادداشت گردید. برای دقت عمل بیشتر، اندازه گیری هر یخش سه مرتبه تکرار گردید. هنگام تصویربرداری میله هایی با اندازه مشخص در کنار اندام ها قرار داده شد تا اندازه های گرفته شده در تصویر تمایان شود و سپس تصاویر لازم از آنها گرفته شد. درنهایت نمونه ها برای نگهداری طولانی مدت به داخل فرمالین ۱۰ درصد انتقال یافتند.

مطالعه بافت شناسی

برای مطالعه بافتی ۳ پرنده نر و ۳ پرنده ماده به طور تصادفی انتخاب شد و هم زمان با مطالعه آناتومی، نمونه های بافتی با اندازه 1×1 سانتیمتر از یخش های پایه (Base)، پدته (Body) و رأس (Apex) هر دو روده کور راست و چپ و همچنین از یخش های ابتدایی، میانی و انتهایی راست روده اخذ گردید و در محلول یاقوتی قرار داده شد. پس از انجام مراحل پاساژ یاقوتی قالب گیری یوسپیه پارافین انجام شد و سپس برش هایی به ضخامت ۷-۶ میکرومتر از آن ها تهیه و متعاقب رنگ آمیزی هماتوکسیلین و اتوزین توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل آماری

میانگین طول و عرض قسمت های مختلف روده بزرگ به تفکیک دو



شکل ۱- محوطه بطنی مرغ مروارید بالغ ماده. a. روده کور راست، b. روده کور چپ، c. راست روده، d. کلوآک، e. بیضه چپ، f. ایلئوم، g. تهی روده، اندازه میله ۳ cm.



شکل ۲- روده های مرغ مروارید نر بالغ. a. روده کور راست، b. روده کور چپ، c. راست روده، d. کلوآک، e. دوازدهه، f. تهی روده، g. سنگدان، h. ایلئوم، i. پیش معده، اندازه میله ۶ cm.

در پایه روده کور اسنونگتر به شکل عضله حلقوی مشاهده شد که ساختار دریچه مانند داشت. در قسمت پدته روده کور مخاط ضخیمتر، چین‌های طولی طوپیتر و تعداد سلول‌های جامی نیز بیشتر از قسمت پایه‌ای مشاهده شد. ارتفاع چین‌های طولی مجدداً در قسمت راسی کاهش می‌یافتد و تشکیلات لنفاوی نیز کمتر رویت گردید. طبقه عضلانی در قسمت راسی ضخیمتر از قسمت پدته و پایه قرار داشت و در مجموع طبقه عضلانی دارای ضخامت زیادی نیود (شکل‌های ۴، ۳ و ۵).

راست روده: دیواره راست روده مرغان مروارید همانند سایر بخش‌های روده و لوله گوارش در چهار لایه قرار داشت. جدار در پیش ابتدایی راست روده ضخیمتر از روده کور مشاهده شد. ارتفاع چین‌های طولی در پیش میانی راست روده مشابه بخش ابتدایی بوده ولی کرک‌ها کاهش یافته بود و در قسمت انتهایی راست روده نیز چین‌های طولی حضور نداشتند و کرک‌ها کوتاه‌تر و پهن مشاهده شد. غدد لیپر کون در قسمت ابتدایی بیشتر بوده و به تدریج تا انتهای کاهش یافته بود. سلول‌های لنفوسيتی پارین در قسمت انتهایی افزایش داشته و عضله مخاطی در قسمت ابتدایی دیده شده و در قسمت میانی پوشش مشهود بود و در انتهای به سختی قابل رویت بود. در زیر مخاط غددی مشاهده نشد و طبقه عضلانی نیز در تمام نواحی در دولایه دیده شد و در قسمت انتهایی ضخامت آن بیشتر بود (شکل‌های ۶ و ۷).

بحث

در مطالعه حاضر روده بزرگ در مرغان مروارید در مطالعه آناتومیکی و یافته در اساس مشاهده با ماکیان می‌باشد. کینگ و مک لاند در سال ۱۹۸۴، نیکل و سامر در سال ۱۹۷۷، سیزون و گراسمن در سال ۱۹۷۵ و دایس و همکاران در سال ۲۰۱۰ اعلام داشتند روده کور در ماکیان به شکل دو لوله تهیسته انگشتی شکل راست

روده در جنس ماده بزرگ‌تر از جنس تر بوده ولی نتایج آزمون آماری student نشان داد که این اختلاف معنی‌دار نمی‌باشد. میانگین و انحراف معیار طول و عرض اندام‌های مورد مطالعه در هر دو جنس در جدول ۱ نشان داده شده است.


بافت شناسی

در بررسی یافته روده بزرگ مرغ مروارید در هر دو جنس مشاهده و در اساس مشاهده با ماکیان بود.


روده کور: دیواره روده کور مرغان مروارید از چهار لایه مخاط، زیرمخاط، عضلانی و سروزی تشکیل می‌شود. مخاط دارای سه بخش اپیتلیوم، پارین و ماهیچه مخاطی بود. در سطح داخلی مجرأ تعداد محدودی پرجستگی‌هایی به شکل چین‌های طولی قابل مشاهده بود و چین‌های حلقوی مشاهده شد. کرک‌ها (Villi) بر روی چین‌ها و بقیه مخاط حضور نداشتند. اپیتلیوم مخاط به شکل استوانه‌ای ساده به همراه سلول‌های جامی و فاقد سلول‌های پانت یوتدند. پارین (Lamina propria) را بافت همیندی سست همراه با اعروق خونی و بافت لنفاوی منتشر در حضور ندول‌های لنفاوی فراوان تشکیل می‌داد. غدد روده‌ای لیپر کون طویل و مستقیم در پارین قابل یودند. ماهیچه مخاطی پارین را از زیرمخاط به شکل یک لایه ظرفی و تازک از عضله صاف جدا می‌کرد. زیرمخاط شامل بافت همیند با مویرگ‌های خونی و لنفی و لنفوسيت منتشر و شبکه عصبی رویت گردید. در برخی نواحی زیرمخاط حاوی توده‌های یافته لنفاوی ندول مشاهده شد ولی هیچ ساختار غددی به شکل غدد یروتر مشاهده نشد. طبقه عضلانی از دو لایه عضله صاف به صورت یک لایه حلقوی داخلی ضخیمتر و یک لایه طولی خارجی پاریک و ظرفی تشکیل می‌شود. لایه سروزی از بافت همیند نسبتاً متراکم تشکیل شده بود که لایه طولی طبیعته عضلانی روده‌های کور را از خارج می‌پوشاند. تشکیلات لنفاوی در محل اتصال روده کور به راست روده په ندول‌های معدودی (لوژه سکومی) قابل مشاهده بودند.

جدول ۱- میانگین و انحراف معیار طول و عرض روده بزرگ بر حسب میلی متر (Mean ± SD).


جنسیت		میانگین ابعاد
ماده	نر	
میانگین	میانگین	
۷۶/۲±۰/۰۴	۷۴/۱±۰/۲۶	طول سکوم راست
۵/۶۵±۱/۸۴	۵/۴۶±۱/۲۴	عرض سکوم راست
۷۵/۱±۰/۶۱	۷۲/۹±۰/۲۷	طول سکوم چپ
۶۱/۹±۱/۸۲	۵/۶۲±۱/۳	عرض سکوم چپ
۸۲/۲±۰/۹۴	۸۱/۱±۰/۶۵	طول راست روده
۵/۶۹±۰/۱۶	۵/۲۵±۰/۲۹	عرض راست روده




شکل ۳- نمای بافت: قسمت پایه روده-کور راست مرغ مروارید ماده بالغ. a. غدد لیبرکوهن، b. بافت بوششی، c. پارین، d. عضله مخاطی، e. زیر مخاطی، f. لایه حلقوی طبقه عضلانی، g. لایه طولی طبقه عضلانی، h. لایه سروزی. رنگ آمیزی همانوکسیلین - انزین $\times 110$.




شکل ۴- نمای بافت: قسمت بدن روده کور راست مرغ مروارید نر بالغ. a. غدد لیبرکوهن، b. بافت بوششی، c. پارین، d. عضله مخاطی، e. زیر مخاطی، f. لایه حلقوی طبقه عضلانی، g. جین طولی. رنگ آمیزی همانوکسیلین - انزین $\times 130$.




شکل ۵- نمای بافت: قسمت رأس روده کور چب مرغ مروارید ماده بالغ. a. غدد لیبرکوهن، b. بافت پوششی کرک، c. پارین، d. عضله مخاطی، e. زیر مخاطی، f. طبقه عضلانی، زنگ آمیزی هماتوکسیلین - اندازین $\times 130$.



شکل ۶- نمای بافت: ابتدای راست روده مرغ مروارید نر. a. غدد لیبرکوهن، b. بافت پوششی کرک، c. پارین، d. مخاطی، e. زیر مخاطی، f. طبقه عضلانی، g. لایه سروزی. زنگ آمیزی هماتوکسیلین - اندازین $\times 130$.



شکل ۷- نمای بافت: قسمت میانی راست روده مرغ مروارید ماده بالغ. a. غدد لیبرکوهن، b. بافت پوششی کرک، c. پارین، d. عضله مخاطی، e. زیر مخاطی، f. طبقه عضلانی، g. لایه سروزی. رنگ آمیزی همانوکسیلین - انوزین $\times 210$.



شکل ۸- نمای بافت: قسمت انتهای راست روده مرغ مروارید نر بالغ. a. غدد لیبرکوهن، b. بافت پوششی کرک، c. پارین، d. عضله مخاطی، e. زیر مخاطی، f. طبقه عضلانی، g. لایه سروزی. رنگ آمیزی همانوکسیلین - انوزین $\times 140$.

در سال ۱۹۷۸ و مهدی مک لاند در سال ۱۹۹۸ اعلام داشتند راست روده ماکیان لوله‌ای مسقیم است که از انتهای ایلنوم به کوپرودئوم متصل می‌باشد و کوتاه‌ترین پخش روده‌های بزرگ و کوچک است. پرز ایلنومی (papilla) به شکل یک حلقه از چنین عضله حلقوی در پایه هر سکوم ماکیان، اردک و مرغابی تشکیل اسننگتر می‌دهد که پوضوچ قابل رویت می‌باشد (۱۶). در مطالعه حاضر راست روده تمامًا مشابه ماکیان می‌باشد با این تفاوت که در مرغ مروارید پرز ایلنومی در مرغ مروارید زیاد مشخص نیست و از این منظر با ماکیان، اردک و مرغابی متفاوت می‌باشد.

کینگ و مک لاند در سال ۱۹۸۴، نیکل و سامر در سال ۱۹۷۷، سیزون و گراسمن در سال ۱۹۷۵ و دایس و همکاران در سال ۲۰۱۰ گزارش کردند سطح خارجی راست روده صاف و یکدست مشاهده می‌شود. سطح داخلی لumen فاقد هر گونه چین ماکروسکوپی است. بند راست روده متصصل می‌کند. قلاور در سال ۱۹۹۱، هرد در سال ۱۹۸۵ و پوتور و همکاران در سال ۲۰۰۶ به ترتیب بیان داشتند در شترمرغ و سایر سینه‌پهنان مانند امو، کاسوواری، رثا و مرغ کیوی سطح خارجی کولون حالت تاصاف و کویسدار (Saccular) می‌باشد و در شترمرغ بدلیل طول زیاد کولون تامیده می‌شود (۲۸). میشل در سال ۱۹۹۶ و گراجال و همکاران در سال ۱۹۸۹ در تحقیقات مشابه دیگری بیان داشتند که هوتزین دارای راست روده بزرگ با حلقه‌های شبیه به شترمرغ ساتان می‌باشد (۲۱). ماتکس در سال ۱۹۷۱ گزارش کرد راست روده در غاز برخلاف ماکیان بزرگ و پیچ خورده است (۱۸). در تحقیق حاضر راست روده مرغ مروارید همانند ماکیان دارای سطح صاف و یکدست بوده و فاقد کیسه و پیچ خورده‌گی می‌باشد و از این منظر با هوتزین، غاز و شترمرغ ساتان متفاوت است.

در مطالعات یافته شناسی به عمل آمده توسط پراون و دوک در سال ۱۹۸۹، کلارک در سال ۱۹۷۸، کلنج و ماتیاس در سال ۱۹۹۵، پوستی در سال ۱۳۸۵ و رضاییان در سال ۱۳۸۵ بیان شده است که در ماکیان یافته لنقاوی پارین و زیرمخاط در پایه هر روده کور بخوبی رشد کرده و قابل تمایز است و لوزه سکومی (Cecal tonsil) را تشکیل می‌دهد (۲۷، ۳۱)، پوتور و همکاران در سال ۲۰۰۶ همچنین عنوان کردند در مرغ کیوی لوزه سکومی وجود تدارد ولی در پرخی نواحی توده‌ی کوچکی از یافته لنقاوی حضور دارد (۲۸). وانگ در سال ۲۰۰۶ نشان داد که پارین پخش رأسی سکوم شترمرغ بالغ، قولیکول‌های لنقاوی فراوانی دارد (۳۲). تحقیق حاضر با مطالعات گذشته متطابق می‌باشد و تنها تفاوت پارز این است که در مرغ مروارید لوزه سکومی به شکل تدول‌های لنقوسیتی فقط در یک سمت دیواره قرار داشت.

پراون و دوک، کلارک، کلنج و ماتیاس، پوستی و رضاییان همچنین عنوان کردند در ماکیان اهلی هر کدام از روده‌های باز می‌شود یک اسننگتر دارند که از پیشیم‌شده‌گی عضلات حلقوی حاصل گردیده است (۳۱). پوتور و همکاران همچنین عنوان کردند که در مرغ کیوی عضله مخاطی و چین‌های متعددی در روده کور به شکل واضح و پیشیم دیده می‌شود. لنقوسیت‌ها در پارین و زیرمخاط بین کریبت‌های لیبر کوهن پراکنده بوده و (۲۸). هرد در یافته شناسی روده امو نشان داد طبقه عضلانی، عضله مخاطی و زیرمخاط به شکل لایه یاریک وجود دارند (۱۱).

و چپ از راست روده در محل اتصال با ایلنوم منشاء می‌گیرند (۲۹، ۲۴، ۱۳، ۷). میشل در سال ۱۹۰۱ گزارش کرد در شترمرغ همانند ماکیان روده کور بصورت زوج وجود دارد (۲۲). در تحقیقات مشابه دیگر میشل در سال ۱۸۹۶، مارشال در سال ۱۹۰۱ و تیاک و دومینیک در سال ۱۹۶۲ گزارش کردند در طوطی، دارکوب، چغد، پرندگان زیبور خوار، پرندگان پادخور کور وجود ندارد (۲۱، ۱۷ و ۲۳). همچنین میشل اعلام کرد که در پرندگان شکاری مانند عقاب، شاهین و کرکس، روده کور وجود نداشته و یا بصورت تحلیل رفته وجود دارد (۲۲). گودی و ران در سال ۱۹۹۱ نیز بیان کردند در اردک ماهیخوار و اردک *Melanitta* روده کور وجود نداشته و در صورت وجود بصورت جزئی و کوتاه می‌باشد. اسکوتور (Mergus) و مرگوس (Mergus) نیز از خانواده اردک و غاز فاقد روده کور است (۹). کوردا در سال ۱۹۸۶ همچنین گزارش کرد روده کور در کبوتر دریایی بصورت کوچک است و گاهی وجود ندارد (۱۴). ماتیاس و کلنج در سال ۱۹۹۵ بیان کردند در پرندگان حواسیل تنها یک روده کور وجود دارد (۳). نتایج تحقیق حاضر با ماکیان و شترمرغ متطابق بوده و روده کور بصورت زوج در اطراف ایلنوم قرار داشته و ساختار کاملتری را نشان می‌دهد. بنایر این از این منظر با طوطی، دارکوب، چغد، پرندگان زیبور خوار، پرندگان پادخورک، عقاب، شاهین، کرکس، اردک ماهیخوار، اسکوتور، مرگوس، کبوتر دریایی و پرندگان حواسیل متفاوت می‌باشد.

کینگ و مک لاند در سال ۱۹۸۴، نیکل و سامر در سال ۱۹۷۷، سیزون و گراسمن در سال ۱۹۷۵ و دایس و همکاران در سال ۲۰۱۰ اعلام داشتند روده کور رادر ماکیان به شکل دو لوله واحد با سطحی صاف و بدون انشعاب و کیسه گزارش کردند. مک لاند در سال ۱۹۸۹ و گزارش کرد روده کور در شترمرغ، مرغ کیوی و قرقاوی هندی (Trugopan) حالت کیسهدار می‌باشد. در قرقاوی تاج زیبا (satyra elegant crested) نیز دارای چندین ساختار کیسه‌ای شکل یوده که سبب شده این ساختار به شکل دو خوشانگور مشاهده شود. مرغ غواص نیز سکوم (Tinamou) نیز دارای شکلی با ساختارهای شکلی یا ساختارهای کیسه‌مانند تانظم داخلی دارد (۲۰ و ۲۱). در مطالعه حاضر روده کور علیرغم اینکه از خانواده قرقاویان می‌باشد به شکل لوله واحد و سطح صاف و بدون انشعاب و کیسه مشاهده شد و با قرقاوی هندی، قرقاوی تاج زیبا، شترمرغ و مرغ کیوی متفاوت بوده و به ماکیان شباهت دارد.

کینگ و مک لاند در سال ۱۹۸۴، نیکل و سامر در سال ۱۹۷۷، سیزون و گراسمن در سال ۱۹۷۵ و دایس و همکاران در سال ۲۰۱۰ اعلام داشتند همچنین اعلام کردند در ماکیان هر روده کور با یک ورودی مجزا از سمت جانبی (Lateral) یا تحاتی جانبی (ventrolateral) به داخل راست روده راه می‌یابد. مهدی و مک لاند در سال ۱۹۸۸ گزارش کردند در اردک هر روده کور با یک ورودی مجزا از سمت جانبی به داخل راست روده راه دارد (۲۶). میشل در سال ۱۹۰۱ اعلام کرد روده کور سمت چپ و راست شترمرغ یا یک سوراخ مشترک در سمت پشتی کولون بایز می‌شود (۲۲). در مطالعه حاضر مجرای ورودی روده کور به راست روده همانند ماکیان و اردک از طریق دو سوراخ مجزا و از سمت جانبی می‌باشد و با شترمرغ متفاوت می‌باشد.

کینگ و مک لاند در سال ۱۹۸۴ و سامر در سال ۱۹۷۷، سیزون و گراسمن در سال ۱۹۷۵ و دایس و همکاران در سال ۲۰۱۰، کلارک

منابع مورد استفاده

- Braun, E. J., Duke, G. E. 1989. Function of the avian cecum. *The Journal of experimental zoology*, 3:1-129.
- Clarke, I.L. 1978. The structure of the ileo-caeco-colic junction of the domestic fowl (*Callus gallus* L.). *British Poultry Science*. 19:595-600.
- Clench, M. H., Mathias, J. R. 1995. The Avian Cecum. *Wilson Bull*, 107(1): 93-121.
- Cooper, R. G., Mahroze, K.m. 2004. Anatomy and physiology of the gastro-intestinal tract and growth curves of the ostrich. *Journal of Animal Science*, 75: 491-498.
- Duke, G.E. 1986. Alimentary canal: anatomy, regulation of feeding, and motility. *Avian physiology*, Fourth Edition. Springer-Verlage, 269-288.
- Duke, G.E. 1986. Alimentary canal: secretion and digestion. *Avian physiology*, Fourth Edition. Springer-Verlag, 289-302.
- Dyce, K.M., Sack, W.O., Wensing, C.J.G. 2010. *Text book of Veterinary Anatomy*. Fourth Edition, Saunders Company, Philadelphia, 797-798.
- Fowler, M.E. 1991. Comparative clinical anatomy of ratites. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*, 22: 204-227.
- Goudie, R. I., Ryan, P.C. 1991. Diets and morphology of digestive organs of five species of sea ducks wintering in Newfoundland. *Journal of the Yamashina Institute for Ornithology*, 22:1-8.
- Grajal, A., Strahl, S. D., Parra, R., Dominguez, M. G. 1989. Foregut fermentation in the Hoatzin, a Neotropical leaf-eating bird. *Science*, 245: 1236-1238.
- Herd, R. M. 1985. Anatomy and histology of the gut of the Emu *Dromaius novaehollandiae*. Agricultural Research Centre, New South Wale. 85:43-46.
- Jiaxiang, W., Kemei, P., Anna, D., Li, T., Hui, S. 2007. Histological structure of the digestive tract in African Ostrich Chicks. *Chinese Journal of Zoology*, 42: 131-135.
- King, A.S., Mclelland, J. 1996. Birds their structure and function. First edition. Academic press, London New York, 6,7,137,138,159,176,221,222.
- Kuroda, N. 1986. On the intestinal twistings in gadfly-petrels and comparative notes on the digestive tract in Procellariiformes. *Japanese Journal of Ornithology*, 35: 11-14.
- Liman, N., Aslan, s., Gulmaz, N. 2002. The histological observations on the large intestine of the goose. *Journal of Veterinary Medical Science* , 64(8):705-709.
- Mahdi, A. H., Mclelland, J. 1988. The arrangement of muscle at the ileo-caeco-rectal junction of the domestic duck (*Anas platyrhynchos*) and the presence of anatomical sphincters. *Journal of*

لیمان و همکاران در سال ۲۰۰۲ در مطالعه روی غاز تشنان دادند عضله مخاطی را با مسیر حلقوی در زیر پارین راستروده و روده کور مشخص کردند و نشان دادند طبقه عضلاتی همانند ماکیان در غاز نیز وجود دارد (۱۵). در مطالعه حاضر مرغ مروارید مشخصات یافته‌ی پرندگان فوق را داشته ولی تفاوت قابل ذکر در این است که ضخیم شدگی عضلاتی به ماکیان و مرغ کیوی و غاز مشاهده نشد و از این منظر با پرنده امو مشابه بیشتری دارد.

چیاکسیانگ و همکاران در سال ۲۰۰۷ عنوان کردند مخاط راستروده شترمرغ همانند ماکیان بصورت چین دار همراه کرک‌های پهن، کوتاه همراه با یافته پوششی حاوی سلول‌های استوانه‌ای و جامی پوشانده می‌شود (۱۲). هر ده همچنین نشان داد در پرنده امو نشان داد وجود هر دو سکوم با چین‌های مخاطی و کرک‌ها باعث افزایش سطح می‌شود. یافته پوششی از سلول‌های استوانه‌ای ساده و جامی تشکیل می‌شود. کریپت‌های لیپرکوهن در پارین قرار دارند و کرک‌ها در پایه روده کور توسعه یافته‌اند و عدد لیپرکوهن کم‌عمق‌اند. این کرک‌ها و عدد لیپرکوهن در رأس سکوم کاهش محسوسی می‌یابند. لیمان و همکاران عنوان کردند که سلول‌های جامی و کریپت‌ها در روده کور و راستروده غاز حضور دارند (۱۵). یافته‌های تحقیق حاضر با پژوهش‌های فوق منطبق می‌باشد و تفاوت یافته مشخصی از این منظر در مرغ مروارید مشاهده نشد.

کوپر و مهروز در سال ۲۰۰۴، هر ده در سال ۱۹۸۵ و پوتو و همکاران در سال ۲۰۰۶ عنوان کردند که در مخاط روده کور شترمرغ، امو و مرغ کیوی چین‌های پیچ خورده به داخل لونم ایجاد می‌شود. عدد مخاطی نیز همانند ماکیان در پارین روده کور پرندگان خاتواده سینه‌پهنان (شترمرغ بالغ، امو و مرغ کیوی) به خوبی رشد کرده است (۱۱، ۲۸). در مرغ مروارید چین‌ها طولی هستند و با پرندگان سینه‌پهنان (شترمرغ بالغ) در پارین در مرغ مروارید نیز همانند سایر ماکیان و شترمرغ به خوبی قابل مشاهده بود.

نتیجه گیری

روده بزرگ مرغان مروارید از نظر آناتومیکی و یافته شناسی تاحدود زیادی مشابه ماکیان می‌باشد. تفاوت معنی‌داری بین اندازه این اعضاء در دو جنس وجود ندارد. ویژگی قابل ذکر آناتومیکی این است که پر زاینومی در مرغ مروارید پرخلاف ماکیان تواضع است و همچنین پرخلاف سایر پرندگان قرقاول روده کور در مرغ مروارید ساختار لوله‌ای داشته و کیسه‌ای شکل نمی‌باشد. در مطالعه یافته نیز در مرغ مروارید لوزه سکومی به شکل ندول‌های لنقوسیتی معده‌دی فقط در یک سمت دیواره قرار داشت و ضخیم شدگی عضلاتی به مانند ماکیان مشاهده نشد. تلایع حاصل از این تحقیق به عنوان اطلاعات پایه ای قابل ارجام می‌باشد.

تسکر و قدردانی

نویسندهای این مقاله از کارکنان سالن تشریح، آزمایشگاه یافته شناسی و بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمیار پرای مساعدت در انجام این تحقیق کمال تسکر و قدردانی را می‌تمایند.

- Anatomy, 161:133-142.

17- Marshall, M. E. 1906. Studies on avian anatomy. II. Geococcyx, Bubo, and Aeronautae. *Texas Academy of Science*, 9:19-41.

18- Mattocks, J. G. 1971. Goose feeding and cellulose digestion. *Wild fowl*, 22:107-113.

19- Mclelland, J. 1989. Anatomy of the avian cecum. *Journal of Experimental Zoology*, 3:2-19.

20- Mclelland, J. 1991. A color atlas of avian anatomy. W.B. Saunders, Philadelphia, Pennsylvania.

21- Mitchell, F. C. 1896. A contribution to the anatomy of the Hoatzin (*Opisthocomus cristatus*) Proceedings of the Zoological Society, London 1896:618-628.

22- Mitchell, F. C. 1901. On the intestinal tract of birds; with remarks on the valuation and nomenclature of zoological characters. *Transactions of the Linnean Society of London*, 8:173-275.

23- Naik, D. R. Dominic, C. J. 1962. A study of the intestinal caeca of some Indian birds in relation to food habits. *The Science of Nature*, 49(12): 287.

24- Nickel, R., Schummer, A. 1977. Anatomy of the domestic birds. Verla Paul Parey. Berlin: 85- 94.

25- Pourhaji Moutab, J., Abbaszadeh, P., Touni, S. R. 2015. Morphological and histological study of the liver, spleen and pancreas in Guinea fowl. *Veterinary Journal*, 106: 76-83.

26- Pourhaji Moutab, J., Sargazi, P., Touni, S. R., Hoseini, S.H. 2014. Histomorphological study on small intestine in Guinea fowl. *Journal of Veterinary research*, 64(4):395-399.

27- Pousty, I., Adib moradi, M., Fazili, A. 2008. Comparative Histology. (7th ed.) Tehran University Publication. Tehran. Iran, 314-429.

28- Potter, M. A., Lente, R. G., Minson, C. J., Birtles, M. J. 2006. Gastrointestinal tract of the brown kiwi. *Journal of Zoology*, 270:429-436.

29- Sisson and Grossman's. Getty, R. 1975. The Anatomy of the Domestic Animals. Volume 2. Fifth Edition, Saunders company. Philadelphia, 1874-1875.

30- Shamsaei, A. 1992. Guinea fowls, Research Institute for Animal husbandry Publications. (1th ed), 1-40.

31- Rezaian, M. 2006. Avian histology, (1th ed). Tehran University Publications, 20-25.

32- Wang, H., Yang, Y., Ni, P., Sun, Z., Yu, G., Kang, J., Liang, H., 2009. Anatomic and histological observation of blind-ending caecum of African ostrich. *Chinese Veterinary Science*, 39: 257-260.

