



مقاله پژوهشی

اثر هشت هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون بر آسپاراتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز موش‌های صحرایی

سید علی حسینی^{۱*}، عبد الصالح زر^۲، سید علی حسینی^۱، قباد حسن پور^۱، مریم خیرده^۳، مهدی نورا^۴

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

۲- گروه علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

۳- گروه علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

۴- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱۲/۰۷

چکیده

زمینه و هدف: سوءصرف مواد مخدر منجر به بروز اختلالات کبدی می‌شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر ۸ هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون بر آنژیم‌های کبدی موش‌های صحرایی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، ۴۸ سر موش صحرایی نژاد اسپراگو-دوالی انتخاب و یک هفتۀ پس از طی دوره سازش‌بذری به طور تصادفی در چهار گروه مساوی ۱۲ سری: (۱) شنای اجباری، (۲) مصرف متادون، (۳) شنای اجباری همراه با مصرف متادون و (۴) کنترل تقسیم شدند. گروه‌های ۲ و ۳ به مدت ۸ هفتۀ روزانه ۲ mg/kg متادون مصرف کردند. همچنین گروه‌های ۱ و ۳ به مدت ۸ هفتۀ ۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۳۰ دقیقه تمرینات شنای اجباری را انجام دادند. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون تعییی توکی استفاده شد ($P \leq 0.05$).

نتایج: نتایج نشان داد تمرین شنای اجباری، مصرف متادون و تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون اثر معنی‌داری بر آنژیم‌های AST ($P=0.90$) و ALT ($P=0.99$) ندارد؛ تمرین شنای اجباری اثر معنی‌داری بر افزایش ALP دارد ($P=0.001$). همچنین تمرین شنای اجباری نسبت به مصرف متادون و ترکیب تمرین شنای اجباری با مصرف متادون اثر بیشتری بر افزایش ALP دارد ($P=0.001$).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می‌رسد ۸ هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون اثر معنی‌داری بر آنژیم‌های کبدی ندارد.

کلمات کلیدی: تمرین شنای اجباری، آسپاراتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، متادون

مقدمه

آن بر روی سلامت حدود ۷۰/۰ درصد تخمین زده است (۳، ۴). متادون یک اوپیوئید ساختگی است، که در تسکین دردهای حاد و مزمن استفاده می‌شود (۵). متادون در فهرست داروهای ژنریک ایران به شکل متادون هیدروکلراید با فرمول شیمیایی $C_{12}H_{27}NO, HC1$ از مشتقات ساختگی مشابه تریاک با نام شیمیایی-۶-دی‌متیل آمینو-۴ و ۴-دی‌فنیل-۳-هپتون هیدروکلراید و وزن مولکولی ۳۴۵/۹۱ گرم بر مول است (۶). با توجه به دو ویژگی آن یعنی نیمه‌عمر طولانی و جذب خوراکی بالا، متادون به عنوان یک درمان جایگزین، جلوگیری و یا کاهش علائم ترک در درمان سوءصرف مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرد (۷). مصرف متادون می‌تواند منجر به بروز اختلالات گوارشی فراوانی گردد (۸) همچنین مصرف متادون دارای وابستگی

اعتياد یا وابستگی به مواد یکی از بزرگ‌ترین معضلات بهداشتی درمانی در دنیا کنونی است که موجب تهدید جدی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گردیده است. اثرات مستقیم اعتیاد بر فرد معتاد، جسم و روان فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد (۱)، لذا اعتیاد موجب نگرانی‌های سیاست‌گذاران شده و به یک مسئله مهم بهداشت عمومی تبدیل گردیده که نیازمند مداخلات و برنامه‌های مقتضی است (۲). روند وابستگی به مواد مخدر در کشورهایی مانند چین، هند، اندونزی، روسیه، مالزی، پاکستان، ایران (۳) و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر دنیا در حال افزایش است به طوری که در چند سال گذشته با رجهانی

*نویسنده مسئول: سید علی حسینی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران alihoseini_57@miau.ac.ir



(۱۳۹۴) نشان دادند ۸ هفته، ۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۹۰ دقیقه تمرینات هوایی آنژیم‌های کبدی را کاهش داد (۱۸). با این وجود، مطالعات صورت گرفته در افراد معتاد نشان‌دهنده عدم اثرگذاری تمرینات ورزشی بر آنژیم‌های مذکور است. برای مثال اسد و همکاران (۲۰۱۳) در مطالعه‌ای تحت عنوان «تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر آنژیم‌های کبدی معتادین زن در حال ترک با متادون» نشان دادند تمرین استقامتی اثر معنی‌داری بر سطوح AST و ALT زنان ندارد (۱۹)، همچنین حدادی و همکاران (۲۰۱۵) گزارش نمودند تمرینات استقامتی اثر معنی‌داری بر ALP زنان مصرف‌کننده متادون ندارد (۲۰). با توجه به اینکه متادون داروی اپیوئیدی است که به شکل خوارکی فعال بوده، دوام اثر طولانی‌تر و سرخوشی کمتری نسبت به مرفين دارد و برخلاف مرفين جذب خوارکی بالايی دارد؛ در جامعه کنونی افراد معتاد جهت کاهش میزان اعتیاد به مواد مخدرا بیشتر به سمت استفاده از متادون سوق داده شده‌اند و همچنین با توجه به اینکه مطالعات نشان داده است که فعالیت‌های ورزشی می‌توانند بر عملکرد کبد اثرگذار باشند و آنژیم‌های کبدی را تحت تأثیر قرار دهند و عدم وجود مطالعه‌ای که به بررسی اثرات تمرین شنا همراه با مصرف متادون بر آنژیم‌های کبدی موش‌های صحرایی پرداخته شود، هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون بر ALP و AST موش‌های صحرایی است.

مواد و روش‌ها

جامعه و نمونه آماری

در این مطالعه تجربی به دلیل سهوالت دسترسی از موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد اسپراغ—داولی که در مرکز پرورش حیوانات واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت تکثیر شده بودند، استفاده شد. حیوانات به اتفاق نگهداری حیوانات در مرکز آزمایشگاه حیوانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با دمای محیطی 22 ± 2 درجه سانتی‌گراد، نور کنترل شده (چرخه ۱۲ ساعته روشنایی و تاریکی) منتقل شده و دوره سازش‌پذیری هشت‌روزه را طی کردند. از شرایط ورود موش‌های صحرایی به مطالعه می‌توان به داشتن حداقل سن هشت‌هفته‌ای، نر بودن، عدم داشتن بیماری‌های پوستی و سالم بودن موش‌های صحرایی اشاره نمود؛ در حقیقت معیارهای خروج از مطالعه سن و وزن پایین

فیزیکی است به طوری که فرد پس از گذشت مدت‌زمانی از مصرف متادون، به مصرف آن وابستگی پیدا می‌کند به طوری که پس از مدتی به این ماده معتاد می‌شود (۹). متادون یکی از اوبیوئید-هایی است که می‌تواند بر عملکرد طبیعی آنژیم‌های کبدی حیوانات و انسان‌ها اثرگذار باشد (۱۰). گزارش شده است آنژیم‌های آسپارتات‌آمینوترانسفراز (AST)، آلانین‌آمینوترانسفراز (ALT) و آلkalین فسفاتاز (ALP) بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت کبد می‌باشند (۱۲). کبد بزرگ‌ترین غده بدن است و آن را می‌توان به کارخانه‌ای شیمیابی تشبیه کرد که وظیفه تولید، تغییر، انبار کردن و دفع مواد را بر عهده دارد. همچنین کبد یکی از مهم‌ترین اعضای بدن است که سمزدایی از داروها، دفع محصولات ناشی از تخرب و نوسازی گلبول‌های قرمز خون به صورت صفراء، تولید عوامل انعقاد خون، ذخیره خون به صورت گلیکوژن و نیز تنظیم سوخت‌وساز گلوكز و چربی از مهم‌ترین نقش‌های آن در بدن است (۱۳). افزایش سطح ALT در خون به طور اختصاصی نشان‌دهنده آسیب بافت اصلی کبد است، در حالی که AST نه تنها در آسیب‌های پارانشیم کبدی، بلکه در صدمات قلبی و عضله‌ای نیز افزایش می‌یابد (۱۳). کریک (۱۹۷۳) نشان داد یکی از عوارض مصرف متادون غیر نرمال بودن عملکرد کبد است (۱۱)، همچنین در پژوهش دیگری که با عنوان تأثیر متادون بر آنژیم‌های کبدی در بیماران تحت درمان با متادون انجام پذیرفت نتایج حاکی از اثر معنی‌دار متادون بر ALP است که نشانه احتمالی الگوی آسیب کلستاتیک (انسدادی) متادون بر کبد بوده است (۱۰). همچنین مطالعات نشان داده‌اند فعالیت‌های ورزشی می‌توانند اثرات مثبتی بر بهبود آنژیم‌های کبدی AST و ALP افراد سالم و یا بیمار داشته باشند (۱۶-۱۴). بیان شده است در حین فعالیت‌های ورزشی، کبد در معرض‌های محرك‌هایی مانند دمای بدن، تشکیل، توقف گردش خون و کاهش گلیکوژن قرار می‌گیرد. همچنین فعالیت‌های ورزشی حمایت کبدی در برابر تنش‌های مختلف محیطی و فیزیولوژیک مانند، سرما، گرما، هیپوکسی، ایسکمی و تخلیه انرژی را افزایش می‌دهد، از این‌رو فعالیت‌های ورزشی منظم می‌تواند سهم عمده‌ای در پیشگیری از بیماری‌ها و اختلالات کبدی داشته باشد و بسیار توصیه شده است (۱۳). گزارش شده است فعالیت ورزشی کوتاه‌مدت نشانگرهای گردش خون آنژیم‌های کبدی در افراد چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی را کاهش می‌دهد (۱۷). همچنین مطالعه نبی زاده حقیقی و شعبانی



مخلوط گردید و توسط فتوومتر در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و طول موج ۴۰۵ نانومتر (۴۰۰-۴۲۰) اندازه گیری توسط میزان جذب نوری بعد از دقایق مختلف انجام شد و بعد از یک سری محاسبات، عدد موردنظر به دست آمد.

پروتکل تمرین شنا

پروتکل تمرین شنا به این صورت بود که موش‌های صحرایی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه ۳۰ دقیقه در داخل وان ویژه موش‌های صحرایی در آب با دمای ۳۰-۲۵ درجه سانتی گراد شنا کرده و در پایان بدن تمامی موش‌های صحرایی بهو سیله سشوار ویژه خشک گردید. در هر وان فقط پنج موش صحرایی قرار داده شد. این نکته قابل ذکر است که تمرین شنای مطالعه حاضر یک تمرین شنای اجباری بود بدین معنی که موش‌های صحرایی می‌باشد جهت حفظ شناوری خود در داخل آب دست‌وپا زده تا بتوانند شناوری خود را حفظ نمایند (۲۱). ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در پایان هفته هشتم، موش‌ها جهت اندازه گیری پارامترهای موردمطالعه، قربانی شدند تا تغییرات بیوشیمیایی ناشی از تأثیر تمرینات شنا و مصرف متادون موربدبر سی قرار گیرد. لازم به یادآوری است تمام جنبه‌های اخلاقی و حقوقی این پژوهش در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بررسی و تأیید شده است.

ابزار و وسائل تحقیق

در تحقیق حاضر جهت انجام تمرینات شنا از وان شنای ویژه موش‌های صحرایی، سشوar Citronal مدل ۵۵۵۰ جهت خشک کردن موش‌های صحرایی، دستگاه سانتریفیوژ ۲۸ کاناله Routine ۲۸ مدل شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد جهت جدا کردن سرم، ترازوی دیجیتال AND مدل ۶۰۰ HL جهت اندازه گیری وزن موش‌های صحرایی، کیت‌های آزمایشگاهی پارس آزمون مدل ۲۴ i2 جهت اندازه گیری آنژیم‌های کبدی و وسائل خون گیری از قبیل سرنگ، لوله فالکون و پارافیلم استفاده شد.

روش آماری

داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS ورژن ۱۹ و آزمون‌های آماری کلوموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعییبی توکی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی‌داری برای تمام تحلیل‌های آماری $p < 0.05$ در نظر گرفته شد.

موش‌های صحرایی، وجود بیماری‌های پوستی و سرکچ بودن موش‌های صحرایی بود. دسترسی حیوانات به آب و غذا در طول دوره آزاد بود. تعداد ۴۸ سرمهش صحرایی با محدوده وزنی $191/80 \pm 22/10$ گرم وارد آزمایش شدند. شروع مداخلات تجربی شامل برنامه تمرینی و مصرف متادون پس از دوره سازش پذیری هشت روزه صورت گرفت. موش‌ها به طور تصادفی به چهار گروه مساوی ۱۲ سری شامل: (۱) تمرین شنای اجباری، (۲) مصرف متادون، (۳) ترکیب تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون و (۴) کنترل تقسیم شدند. به گروه‌های ۱ و ۳ به مدت سه روز در هفته تمرین شنای اجباری داده شد. همچنین به گروه‌های ۲ و ۳ به مدت هشت هفته روزانه دو میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن متادون به صورت صفاتی تزریق گردید. طول مدت تحقیق هشت هفته بود. بعدازاین مدت، نمونه گیری خون انجام شد تا متغیرهای موردمطالعه اندازه گیری شوند.

نمونه گیری خون

قبل از انجام خون گیری، حیوانات به مدت ۱۶ ساعت ناشتا نگهداری شدند. پس از انجام خون گیری پنج سی سی خون داخل لوله‌های فالکون (جهت اندازه گیری ALT، AST و ALP) ریخته شد. نمونه‌های خون بدون EDTA برای مدت ۴۰ دقیقه در دمای آزمایشگاه نگهداری شد و سپس به منظور تهیه سرم با دور ۳۰۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ شدند (۱۷).

اندازه گیری آنژیم‌های کبدی

آنژیم‌های کبدی با روش آنژیماتیک موردنیجش قرار گرفتند. برای سنجش آنژیم‌ها از کیت‌های آزمایشگاهی پارس آزمون مدل ۲۴ استفاده شد. جهت اندازه گیری ALT و AST از روش IFCC (فرادراسیون بین‌المللی شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی) بدون افزایش پیریدوک سال ۵-۵ فسفات استفاده شد. بدین منظور در ابتدا محلول‌های معرف ۱ و ۲ تهیه و به نسبت‌های مشخص با هم مخلوط شد و توسط فتوومتر در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و طول موج ۳۴۰ نانومتر اندازه گیری توسط میزان جذب نوری، بعد از دقایق مختلف انجام گردید و بعد از انجام یکسری محاسبات، عدد موردنظر به دست آمد. جهت اندازه گیری ALP از روش DGKC (استاندارد انجمن بیوشیمی آلمان) استفاده شد. بدین منظور ابتدا محلول‌های معرف ۱ و ۲ تهیه و برای انجام آزمایش‌ها به نسبت‌های مشخص، با هم



نتایج

واریانس یکراهه در جدول ۳ نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری $P=0.001$ (F_{۲,۴۴}) در سطوح ALP گروه‌های تحقیق وجود دارد =۰/۸۳ P=.۰۰۱). نتایج آزمون تعقیبی توکی در جدول ۴ نشان می‌دهد که هشت هفته تمرین شنا اثر معنی‌داری بر افزایش ALP موش‌های صحرایی دارد (P=.۰۰۱) با این وجود هشت هفته مصرف متادون اثر معنی‌داری دارد (P=.۰/۹۶) همچنین نتایج این جدول نشان می‌دهد که هشت هفته تمرین شنا نسبت به هشت هفته مصرف متادون و همچنین هشت هفته تمرین شنا با مصرف متادون اثر بیشتری بر افزایش ALP دارد (P=.۰۰۱).

در جدول ۱ و ۲ به ترتیب وزن موش‌های صحرایی در هفته اول و هفته هشتم و سطوح آنزیم‌های AST، ALT و موش‌های صحرایی ارائه شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه در جدول ۳ نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری در سطوح ALT (F_{۲,۴۴} =۰/۱۹ P=.۰/۹۰) و ALP (F_{۲,۴۴} =۰/۰۲ P=.۰/۰۲) گروه‌های چهارگانه تحقیق وجود ندارد ازین‌رو هشت هفته تمرین شنا، هشت هفته مصرف متادون و همچنین هشت هفته تمرین شنا همراه با مصرف متادون اثر معنی‌داری بر آنزیم‌های AST و ALT ندارد. با این وجود نتایج آزمون تحلیل

جدول ۱- توصیف وزن موش‌های صحرایی در گروه‌های تحقیق (متغیرها بر اساس انحراف استاندارد ± میانگین گزارش شده‌اند)

نام گروه	پیش آزمون (گرم)	پس آزمون (گرم)
تمرین شنا	$۲۳۱/۲۲ \pm ۰/۰/۶۴$	$۱۸۵/۷۱ \pm ۱۹/۱۵$
صرف متادون	$۲۱۸/۲۵ \pm ۳۰/۱۰$	$۱۹۵/۰۷ \pm ۲۴/۶۷$
ترکیب تمرین شنا همراه با مصرف متادون	$۲۱۰/۱۷ \pm ۰/۷/۱۹$	$۱۹۵/۳۰ \pm ۱۷/۵۸$
کنترل	$۲۱۴/۱۸ \pm ۲۸/۰/۴$	$۱۷۸/۴۲ \pm ۱۹/۶۰$

جدول ۲- سطوح آنزیم‌های AST، ALT و ALP موش‌های صحرایی در گروه‌های چهارگانه تحقیق(انحراف استاندارد ± میانگین گزارش شده است)

گروه‌ها	AST (u/l)	ALT (u/l)	ALP (u/l)
تمرین شنا	$۴۰/۲۵ \pm ۸/۰۰$	$۳۶/۰۰ \pm ۵/۱۶$	$۳۹۲/۰۸ \pm ۸۲/۷۷$
صرف متادون	$۳۹/۴۱ \pm ۸/۱۸$	$۳۵/۵۸ \pm ۷/۴۷$	$۲۱۸/۷۵ \pm ۷۰/۸۱$
ترکیب تمرین شنا همراه با مصرف متادون	$۳۹/۸۳ \pm ۷/۵۷$	$۳۵/۵۰ \pm ۶/۴۰$	$۲۶۱/۱۶ \pm ۸۰/۷۶$
کنترل	$۴۲/۵۸ \pm ۱۷/۷۸$	$۳۶/۳۳ \pm ۱۴/۸۲$	$۲۰۳/۱۶ \pm ۷۳/۵۹$

جدول ۳- نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه جهت مقایسه سطوح آنزیم‌های AST، ALT و ALP در بین گروه‌های چهارگانه

متغیر	مجموع مربعات	df	میانگین مربعات	F	سطح معنی‌داری
AST	$۷۲/۲۲$	۳	$۲۴/۰۷$	$۰/۱۹$	$۰/۹۰$
	$۵۵۵۱/۷۵$	۴۴	$۱۲۶/۱۷$		
	$۵۶۲۳/۹۷$	۴۷			مجموع
ALT	$۵/۳۹$	۳	$۱/۷۹$	$۰/۰۲$	$۰/۹۹$
	$۳۷۷۸/۵۸$	۴۴	$۸۵/۸۷$		
	$۳۷۸۳/۹۷$	۴۷			مجموع
ALP	$۲۶۴۸۳۷/۴۱$	۳	$۸۸۲۷۹/۱۳$	$۱۴/۸۳$	$۰/۰۰۱$
	$۲۶۱۸۷۲/۵۰$	۴۴	$۵۹۵۱/۶۴$		
	$۵۲۶۷۰۹/۹۱$	۴۷			مجموع



جدول ۴- نتایج آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت گروههای ALP چهارگانه تحقیق

گروه ها	تمرین شنا همراه با مصرف متادون	مصرف متادون	کنترل
تمرین شنا	M=۱۳۰/۹۱ P=.۰/۰۰۱	M=۱۷۳/۳۳ P=.۰/۰۰۱	M=۱۸۸/۹۱ P=.۰/۰۰۱
مصرف متادون	M=-۴۲/۴۱ P=.۰/۵۳		M=۱۵/۵۸ P=.۰/۹۶
تمرین شنا همراه با مصرف متادون		M=۵۸/۰۰ P=.۰/۲۶	

بحث

همکاران (۱۳۹۳) گزارش نمودند ۸ هفته، ۳ جلسه در هفتة و هر جلسه ۳۰ دقیقه دویین با شدت ۵۰ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب منجر به افزایش معنی دار ALP مردان غیرفعال گردید (۱۳). از دیگر تحقیقات که نتایج آن ها همسو با نتایج مطالعه حاضر است، می توان به تحقیق بزرگزاده زرندی و همکاران (۱۳۹۱) اشاره نمود که گزارش نمودند انجام ۶ و ۱۲ هفته تمرینات تداومی و تناوبی منجر به افزایش معنی داری آنزیم ALP مosh های سالمند می شود (۲۷)، ترتیبیان و همکاران (۱۳۸۷) گزارش کردند که ۹ هفته تمرین هوایی سبب افزایش معنی داری آنزیم ALP می شود (۲۸) همچنین لستر و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ۸ هفته ورزش منظم (هوایی - مقاومتی) با افزایش سطوح آنزیم ALP همراه است (۲۹). اثر بر آنزیم های کبدی یکی از تأثیرات مهم فعالیت بدنی است. بر اساس نتایج حاصله از تحقیقات، کبد یکی از اندام های حیاتی در گیر در فعالیت های ورزشی مختلف است که ممکن است در اثر فعالیت های ورزشی مختلف میزان آنزیم های آن در خون افزایش یابد (۳۰). در حقیقت افزایش سرمی AST و ALT نشان دهنده ورود آنزیم های کبدی و عضلانی به گردش خون است. بنابراین تغییر غلظت این آنزیم ها می تواند به علت آسیب عضلانی باشد (۳۱). همچنین مشخص شده است زمانی که آسیبی به غشاء کانالیکولهای سلول های کبدی وارد شود انتقال ALP از غشاء این کانالیکول ها به سطح سلول های کبدی و در نهایت به خون صورت می گیرد (۳۲). بشیری و همکاران (۱۳۸۹) در مطالعه خود این چنین گزارش کردند که از جمله عوامل اثرگذار بر تغییر میزان این آنزیم ها می توان به نوع، مدت و شدت فعالیت ورزشی اشاره کرد (۳۱)، به طوری که فعالیت های بلندمدت و استقامتی که تولید انرژی آن بیشتر هوایی است، بر میزان فعالیت آنزیم های ALT و AST سرمی تأثیرگذار است. این احتمال وجود دارد که این افزایش سطح سرمی، در نتیجه آسیب دیدگی و ورود این آنزیم ها از همه ارگان های ذکر شده باشد

نتایج مطالعه حاضر نشان داد هشت هفته تمرین شنا اثر معنی داری بر AST و ALT ندارد، با این وجود منجر به افزایش معنی دار ALP می‌گردد. در همین زمینه نتایج برخی مطالعات با یافته‌های تحقیق حاضر همسو نمی‌باشند، به طوری که اغلب مطالعات به این مطلب اشاره دارند که فعالیت‌های ورزشی بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش معنی دار سطوح استراحتی آنزیم‌های کبدی AST و ALP گردد. برای مثال فیلی و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیق خود دریافتند که ورزش کوتاه‌مدت نشانگرهای گردش خون آنزیم‌های کبدی در افراد چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی را کاهش می‌دهد (۱۷)، داوودی و همکاران (۱۳۹۱) در بررسی اثر هشت هفته تمرینات استقامتی بر آنزیم‌های کبدی AST و ALT مردان مبتلا به بیماری کبد چرب کاهش معنی دار AST و ALT را گزارش نمودند (۲۲)، نسی زاده حقیقی و شعبانی (۱۳۹۴) گزارش نمودند ۸ هفته، ۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۹۰ دقیقه تمرینات هوایی آنزیم‌های کبدی را به طور معنی داری کاهش می‌دهد (۱۸). همچنین مسعود سینکی و همکاران (۱۳۹۳) نشان دادند که ۶ هفته تمرین هوایی به همراه مصرف مکمل امگا ۳ اثر معنی داری بر کاهش AST دارد (۲۳). با این وجود برخی از مطالعات نیز به این نکته اشاره دارند که فعالیت‌های ورزشی می‌توانند منجر به افزایش معنی دار آنزیم‌های کبدی گردد. برای مثال نوبهار (۱۳۹۱) دریافت تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته اثر معنی داری بر افزایش AST دختران فعال دارد (۲۴)، رضایی و همکاران (۱۳۹۲) در بررسی اثر تمرینات ورزشی روی مושهای صحرایی نر نژاد اسپراغو-داولی دریافتند سه جلسه تمرین (دو بیدن روی نوار گردان) در شبیه منفی منجر به افزایش معنی داری ALT و AST می‌گردد (۲۵)، دواکی و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند ۱۵ دقیقه تمرینات شنای اجباری منجر به افزایش معنی دار ALT و AST موشهای صحرایی، می‌گردد (۲۶). همچنین نامه، نژاد و



باقی مانده و به طور آهسته در بدن انتشار می‌یابد. انتشار آهسته از کبد و سایر بافت‌ها باعث افزایش طول عمر و مدت عمل این ماده می‌گردد (۳۶). نتایج این مطالعه نشان داد هشت هفته مصرف متادون اثر معنی‌داری بر آنزیم‌های کبدی ALT، AST و ALP ندارد. در اکثر انواع بیماری‌ها، فعالیت ALT بیشتر از AST است. اگرچه فعالیت سرمی هر دو آنزیم AST و ALT هر زمان که یکپارچگی سلول‌های کبدی، تحت تأثیر بیماری‌ها قرار گیرند بالا می‌رود، ولی ALT آنزیم اختصاصی‌تری برای کبد است. افزایش فعالیت ALT برای مدت طولانی‌تری نسبت به افزایش فعالیت AST پایدار می‌ماند. ALP آنزیمی است که در برخی از اختلالات از قبیل بیماری‌های کلیه، قلب و استخوان و همچنین اختلالات کبدی ناشی از صفراء و نفوذپذیری کبد افزایش می‌یابد (۳۴). در رابطه با بررسی اثرات مصرف متادون بر آنزیم‌های AST، ALT و ALP مطالعات اندکی در دسترس است. در همین زمینه نتایج برخی مطالعات همسو و برخی ناهمسو با یافته‌های مطالعه حاضر می‌باشند. برای مثال اسلامی شهربابکی و همکاران (۲۰۱۲) در بررسی اثر مصرف متادون بر آنزیم‌های کبدی بیماران تحت درمان متادون، نشان دادند ۲۴ ماه مصرف متادون اثر معنی‌داری بر تغییرات سطوح استراحتی آنزیم‌های ALT و AST ندارد (۱۰)، تشکری و همکاران (۲۰۰۹) ۹۸ فرد معتاد ۷۱ درصد وابسته به هروئین و ۷ آزمودنی دارای HIV مثبت) را تحت درمان متادون قراردادند و در پایان مشاهده نمودند که در طول یک سال درمان با متادون نتایج بررسی عملکرد کبد در دامنه طبیعی باقی مانده است، با این وجود سطوح آنزیم‌های کبدی بیماران HIV مثبت، بعد از مصرف متادون به میزان اندکی افزایش یافته است (۳۷). همچنین کریک و همکاران در یک مطالعه سه‌ساله به بررسی اثرات مصرف متادون (صرف روزانه ۸۰ تا ۱۲۰ میلی‌گرم) بر سمیت کبدی بیمار (با و بدون بیماری کبدی) پرداختند و مشاهده نمودند که به دنبال مصرف متادون در هیچ‌کدام از ۱۲۹ بیمار علائم سمیت کبدی مشاهده نشد (این نکته قابل ذکر است که ۲۳ درصد دارای پیشینه هپاتیت بودند و ۲۵ درصد مصرف‌کننده متوسط تا بالای الكل بودند). در این تحقیق ناهنجاری‌های تست کبد در ۵۷ درصد از آزمودنی‌ها در ابتدای شروع تحقیق گزارش شده بود و سه سال بعد از درمان، ۵۱ درصد از ناهنجاری‌ها مرتبط با هپاتیت و مصرف الكل بود (۳۸). همان‌طور که در سطرهای بالا ذکر شد یافته‌های مطالعه اسلامی شهربابکی (۲۰۱۲) در رابطه با عدم اثرگذاری مصرف

و همچنین تمرين با انقباض اکستنریک و عدم رعایت فرصت کافی به منظور برگشت به حال اولیه باعث آسیب به برخی ارگان‌های بدن می‌شود (۳۳). در مطالعات مختلف، محققین از پروتکل‌های تمرينی متفاوتی استفاده کرده‌اند که شاید بتوان دليل این ناهمسانی در نتایج را به نوع پروتکل تمرينی نسبت داد. در حقیقت آمینوترانسفرازها در سرم طبیعی، فعالیت اندکی دارند و در اثر تمرينات و رقابت‌های استقامتی، کوتاه‌مدت و شدید، برون‌گرا و حتی ورزش‌هایی که در آن‌ها وزن بدن تحمل نمی‌شود، مقادیر آنزیم‌های فوق افزایش می‌یابد (۳۴). البته نمی‌توان از دیگر عوامل اصلی از قبیل سابقه تمرين، نوع آزمودنی، سطح آمادگی جسمانی، نوع ورزش که هر کدام می‌تواند یک دليل اصلی برای این تفاوت‌ها باشند چشم‌پوشی کرد. به طوری که در اکثر مطالعات، این متغیرها از یک مطالعه به مطالعه دیگر متفاوت است. علاوه بر موارد مذکور گزارش شده است در اثر تمرينات طولانی‌مدت با افزایش $V_{O_2 \text{ max}}$ روبرو خواهیم شد که این بهبود و افزایش به دليل سازگاری دستگاه قلبی عروقی، عضلانی و متابولیک به فعالیت ورزشی است. از دلایل احتمالی افزایش $V_{O_2 \text{ max}}$ پس از تمرين می‌توان به افزایش حجم خون و پلاسمای و فعالیت آنزیم‌های اکسیداتیو میتوکندریایی اشاره کرد. در همین زمینه مشخص شده است که در افراد مبتدی و تمرين نکرده افزایش $V_{O_2 \text{ max}}$ را می‌توان به بهبود حمل و تحويل اکسیژن به عضلات اسکلتی نسبت داد که احتمالاً از طریق افزایش رهاسازی و اکسیداسیون اسیدهای چرب است که خود راهکاری مطلوب برای کاهش چربی کبد و بهبود شاخص‌های آسیب‌های کبدی به حساب می‌آید (۳۴).

متادون یک داروی مخدّر صنعتی قوی است که اعتیادآوری آن کمتر از مرفین و هروئین بوده و اغلب تحت عنوان یک داروی نگهدارنده جهت مهار اعتیاد به هروئین و دیگر مواد مخدّر مورداستفاده قرار می‌گیرد. متادون به دلیل بلوکه کردن اثرات هروئین در دوز بالا، در درمان سوءصرف هروئین استفاده می‌شود. تجویز مزمن متادون تحمل و واستگی ایجاد نموده و همین عامل منجر به سوءصرف آن شده است. از آنجاکه متادون چربی‌دوست است، مشخص شده است که در کبد و سایر بافت‌ها



کشیدن سیگار و یا تمرینات ورزشی با دوره‌های طولانی مدت قرار می‌گیرد (۲۰۱۳). همچنین اسد و همکاران (۲۰۱۳) گزارش نمودند ۸ هفته تمرینات استقامتی اثر معنی‌داری بر سطوح سرمی ALT و AST زنانی که در دوره ترک مصرف متادون بودند، ندارد (۱۹). با توجه به محدودیت‌های موجود در تحقیق حاضر از نقاط ضعف تحقیق حاضر می‌تواند به عدم کنترل ترکیبات اضافی آب از قبیل کلر، عدم اعمال اضافه‌بار تمرینی بر اساس اصل اضافه‌بار فراینده، نمونه آماری پایین و همچنین عدم مصرف متادون با دوزهای مختلف اشاره نمود، با این وجود از نقاط قوت تحقیق حاضر می‌توان به هم‌زمان بودن شروع تمرینات شنای اجباری موش‌های صحرایی، کنترل دقیق دمای آب و همچنین نگهداری موش‌های صحرایی در شرایط مناسب اشاره کرد. از این‌رو جهت کسب بینش دقیق‌تر در رابطه با اثرات مصرف متادون و همچنین فعالیت‌های ورزشی بر آنژیم‌های کبدی نیاز به مطالعات بیشتر همراه با تعداد نمونه‌های آماری بالا، دوزهای مختلف مصرف متادون، مصرف طولانی‌تر مصرف متادون، پروتکل‌های ورزشی متنوع و همچنین طولانی‌مدت تر است.

نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج مطالعه حاضر هشت هفته مصرف متادون اثر معنی‌داری بر آنژیم‌های ALT و AST ندارد و هشت هفته تمرین شنا اثر معنی‌داری بر آنژیم‌های AST و ALT ندارد، همچنین هشت هفته تمرین شنا همراه با افزایش ALP می‌گردد. همچنین هشت هفته تمرین شنا همراه با مصرف متادون اثر معنی‌داری بر آنژیم‌های ALT و ALP ندارد.

تشکر و قدردانی

با توجه به اینکه مطالعه حاضر تحت عنوان طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت صورت گرفته است، از کمک‌های مالی و معنوی معاونت پژوهش و همچنین کارشناس آزمایشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی این واحد دانشگاهی تشکر و قدردانی می‌گردد.

تعارض منافع

نویسنده‌گان هیچ گونه تعارض منافعی را اعلام نکرده‌اند.

متادون بر ALT و AST همسو با نتایج مطالعه حاضر است، با این وجود محققین مذکور بیان نمودند اگرچه ۲۴ ماه مصرف متادون اثر معنی‌داری بر آنژیم‌های ALT و AST ندارد، با این وجود منجر به افزایش معنی‌دار سطوح ALP بیماران تحت درمان متادون می‌گردد که این نتایج با نتایج مطالعه حاضر همسو نیست (۱۰). بر پایه گزارش محققین یکی از علت‌های افزایش ALP متعاقب مصرف متادون می‌تواند ناشی از فعالیت‌های صفرایی آسیب کبدی باشد. این الگو به طور عمده ناشی از داروهای مهارکننده ترشح صفرا از کید است. علاوه بر این، محققین همچنین بیان کردند علی‌رغم شیوع بالای هپاتیت B و C و همچنین افزایش سطوح آنژیم‌های کبدی در بین افراد معتاد، عدم افزایش آنژیم‌های ALT و AST در تحقیق آن‌ها شایان توجه نیست (۱۰).

همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد هشت هفته تمرین شنا همراه با مصرف متادون اثر معنی‌داری بر آنژیم‌های AST و ALP موش‌های صحرایی ندارد. در حقیقت نتایج این مطالعه نشان داد مصرف روزانه دو میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به همراه تمرین شنا به مدت هشت هفته بر تغییرات آنژیم‌های کبدی اثرگذار نبوده است که علت عدم اثرگذاری تمرینات شنا و همچنین مصرف متادون می‌تواند ناشی از شدت و یا حجم تمرینات شنا و یا دوز مصرفی متادون باشد، با این وجود مصرف متادون به همراه تمرین شنا منجر به عدم افزایش معنی‌دار ALP ناشی از تمرینات شنا گردیده است. همسو با نتایج تحقیق حاضر حدادی و همکاران (۲۰۱۵) در بررسی اثرات تمرینات استقامتی بر ALP زنان معتاد به متادون گزارش نمودند ۸ هفته (در ۲ هفته اول ۳ جلسه تمرین در هفته و هر جلسه ۲۵ دقیقه تمرین استقامتی با شدت ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب، در ۳ هفته بعد ۳ جلسه تمرین در هفته و هر جلسه ۳۵ دقیقه تمرین استقامتی با شدت ۶۵ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب و در ۳ هفته آخر ۳ جلسه تمرین در هفته و هر جلسه ۴۰ دقیقه تمرین استقامتی با شدت ۷۵ تا ۸۵ درصد حداکثر ضربان قلب) تمرینات ورزشی اثر معنی‌داری بر سطوح ALP زنان معتاد به متادون ندارد (۲۰). این محققین بیان نمودند احتمالاً تغییرات ALP تحت تأثیر عواملی از قبیل کنترل عادات غذایی، ترک



References

1. Dastjerdi G, Ebrahimi Dehshiri V, Kholasezade G, Ehsani F. Effectiveness of Methadone in Reduction of High Risk Behaviors in Clients of MMT Center. *Shaid Sadoughi Med Sci Uni J.* 2010; 18 (3): 215- 219. [In Persian]
2. Hall WD, Mattick RP. Oral Substitution Treatments for Opioid Dependence. *The Lancet.* 2008; 371 (9631): 2150-1.
3. Ezzati M, Rodgers A, Lopez AD, Vander Hoorn S, Murray CJ. Mortality and Burden of Disease Attributable to Individual Risk Factors, Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional Burden of Diseases Attributable to Selected Major Risk Factors. 2004.
4. Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Vander Hoorn S, Murray CJ. Selected Major Risk Factors and Global and Regional Burden of Disease. *The Lancet.* 2002; 360 (9343): 1347- 60.
5. Levy RH, Thummel KE, Trager WF, Hansten PD, Eichelbaum M. Metabolic Drug Interactions: Philadelphia Lippincot Williams & Wilkins. 2000.
6. Shahraz S, Ghaziany T. Iran Farma, Comprehensive Drug Official. Tehran: Tymurzadeh Pub. 2007.
7. Parvares N, Sabahi AR, Mazhari S, Gilani H. A Study of the Sexual Function, Sleep, and Weight Status of Patients after. *J Addict Health.* 2015; 7 (1-2): 24- 29.
8. Gholami MS, Alipoor R, Zareie T, Rezaieyan F, Hedayati A. Frequency of Side Effects of Methadone Maintenance Therapy in Patients Referred to Fasa Doctor Shariati Hospital. *Fasa Med Sci Uni J.* 2015;5(2): 248- 256. [In Persian]
9. Ahangar N. A Brief Review of Opioids and their Applications. *J Food Drug Sari Uni.* 2012;13(1):13- 19. [In Persian]
10. Eslami Shahrbabaki M, Haghdoost AA, Mashaiekhi A, Khalili N, Amini Ranjbar Z, Ghayomi A. Effects of Methadone on Liver Enzymes in Patients Undergoing Methadone Maintenance Treatment. *Addiction Health J.* 2012; 4 (3-4): 111- 115.
11. Kreek MJ. Medical Safety and Side Effects of Methadone in Tolerant Individuals. *Am Med Association J.* 1973; 223 (6): 665- 668.
12. Villegas R, Xiang YB, Elasy T, Cai Q, Xu W, Li H, et al. Liver Enzymes, Type 2 Diabetes, and Metabolic Syndrome in Middle-aged, Urban Chinese Men. *MSRD.* 2011; 9 (4): 305- 311.
13. Naminezhad Z, Hosseini SA, Naminezhad Z, Noura M, Naminezhad A. The Effect of Two Weeks Detraining Following Eight Weeks Aerobic Training on Alanine Amino Teransferaz and Aspartate Amino Teransferaz of Inactive Male. *Res Sport Biol J.* 2014;15 (4):55- 71. [In Persian]
14. Shamsoddini A, Sobhani V, Chehreh MEG, Alavian SM, Zaree A. Effect of Aerobic and Resistance Exercise Training on Liver Enzymes and Hepatic Fat in Iranian Men With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Hepatitis Monthly.* 2015;15(10): 31434- 31441.
15. Smart N, King N, Mc Farlane J, Graham P, Dieberg G. Effect of Exercise Training on Liver Function in Adults who are Overweight or Exhibit Fatty Liver Disease: a Systematic Review and Meta-analysis. *Br J Sports Med.* 2016; 50 (11): 1- 11.
16. Islami F. The Effects of Aerobic Training on Serum Level of Liver Enzymes and Metabolic Syndrome Risk Factors in Young Inactive Women. *Med Lab J.* 2015; 9(5):45- 52. [In Persian]
17. Fealy CE, Haus JM, Solomon TP, Pagadala M, Flask CA, McCullough AJ, et al. Short-term Exercise Reduces Markers of Hepatocyte Apoptosis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Appl Physiol J.* 2012;113(1): 1- 6.
18. Nabizadeh Haghghi A, Shabani R. Comparing Effects of Medication Therapy and Exercise Training with Diet on Liver enzyme Levels and Liver Sonography in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). *Fasa Med Sci Uni J.* 2016;5(4):488- 500. [In Persian]
19. Asad MR, Haddadi F, Rostami Nejad M, Soktehzari S. Effect of Eight Weeks Endurance Exercise on Liver Enzymes in Stopping Drug Women with Methadone. *Paramedical Sci J.* 2013;4(2):68- 71.
20. Haddadi F, Jazizadeh Karimi M, Nejad MR. The Effect of Endurance Training on Addicted Women's Level of Alkaline Phosphates who use Methadone. *Rep Health Care J.* 2015;1(2): 44- 46.
21. Drumond LE, Mourão FAG, Leite HR, Abreu RV, Reis HJ, Moraes MFD, et al. Differential Effects of Swimming Training on Neuronal Calcium Sensor-1 Expression in Rat Hippocampus/cortex and in Object Recognition Memory Tasks. *Brain Res Bulletin.* 2012; 88(4): 385- 391.
22. Davoodi M, Moosavi H, Nikbakht M. The Effect of Eight Weeks Selected Aerobic Exercise on Liver Parenchyma and Liver Enzymes (AST, ALT) of Fat Liver Patients. *Shahrekord Med Sci Uni J.* 2012;14(1): 84- 90. [In Persian]
23. Masoodsinaki H, Nazarali P, Hanachi P. Evaluation and Impact of Omega-3 Supplementation with a Period of Selective Aerobic Exercise on Liver Enzymes (AST- ALT) of Active Student Girls. *Hormozgan Med Sci J.* 2015;18 (3):247- 256. [In Persian]
24. Nobahar M, Mirdar SH. The Effects of one Progressive Session Exercise in Day During a Week on some Enzymes Muscle Damage in Active Girls. *Appl Res Sport Manag J.* 2013;1(3):79- 84. [In Persian]
25. Rezaei M, Rahimi E, Bordbar S, Namdar S. The Effects of Three Sessions of Running on a Negative Slope on Serum Levels of Liver Enzymes in Adult Male Rats. *Zahedan Med Sci J.* 2013;15(5):47- 49. [In Persian]
26. Devaki M, Nirupama R, Yajurvedi H. Repeated Acute Stress Alters Activity of Serum Aminotransferases and Lactate Dehydrogenase in Rat. *Physiol Biomed Sci J.* 2010;23(2):1- 4.
27. Barzegarzadeh Zarandi H, Dabid Roshan V.



- Changes in Some Liver Enzymes and Blood Lipid Level Following Interval and Continuous Regular Aerobic Training in Old Rats. *Shahrekord Med Sci Uni J.* 2012;14(5): 13- 23. [In Persian]
28. Tartibian B, Moutab Saei N. Effects of 9 Weeks High Intensity Aerobic Exercises on Parathyroid Hormone and Marker of Metabolism of Bone Formation in Young Women. *Olympic J.* 2009;16(4):79- 88. [In Persian]
29. Lester ME, Urso ML, Evans RK, Pierce JR, Spiering BA, Maresh CM, et al. Influence of Exercise Mode and Osteogenic Index on Bone Biomarker Responses During Short-term Physical Training. *Bone J.* 2009;45(4):768- 776.
30. Cavas L, Tarhan L. Effects of Vitamin-mineral Supplementation on Cardiac Marker and Radical Scavenging Enzymes, and MDA Levels in Young Swimmers. *Inte J Sport Nutr Exer Met.* 2004;14(2):133- 146.
31. Bashiri J, Gaeini A, Nikbakht H, Hadi H, Bashiri M. Effect of Concurrent Creatine Monohydrate Ingestion and Resistance Training on Hepatic Enzymes Activity Levels in Non-athlete Males. *Iranian J Endocrin Met.* 2010;12 (1):42- 47. [In Persian]
32. Woreta TA, Alqahtani SA. Evaluation of Abnormal Liver Tests. *Med Clinics North Am.* 2014;98(1):1- 16.
33. Salmani M, Aalizadeh A, Moghimi S, Tarverdizadeh B, Akbarzadeh S, Changizi Ashtiyani S, et al. Studying the Effects Aqueous Extract of Urtica Dioica and Swimming Training on the Histochemical Properties of Liver in Diabetic Rats. *Chem Pharma Res J.* 2015; 7(1):654- 660.
34. Barani F, Afzalpour ME, Ilbiegi S, Kazemi T, Mohammadi Fard M. The Effect of Resistance and Combined Exercise on Serum Levels of Liver Enzymes and Fitness Indicators in Women with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Birjand Med Sci Uni J.* 2014;21(2):188- 202. [In Persian]
35. Nikroo H, Nemati M, Sima HR, Attarzade Hosseini SR. The Effect of Restricted Diet with or without Aerobic Training Program on Cardio Respiratory Fitness and Anthropometric Indices in Patients with Non Alcoholic Steatohepatitis. *North Khorasan Med Sci Uni J.* 2011;3(3):91- 99. [In Persian]
36. Säwe J. High-dose Morphine and Methadone in Cancer Patients. Clinical Pharmacokinetic Considerations of Oral Treatment. *Clin Pharmacokinet.* 1986;11(2): 87- 106.
37. Tashakori A, Heshmati A, Afshari R, editors. *Methadone Induced Hepatotoxicity.* Proceeding of 8th Annual Congress of the Asia Pacific of Medical Toxicology; 2009.
38. Kreek MJ, Dodes L, Kane S, Knobler J, Martin R. Long-term Methadone Maintenance Therapy: Effects on Liver Function. *Ann Intern Med.* 1972;77(4):598- 602.

**Original Article**

Effect of Eight Weeks Forced Swimming Training with Methadone Supplementation on Aspartate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase, and Alkaline Phosphatase of Rats

Hoseini SA^{1*}, Zar A², Hoseini SA¹, Hassanpour Gh¹, Kheirdeh M³, Noura M⁴

1- Sport Physiology Department, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

2- Sport Physiology Department, University of Jahrom, Jahrom, Iran

3- Physical Education Department of Sama Collage, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

4- Sport Physiology Department, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

Received: 26 Feb 2016

Accepted: 05 Sep 2016

Abstract

Background & Objective: Narcotics abuse can induce liver disorders; nevertheless, exercises improve liver disorders. The present research aimed to review the effect of eight weeks forced swimming training with methadone supplementation on liver enzymes of rats.

Material & Method: In this experimental research, 48 rats were selected, and after one week adaptation to lab environment, they were randomly divided into four groups of 12 rats including (1) forced swimming training, (2) methadone supplementation, (3) forced swimming training with methadone supplementation, and (4) control. Groups 2 and 3 used 2 mg/kg methadone daily for 8 weeks. Also, groups 1 and 3 swam for 8 weeks, three sessions per week and each session for 30 minutes. For statistical analysis of data, one-way ANOVA and Tukey post hoc tests were used ($\alpha \leq 0.05$).

Results: Findings showed that forced swimming training, methadone supplementation, and forced swimming training with methadone supplementation had no significant effect on AST ($P=0.90$) and ALT ($P=0.99$) enzymes; forced swimming training had significant effect on increase of ALP ($P=0.001$); also, forced swimming training, compared with methadone supplementation and combination of forced swimming training with methadone supplementation, had significant effect on increase of ALP ($P=0.001$).

Conclusion: Accordingly, 8 weeks of forced swimming training with methadone has possibly no significant effect on liver enzymes.

Keywords: Forced Swimming Training, Aspartate Aminotransferase, Alanine aminotransferase, Alkaline Phosphatase, Methadone

*Corresponding author: Seyed Ali Hoseini, Sport Physiology Department, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
Email: alihoseini_57@miau.ac.ir