

اثر تیمار اسیدهای آلی بهنهایی یا همراه با امواج فراصوت در افزایش عمر قفسه‌ای برش‌های تازه میوه کیوی

آمنه منصوری^۱ و اورنگ خادمی^۲

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۶/۱۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰)

چکیده

عرضه میوه به صورت برش‌های تازه و آماده مصرف در سال‌های اخیر افزایش زیادی یافته است. میوه کیوی نیز از جمله میوه‌هایی است که عرضه آن به صورت تازه‌بریده در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. آلوگی میکروبی، کاهش شدید سفتی و قهوه‌ای شدن از عوامل اصلی محدود کننده عمر قفسه‌ای قطعات تازه‌بریده میوه‌ها می‌باشدند. در این پژوهش اثر تیمارهای اسید اگزالیک و اسید سیتریک هریک در غلظت‌های صفر، دو، چهار و شش میلی‌مولار بهنهایی و یا در تلفیق با تیمار امواج فراصوت روزی قطعات تازه‌بریده میوه کیوی مورد بررسی قرار گرفت. قطعات تازه‌بریده کیوی پس از اعمال تیمار، در دمای دو درجه سانتی‌گراد ابیار و در زمان‌های ۷ و ۱۴ روز از ابیار سرد خارج و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمارهای اسید اگزالیک و اسید سیتریک به طور مؤثری در مقایسه با شاهد ظاهر محصول را حفظ نموده و دارای سفتی بافت، اسید قابل تیتر، اسید آسکوربیک، مقدار فنل کل و ظرفیت آنتی‌اسیدانی بالاتر و در عین حال کلونی باکتری کمتری بودند. در بین تیمارهای اعمال شده نیز تیمارهای اسید اگزالیک در غلظت‌های دو، چهار و شش میلی‌مولار و اسید سیتریک در غلظت شش میلی‌مولار بهتر از سایر تیمارها عمل نمودند. اعمال تیمار فراصوت بهنهایی با وجود کاهش بار میکروبی و حفظ بهتر ویژگی‌های آنتی‌اسیدانی تأثیر چندانی در حفظ بازارپسندی قطعات تازه‌بریده میوه کیوی نشان نداد. بنابراین اعمال تیمارهای اسیدآلی به صورت غوطه‌وری می‌تواند در افزایش عمر قفسه‌ای قطعات بریده شده میوه کیوی مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: اسید اگزالیک، اسید سیتریک، بازارپسندی، عمر قفسه‌ای، فراصوت، کیوی

۱ و ۲. به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار، گروه علوم باگیانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

*. مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: o.khademi@shahed.ac.ir

مقدمه

گسترده بهمنظور جلوگیری از فرآیند قهوه‌ای شدن و کاهش جمعیت میکروب‌ها در میوه برش خورده استفاده می‌شود (۴۰). در پژوهشی محققان دریافتند که استفاده از اسید سیتریک ۵/۱ مولار سبب حفظ کیفیت غذایی و افزایش عمر قفسه‌ای قطعات تازه‌بریده میوه شاهبلوط چینی شد (۲۰). اسید اگزالیک نیز به عنوان یک آنتی‌اسیدان طبیعی نقش مهمی در ممانعت از فعالیت آنزیم‌های اکسید کننده و رشد عوامل میکروبی روی سطح برش خورده محصولات تازه‌بریده دارد (۴۸). پژوهشگران نشان داده‌اند که اسید اگزالیک پتانسیل قوی در افزایش ماندگاری قطعات تازه‌بریده میوه سبب دارد (۳۷).

امواج فراصوت (Ultra Sonic) از طریق تخریب میکروارگانیسم‌ها و غیر فعال‌سازی بعضی از آنزیم‌ها بدون تغییر در خواص کیفی میوه‌ها و سبزی‌ها سبب کاهش بار میکروبی روی آنها می‌شود. بدین صورت که انرژی فیزیکی و شیمیابی تولید شده به‌وسیله امواج فراصوت منجر به غیر فعال شدن فعالیت میکروارگانیسم‌ها می‌گردد (۷ و ۱۳). غیر فعال‌سازی میکروارگانیسم‌ها نتیجه شکل‌گیری، رشد و فروپاشی حباب‌هایی است که از انرژی شیمیابی و مکانیکی حاصل از امواج فراصوت درون سلول‌های میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شود (۱۵ و ۳۲). در مکانیسم دیگر امواج فراصوت با تحریک تولید رادیکال‌های آزاد منجر به تخریب DNA سلول‌های باکتری می‌شود (۸). طی پژوهش‌های صورت گرفته اثر مثبت کاربرد امواج فراصوت در کاهش بار میکروبی و افزایش ماندگاری میوه توت‌فرنگی طی انبار سرد نشان داده شده است (۶ و ۱۸). هم‌چنین مو و جانگ (۲۷) نشان دادند که تیمار فراصوت در تلفیق با اسید آسکوربیک با غیر فعال‌سازی بسیاری از آنزیم‌ها و کاهش بار میکروبی سبب افزایش عمر قفسه‌ای قطعات بریده میوه توت‌فرنگی می‌شود. اثربخشی تیمار فراصوت در کاهش جمعیت باکتریابی و در پی آن افزایش عمر قفسه‌ای قطعات بریده شده کاهو نیز توسط ساگونگ و همکاران نشان داده شده است (۴۲).

در ایران عرضه میوه‌ها به صورت برش‌های تازه رواج ندارد

کیوی (Actinidia deliciosa) میوه‌ای نیمه‌گرسیمیری متعلق به خانواده Actinidiaceae است که مهم‌ترین رقم تجاری آن هایوارد می‌باشد (۴۴). این رقم در ایران نیز در سطح قابل توجه کشت و مصرف می‌گردد. میوه کیوی از جمله محصولاتی است که عرضه آن به صورت قطعات بریده شده (Fresh cut)، روند افزایشی دارد (۴). به‌طورکلی محصولات تازه‌بریده به‌دلیل راحتی مصرف بازار پستنی بالای دارند و مصرف آنها رو به گسترش است (۲۱ و ۴۵). متهی عرضه میوه کیوی به صورت تازه‌بریده با عوامل محدود کننده‌ای عمدۀ‌ای همراه است (۲۵). قطعات بریده شده میوه کیوی به‌وسیله کپک آبی فراوان و نرم شدن سریع مستعد آلودگی به‌وسیله کپک آبی (Botrytis cinerea)، کپک خاکستری (Penicillium expansum) و Phomopsis actinidia هستند (۲). علاوه بر این قطعات بریده شده میوه کیوی، همانند سایر محصولات تازه‌بریده به‌دلیل نبود سده‌های مکانیکی مناسب با حملۀ انواع باکتری‌ها نیز مواجه می‌باشند (۹). ایجاد زخم که برای تهیه محصولات تازه‌بریده اجتناب‌ناپذیر است، حساسیت بافت‌های گیاهی به قهوه‌ای شدن و کاهش شدید سفتی را افزایش می‌دهد (۱، ۴ و ۱۰).

کاهش بار میکروبی و ممانعت از قهوه‌ای شدن از مهم‌ترین مراحل در زنجیره تولید محصولات غذایی، به‌ویژه محصولات تازه‌بریده شده می‌باشد (۳ و ۴۳). روش‌های متفاوتی با هدف کاهش بار میکروبی و کنترل قهوه‌ای شدن آنژیمی در صنعت پس از برداشت و در این بین، صنعت محصولات تازه‌بریده به‌کار برده می‌شود (۳۴، ۳۳ و ۳۵). استفاده از اینبارهای سرد، تغییر pH اطراف سلول، تیمارهای شیمیابی، اینبارهایی با اتمسفر تغییر یافته و بسته‌بندی با پوشش مناسب از جمله راه‌های هستند که برای نگهداری محصولات تازه‌بریده شده مورد استفاده قرار می‌گیرند (۳۰، ۳۸ و ۳۹). دمای پایین و شرایط اسیدی که با استفاده از اسیدهای آلی و نمک‌های آنها ایجاد می‌شود، عمر پس از برداشت محصولات میوه‌ای را افزایش می‌دهد (۲۸ و ۳۹). در این بین، اسید سیتریک به صورت

شش واحد آزمایشی هر یک دارای ۲۰ قطعه بریده شده به عرض یک سانتی متر تقسیم بندی شدند. نمونه های هر واحد آزمایشی در بسته های پلی اتیلنی قرار گرفته و با سلفون پوشیده شدند. بسته های تهیه شده به دمای ۲ درجه سانتی گراد منتقل و سه بسته از هر تیمار به عنوان سه تکرار در روز هفتم و سه بسته باقی مانده در روز چهاردهم پس از قرار گیری، به مدت دو روز در دمای معمولی، به عنوان عمر قفسه ای مورد بررسی قرار گرفتند.

اندازه گیری شاخص های فیزیکی و شیمیایی

درجه بازار پسندی نمونه ها به صورت مشاهده ای و با در نظر گرفتن ظاهر مطلوب و درجه آلودگی بیمار های قارچی در محدوده صفر الی پنج نمره دهی شد. صفر قطعاتی با ظاهری سالم و بدون آلودگی و پنج میوه هایی با ظاهر تخرب شده، بد رنگ و دارای آلودگی قارچی بالا بود. سفتی قطعات تازه بریده کیوی با استفاده از دستگاه سفتی سنج دستی (مدل: FTO11) با قطر پیستون چهار میلی متر) و در دو قسمت از هر قطعه اندازه گیری و میانگین آن برآسas نیوتون بیان شد. تعداد شش نمونه از هر واحد آزمایشی عصاره گیری شده و برای اندازه گیری مقدار مواد جامد محلول اختصاص یافت. مقدار مواد جامد محلول با استفاده از دستگاه رفراکتومتر دستی (مدل Atago Manual.

برای تعیین واحد تشکیل کلونی باکتریایی، CFU، colony-forming unit)، مقدار یک گرم نمونه به طور تصادفی از قطعات بریده شده هر واحد آزمایشی برداشته شده و در ۱۰ میلی لیتر آب مقطر استریل هموژن شد. مقدار یک میلی لیتر از هموژن در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر استریل رقیق شد و یک قطره از هموژن حاصل روی محیط کشت نوترینت آگار کشت و تعداد کلونی های تشکیل شده پس از ۴۸ ساعت شمارش شد. مقدار اسید آسکوربیک (ویتامین ث) با روش تیتراسیون با دی کلروفنل ایندوفنل اندازه گیری شد و مقدار ویتامین ث بر حسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تر میوه بیان شد (۲۴). مقدار فنل کل میوه ها نیز پس از عصاره گیری با متابول

ولی امروزه در بیشتر کشورهای توسعه یافته و یا حتی کشورهای در حال توسعه محصولات مهم با غبانی به صورت بریده شده و آماده مصرف عرضه می شود. بنابراین لازم است برای توسعه عرضه محصولات با غبانی به صورت آماده مصرف در کشور که با افزایش بهره وری اقتصادی و توسعه صادرات همراه خواهد بود، ابتدا پژوهش های علمی در این خصوص صورت گیرد. در این آزمایش با توجه به اثرات مثبت تیمارهای اسیدهای آلی و فراصوت در افزایش عمر قفسه ای محصولات آماده مصرف و نبود اطلاعات چندان روی کیوی، اثر تلفیقی این دو تیمار روی قطعات بریده شده میوه کیوی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

نمونه های میوه

میوه کیوی رقم هایپاراد (با سفتی متوسط ۸۰ نیوتون و مقدار مواد جامد محلول ۷/۵ درجه برقیس) از باعی در اطراف شهر رامسر تهیه و در کمتر از ۱۰ ساعت به آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شاهد منتقل شد. میوه های معیوب و صدمه دیده حذف و میوه های سالم و یکنواخت برای انجام آزمایش انتخاب شدند.

اعمال تیمارها

میوه ها پس از شستشو، به مدت پنج دقیقه با محلول هیپوکلرید سدیم (پنج درصد) ضد عفونی شده (۵) و در گروه های مختلف برای اعمال تیمار توزیع شدند. میوه ها قبل از اعمال تیمارها پرست کنی شده و در قطعاتی یکسان به عرض یک سانتی متر و با استفاده از اسلایسر دستی تهیه شدند. تیمارهای اعمال شده شامل اسید اگزالیک و اسید سیتریک هریک در چهار غلظت صفر (به عنوان شاهد)، دو، چهار و شش میلی مولار بودند. تیمارهای مذکور به مدت پنج دقیقه یکبار، به صورت غوطه وری و بار دیگر در دستگاه فراصوت (با قدرت ۴۰ مگا هرتز) اعمال شدند. قطعات بریده شده میوه کیوی پس از اعمال تیمارها در دمای آزمایشگاه خشک شده و سپس نمونه های هر تیمار به

پس از هفت روز نمونه‌های تمامی تیمارهای اعمال شده دارای درجه بازارپستنی بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند و در این بین تیمارهای اسید اگزالیک در هر سه غلظت دو، چهار و شش میلی‌مولار و تیمار اسید سیتریک در غلظت شش میلی‌مولار دارای درجه بازارپستنی بیشتری در مقایسه با تیمارهای اسید سیتریک در غلظت‌های دو و چهار میلی‌مولار بودند. در زمان بررسی ۱۴ روز، درجه بازارپستنی نمونه‌های تیمار شده در مقایسه با زمان بررسی هفت روز کاهش یافت. در این زمان بررسی نمونه‌های تیمارهای اسید سیتریک در غلظت‌های دو و چهار میلی‌مولار دارای اختلاف معنی‌داری نسبت به شاهد از نظر درجه بازارپستنی بودند، درحالی‌که نمونه‌های تیمارهای اسید اگزالیک در هر سه غلظت دو، چهار و شش میلی‌مولار و تیمار اسید سیتریک در غلظت شش میلی‌مولار دارای درجه بازارپستنی بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند (شکل ۱).

سفتی بافت

نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که نمونه‌های تیمارهای اسید اگزالیک و اسید سیتریک در هر سه غلظت دو، چهار و شش میلی‌مولار دارای سفتی بافت بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد (با سفتی کمتر از یک نیوتون) بودند. در بین تیمارها نیز نمونه‌های تیمارهای اسید اگزالیک (با سفتی نزدیک به سه نیوتون) دارای سفتی بافت بیشتری در مقایسه با نمونه‌های تیمارهای اسید سیتریک بودند، هرچند با اسید سیتریک شش میلی‌مولار اختلاف معنی‌داری از نظر سفتی بافت نشان ندادند (شکل ۲).

درصد اسیدیته قابل تیتر و مقدار مواد جامد محلول
مقدار اسید قابل تیتر میوه‌ها در زمان برداشت ۵/۸۲ درصد بوده ولی با گذشت زمان آزمایش مقدار اسید قابل تیتر نمونه‌ها به طور معنی‌داری کاهش یافت. متوجه میوه‌های تیمار شده با فراصوت (با مقدار اسیدیته ۰/۶۸ درصد) دارای اسید قابل تیتر

درصد با استفاده از معرف فولین سیوکالترا و براساس استاندارد اسید تانیک تهیه شده، اندازه‌گیری گردید (۱۲). ظرفیت آنتی‌اکسیدان کل بر مبنای اسید آسکوربیک (AEAC) Ascrobate equivalent antioxidant capacity روش ذکر شده در فانیادیس و همکاران (۱۴) اندازه‌گیری شد.

تجزیه و تحلیل آماری

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تیمار اسیدهای آلی در هفت سطح، فراصوت در دو سطح و زمان بررسی در دو سطح بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS (ورژن ۹/۲) صورت گرفته و برای مقایسه میانگین از حداقل تفاوت معنی‌دار ($LSD = 0.05$) استفاده شد.

نتایج

نتایج مقایسه میانگین


براساس نتایج تجزیه واریانس (جدول ۱)، اثر تیمار فراصوت بر اسید قابل تیتر، واحد تشکیل کلونی، مقدار ویتامین ث، مقدار فتل کل و آنتی‌اکسیدان معنی‌دار ولی بر بازارپستنی و سفتی غیر معنی‌دار بود. اثر تیمار اسید آلی نیز بر بازارپستنی، سفتی بافت، اسید قابل تیتر، واحد تشکیل کلونی باکتری، مقدار ویتامین ث، مقدار فتل کل و آنتی‌اکسیدان معنی‌دار ولی بر درصد مواد جامد محلول غیر معنی‌دار بود. اثر زمان بررسی بر بازارپستنی، اسید قابل تیتر، واحد تشکیل کلونی باکتری، مقدار ویتامین ث، مقدار فتل کل و آنتی‌اکسیدان معنی‌دار ولی بر سفتی بافت و مواد جامد محلول غیر معنی‌دار بود. در بین برهمکنش بین عامل‌ها تنها اثر برهمکنش بین زمان و اسید آلی بر بازارپستنی معنی‌دار ولی سایر اثرها غیر معنی‌دار بود.

بازارپستنی


بررسی برهمکنش بین تیمارهای اسید آلی و زمان نشان داد که

جدول ۱. نتایج تعزیه واریانس آزمایش اثر امیدهای آلتی و فراآنوت بر افزایش عمر قفسه‌ای کبوی برش خورده


NS : غير معنی دار، *: معنی دار در سطح احتمال ۰/۱، **: معنی دار در سطح احتمال ۰/۵




شکل ۲.۳ اثر اصلی تیمار فراصوت بر درصد اسید قابل تیتر قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین‌هایی با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نمی‌باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و هفت تیمار اسید آلی می‌باشد (n=۴۲).



شکل ۱. برهمکنش بین تیمارهای اسید آلی و زمان نگهداری بر درجه بازارپسندی قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین‌هایی با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر معنی دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نمی‌باشند.



شکل ۴. اثر اصلی تیمارهای اسید آلی بر درصد اسید قابل تیتر قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین‌هایی با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نمی‌باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و دو تیمار فراصوت می‌باشد (n=۱۲).




شکل ۲. اثر اصلی تیمارهای اسید آلی بر سفتی بافت قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین‌هایی با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نمی‌باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و دو تیمار فراصوت می‌باشد (n=۱۲).


۴ میلی‌مولا ر دارای اسید قابل تیتر کمتری از تیمارهای اسید سیتریک در غلاظت شش میلی‌مولا ر و اسید اگزالیک در هر سه غلاظت دو، چهار و شش میلی‌مولا ر بودند (شکل ۴). اختلاف آماری معنی داری بین تیمارهای اسید آلی و فراصوت و زمان‌های بررسی از نظر مقدار مواد جامد محلول مشاهده نشد.

بیشتری در مقایسه با میوه‌های تیمار نشده با آن (با مقدار اسیدیته ۰/۵ درصد) بود (شکل ۳). بررسی اثر اصلی تیمارهای اسید آلی نیز نشان داد که تمامی تیمارهای اعمال شده دارای اسید قابل تیتر بیشتری در مقایسه با میوه‌های شاهد بودند. در بین تیمارهای اسید آلی اعمال شده تیمار اسید سیتریک در غلاظت دو میلی‌مولا ر و در درجه بعدی تیمار اسید سیتریک در غلاظت

اثر تیمار اسیدهای آلی بهتایی یا همراه با امواج فرماصوت در افزایش ...



شکل ۵. اثر اصلی تیمار فرماصوت بر میزان تشکیل کلونی باکتریایی قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگینهای با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر (LSD) در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (CFU = 5×10^3) نمی باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و هفت تیمار اسید آلی می باشد (n = ۴۲).



شکل ۶. اثر اصلی تیمارهای اسید آلی بر میزان تشکیل کلونی باکتریایی قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگینهای با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نمی باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و دو تیمار فرماصوت می باشد (n = ۱۲).

تیمارهای اسید سیتریک دو و چهار میلی مولار دارای مقدار اسید آسکوربیک بیشتری بودند (شکل ۸).

مقدار فنل کل
نمونه های کیوی در زمان برداشت دارای مقدار فنل کل ۱۳۰

میزان تشکیل کلونی باکتریایی (CFU)

با گذشت زمان آزمایش میزان تشکیل کلونی در نمونه های کیوی برش خورده افزایش یافت. متنه اعمال تیمار فرماصوت در مقایسه با عدم اعمال تیمار فرماصوت به طور معنی داری بار میکروبی نمونه ها را کاهش داد (شکل ۵). اعمال تیمارهای اسید اگزالیک و اسید سیتریک در هر سه غلظت دو، چهار و شش میلی مولار نیز در مقایسه با شاهد (CFU = 11×10^3) منجر به کاهش معنی دار میزان تشکیل کلونی باکتریایی شد. در این بین بیشترین اثر را در کاهش بار میکروبی تیمار اسید اگزالیک شش میلی مولار (CFU = 5×10^3) داشت که داری کمترین بار میکروبی در بین تیمارهای اسید آلی بود. تیمار اسید سیتریک دو میلی مولار نیز دارای بار میکروبی بیشتری در مقایسه با سایر تیمارهای اسید آلی بود، ولی بین تیمارهای اسید اگزالیک دو و چهار میلی مولار و اسید سیتریک چهار و شش میلی مولار اختلاف معنی دار از نظر میزان تشکیل کلونی باکتریایی مشاهده نشد (شکل ۶).

مقدار اسید آسکوربیک


مقدار اسید آسکوربیک نمونه ها در زمان برداشت در حدود ۷۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تر میوه بود که با گذشت زمان آزمایش کاهش یافت. ولی اعمال تیمار فرماصوت و نیز اعمال تیمارهای اسید آلی منجر به حفظ بهتر اسید آسکوربیک نمونه ها شد. به طوری که نمونه های تیمار شده با فرماصوت در مقایسه با نمونه های تیمار نشده دارای مقدار اسید آسکوربیک بیشتری بودند (شکل ۷). تمامی تیمارهای اسید آلی اعمال شده نیز در مقایسه با شاهد (با مقدار ۳۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تر) دارای مقدار اسید آسکوربیک بیشتری بودند. در این بین بیشترین مقدار اسید آسکوربیک در نمونه های تیمار اسید اگزالیک شش میلی مولار (با مقدار ۶۳ میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تر) مشاهده شد. نمونه های تیمارهای اسید اگزالیک دو و چهار میلی مولار و اسید سیتریک شش میلی مولار نیز بدون اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر در مقایسه با نمونه های

میانگین ۱۱۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن تر) در مقایسه با نمونه‌های تیمار نشده (با میانگین ۹۴ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن تر) با فراصوت دارای مقدار فنل کل بیشتری بودند (شکل ۹). نمونه‌های تمامی تیمارهای اسیدهای آلی نیز در مقایسه با شاهد دارای مقدار فنل کل بیشتری بودند. در این میان نمونه‌های تیمار شده با اسید اگزالیک به‌طور نسبی دارای مقدار فنل کل بیشتری در مقایسه با نمونه‌های تیمار شده با اسید سیتریک بودند (شکل ۱۰).


ظرفیت آنتی اکسیدان کل بر مبنای اسید آسکوربیک (AEAC) به‌طورکلی ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه‌ها با گذشت زمان آزمایش کاهش معنی‌داری نشان داد. متهی نمونه‌های تیمار شده با فراصوت در مقایسه با نمونه‌های تیمار نشده با آن به‌طور معنی‌داری دارای ظرفیت آنتی اکسیدانی بیشتری بودند (شکل ۱۱). نمونه‌های تمامی تیمارهای اعمال شده اسید آلی نیز دارای ظرفیت آنتی اکسیدانی بیشتری در مقایسه با نمونه‌های تیمار شاهد بودند (شکل ۱۲).

بحث

کیفیت ظاهری محصول به عنوان مهم‌ترین شاخص ارزیابی بازارپسندی محصول می‌باشد. نقصان ظاهر و بازارپسندی محصولات تازه‌بریده ناشی از شیوه بیماری‌های مختلف و بروز واکنش قهقهه‌ای شدن آنزیمی در آنها می‌باشد (۲۶). نتایج این پژوهش نشان داد که تیمارهای اسید اگزالیک در هر سه غلاظت دو، چهار و شش میلی‌مولار و اسید سیتریک در غلاظت شش میلی‌مولار به‌طور مؤثری موجب حفظ بهتر بازارپسندی قطعات تازه‌بریده میوه کیوی شدند. در پژوهشی، نشان داده شده است که غوطه‌ور نمودن میوه لیچی در محلول اسید اگزالیک با کاهش فعالیت آنزیم پلی‌فنل اکسیداز منجر به تأخیر فرآیند قهقهه‌ای شدن و حفظ کیفیت ظاهری میوه شده است (۴۸). تیمار اسید اگزالیک در انبه، هلو، عناب و موز نیز با ممانعت از توسعه پاتوژن‌ها سبب حفظ کیفیت ظاهری میوه گردیده است.




شکل ۷. اثر اصلی تیمار فراصوت بر مقدار اسید آسکوربیک قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین‌های با حروف مشابه دارای اختلاف معنی‌دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار (LSD) نمی‌باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و هفت تیمار اسید‌آلی می‌باشد ($n = 42$).




شکل ۸. اثر اصلی تیمارهای اسید آلی بر مقدار اسید آسکوربیک قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین‌های با حروف مشابه دارای اختلاف معنی‌دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار (LSD) نمی‌باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و دو تیمار فراصوت می‌باشد ($n = 12$).

میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم وزن تر بودند که این مقدار با گذشت زمان آزمایش به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. بررسی مقایسه میانگین‌ها نشان داد که نمونه‌های تیمار شده با فراصوت (با

اثر تیمار اسیدهای آلی بهتنهایی یا همراه با امواج فراصوت در افزایش ...




شكل ۱۱. اثر اصلی تیمار فراصوت بر ظرفیت آنتسی اکسیدانی قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین های با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نمی باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و هفت تیمار اسید آلی می باشد (n=۴۲).




شكل ۱۲. اثر اصلی تیمارهای اسید آلی بر ظرفیت آنتسی اکسیدانی قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین های با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نمی باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و دو تیمار فرداصوت می باشد (n=۱۲).

سلولی و کاهش آلودگی های باکتریایی و قارچی در اثر این تیمارها بوده است. سفتی بافت میوه کیوی در زمان برداشت بالا بوده و به تدریج در طی نگهداری به شدت کاهش می یابد که این کاهش شدید سفتی در قطعات تازه بریده میوه کیوی پس از ایجاد برش



شكل ۹. اثر اصلی تیمار فرداصوت بر مقدار فنل کل قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین های با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نمی باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و هفت تیمار اسید آلی می باشد (n=۴۲).



شكل ۱۰. اثر اصلی تیمارهای اسید آلی بر مقدار فنل کل قطعات برش خورده میوه کیوی. میانگین های با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار نسبت به یکدیگر در سطح ۵٪ آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نمی باشند. هریک از اعداد میانگین دو زمان بررسی و دو تیمار فرداصوت می باشد (n=۱۲).

(۱۹، ۴۷، ۴۹ و ۵۰). اسید سیتریک خاصیت ضد میکروبی دارد به همین دلیل تیمار نمونه ها با اسید سیتریک در افزایش عمر قفسه ای و حفظ کیفیت ظاهری محصولات تازه بریده تأثیر دارد (۳۷). از این رو به نظر می رسد عامل اصلی حفظ کیفیت ظاهری کیوی، برش تازه بریده توسط تیمارهای اسید آلی، حفظ ساختار

آن نشان دادند (۴۲).

مقدار اسیدهای آلی با گذشت زمان بهدلیل تنفس و تبدیل شدن به قندها کاهش می‌یابد و کاهش آن رابطه مستقیمی با سرعت فعالیت‌های متابولیک در سلول دارد. در واقع اسیدهای آلی به عنوان یک منبع ذخیره انرژی میوه می‌باشند که در هنگام تنفس با افزایش سوخت‌وساز مصرف می‌شوند (۳۱). در این پژوهش مقدار اسیدهای آلی توسط تیمارهای اعمال شده در مقایسه با شاهد کمتر کاهش یافت و تیمارهای اسید اگزالیک در حفظ بهتر اسیدهای آلی مؤثرتر از اسید سیتریک بودند. این امر نشان می‌دهد که اسیدهای آلی با حفظ ساختار سلولی و با ممانعت از افزایش تولید اتیلن سرعت فعالیت‌های متابولیکی را کاهش داده و بدین طریق منجر به حفظ بهتر اسیدهای آلی شدند (۲۲). در این پژوهش نمونه‌های تیمار شده با فراصوت دارای مقدار اسید قابل تیتر بیشتری در مقایسه با شاهد بودند که نشان از حفظ بهتر ساختار سلولی و مصرف کمتر اسیدهای آلی در اثر این تیمار دارد. این نتایج با نتایج هو و همکاران مطابقت داشت که بیان نمودند کاربرد تیمار فراصوت سبب حفظ بهتر مقدار اسیدیته و کند شدن فرآیند مصرف و تخریب اسید آلی در میوه‌های توت‌فرنگی شده است (۱۸).

ظرفیت آنتی‌اسیدانی میوه کیوی عمدتاً تحت تأثیر سطوح ویتامین ث و پلی‌فنل‌ها در آن می‌باشد و رابطه خطی معنی‌داری بین ظرفیت آنتی‌اسیدانی میوه کیوی و مقدار پلی‌فنل‌ها و ویتامین ث وجود دارد (۱۱ و ۲۳). نتایج این آزمایش نشان داد که اسید آسکوربیک و مقدار فنل کل و در راستای آن ظرفیت آنتی‌اسیدانی قطعات بریده شده کیوی با گذشت زمان کاهش یافت، منتهی این کاهش توسط تیمارهای اسید آلی بهخصوص اسید اگزالیک در غلظت بالا تعديل یافت. در این آزمایش مقدار فنل کل نمونه‌های تیمار شده با اسید اگزالیک به میزان بیشتری نسبت به سایر تیمارها حفظ شد. حفظ بهتر متابولیت‌ها در اثر تیمارهای اسید اگزالیک بهدلیل حفظ بهتر ساختار سلولی و احتمالاً کاهش سرعت تنفس، کاهش تولید اتیلن و کاهش بار میکروبی در اثر آنها بوده است (۲۲). در گزارش مشابهی

بهدلیل ایجاد زخم و در پی آن تحریک تولید اتیلن و تراوش آنزیمهای تخریب کننده دیواره سلولی به فضای بین سلولی رخ می‌دهد (۲۵). تیمارهای اسید آلی در این آزمایش به طور مؤثری کاهش سفتی قطعات بریده شده کیوی را در طول عمر قفسه‌ای تعديل نمودند. نقش مثبت اسیدهای آلی در کاهش سرعت تولید اتیلن و سرعت تنفسی نشان داده شد (۱۷ و ۳۶). بنابراین بهنظر می‌رسد از جمله دلایل اصلی حفظ سفتی توسط تیمارهای اسید آلی ممانعت از افزایش تولید اتیلن در اثر این تیمارها می‌باشد. بهویژه اینکه تیمارهایی در حفظ سفتی بهتر عمل نمودند که دارای آلوودگی قارچی کمتری بودند. بیماری‌های قارچی از عوامل اصلی تحریک تولید اتیلن محسوب می‌گردند (۱۷، ۳۶ و ۳۹). گویلن و همکاران (۱۶) طی پژوهشی نشان دادند که تیمار با اسید اگزالیک با کاهش از دست دادن آب سبب حفظ بهتر سفتی آرتیشو شد. از این‌رو از دلایل دیگر حفظ سفتی توسط تیمارهای اسید آلی می‌تواند حفظ بهتر محتوای آب و پدیده تورژسانس در قطعات بریده شده کیوی باشد.

در این بررسی هر دو اسید آلی سیتریک و اگزالیک نسبت به نمونه‌های شاهد بار باکتریایی را کاهش داده و اسید اگزالیک شش میلی‌مولار در این بین بیشترین تأثیر را در کاهش بار باکتریایی داشت. هم‌چنین تیمار فراصوت سبب کاهش بار باکتریایی نمونه‌ها شد. اسیدهای آلی در بافت میوه سیستم مقاومت را افزایش داده و با ضدغذنی بافت میوه از رشد و فعالیت عوامل میکروبی ممانعت می‌نماید (۴۸). هم‌چنین تأثیر اسیدهای آلی در کاهش بار میکروبی می‌تواند ناشی از حفظ بهتر سفتی بافت میوه در اثر این تیمارها و کاهش pH سطح سلول باشد، چرا که باکتری‌ها در pH نزدیک خشی فعالیت بیشتری از خود در مقایسه با pH‌های پایین نشان می‌دهند (۱۶). در تحقیقی مشابه با تحقیق حاضر، محققان اثرات مثبت فرایندهای را در استفاده از تیمار امواج فراصوت و اسید سیتریک در غیرفعال‌سازی باکتری‌های *E.coli*, *Typhimurium*, *L.monocytogenes* در قطعات تازه‌بریده کاهوی ارگانیک بدون تغییر در بافت و رنگ

میوه کیوی سریعاً در طی دوره عمر قفسه‌ای دچار نقصان می‌شوند و علائم نقصان شامل کاهش شدید سفتی، آلوگی میکروبی و بد رنگ شدن سطح میوه می‌باشد. تیمارهای اسید سیتریک و اسید اگرالیک به دلیل خاصیت ضد پاتوژنی و آنتی اکسیدانی منجر به افزایش عمر قفسه‌ای قطعه‌های تازه‌بریده میوه کیوی شدنند. این تیمارها سفتی بافت و ارزش غذایی را حفظ و بار میکروبی و بد رنگ شدن محصول را کاهش دادند، ولی تیمار فراصوت علی‌رغم حفظ خصوصیات آنتی اکسیدانی و کاهش تراکم باکتریایی به دلیل عدم کترل بیماری‌های قارچی و حفظ ظاهر مناسب در افزایش عمر قفسه‌ای قطعه‌های تازه‌بریده کیوی، مؤثر نشان نداد.

محتوای فلکل و ظرفیت آنتی اکسیدانی آرتیشو توسط تیمارهای اسید اگرالیک نسبت به نمونه‌های شاهد بهتر حفظ شد (۱۶). در این پژوهش اعمال تیمار فراصوت نیز به حفظ بهتر متابولیت‌های میوه کیوی و ظرفیت آنتی اکسیدانی آن منجر شد که یافته حاصل از این آزمایش با نتایج سوریا و ویلامیل (۲۰۱۰) مطابقت دارد که بیان نمودند کاربرد تیمار فراصوت سبب حفظ بهتر ظرفیت آنتی اکسیدان‌ها و حفظ ترکیباتی چون فلاونوئیدها و اسید آسکوربیک در محصولات غذایی می‌شود (۴۱).

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که قطعه‌های تازه‌بریده

منابع مورد استفاده

1. Asemota, H. N., M. A. Wellington, A. A. Odutuga and M. H. Ahmad. 1992. Effect of short-term storage on phenolic content, o-diphenolase and peroxidase activity of cut yam tubers (*Dioscorea sp*). *Journal of the Science of Food and Agriculture* 60: 309-312.
2. Agar, I. T., R. Massantini, B. Hess-Pierce and A. Kader. 1999. Postharvest CO₂ and ethylene production and quality maintenance of fresh-cut kiwifruit slices. *Journal of the Food Science* 64: 433- 440.
3. Alvaro, J. E., S. Moreno, F. Dianez, M. Santos, G. Carrasco and M. Urrestarazu. 2009. Effects of per acetic acid disinfectant on the postharvest of some fresh vegetables. *Journal of Food Engineering* 95: 11-15.
4. Antunes, M. D. C., S. Dandlen, A. M. Cavaco and G. Miguel. 2010. Effects of postharvest application of 1-MCP and post cutting dip treatment on the quality and nutritional properties of fresh-cut kiwifruit. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 58: 173-618.
5. Abadias, M., I. Alegre, J. Usall, R. Torres and S. Vina. 2011. Evaluation of alternative sanitizers to chlorine disinfection for reducing food borne pathogen in fresh-cut apple. *Postharvest Biology and Technology* 59: 289-297.
6. Aday, S. M. and C. Caner. 2014. Individual and combined effect of ultrasound ozone and chlorine dioxide on strawberry storage life. *LWT-Food Science and Technology* 57: 344 -351.
7. Andrade, N. J. D., J. F. B. Jose and A. M. Ramose. 2014. Decontamination by ultrasound application in fresh fruits and vegetables. *Food Control* 45: 36-50.
8. Bermudez-Aguirre, D., T. Mobbs and G. V. Barbosa-Canovas. 2011. Ultrasound application in food processing, pp. 65-105, In: H. Feng, G. Barbosa-Cánovas and J. Weiss (Eds.), *Ultrasound Technologies for Food and Bioprocessing*. Springer Science & Business Media, New York.
9. Beirao-Da-Costa, S., M. C. Moura-Guedes, M. M. Ferreira-Pinto, J. Empis and M. Moldao-Martins. 2012. Alternative sanitizing methods to ensure safety and quality of fresh-cut kiwifruit. *Journal of Food Processing and Preservation* 38: 1-10.
10. Couture, R., M. I. Cantwell, D. Ke and J. M. E. Saltveit. 1993. Physiological attributes related to quality attributes and storage life of minimally processed lettuce. *HortScience* 28: 723-725.
11. Du, G., F. Limma and D. Liang. 2009. Antioxidant capacity and the relationship with polyphenol and vitamin C in *Actinidia* fruits. *Food Chemistry* 113: 557-562.
12. Escarpa, A. and M. Gonzalez. 2001. Approach to the content of total extractable phenolic compounds from different food samples by comparison of chromatographic and spectrophotometric methods. *Analytica Chimica Acta* 427: 119-127.
13. Elizaquivel, P., G. Sanchez., M. V. Salema and R. Aznar. 2012. Application of propidium monoazide-qPCR to evaluate the ultrasonic inactivation *Escherichia coli* 157: H7 in fresh cut vegetable wash water. *Food Microbiology* 30: 316-320.

14. Faniadis, D., P. D. Drogoudi and M. Vasilakakis. 2010. Effects of cultivar, orchard elevation, and storage on fruit quality characters of sweet cherry (*Prunus avium* L.). *Scientia Horticulturae* 125: 301-304.
15. Gogate, P. R. and A. M. Kabadi. 2009. A review of applications of cavitations in biochemical engineering/biotechnology. *Biochemical Engineering Journal* 44: 60-72.
16. Guillen, F., R. J. Ruiz-Jimenez, P. J. Zapata, M. Serrano, D. Vallero, D. Martinez-Romero and S. Castillo. 2014. Effect of oxalic acid on quality attributes of artichokes stored at ambient temperature. *Postharvest Biology and Technology* 95: 60-63.
17. Han, T., Y. Wang, L. Li and X. Ge. 2003. Effect of exogenous salicylic acid on postharvest physiology of peaches. *Acta Horticulturae* 628:583-589.
18. Hu, Z., S. Cao and B. Pang. 2010. Optimization postharvest ultrasonic treatment of strawberry fruit. *Postharvest Biology and Technology* 55: 150-153.
19. Huang, H., G. Jing, L. Guo, D. Zhang, B. Yang, X. Duan, M. Ashraf and Y. Jiang. 2013. Effect of oxalic acid on ripening attributes of banana fruit during storage. *Postharvest Biology and Technology* 84: 22-27.
20. Jiang, Y., L. Pen and J. Li. 2004. Use of citric acid for shelf life and quality maintenance of fresh-cut Chinese water chestnut. *Journal of Food Engineering* 63: 325-328.
21. Jeong, H. L., W. J. Jin, D. M. Kwang and J. P. Kee. 2008. Effects of anti-browning agents on poly phenol oxidase activity and total phenolics as related to browning of fresh-cut 'Fuji' apple. *ASEAN Food Journal* 15: 79-87.
22. Jiang, Y., H. Haung, G. Jing, L. Guo, D. Zhang, B. Yang, X. Duan and M. Ashraf. 2013. Effect of oxalic acid on ripening attributes of banana fruit during storage. *Postharvest Biology and Technology* 84: 22-27.
23. Lee, K. W., Y. J. Kim, D. O. Kim, H. J. Lee and Y. C. Lee. 2003. Major phenolics in apple and their contribution to the total antioxidant capacity. *Journal of Agriculture and Food Chemistry* 51: 6516-652.
24. Manolopoulou, H. and P. Papadopoulou. 1998. A study of respiratory and physico-chemical change of four Kiwifruit cultivar during cold-storage. *Food Chemistry* 63: 529-534.
25. Mao, L., G. Wang and F. Que. 2007. Application of 1- methylcyclopropan prior to cutting reduces wound responses and quality in cut kiwifruit. *Journal of Food Engineering* 78: 361- 365.
26. Oms-Oliu, G., M. A. Rojas Grau, L. A. Gonzalez, P. Varela, R. Saliva-Fortuny, M. I. Hernando, I. Perez-Munurea, S. Fiszman and O. Martin-Belloso. 2010. Recent approaches using chemical treatments to preserve quality of fresh-cut fruit: A review. *Postharvest Biology and Technology* 57:139-148.
27. Moo, D. K. and J. H. Jang. 2011. Inhibition of poly phenol oxidase and peroxidase activities on fresh-cut apple by simultaneous treatment of ultrasound and ascorbic acid. *Food Chemistry* 124: 444- 449.
28. Pilizota, V. and G. Sapers. 2004. Novel browning inhibitor formulation for fresh-cut apples. *Journal of Food Science* 69: 140-143.
29. Rice-Evans, C. A., N. J. Miller, P. G. Bolwell, P. M. Bramley and J. B. Pridham. 1995. The relative antioxidant activities of plant-derived polyphenolic flavonoids. *Free Radical Research* 22: 375- 383.
30. Rocha, A., C. Brochado and A. Morais. 1998. Influence of chemical treatment on quality of cut apple (cv. Jonagored). *Journal of Food Quality* 21: 13-28.
31. Rahemi, M. 2004. Postharvest: An Introduction to the Physiology and Handling of Fruit, Vegetables and Ornamentals (4th Edition). Shiraz University Press, Shiraz. (In Farsi).
32. Rastogi, N. 2011. Opportunities and challenges in application of ultrasound in food processing. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 51: 705-722.
33. Sapers, G. M. and K. B. Hicks. 1989. Inhibition of enzymatic browning in fruits and vegetables, pp. 29-43. In: J. J. Jen (Ed.), *Quality Factors of Fruits and Vegetables, Chemistry and Technology*. American Chemical Society. The University of Georgia. Georgia.
34. Sapers, G. M., K. B. Hicks, J. G. Phillips, L. Garzarella, D. L. Pondish, R. M. Matulaitis, T. J. McCormack, S. M. Sondey, P. A. Seib and Y. S. El-Atawy. 1989. Control of enzymatic browning in apple with ascorbic acid derivatives, polyphenol oxidase inhibitors, and complexing agents. *Food Science* 54: 997-1002.
35. Sapers, G. M., R. L. Miller, F. C. Miller, P. H. Cooke and S. Choi. 1994. Enzymatic browning control in minimally processed mushrooms. *Food Science* 59: 1042-1047.
36. Srivastava, M. K. and U. N. Dwivedi. 2000. Delayed ripening of banana fruit by salicylic acid. *Plant Science* 158: 87- 96.
37. Son, S. M., K. D. Moon and C. Y. Lee. 2001. Inhibitory effects of various anti browning agents on apple slices. *Food Chemistry* 73: 23-30.
38. Soliva-Fortuny, R., G. Oms-Oliu and O. Martin-Belloso. 2002. Effects of ripeness stages on the storage atmosphere, color and textural properties of minimally processed apple slices. *Food Science* 67: 1958-1962.
39. Soliva-Fortuny, R., P. Elez-Martinez and O. Martinez-Belloso. 2004. Microbiological and biochemical stability of fresh-cut apples preserved by modified atmosphere packaging. *Innovative Food Science and Emerging Technologies* 5: 215-224.

اثر تیمار اسیدهای آلی بهتنهایی یا همراه با امواج فرا صوت در افزایش ...

40. Simon, A., E. Gonzales and M. Vazquez. 2010. Effect of washing citric acid and packaging in modified atmosphere on the sensory and microbiological quality of sliced mushrooms. *Food Control* 21: 851-856.
41. Soria, A. C. and M. Villamiel. 2010. Effect of ultrasound on technological properties and bioactivity of food: a review. *Trends in Food Science and Technology* 21: 323-331.
42. Sagong, H. G., S. Y. Lee, P. S. Chang, S. Heu, Y. J. Choi. 2011. Combined effect of ultrasound and organic acids to reduce *Escherichia coli* o1 57:H7 *Salmonella Typhimurium* and *Listeria monocytogenes* on organic fresh lettuce. *Food Microbiology* 28: 287-292.
43. Toivonen, M. A. and A. D. Brummell. 2008. Biochemical bases of appearance and texture in fresh-cut fruit and vegetables. *Postharvest Biology and Technology* 48: 1-14.
44. Warrington, I. and G. Weston. 1990. Kiwifruit. *Food Chemistry* 96: 519-523.
45. Watada, A.E and L. Qi. 1999. Quality of fresh-cut produce. *Postharvest Biology and Technology* 15: 201 - 205.
46. Wang, Y. C., J. G. Buta. 2003. Maintaining quality of fresh-cut kiwifruit with volatile compounds. *Postharvest Biology and Technology* 28: 181-186.
47. Wang, Q., T. Lai, G. Qin and S. Tian. 2009. Response of jujube fruits to exogenous oxalic acid treatment based on proteomic analysis. *Plant and Cell Physiology* 50: 230-242.
48. Zheng, X. and S. Tian. 2006. Effect of oxalic acid on control of postharvest browning of litchi fruit. *Food Chemistry* 96: 519-523.
49. Zheng, X., S. Tian, M. J. Gidley, H. Yue and B. Li. 2007. Effects of exogenous oxalic acid on ripening and decay incidence in mango fruit during storage at room temperature. *Postharvest Biology and Technology* 45: 281-284.
50. Zheng, X., S. Tian, X. Meng and B. Li. 2007. Physiological and biochemical responses in peach fruit to oxalic acid treatment during storage at room temperature. *Food Chemistry* 140: 156-162.