

روابط آبی ساقه گل دهنده، جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده و کیفیت پس از  
برداشت گل شاخه بریده آلسترومیرا (*Alstroemeria hybrida 'Bordeaux'*)  
تحت تأثیر اسانس نعناع فلفلی و ساکارز

الهام جهانی‌فر<sup>۱</sup>، محمدجواد نظری‌دلجو<sup>۲\*</sup> و شهرام آرمیده<sup>۳</sup>

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۲۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۱/۴)

#### چکیده

بهبود جذب آب ساقه گل دهنده و کنترل آلدگی‌های باکتریایی محلول نگهدارنده گل‌های شاخه بریده طی دوره پس از برداشت یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای حفظ کیفیت و افزایش دوام عمر گل‌جایی گل‌های شاخه بریده بهویژه انواع ساقه‌های برگدار مانند آلسترومیرا، به‌دلیل سطح تعرق و اتلاف سریع تر آب می‌باشد. این پژوهش در راستای بررسی تأثیر اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ میلی‌گرم در لیتر) تؤام با ساکارز (۰، ۳ و ۶ درصد) بر جذب آب ساقه گل دهنده، پایداری غشای سلولی، عارضه زد برگی و کنترل جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده گل شاخه بریده آلسترومیرا در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار انجام پذیرفت. نتایج آزمایش بیانگر تأثیر معنی‌دار اسانس نعناع فلفلی (۶۰۰ میلی‌گرم در لیتر) و ساکارز (۶ درصد) بر افزایش جذب آب، پایداری غشای یاخته‌ای و رنگیزه‌های فتوستزی و کاهش آلدگی قارچی و باکتریایی محلول نگهدارنده و کنترل عارضه فیزیولوژیکی زرد شدن زود هنگام برگ‌ها و در نتیجه افزایش قابل توجه (۱۴ روز) عمر پس از برداشت نسبت به شاهد گردید. با توجه به نتایج آزمایش، کاربرد اسانس نعناع فلفلی به‌دلیل خاصیت ضد میکروبی ترکیبات اسانس مانند متون و متول و نیز ساکارز به‌دلیل تأمین مواد غذایی، در محلول‌های محافظ گل شاخه بریده آلسترومیرا توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی اسانس نعناع فلفلی، عمر گل‌جایی، آلدگی میکروبی، جذب آب

۱. مریم مدعو گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز شاهین‌دز، آذربایجان غربی

۲. استادیار، گروه مهندسی تولیدات گیاهی و علوم باگبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد

۳. استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی

\*. مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: nazarideljou@yahoo.com

**مقدمه**

جذب گل‌های شاخه‌بریده نرگس، اثرات انسانس را در این موارد بیشتر اعلام کردند. پژوهش طهماسبی‌نوترکی و همکاران (۲۰) در استفاده از غلظت‌های مختلف انسانس‌های گیاهی و نانوذرارات نقره بر عمر پس از برداشت گل بریده لیلیوم رقم روپینا نشان داد که انسانس‌های گیاهی بیشترین تأثیر را بر میزان جذب آب و افزایش وزن تازه داشت.

این تحقیق با توجه به اثرات مثبت انسانس‌های گیاهی در کنترل آلوگی‌های باکتریایی و بهویژه بررسی برهمکنش انسانس با کربوهیدرات‌های محلول نگهدارنده گل‌های شاخه‌بریده، تأثیر بر روابط آبی، کیفیت و عارضه زردبرگی گل شاخه‌بریده آسترومیریا به عنوان نهمین گل شاخه‌بریده (۱۰) طراحی و انجام شد.

**مواد و روش‌ها**

**نمونه‌های گیاهی، شرایط آزمایشگاهی و تیمارهای مورد بررسی**

این پژوهش در آزمایشگاه پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، طی سال ۱۳۹۰ انجام گردید. انسانس مورد نیاز از گیاهان برداشت شده نعناع فلفلی (در مرحله گل‌دهی) به عنوان یکی از پرکاربردترین گیاهان دارویی با اثرات آنتی‌باکتریایی قوی، توسط دستگاه انسانس‌گیری (Clevenger) استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات انسانس توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی Shimadzu، GC/MS- QP5050 (انجام (جدول ۱) و تا زمان انجام آزمایشات در یخچال با دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. گل‌های مورد آزمایش آزمایشگاه (Damai 'Bordeaux') از گلخانه‌ای استاندارد در شهرستان پاکدشت استان تهران تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه (Damai  $\pm$  ۲ درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی  $\pm$  ۶ درصد و شدت نور ۱۲ میکرومول در مترمربع در ثانیه با استفاده از لامپ‌های مهتابی و طول روز ۱۲ ساعت) از ارتفاع یکسان حدود ۴۵ سانتی‌متری کوتاه و یک سوم از برگ‌های

در شرایط یکسان طول عمر گل‌های شاخه‌بریده از گل‌های روی گیاه کمتر است. گل‌های شاخه‌بریده به‌ویژه انواع ساقه‌های برگ‌دار مانند آسترومیریا به‌دلیل سطح تعرق بیشتر، سریع‌تر آب خود را از دست داده و پلاسیده می‌شوند. رفع پیوستگی ستون آب در آوندها با هوا، آلوگی باکتریایی و کیفیت پایین آب از مهم‌ترین عوامل دخیل در کاهش جذب آب توسط ساقه گل‌دهنده طی دوره پس از برداشت می‌باشد (۲، ۳ و ۲۲).

تیمار و کاربرد پس از برداشت کربوهیدرات در محلول‌های نگهدارنده، تعادل آبی را در گل‌های بریده با تأثیر بر روی بسته شدن روزنه‌ها و کاهش در میزان از دست‌دهی آب بهبود می‌بخشد و این یکی از راههای حفظ کیفیت و افزایش عمر گل‌جایی گل‌های شاخه‌بریده می‌باشد (۶)، لیکن قندها علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز گل‌ها، منع غذایی مناسبی برای رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها و در نتیجه انسداد آوندی و نهایتاً کاهش جذب آب توسط ساقه گل‌دهنده می‌باشد (۴ و ۱۱). در همین راستا استفاده از ترکیبات شیمیایی علی‌رغم کنترل آلوگی‌های میکروبی محلول‌های نگهدارنده، تأثیر مخربی بر محیط‌زیست و سلامت مصرف‌کنندگان به‌همراه دارد. از این‌رو استفاده از ترکیبات طبیعی مانند انسانس‌های گیاهی می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای مورد استفاده در فیزیولوژی پس از برداشت گل‌های شاخه‌بریده باشد. خاصیت ضد میکروبی و آنتی‌بیوتیکی انسانس و عصاره نعناع فلفلی در مطالعات متعدد به اثبات رسیده است، حسنی و همکاران (۷) تأثیر انسانس‌های آویشن و زینیان را بر میزان کنترل آلوگی‌های قارچی در انگور معنی دار دانستند. کرمی‌اسبو و همکاران (۹) نیز در بررسی‌های خود نشان دادند که انسانس‌های آویشن و مرزه به‌خوبی از رشد باکتری اروپینیا آمیلوروا (عامل اصلی آتشک گلابی) در شرایط آزمایشگاه جلوگیری می‌کند. نتایج آزمایشات شنیور و همکاران (۱۸) در مقایسه بین اثرات انسانس آویشن با ۸-هیدروکسی کوئینولین سولفات در افزایش عمر پس از برداشت و میزان

## شاخص‌های مورد بررسی

## اندازه‌گیری رنگیزه‌های فتوستزی

بدین منظور ۰/۲۵ گرم برگ کاملاً توسعه یافته در محیطی تاریک و خنک باستفاده از استون ۸۰٪ هضم و سپس بهروش اسپکتروفوتومتری (PerkinElmer, Lambda 25, UV/Vis Spectrophotometer) جذب نمونه‌های حاصل در طول موج‌های ۶۴۵ و ۶۶۳ نانومتر قرائت و میزان کلروفیل a، b و کل از فرمول زیر محاسبه گردید.

(۵) و (۲۱).

(۱)

$$a = (0.0127 \times OD_{663}) + (0.00269 \times OD_{645})$$

(۲)

$$b = (0.0229 \times OD_{645}) + (0.00468 \times OD_{663})$$

$$\text{کلروفیل } b + \text{کلروفیل } a = \text{کلروفیل کل } (g/l) \quad (3)$$

## اندازه‌گیری مقدار محلول جذب شده

به منظور بررسی محلول جذب شده توسط ساقه گل دهنده، روزانه مقدار آب جذبی توسط هر ساقه به طور جداگانه ارزیابی و نهایتاً براساس رابطه ذیل مقادیر جذب آب به ازای هر گرم وزن تر در روز محاسبه گردید (۸).

$$\text{Solution uptake (ml day}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ fw}) = (S_{t-1} - S_t) / \text{wt0} \quad (4)$$

که در آن  $S_t$  = وزن آب داخل ظرف شیشه حاوی گل (g) در روز  $t-1$  و  $S_0$  = وزن آب داخل ظرف شیشه حاوی گل (g) در روز قبل،  $\text{wt}_0$  = وزن همان ساقه در روز اول در نهایت میانگین آب جذب شده طی ۸ روز برای هر رقم به صورت یک عدد محاسبه گردید.

## اندازه‌گیری طول عمر

طول عمر گل با مشاهده علائم پژمردگی، تغییر رنگ و ریزش گلبرگ‌ها که بازار پستندی گل‌ها را کاهش می‌دهد، قابل ارزیابی می‌باشد. بر این اساس طول عمر گل‌ها در هر تیمار به طور جداگانه بررسی و ثبت گردید. به طور کلی پژمردگی یا ریزش ۰/۵٪ از گل‌های یک شاخه به عنوان پایان

جدول ۱. مهم‌ترین ترکیبات اسانس گیاه داوری نعناع فلفلی

ترکیبات	درصد
beta-pinene	۰/۹۲
Limonene	۲/۱۲
1,8-Cineole	۴/۱۲
Menthol	۲۵/۱۷
Carvone	۱۱/۱۴
beta-Bourbonene	۰/۵
beta-Caryophyllene	۱/۸۶
Germacrene-D	۱/۵۵
Menthone	۱۳/۰۱
Pulegone	۰/۴۹
alpha-Humulene	۰/۳۷
trans-sabinenhydrate	۲/۱۵
Neodihydrocarveo	۲/۰۷
Neomenthol	۵/۸۵
beta-Farnesene	۰/۹۴
para-Cymene	۱/۳۴
Terpinene-4-ol	۳/۶۷

پایینی ساقه نیز حذف گردید. پس از آماده‌سازی و توزیع اولیه گل‌ها، ۴۰۰ میلی لیتر از تیمارهای مورد بررسی شامل غلظت‌های مختلف اسانس نعناع فلفلی (۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ و ۹۰۰ میلی گرم در لیتر)، ساکارز (۰، ۳ و ۶ درصد) و ترکیب سطوح مختلف اسانس و ساکارز به شیشه‌های یک لیتری منتقل گردیدند. با توجه به طرح آماری مورد استفاده در این پژوهش (آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار) در هر واحد آزمایشی سه شیشه و هر شیشه حاوی یک گل که مجموعاً ۹ گل در هر تیمار و ۱۰۸ شاخه گل در کل آزمایش مورد بررسی قرار گرفت.

میانگین نیز با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد و تجزیه واریانس داده‌های مربوطه با استفاده از نرم افزار SAS نسخه ۹/۱ انجام گردید.

### نتایج

**تأثیر اسانس نعناع فلفلی بر شاخص‌های پس از برداشت**

براساس نتایج تجزیه واریانس و مقایسات میانگین غلط‌های مختلف اسانس تأثیر معنی‌داری بر مقدار جذب آب، آلدگی باکتریایی و قارچی (جدول ۲)، کلروفیل a، b و کلروفیل کل (شکل ۱)، نشت الکتروولیت گلبرگ و طول عمر گل نشان دادند ( $P < 0.01$ ). بر همین اساس بیشترین جذب محلول توسط ساقه گل‌دهنده، کلروفیل a، b و کل و طول عمر در غلط‌ت ۶۰۰ میلی‌گرم در لیتر اسانس نعناع فلفلی و کمترین مقادیر در تیمار شاهد مشاهده گردید. هم‌چنین با توجه به (شکل ۲A) استفاده از اسانس منجر به افزایش دو برابری در طول عمر شده است. کمترین نشت الکتروولیت (شکل ۲B) و آلدگی‌های باکتریایی و قارچی در مقایسه با شاهد (بدون اسانس) در تیمارهای حاوی اسانس حاصل گردید.

**تأثیر ساکارز بر شاخص‌های پس از برداشت**

براساس نتایج مقایسات میانگین (جدول ۳) اختلافات معنی‌داری بین غلط‌های مختلف ساکارز بر تیمارها، به‌غیر از کلروفیل a، b و کل، وجود داشت؛ به‌طوری‌که با افزایش غلط ساکارز، کمترین درصد نشت یونی و بیشترین مقادیر آلدگی باکتریایی و قارچی (شکل ۳B)، جذب محلول، کلروفیل a، b کل و دوام عمر گل را در مقایسه با شاهد داشت ( $P < 0.05$ ). همان‌طوری‌که در (شکل ۳A) مشاهده می‌شود با افزایش کربوهیدرات‌یا همان ساکارز به عنوان منع تأمین انرژی، طول عمر در مقایسه با شاهد به‌ویژه در غلط ۶٪ به میزان ۲/۲۵ روز بیشتر شده است.

### اندازه‌گیری کلونی‌های باکتری و قارچ

جهت شمارش باکتری و قارچ با استفاده از تهیه رقت‌های متوالی (Serial Dilution) ۱ میلی‌لیتر از محلول‌های نگهداری گل با آب مقطر به حجم ۱۰ میلی‌لیتر رسید و سپس این کار ۷ بار تکرار گردید. در پایان ۱ میلی‌لیتر از محلول در زیر هود و شرایط استریل داخل محیط کشت آگار مغذی یا نوترینت آگار (NA) جهت رشد باکتری و هم‌چنین محیط کشت سیب‌زمینی یا دکستروز آگار (PDA) جهت رشد قارچ منتقل گردید. سپس نمونه‌ها به مدت ۴۲ ساعت درون انکوباتور در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده و نهایتاً کلونی باکتری و پرگن‌های قارچ با استفاده از دستگاه کلنی‌شمار (Colony counter) شمارش و تعداد باکتری و پرگن‌های قارچ‌ها بر حسب (CFU/ml) براساس فرمول زیر محاسبه گردید (۲۵).

$$(5) \quad \text{تعداد کلونی} \times \text{عکس رقت} = \text{تعداد کلونی در یک میلی‌لیتر از نمونه}$$


### اندازه‌گیری نشت یونی

بدین منظور از گلبرگ‌های هر تکرار نمونه‌هایی در اندازه‌های یک سانتی‌متری تهیی و پس از دو بار شستشو با آب دوبار تقطیر و انتقال به لوله‌های آزمایش حاوی آب دوبار تقطیر، هدایت الکتریکی نمونه‌ها توسط دستگاه هدایت الکتریکی سنج طی دو مرحله در شرایط آزمایشگاهی (EC<sub>1</sub>) و پس از قرار دادن نمونه‌ها در حمام آب گرم ترموستاتیک در ۹۵°C به مدت ۱۵ دقیقه (EC<sub>2</sub>)، درصد نشت الکتروولیت یا نشت یونی به‌روش ذیل انجام گردید (۶).


$$(6) \quad \text{Ion leakage (percentage)} = (\text{EC}_1/\text{EC}_2) \times 100$$

### طرح آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها

طرح آماری مورد استفاده در این پژوهش براساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار و مقایسات



شکل ۱. تأثیر اسانس نعناع فلفلی بر کلروفیل a، b و کل گل شاخه بریده آلسترومریا رقم Bordeaux (حروف غیر مشابه نمودار بیانگر اختلاف معنی دار براساس آزمون چند دامنه ای دانکن ( $P < 0.05$ ) می باشد).



شکل ۲. تأثیر اسانس نعناع فلفلی بر دوام عمر (A) و نشت الکتروولیت گلبرگ (B) گل شاخه بریده آلسترومریا رقم Bordeaux (حروف غیر مشابه و میله های روی ستون ها (Error Bars) به ترتیب بیانگر اختلاف معنی دار براساس آزمون چند دامنه ای دانکن ( $P < 0.05$ ) و خطای استاندارد (Mean  $\pm$  SEM) (Mean  $\pm$  SEM) می باشد).

در ارتباط با آلودگی باکتریایی و قارچی، روند آلودگی در تیمارهای شاهد (بدون اسانس) بدین ترتیب بود که با افزایش غلظت ساکارز به  $6$  و  $3$  درصد، افزایش آلودگی قارچی و باکتریایی چشمگیر مشاهده گردید (شکل ۵).

اثرات متقابل اسانس نعناع فلفلی و ساکارز بر شاخص های پس از برداشت

طبق مقایسات میانگین (جدول ۴)، تفاوت های معنی داری بین تیمارهای مورد بررسی مشاهده گردید؛ بر همین اساس با افزایش درصد ساکارز و غلظت اسانس در محلول نگهدارنده تا  $600$  میلی گرم در لیتر منجر به کاهش نشت یونی و افزایش جذب محلول و طول عمر (شکل ۴) گردید، ولی با افزایش غلظت اسانس به  $900$  میلی گرم در لیتر این روند نزولی گردید؛ با این حال در مقایسه با شاهد درصد نشت یونی کمتر و جذب محلول، کلروفیل a، b، کل و طول عمر بیشتری نشان داد.

## بحث

جذب آب توسط آوندها اهمیت زیادی در فراهم نمودن مقدار آب کافی برای ساقه های بریده در حال تعرق دارد (۲۴). براساس نتایج آزمایش افزایش غلظت اسانس نعناع فلفلی تا  $600$  میلی گرم در لیتر منجر به حصول نتایج مثبت در اکثر

جدول ۲. مقایسه میانگین تأثیر غلظت‌های مختلف اسانس نعناع فلفلی بر جمعیت میکروبی و

## جذب محلول گل شاخه‌بریده آلتسترومیرا رقم Bordeaux


قارچ (CFU/ml)	باکتری (CFU/ml)	جذب محلول (ml/gFW/d)	اسانس نعناع فلفلی (mg/l)
۱۲۷۴۴۴۴۴۴ <sup>a</sup>	۱۱۰۶۶۶۶۶۷ <sup>a</sup>	۰/۱۷۱ <sup>c</sup>	۰ (شاهد)
۶۰۶۶۶۶۶۷ <sup>c</sup>	۶۷۲۲۲۲۲۲ <sup>c</sup>	۰/۲۲۱ <sup>a</sup>	۳۰۰
۲۶۱۱۱۱۱۱ <sup>d</sup>	۳۵۷۷۷۷۷۸ <sup>d</sup>	۰/۲۳۲ <sup>a</sup>	۶۰۰
۹۴۷۷۷۷۷۷ <sup>b</sup>	۹۴۵۵۵۵۵۶ <sup>b</sup>	۰/۱۹۲ <sup>b</sup>	۹۰۰

میانگین‌هایی که در ستون با حروف مشترک مشخص شده‌اند، با یکدیگر اختلاف معنی‌داری براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ ندارند.

جدول ۳. مقایسه میانگین تأثیر ساکارز بر شاخص‌های اندازه‌گیری شده گل شاخه‌بریده آلتسترومیرا رقم Bordeaux

کلروفیل کل (g/L)	b کلروفیل (g/L)	a کلروفیل (g/L)	نشت یونی (٪)	جذب محلول (ml/gFW/d)	تیمار (ساکارز) (٪)
۰/۰۰۳۱ <sup>a</sup>	۰/۰۰۱۶ <sup>a</sup>	۰/۰۰۱۴ <sup>a</sup>	۱۸/۲۵ <sup>a</sup>	۰/۳۰ <sup>b</sup>	۰ (شاهد)
۰/۰۰۳۴ <sup>a</sup>	۰/۰۰۱۹ <sup>a</sup>	۰/۰۰۱۵ <sup>a</sup>	۱۷/۱۲ <sup>ab</sup>	۰/۳۴ <sup>ab</sup>	۳
۰/۰۰۳۷ <sup>a</sup>	۰/۰۰۲۱ <sup>a</sup>	۰/۰۰۱۶ <sup>a</sup>	۱۵/۹۱ <sup>b</sup>	۰/۳۹ <sup>a</sup>	۶

میانگین‌هایی که در ستون با حروف مشترک مشخص شده‌اند، با یکدیگر اختلاف معنی‌داری براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ ندارند.



شکل ۳. تأثیر ساکارز بر دوام عمر (A) و آلدگی قارچی و باکتریایی محلول نگهداری (B) گل شاخه‌بریده آلتسترومیرا . Bordeaux .  
حروف غیر مشابه و میله‌های روی ستون‌ها (Error Bars) به ترتیب بیانگر اختلاف معنی‌دار براساس آزمون چند دامنه‌ای  
دانکن ( $P < 0.05$ ) و خطای استاندارد (Mean  $\pm$  SEM) می‌باشد.


## روابط آبی ساقه گل دهنده، جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده و کیفیت ...

جدول ۴. مقایسات میانگین اثرات متقابل اسانس نعناع فلفلی و ساکارز بر نشت یونی، جذب محلول و رنگیزه‌های فتوسترزی

## گل بریده آلسترومریا رقم Bordeaux

اسانس (ppm)	ساکارز (%)	نشت یونی (%)	جذب محلول (g/l)	کلروفیل a (g/l)	کلروفیل b (g/l)	کلروفیل کل (g/l)
۰	۰	$2 \times 10^{-7}$ f	۲۵/۲۳ <sup>a</sup>	۰/۰۰۰۴f	۰/۰۰۰۴g	۰/۰۰۰۸f
۳	۳	$3 \times 10^{-7}$ f	۲۲/۹۷ <sup>ab</sup>	۰/۰۰۰۷ef	۰/۰۰۰۷fg	۰/۰۰۱۵ef
۶	۶	$3/9 \times 10^{-7}$ f	۲۲/۰۶ <sup>ab</sup>	۰/۰۰۰۸ef	۰/۰۰۰۹efg	۰/۰۰۱۷ef
۰	۰	$1/3 \times 10^{-7}$ cd	۱۶/۵۰ <sup>c</sup>	۰/۰۰۱۷bcd	۰/۰۰۲۰cd	۰/۰۰۳۷cd
۳	۳	$1/1 \times 10^{-6}$ c	۱۵/۷۷ <sup>cd</sup>	۰/۰۰۱۸bc	۰/۰۰۲۲bc	۰/۰۰۴۰bc
۳۰۰	۳۰۰	$1/5 \times 10^{-6}$ bc	۱۵/۶۰ <sup>cd</sup>	۰/۰۰۱۸bc	۰/۰۰۲۲bc	۰/۰۰۴۱bc
۶۰۰	۶۰۰	$1/8 \times 10^{-6}$ b	۱۱/۵۳ <sup>de</sup>	۰/۰۰۲۴ab	۰/۰۰۳۰ab	۰/۰۰۵۴ab
۳	۳	$2/3 \times 10^{-6}$ a	۱۰/۷۰ <sup>e</sup>	۰/۰۰۲۵ab	۰/۰۰۳۲a	۰/۰۰۵۷a
۶	۶	$2/6 \times 10^{-6}$ a	۷/۶۶ <sup>e</sup>	۰/۰۰۲۷a	۰/۰۰۳۵a	۰/۰۰۶۲a
۰	۰	$5/1 \times 10^{-6}$ ef	۱۹/۷۶ <sup>bc</sup>	۰/۰۰۱۰def	۰/۰۰۱۲defg	۰/۰۰۲۲def
۹۰۰	۹۰۰	$6/1 \times 10^{-6}$ ef	۱۹/۱۳ <sup>bc</sup>	۰/۰۰۱۲cde	۰/۰۰۱۴cdef	۰/۰۰۲۶de
۶	۶	$9 \times 10^{-7}$ de	۱۸/۳۳ <sup>bc</sup>	۰/۰۰۱۳cde	۰/۰۰۱۷cde	۰/۰۰۳۱cde


میانگین‌هایی که در ستون با حروف مشترک مشخص شده‌اند، با یکدیگر اختلاف معنی‌داری براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ ندارند.




شکل ۴. اثر اسانس نعناع فلفلی (میلی گرم در لیتر) و ساکارز (درصد) بر طول عمر گل شاخه‌بریده آلسترومریا رقم Bordeaux. (حروف غیر مشابه و میله‌های روی ستون‌ها (Error Bars) به ترتیب بیانگر اختلاف معنی‌دار براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن ( $P < 0.05$ ) و خطای استاندارد (Mean  $\pm$  SEM) می‌باشد).

مهمی در رفع انسداد بافت آوندی گل‌های شاخه‌بریده گیاهان دارند (۲۳). رابطه مستقیم داشت (شکل ۶). نتایج این آزمایش با نتایج بصیری و همکاران (۱) مبنی بر معنی‌دار بودن کاهش

شاخص‌های پس از برداشت از جمله طول عمر گردید که این امر با کاهش رشد کلونی قارچ و باکتری به دلیل مواد ضد باکتریایی اسانس مانند متون، متول و غیره (جدول ۱) که نقش



شکل ۵. تأثیر اسانس نعناع فلفلی (میلی گرم در لیتر) و ساکارز (درصد) بر جمعیت قارچی و باکتریایی محلول نگهداری گل آلسترومریا رقم Bordeaux. (حروف غیر مشابه و میله‌های روی ستونها (Error Bars) به ترتیب یانگر اختلاف معنی دار براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن (Mean  $\pm$  SEM) ( $P < 0.05$ ) و خطای استاندارد (P) می‌باشد).




شکل ۶. رابطه بین طول عمر گل با میزان آلوودگی قارچی و باکتریایی محلول نگهدارنده گل شاخه‌بریده آلسترومریا رقم Bordeaux تحت اسانس توأم با ساکارز. (میله‌های روی نمودار (Error Bars) یانگر خطای استاندارد (Mean  $\pm$  SEM) می‌باشد).

و تعادل آبی، سنتز دیواره سلولی و با تأثیر بر بسته شدن روزنه‌ها و کاهش در میزان از دست‌دهی آب، دوام عمر گل‌جایی گل‌های شاخه‌بریده را بهبود می‌بخشد (۶). براساس نتایج آزمایش ارتباط مستقیمی بین طول عمر گل شاخه‌بریده آلسترومریا و درصد تأمین ساکارز در محلول نگهدارنده مشاهده گردید (شکل ۷)، که با نتایج محمدخانی و روحی (۱۲) مطابقت دارد. تخریب کلروفیل برگ‌ها طی دوره پس از برداشت تأثیر مهمی در کاهش طول عمر گل‌های شاخه‌بریده دارد. حفظ

تجمع باکتری در اثر استفاده کردن از غلاظت‌های مختلف اسانس رزماری نسبت به تیمار شاهد به دست آمده بود، مطابقت دارد. اما استفاده از غلاظت ۹۰۰ میلی گرم در لیتر اسانس احتمالاً به علت سمیت ناشی از غلاظت زیاد منجر به لهیگی، انسداد آوندی و افزایش میزان آلوودگی قارچی و باکتریایی موجب کاهش این روند گردیده است که با مطالعات رخشانی (۱۷) منطبق است.

ساکارز در بیشتر محلول‌های نگهدارنده به دلیل ایجاد توازن



شکل ۷. رابطه بین عمر گل‌جای و محلول جذب شده توسط ساقه گل دهنده آلتزومریا رقم Bordeaux تحت تأثیر درصدهای مختلف ساکارز محلول نگهدارنده. (میله‌های روی نمودار (Error Bars) بیانگر خطای استاندارد (Mean  $\pm$  SEM) می‌باشد).

کلروفیل، نشت یونی، میزان قند ساقه، انسداد آوندی در نتیجه آلودگی‌های میکروبی و غیره بستگی دارد که در این آزمایش انسانس‌ها با تأثیر گذاشتن بر عوامل دخیل در افزایش دوام عمر گل، موجب افزایش طول عمر گل شاخه‌بریده شدند که روند تغییرات طول عمر در تیمار نعناع فلفلی به ترتیب ۶۰۰ و ۳۰۰، ۹۰۰ و ۰ میلی گرم در لیتر بود، به عبارتی بالاترین دوام عمر آلتزومریا در غلظت ۶۰۰ میلی گرم در لیتر نعناع فلفلی مشاهده گردید که در مقایسه با شاهد به مدت ۱۴ روز افزایش بیشتری را نشان داد. گزارشات سلگی (۱۹) معنی دار بودن تأثیر انسانس آویشن با غایی و شیرازی بر شاخص‌های کیفی پس از برداشت از جمله افزایش ۲ - ۱/۷ برابری عمر گل‌جایی گل بریدنی ژربرا را نشان داد. همچنین تحقیقات موسوی و تهرانی فر (۱۳) در بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اتانول، متانول و انسانس‌های گیاهی بیانگر بهبود دوام عمر گل آلتزومریا به مدت ۶ - ۷/۵ روز بود.

### نتیجه گیری

در این تحقیق تمامی سطوح تیماری نسبت به تیمار شاهد موجب افزایش معنی‌داری در کیفیت پس از برداشت گل آلتزومریا رقم Bordeaux گردید؛ بر همین اساس انسانس نعناع فلفلی با غلظت ۶۰۰ میلی گرم در لیتر و ساکارز ۶ درصد در بین

کلروفیل منجر به سبز ماندن برگ و در نتیجه کاهش عارضه زرد برگی آلتزومریا به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات این گل شده است. در نتایج این پژوهش مقدار کلروفیل تحت تأثیر انسانس معنی‌دار بود، انسانس‌ها احتمالاً با جلوگیری از فعالیت آنزیم‌های کلروفیل اکسیداز مانع تجزیه کلروفیل شده و سبب حفظ رنگ سبز برگ‌های گیاه می‌شوند؛ بدین معنی که انسانس موجب حفظ کلروفیل نسبت به تیمار شاهد گردیده است. میزان کلروفیل a و b کل در تیمار با انسانس نعناع فلفلی در غلظت ۶۰۰ میلی گرم در لیتر بیشترین بود که با استنتاج‌های بصیری و همکاران (۱) در بررسی اثر انسانس رزماری بر خصوصیات کیفی پس از برداشت گل‌های شاخه‌بریده میخواست که بیشترین محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل در تیمار انسانس رزماری با غلظت ۲۵٪ و کمترین مقدار در تیمارهای شاهد مشاهده کردند، مطابقت دارد. بالاترین میزان کلروفیل a و b کل مربوط به تیمار ۶ درصد ساکارز و کمترین در تیمار شاهد مشاهده شد که با گزارشات نقی لو و همکاران (۱۵) که افزایش ماندگاری گل، محتوای نسبی آب، میزان کلروفیل و همچنین کاهش درصد زردی برگ‌ها را در بالاترین تیمار ساکارز به همراه بنزیل آدنین و سولفات آلمینیوم روی گل‌های آلتزومریا نشان دادند، منطبق است. طول عمر یک گل شاخه‌بریده به عواملی همچون رقم، نوع محلول نگهداری، میزان جذب محلول، میزان

حفظ غشاء سلولی توسط ساکارز و اسانس به عنوان یک عامل ضد میکروبی می‌باشد.

سایر سطوح اسانس و ساکارز، بالاترین تأثیر را در افزایش ماندگاری و شاخص‌های پس از برداشت گل آسترومیرا رقم Bordeaux نشان دادند که این امر بدلیل تأمین مواد غذایی و

### منابع مورد استفاده

- Basiri, Y., H. Zarei, K. Mashayekhy and M. H. Pahlavany. 2011. Effect of rosemary extract on vase life and some qualitative characteristics of cut carnation flowers (*Dianthus caryophyllus* cv. 'white librity'). *Journal of Stored Products and Postharvest Research* 2(14): 261-265.
- Ebrahimzadeh A. and Y. Seyfi. 1999. (Translation) Storage and Handling of Cut Flowers, Ornamental Greenery and Potted Plants. Akhtar's Publications. (In Farsi).
- Edrisi, B. 2002. Water Relations of Cut Flowers. Flowers and Ornamental Plants Research Institute of Iran. Publications of Agricultural Research Center of Markazi Province. Markazi. (In Farsi).
- Elgimabi, M. N. and K. Ahmedo. 2002. Effects of bactericides and sucrose-pulsing on vase life of rose cut flowers (*Rosa hybrida*). *Botany Research International* 2 (3): 164-168.
- Gross, J. 1991. Pigments in Vegetables: Chlorophylls and Carotenoids. Van.Nostrand Reinhold, New York.
- Halevy, A. H. and S. Mayak. 1979. Senescence and postharvest physiology of cut flowers. Part 1. *Horticultural Review* (1): 204-236.
- Hasani, A., R. Jalili and Y. Ghosta. 2008. Effect of vegetable oils in controlling the growth of fungus *Botrytis cinerea* on pear during cold storage. In: Proceeding of the 5<sup>th</sup> Iranian Horticultural Science Congress. Fars, Iran. pp. 85-94. (In Farsi).
- He, S., D. C. Joycev, D. E. Irving and J. D. Faragher. 2006. Stem end blockage in cut Grevillea 'Crimson Yul-lo' inflorescences. *Postharvest Biology and Technology* 41: 78-84.
- Karamiosbo, R., M. Khodaverdi and F. Aliakbari. 2010. The main components of the essential oil of thyme and savory antibacterial effect on bacteria (*Erwinia amylovora*). *Plant Diseases* 45: 45-35. (In Farsi).
- Lim, S. S., S. I. Lee, S. C. Kang and J. B. Kim. 2012. Alstroemeria plants and its biotechnological applications. *Journal of Plant Biotechnology* 39:219–224.
- Moghadam, M., R. Omid Beygi, N. Yazdani and N. Asgari Raberi. 2008. Evaluation of antifungal secondary metabolites obtained from some medicinal plants against fungal *Macrophomina phaseolina*. In: Proceeding of the 5<sup>th</sup> Iranian Horticultural Science Congress. Fars, Iran. (In Farsi).
- Mohamadkhani, A. R. and V. Rohi. 2010. Effect of sucrose aluminum sulfate and citric acid on the longevity of cut flowers, roses Yrdasht. In: Proceeding of the 6<sup>th</sup> Iranian Horticultural Science Congress. Guilan, Iran. (In Farsi).
- Mousavibazaz, A. and A. Tehranifar. 2011. Effect of ethanol, methanol and essential oils as novel agents to improve vase-life of Alstroemeria flowers. *Journal of Environmental Biology* 5(14): 41-46.
- Mutui, T. M., V. E. Emongor and M. J. Hutchinson. 2001. Effect of accel on the vase life and postharvest quality of Alstroemeria (*Alstroemeria aurantiaca* L.) cut flowers. *African Journal of Science and Technology* 2: 82-88.
- Naghilo, S., S. R. Mortazavi, A. Nabigol and H. Zeynali. 2010. Effects of various physiological factors on the vase life cut flowers *Alstroemeria* cv. Pronus. In: Proceeding of the 6<sup>th</sup> Iranian Horticultural Science Congress. Guilan, Iran. (In Farsi).
- Pun, U. K., H. Shimizu, K. Tanase and K. Ichimura. 2005. Effect of sucrose on ethylene biosynthesis in cut spray carnation flowers. *Acta Horticulturae* 669: 171-174.
- Rakhshani, A. 2002. Agricultural Toxicology Principles (Pesticides). Comprehensive Culture Publishing of Tehran, Tehran. (In Farsi).
- Sheniyor, S., A. H. Abotalebi and A. R. Zakerian. 2010. Effects of thyme essential oil and 8 - Hydroxyquinoline sulfate on increase postharvest life of amaryllis. In: Proceeding of the 6<sup>th</sup> Iranian Horticultural Science Congress. Guilan, Iran. (In Farsi).
- Solgi, M. 2010. Effect of silver nanoparticles and thyme essential oils on postharvest quality of gerbera cut flower cultivars. PhD. Thesis, Tehran University, Tehran, Iran.
- Tahmasebinotorki, A., A. Alizadeh, A. Abotalebi and M. Zadeh bagher. 2012. Effect of plant essential oils and silver nanoparticles on the postharvest life of cut flowers *Lilium* (*Lilium 'Robina'*). In: Proceedings of the National Conference on Advances in Agronomy. Ghods Azad University. Ghods, Iran. (In Farsi).
- Turner, N. C. 1981. Techniques and experimental approaches for the measurement of plant water status. *Plant and Soil* 58(1): 339-366.

روابط آبی ساقه گل دهنده، جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده و کیفیت ...

---

---

22. Van Doorn, W. G. and K. Hort. 1994. Interaction between the effects of bacteria and dry storage on the opening and water relations of cut Rosa flower. *Journal of Applied Bacteriology* 77: 644-649.
23. Wilkins, H. F. 2002. Basic considerations for the postharvest care of cut flowers. *Horticultural Science* 38: 85-92.
24. Williamson, V. G., J. D. Faragher, S. Parsonsand and P. Franz. 2002. Inhibiting the Postharvest Wound Response in Wildflowers. Rural Industries Research and Development Corporation (RIRDC), Publication No. 02/114, Australia.
25. Yu, E. W., Q. Zhangand and M. H. Brown. 2013. Microbial Efflux Pumps, Iowa State University, Iowa, United States.