

مُوحَّد مُختَلِفٌ آلوئهٌ خَيْ فَرَا سِنْجَهٌ خَيْ، بِيوشِيمَايِي
در مدل جوجه

علی مهدوی^۱(Ph.D)، مرتضی صابری^۲(M.Sc)، غلامعلی جلودار^۳(Ph.D)، ابراهیم شهروزیان^۴(Ph.D)^{**}

- ۱- گروه بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 - ۲- گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 - ۳- گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حکیمہ

حیف: «اگر این اثرات تجویز خوراک» تسلیم مختلف ژل آلوئه-ای خانی فراسنجه‌ای همان‌جا نداشتند. این اثرات ریکی در مدل جوچه انجام گرفت.

جهه ری: خانلر ۱/۱۰ آلوئه - غذایی، احتمالاً ورال را تحریک می‌نماید.
جهه ری: خانلر ۱/۱۰ آلوئه - برای مقابله با عوامل عفوونی اضافه شود.

ازه ۱۲۵- کلیدی: آئندہ اموری سلوالی - وجہا

در هر زمان وجود داشته باشد. استفاده از آنتی بیوتیک ها و واکسن ها، راه حل هایی هستند که امروزه پرورش دهنده گان در چنین شرایطی از آن ها استفاده می کنند. لیکن این سازی و افزایش مقاومت گله در برابر تمامی اجرام بیماری زا امکان پذیر نیست. در بعضی موارد مثل مایکوپلاسمها و واکسن ها، این مطلب را ایجاد نمی کنند و در بعضی موارد هنوز واکسن

مقدمة

عوارض ناشی از باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها و ترکیبات سمی‌الزاماً به صورت بیماری بروز نکرده و ممکن است بر روی سیستم ایمنی تأثیر گذاشته و موجب اختلال در رشد شوند [۱]. عدم وجود نظارت بر سلامت اقلام خوراکی در صنعت طبیور سبب شده است که احتمال ورود اجرام بیماری‌زا

اما مدل‌های دیگری نیز هستند که به دلایل سهولت دسترسی و پژوهشی و پژوهش‌های خاص مورد توجه هستند. پرنده‌گان از جمله جوجه‌های مرغ از جمله مدل‌هایی هستند که در تحقیقات زیست پزشکی شامل آترواسکلروزیس، تغذیه، جراحی، سنجش اینمی، تست‌های سمیت و کشاورزی مورد مطالعه قرار می‌گیرند [۷].

گیاه دارویی آلوئه‌ورا با توجه به خواص آن، به نظر می‌رسد بر عمل کرد اینمی و ضریب تبدیل پرنده اثر داشته باشد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی عمل کرد سیستم اینمی (همورال و سلولی) به منظور افزودنی رشد و تحریک‌کننده اینمی سلولی و همورال برای مقابله با بیماری‌های عفونی (ویروسی و باکتریایی و انگلی) می‌باشد.

مواد و روش‌ها

۱- اثرا و مدیر...، جوجه‌های گوشتی این مطالعه در دانشکده دام‌پزشکی دانشگاه سمنان و بر اساس دستورالعمل قوانین رفاهی حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دام‌پزشکی دنشگاه سمنان انجام گردید. همه جوجه‌ها در قفس‌های ۱/۵*۱ که کف آن‌ها با تراشه‌های چوب پوشیده شده بود، و تحت شرایط مدیریت استاندارد جاده‌ی حیوانات بودند، قرار گرفتند. تعداد دویست و چهل جوجه گوشتی یک روزه نژاد راس ۳۰۸ از جوجه‌کشی محلی تهیه شد و به صورت کاملاً اتفاقی به پنج گروه با چهار تکرار تقسیم شدند. گروه‌ها شامل گروه کنترل (جیره پایه بدون افزودنی‌ها به جیره)، گروه بعدی (جیره پایه مخلوط با ویرجینیامايسین (gr/kg diet) ۰/۱) و برای سه گروه دیگر یک، دو و سه درصد ژل آلوئه‌ورا به جیره اضافه شد. جیره گروه‌های آزمایشی از روز ۱ تا ۴۲ در اختیار جوجه‌ها قرار گرفتند. نیازهای تغذیه‌ای جوجه‌های گوشتی به صورت آزاد در دوره‌های مختلف آزمایشی: دوره رشد (۰ تا ۱۰)، دوره رشد (۱۱ تا ۲۴) و دوره پایانی (۲۵ تا ۴۲) از جداولی که آب و غذا را برای جوجه‌های راس ۳۰۸ فراهم کرده بود، استخراج گردید. جوجه‌ها با برنامه واکسیناسیون معمول تلقیح شدند. برنامه نوردهی ۲۳ ساعت روشنایی و ۱

مؤثری ساخته نشده است. مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها نیز علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد مقاومت میکروبی، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان این تولیدات را نیز به خطر اندازد. با توجه به محدودیت‌های موجود در راه حل‌های پیشنهاد شده، لازم است روش جایگزین و مناسبی که موانع روش‌های قبلی را نداشته باشد، ارائه گردد. تحریک سیستم اینمی طیور روش مناسبی برای مبارزه با اجرام بیماری‌زا است که از راه‌های مختلف وارد گله‌های طیور می‌شوند. چندین تغییر کننده اینمی سنتزی و طبیعی برای تنظیم پاسخ‌های اینمی وجود دارد که باعث بهبود عمل کرد تولید پرنده می‌شود. به دلیل این‌که تولیدات طیور به مصرف مستقیم انسان می‌رسد، بیشترین تمايل به مصرف ترکیبات طبیعی و گیاهی وجود دارد. تغییر کننده‌های اینمی گیاهی، به دلیل در دسترس بودن فراوان آن‌ها، فرآوری آسان، کارایی قوی و حداقل مقدار باقیمانده در محصولات دائمی مورد مصرف انسان، ایده‌آل هستند [۴-۲]. یکی از این ترکیبات گیاهی و طبیعی، استفاده از ژل آلوئه‌وار است. آلوئه‌ورا گیاه بومی آفریقای شمالی و متعلق به خانواده لیلیاسه ۲ می‌باشد که گیاهی با برگ‌های گوشتی ضخیم است. در ترکیب شیمیایی این گیاه، پلی‌ساقاریدهای محلول در آب، پیش‌ساخت‌های پروستاگلاندین‌ها، ویتامین‌های A، C و E، ساپونین، استرونول‌های گیاهی و اسیدهای آمینه یافت می‌شود. معروفیت تاریخی این گیاه به دلیل اثرات درمانی و مکمل غذایی می‌باشد. آلوئه‌ورا از گیاهان دارویی است که برای درمان التهاب، بهبود سوختگی، تحریک و تقویت و تغییر سیستم اینمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فعالیت‌های تغییر عضلانی ۵۰۰ میکروگرم (به ازای هر جوجه داده‌اند که تزریق عضلانی آزمایشات *in vitro* نشان ۲ ماهه) آسمانان می‌تواند اثر و دوام ظرفیت فعالیت ماکروفازهای سیستم اینمی را افزایش دهد [۶].

در تحقیقات زیست پزشکی از مدل‌های متنوع حیوانی برای مطالعات تجربی استفاده می‌شود. عمدۀ این پژوهش‌ها روی جوندگان از جمله موش سوری و رت انجام می‌پذیرد.

معنی دار بود ($P < 0.05$), و در گروه های دیگر اختلاف معنی دار، مشاهده نشد (حداکثر ۱).

نتایج فاکتورهای خونی در ۲۸ روزگی: اثر مقادیر مختلف آلوئورا روی مقادیر گلوكز نسبت به گروه شاهد معنی دار گزارش شد ($P < 0.05$) و در دیگر فراسنجه ها نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری رویت نشد (جدول ۲).

نتایج فاکتورهای خونی در ۴۲ روزگی: در بررسی روز ۴۲، اثر مقادیر مختلف آلوئهورا روی مقدار گلوكز نسبت به گروه شاهد معنی دار بود ($P < 0.05$). و در دیگر فراسنجه ها در چهار گروه نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری مشاهده شد (جدول ۳).

۱۱۱- سلول های نمید خون

نحویت در این تحقیق اثر مقادیر مختلف آلوئیدها بر تعداد لنفوسیت، هتروفیل و مونوسیت نسبت به گروه شاهد معنی دار بود ($P < 0.05$). ولی در اوزینوفیل و بازووفیل اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نسبت هتروفیل به لنفوسیت در بعضی گروهها نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری به دست آمد.

نحوه سیت اثر مقادیر مختلف آلئهورا بر تعداد لنفوسيت، مونوسیت و بازوفیل در هیچ کدام از گروهها معنی دار نبود، و در تعداد هتروفیل و ائوزینوفیل اختلاف معنی داری به دست آمد. در نسبت هتروفیل به لنفوسيت اختلاف معنی داری نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید. ($P < 0.05$). (جدول ۵).

SRBC Sheep Red Blood Cell (بُو ط بہ اے اے)

۱۰۷ مزگو سفند)

SRBC Base (۰۰۱۱ تزریق) با توجه به این موضوع که،

از قبل هیچ گونه تزریق گلbul قرمز گوسفند وجود نداشت، در این مرحله باید این انتظار وجود داشته باشد که آتنی بادی بر علیه گلbul قرمز گوسفند ترشح نشده باشد. بنابراین در هیچ کدام از گروه‌ها اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. (جدول

(۹)

۱۰- مختلط ژل آلوئه را خ فرستنده‌ای...

ساعت تاریکی بود. برای افزایش دمای سالن از بخاری‌های اتوماتیک استفاده شد. دمای اولیه ۳۳ درجه سانتی‌گراد بود که به تدریج بر اساس استاندارد پرورشی کاهش یافت. فراسنجه‌های کنترل مثل دما، رطوبت، نور، تهویه و واکسیناسیون در همه گروه‌ها مشابه بود.

ژل آوئهورا (بی رنگ، بدون بار میکروبی و pH=۴/۴۹) از شرکت باریج اسانس خریداری شد. دان با ژل آلوئهورا مخلوط شد و سپس در آغاز هر دوره پرورشی (آغازین، رشد و پایانی) با آن تغذیه می شدند. در ابتدا ژل آلوئهورا با سویا مخلوط می شد و سپس ذرت و افزودنی ای دیگر اضافه می شد. نسخه بوشیمیابی نمونه های خون از دو جوجه در هر گروه در روزهای ۱۴، ۲۸ و ۴۲ از طریق ورید بال برای آنالیز بیوشیمیابی گرفته شد [۸]. بلافضله، سرم برای اندازه گیری پروتئین تام، گلوكر، آلبومین، آلكالین فسفاتاز با استفاده از کیت پارس آزمون به روش رنگ سنجی جدا شد و تا زمان سنجش در ۲۰- نگهداری شد.

پاسخ‌های اینترنتی

ش. ا. سلول های سفید خون نمونه های خون از دو جوجه در هر گروه در روزهای ۱۴، ۲۸ و ۴۲ برای شمارش سلول های سفید خون (مفوسیت، هتروفیل، مونوسیت، آئوزینوفیل، بازو فیل و نسبت لمفوسیت به مونوسیت) گرفته شد. برای ارزیابی پاسخ همورال، تیتر آنتی بادی آنتی SRBC با استفاده از تست هماگلوبلیناسیون بر اساس روش توصیف شده به وسیله سیگل و گراس، ۱۹۸۰ اندازه گیری شد [۹]. آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون چند دامنه دانکن در سطح $P < 0.05$ برای تعیین معنی دار بودن آماری با استفاده از نرم افزار آنالیز آماری (SAS، ۱۹۹۷) استفاده شد.

ستایج

۱۴- باکه: راهی خونی نتایج فاکتورهای خونی در روزگی: در این تحقیق اثر مقادیر مختلف آلوئهورا روی پرتوئین تام، گلوكز و گلوبولین خون نسبت به گروه شاهد

علیه دومین تزریق گلbul قرمز گوسفند نشان داده که اختلاف معنی‌داری نسبت به گروه شاهد وجود دارد ($P<0.05$) (جدول ۶).

۱. نتیجه دومین نتیجه SRBC اثر مقادیر مختلف آلوئه‌ورا روی اولین تزریق SRBC، در هیچ یک از گروه‌ها اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. (جدول ۵). با توجه به تجویز مقادیر مختلف آلوئه‌ورا و به تبع آن، تیتر آنتی‌بادی مترشحه

جدول ۱. مقایسه میانگین (\pm SEM) مقادیر گلوكز، پروتئين تام، آلبومين و آلكالين فسفاتاز (ALP) در ۱۴ روزگی

| (U/L) ALP | گلوكز ($\frac{mg}{dl}$) | گلوبولين ($\frac{gr}{dl}$) | آلبومين ($\frac{gr}{dl}$) | بروتئين تام ($\frac{gr}{dl}$) | گروه‌ها |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| ۲۸۶/۱۶۸۷/۷۶ ^a | ۷۷۲۱۴±۷/۶۳ ^b | ۱/۲۶±۱/۱۵ ^{ab} | ۲/۱۲±۰/۰۸ ^a | ۳/۳۹±۰/۱۵ ^{ab} | شاهد |
| ۲۸۱/۱۸۱/۰۸ ^a | ۸۸۳۲۲۸/۹۱ ^b | ۱/۵۱±۰/۱۵ ^{ab} | ۱/۸۰±۰/۰۶ ^a | ۳/۳۰±۱۷ ^{ab} | ویرجینیامايسین |
| ۲۷۱/۱۶۳۶/۸۹ ^a | ۸۸۷۲۰/۷/۱۷ ^b | ۱/۵۰±۰/۱۷ ^{ab} | ۱/۷۴±۰/۰۹ ^a | ۳/۱۴±۰/۱۸ ^b | ۱٪ آلوئه‌ورا |
| ۱۶۲۶۳/۴۱ ^a | ۲۰۳۰/۸/۰۴ ^a | ۱/۰۷±۰/۱۲ ^b | ۲/۰۱±۰/۱۱ ^a | ۳/۰۸±۰/۰۴ ^b | ۲٪ آلوئه‌ورا |
| ۲۵۴/۱۵۲۷/۹۱ ^a | ۷۸۶۱۷۰/۵۸ ^c | ۱/۸۲±۰/۳۴ ^a | ۱/۸۷±۰/۲۱ ^a | ۳/۶۹±۰/۱۹ ^a | ۳٪ آلوئه‌ورا |
| ۵/۰۳ | ۴/۶۵ | ۰/۰۹ | ۰/۰۵ | ۰/۰۷ | SEM |

* حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختلاف معنی دار آماری می‌باشد ($P<0.05$).

جدول ۲. مقایسه میانگین (\pm SEM) مقادیر گلوكز، پروتئين تام، آلبومين و آلكالين فسفاتاز (ALP) در ۲۸ روزگی

| (U/L) ALP | گلوكز ($\frac{mg}{dl}$) | گلوبولين ($\frac{gr}{dl}$) | آلبومين ($\frac{gr}{dl}$) | بروتئين تام ($\frac{gr}{dl}$) | گروه‌ها |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| ۲۸۹/۷۵±۱۸/۹۳ ^a | ۲۵۲/۴۷±۱۴/۴۷ ^a | ۱/۴۸±۰/۱۳ ^a | ۱/۵۲±۰/۰۶ ^a | ۳/۰۰±۰/۱۱ ^a | شاهد |
| ۲۷۷/۶۰±۱۷/۹۷ ^a | ۲۱۶/۸۴±۲۲/۶۷ ^{ab} | ۱/۱۱±۰/۰۹ ^a | ۱/۶۷±۰/۱۱ ^a | ۲/۷۴±۰/۱۱ ^a | ویرجینیامايسین |
| ۲۸۴/۶۹±۱۸/۳۵ ^a | ۱۸۴/۱۴±۱۰/۵۲ ^c | ۱/۲۳±۰/۱۵ ^a | ۱/۶۴±۰/۰۷ ^a | ۲/۸۷±۰/۱۲ ^a | ۱٪ آلوئه‌ورا |
| ۲۷۸/۵±۱۸/۰۱ ^a | ۲۲۰/۹۱±۱۲/۴۴ ^{ab} | ۱/۲۴±۰/۱۸ ^a | ۱/۷۱±۰/۱۰ ^a | ۲/۹۴±۰/۱۲ ^a | ۲٪ آلوئه‌ورا |
| ۲۶۵/۹۴±۱۶/۶۸ ^a | ۲۰۲/۶۷±۸/۳۶ ^{bc} | ۱/۲۴±۰/۱۹ ^a | ۱/۵۳±۰/۰۸ ^a | ۷۸۲±۰/۱۹ ^a | ۳٪ آلوئه‌ورا |
| ۰/۷۵ | ۷/۲۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۴ | ۰/۰۶ | SEM |

* حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختلاف معنی دار آماری می‌باشد ($P<0.05$).

جدول ۳. مقایسه میانگین (\pm SEM) مقادیر گلوكز، پروتئين تام، آلبومين و آلكالين فسفاتاز (ALP) در ۴۲ روزگی

| (U/L) ALP | گلوكز ($\frac{mg}{dl}$) | گلوبولين ($\frac{mg}{dl}$) | آلبومين ($\frac{mg}{dl}$) | بروتئين تام ($\frac{mg}{dl}$) | گروه‌ها |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| ۲۸۰/۱۸۸۵/۰۳ ^a | ۲۰۸/۰/۷±۴/۴۲ ^a | ۱/۸۹±۰/۰۶ ^a | ۱/۳۳±۰/۰۴ ^a | ۲/۲۳±۰/۰۷ ^a | شاهد |
| ۲۷۱/۱۶۵۱/۹۳ ^a | ۲۱۱/۵۶±۴/۵۵ ^a | ۱/۷۱±۰/۰۸ ^a | ۱/۴۴±۰/۰۹ ^a | ۳/۱۶±۰/۱۵ ^a | ویرجینیامايسین |
| ۲۶۲/۱۶۷۴/۳۶ ^a | ۲۰۴/۸۸±۴/۱۱ ^a | ۱/۷۸±۰/۰۸ ^a | ۱/۴۵±۰/۰۶ ^a | ۳/۲۴±۰/۱۲ ^a | ۱٪ آلوئه‌ورا |
| ۲۵۸/۱۵۲۹/۶۲ ^a | ۲۲۰/۳۸±۱۰/۸۰ ^a | ۱/۸۸±۰/۰۵ ^a | ۱/۴۱±۰/۰۵ ^a | ۳/۲۹±۰/۰۸ ^a | ۲٪ آلوئه‌ورا |
| ۲۵۷/۱۵۳۷/۳۹ ^a | ۱۷۸/۵۵۴/۳۹ ^b | ۱/۷۶±۰/۱۴ ^a | ۱/۴۰±۰/۰۴ ^a | ۳/۱۵±۰/۱۲ ^a | ۳٪ آلوئه‌ورا |
| ۴/۹۲ | ۳/۵۱ | ۰/۰۴ | ۰/۰۲ | ۰/۰۵ | SEM |

* حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختلاف معنی دار آماری می‌باشد ($P<0.05$).

جدول ۴. مقایسه میانگین (\pm SEM) درصد گبولهای سفید خون در ۲۸ روزگی

| گروه‌ها | شاهد | ویرجینیا مایسین | ۱٪ آلوئه ورا | ۲٪ آلوئه ورا | ۳٪ آلوئه ورا | SEM |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| لنفوسيت | ۶۲/۸۷±۲/۵۱ ^b | ۶۱/۲۵±۳/۲۲ ^b | ۶۸/۲۵±۰/۵۷ ^{ab} | ۶۶/۱۲±۱/۶۸ ^{ab} | ۷۳/۱۲±۶۷۲ ^a | ۱/۲۰ |
| هتروفیل | ۳۲/۵۰±۲/۴۴ ^a | ۳۱/۷۵±۲/۳۲ ^a | ۲۲/۷۵±۱/۶۲ ^{bc} | ۲۵/۵۰±۱/۵۷ ^{ab} | ۱۷/۵۰±۱/۷۰ ^c | ۱/۲۴ |
| مونوسیت | ۳/۱۲±۰/۲۹ ^c | ۵/۲۵±۰/۴۵ ^b | ۷/۶۲±۰/۳۷ ^a | ۶/۸۷±۰/۴۸ ^a | ۶/۶۲±۰/۶۸ ^a | ۰/۳۲ |
| أوزونوفیل | ۱/۵۰±۰/۳۲ ^a | ۱/۷۵±۰/۳۱ ^a | ۱/۳۷±۰/۱۸ ^a | ۱/۵۰±۰/۳۲ ^a | ۱/۶۲±۰/۱۸ ^a | ۰/۱۲ |
| بازوفیل | • | • | • | • | ۰/۱۲±۰/۱۲ ^a | ۰/۰۲ |
| نسبت هتروفیل به لنفوسيت | ۰/۰۶±۰/۰۵ ^a | ۰/۵۴±۰/۰۸ ^a | ۰/۳۳±۰/۱ ^{bc} | ۰/۳۹±۰/۰۳ ^{ab} | ۰/۲۴±۰/۰۹ ^c | ۰/۰۳ |

* حروف غیر مشابه در هر ستون پیانگر اختلاف معنی دار آماری می باشد ($P < 0.05$).

جدول ۵. مقایسه میانگین (\bar{X}) درصد گلوبولهای سفید خون در ۴۲ روزگار

| گروه‌ها | شاهد | ویرجینیا مایسین | % آلوئه ورا | % آلوئه ورا | SEM |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| لحفوسیت | ۵۷/۶۵±۲/۹۴ ^b | ۵۶/۴۵±۲/۱۲ ^b | ۶۸/۸۷±۱/۷۱ ^a | ۶۵/۱۲±۲/۷۹ ^a | ۱/۱۱ |
| هتروفیل | ۳۷/۹۷±۳/۴۰ ^a | ۳۷/۰۵±۲/۸۰ ^{ab} | ۲۳/۶۲±۱/۸۴ ^b | ۲۷/۰۵±۲/۶۳ ^{ab} | ۱/۲۴ |
| مونوسیت | ۳/۶۲±۰/۶۲ ^c | ۴/۵±۲/۷۰ ^b | ۶/۱۲±۰/۰۵ ^a | ۵/۲۵±۰/۴۱ ^a | ۰/۲۷ |
| اوزونوفیل | ۰/۷۵±۰/۳۱ ^b | ۲±۰/۲۶ ^a | ۱/۳۷±۳۷ ^{ab} | ۲/۱۲±۰/۴۷ ^a | ۰/۱۷ |
| بازوفیل | • | • | • | •/۱۲±۰/۱۲ ^a | ۰/۰۲ |
| نسبت هتروفیل به لحفوسیت | ۰/۶۸±۰/۰۹ ^a | ۰/۶۸±۰/۰۶ ^a | ۰/۳۴±۰/۰۳ ^b | ۰/۴۴±۰/۰۶ ^{ab} | ۰/۰۳ |

* حروف غیر مشایه در هر سی و پانگ اختلاف معنی دار آماری می باشد ($P < 0.05$).

حدوٰء، ع. مقاسه میانگین: SRBC (\pm SEM)

| گروه‌ها | SRBC base | اولین تزریق SRBC (میانگین \log_2) | دومین تزریق SRBC (میانگین \log_2) | (\log_2 SRBC) |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| شاهد | . | • / ۶۲ ± ۰ / ۳۷ ^a | • / ۵۰ ± ۰ / ۲۷ ^c | . |
| ویرجینیا مایسین | . | • / ۸۷ ± ۰ / ۱ ^a | • / ۷۲ ± ۰ / ۹۱ ^b | . |
| % آلوئه ورا | . | • / ۶۲ ± ۰ / ۷۴ ^a | • / ۳۷ ± ۱ / ۰۶ ^a | . |
| % آلوئه ورا | . | • / ۱۲ ± ۰ / ۸۳ ^a | • / ۵۰ ± ۰ / ۷۵ ^b | . |
| % آلوئه ورا | . | • / ۳۷ ± ۰ / ۷۴ ^a | • / ۶۲ ± ۰ / ۹۱ ^b | . |
| SEM | . | • / ۱۴ | • / ۱۸ | . |

* حروف غیر مشابه در هسته، سانگ اختلاف بعنه دار آماده، را باشد (۰/۰۵-^P). * تته های آنته باده، را اساس میانگ، Log سانه شده است.

Sheep Red Blood Cell = SRBC ***

بوده، اما نتیجه مقدار گلوبولین، منطبق بر یافته‌های پژوهشگران نامبرده می‌باشد. این محققان در طی پژوهشی، ۴۰ موش صحرایی را به ۴ گروه، دارای ۱۰ موش صحرایی تقسیم کردند. گروه اول (شاهد) حاوی آب آشامیدنی بدون عصاره آلومینورا، گروه دوم دارای ۵۰ ppm عصاره آلومینورا مخلوط در آب آشامیدنی، گروه سوم حاوی ۱۰۰ ppm عصاره آلومینورا مخلوط در آب آشامیدنی، بوده و به گروه جهادم ۱۵۰ ppm مخلوط در آب آشامیدنی، بوده.

بحث و نتیجه‌گیری

فراسنجه‌های پیمایی خون همان‌طور که نتایج نشان داد افروden مقادیر مختلف آلوئه‌ورا بر روی پروتئین Tam، آلبومین و گلوبولین سرم در روزهای ۲۸، ۱۴ و ۴۲ اثر معنی داری نداشته است. نتایج مقادیر پروتئین Tam و آلبومین پژوهش حاضر در تضاد با نتایج Taiwo و همکاران (۲۰۰۵)

پژوهش ما که نشان داد در جوجه‌های گوشته، ژل آلوئه‌ورا باعث کاهش معنی‌داری در قند خون می‌گردد ($P<0.05$)، همخوانی دارد [۱۷، ۱۶].

نتایج مربوط به آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین نیز نشان داد که این آنتی‌بیوتیک تأثیری روی پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، گلوكز و ALP ندارد و این امر مشابه با نتایج Mathivanan و همکاران (۲۰۰۷) بود. این پژوهشگران گزارش کردند که گروه حاوی ویرجینیامايسین تأثیر قابل توجهی روی گلوكز، تیتر SRBC، تعداد کل لکوسیت‌ها، فعالیت آنزیم ALP، پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین در مقایسه با گروه شاهد در جوجه‌های گوشته نداشت [۱۸].

نتایج مربوط به ALP نیز نشان می‌دهد که مقادیر مختلف ژل آلوئه‌ورا در کاهش میزان ALP تأثیرگذار نیست.

پژوهشی روی جوجه‌های گوشته با ترکیب چهار گیاه آلوئه‌ورا، سیر، زنجبل، و زرشک انجام شد. در این آزمایش نشان داده شد که این چهار گیاه باعث افزایش قابل توجه پروتئین تام و کاهش معنی‌دار ALP می‌شود ($P<0.05$)، هم‌چنین این گیاهان با افزایش میزان انسولین سبب کاهش قند خون می‌شوند [۱۷].

با توجه به استفاده از چهار گیاه در این پژوهش کاهش آنزیم ALP را دقیقاً نمی‌توان به آلوئه‌ورا نسبت داد و این تحقیق نمی‌تواند معیاری برای رد نتایج تحقیق حاضر باشد.

در یک مطالعه، اثرات مکمل فیتاز میکروبی در جوجه‌های تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر غیر فیتات، روی عملکرد، احتباس مواد معدنی، مواد معدنی پلاسما و استخوان، و فعالیت آنزیم‌های سرم از جمله ALP بررسی شد و باعث افزایش این آنزیم در رشد استخوان‌های دراز شد [۱۹].

اثرات آلوئه‌ورا روی رشد و فراسنجه‌های هاتولوزی و بیوشیمیایی در جوجه‌های گوشته توسط سینگ و همکاران مورد بررسی قرار گرفت که هیچ اختلاف معنی‌داری در بین گروه‌ها در فعالیت آنزیمی ALP دیده نشد [۲۰].

در مطالعه دیگر توسط فلاح اثرات سطوح مختلف ژل آلوئه‌ورا و پودر سیر در عملکرد رشد و کبد در جوجه‌های

عصاره آلوئه‌ورا مخلوط در آب آسامیدنی داده شد. نتایج نشان داد که مقدار پروتئین تام ۱۴ روزگی، در بین گروه‌ها اختلاف معنی‌داری را نداشت، اما در ۲۸ روزگی، گروه‌های حاوی عصاره آلوئه‌ورا در آب (دوم، سوم و چهارم)، مقدار پروتئین تام آن‌ها کاهش یکسانی را داشت ($P<0.05$). مقدار آلبومین در ۱۴ و ۲۸ روزگی در گروه‌های حاوی عصاره آلوئه‌ورا نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‌داری را نشان داد ($P<0.05$). مقدار گلوبولین در ۱۴ و ۲۸ روزگی در گروه‌های حاوی سطوح مختلف آلوئه‌ورا، اختلاف معنی‌داری را با گروه شاهد نداشت [۱۰].

گلوبولین‌ها از عوامل اینمنی هستند و در طی این آزمایش نشان داده شد که آلوئه‌ورا تأثیری بر افزایش گلوبولین‌ها نداشته است. اثر مقادیر مختلف آلوئه‌ورا روی گلوكز بیانگر این است که گروه‌های حاوی آلوئه‌ورا باعث کاهش معنی‌دار مقدار گلوكز نسبت به گروه شاهد شده است.

مطالعاتی در زمینه کاهش قند خون توسط ژل آلوئه‌ورا در مدل‌های حیوانی (موس) و انسانی انجام شده است که مکانیسم تأثیر این ژل به طور کامل معلوم نیست، اما این فرضیه وجود دارد که آلوئه‌ورا باعث تحریک آزادسازی و سنتز انسولین از سلول‌های β بافت جزاير لانگرهانس بشود [۱۱]. مصرف خوراکی ژل آلوئه‌ورا به همراه گلی‌بن‌کلامید در بیماران دیابتی باعث کاهش معنی‌دار غلظت گلوكز خون گردیده است [۱۲].

مطالعاتی دیگر نشان داده است که مواد موجود در آلوئه‌ورا با مهار گلوكوتشوئنر باعث کاهش قند خون می‌شود [۱۳]. هم‌چنین مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که آلوئه‌ورا آزادسازی انسولین را از پانکراس تحریک نموده و باعث پایین آمدن مقدار گلوكز خون در موس می‌شود [۱۴]. Rajasekaran و همکاران (۲۰۰۶)، اظهار کردند که تجویز خوراکی ژل آلوئه‌ورا 30 mg/kg در موس‌های دیابتی شده با استریتوزوسین، کاهش معنی‌داری در قند خون ناشتا را نشان داد ($P<0.05$) [۱۵]. یافته‌های حاصل از مطالعات Sajid و Hemkaran (۱۹۸۹) و Mehala و همکاران (۲۰۰۸) با نتایج

این امر باعث افزایش مقدار ترشح ایمونوگلوبولین‌ها از جمله IgM و IgG2 می‌گردد. همچنان آسمانان باعث افزایش لنفوسیت‌های نوع B و نوع T می‌گردد. Djenta و همکاران (۱۹۹۹)، نشان دادند که تزریق عضلانی ۵۰۰ میکروگرم از آسمانان به ازای هر جوجه می‌تواند اثر و دوام ظرفیت فعالیت مونوپلیت‌های سیستم ایمنی را افزایش دهد. Kathi و همکاران (۱۹۹۹) گزارش کردند که تزریق زیر پوستی آسمانان به موش‌ها باعث افزایش گلبول‌های سفید خون، سلول‌های طحال، لنفوسیت‌ها و مونوپلیت‌ها می‌شود [۲۵]. Vall-paraso و همکاران (۲۰۰۵) نشان دادند که جوجه‌های دریافت‌کننده ژل آلوئومورا (مخلوط با آب آشامیدنی) افزایش معنی‌داری در تعداد کل گلبول‌های سفید در روزهای ۳۷ و ۵۲ دوره پرورش نسبت به گروه شاهد داشتند. همچنان در این روزها افزایش معنی‌داری در تعداد لنفوسیت‌های خون در جوجه‌های دریافت‌کننده نسبت به گروه شاهد وجود داشت (P<۰/۰۵). Tan و همکاران بیان کردند که آسمانان باعث افزایش فعالیت فاگوسیتوزی و تحریک لوكوبیت‌ها و لنفوسیت‌ها و علاوه بر این موجب آزادی‌سازی ایترلوكین ۱ و TNF α می‌شود. همچنان استفاده از آسمانان نشان داده است که یک اثر مثبت بر روی افزایش لنفوسیت‌ها در طحال و مغز استخوان دارد [۵].

افزوond ویرجینیامایسین در گروه ویرجینیامایسین در تحقیق نشان داد که این آنتی‌بیوتیک در ۲۸ و ۴۲ روزگی باعث تغییر معنی‌داری در تعداد مونوپلیت‌ها شده است. در ۴۲ روزگی، این آنتی‌بیوتیک منجر به اختلاف معنی‌داری در تعداد اوزینوفیل‌ها شد، اما در ۲۸ روزگی تعداد اوزینوفیل‌ها تحت تأثیر آنتی‌بیوتیک قرار نگرفت. این آنتی‌بیوتیک تأثیری روی اختلاف معنی‌داری در تعداد لنفوسیت‌ها و هتروفیل‌ها نداشت. یافته‌های حاضر، در مورد اثر ویرجینیامایسین بر روی مونوپلیت‌ها، با نتایج Mathivanan و همکاران (۲۰۰۷) مطابقت نداشت. این پژوهشگران گزارش کردند که گروه‌های حاوی ویرجینیامایسین تأثیر قابل توجهی را روی تعداد کل لکوبیت‌ها در مقایسه با گروه شاهد نداشته است [۱۸].

گوشتشی مورد مطالع قرار گرفت که نتایج آن اختلاف معنی‌داری را در بین گروه‌ها نشان نمی‌دهد [۲۱]. در میان فراسنجه‌های خونی، آکالالین فسفاتاز سرمی (ALP) شاخص بالقوه مفیدی برای رشد و استخوانی شدن ثانویه بافت‌های استخوانی است. فعالیت ALP سرمی از مجموع فعالیت‌های ALP از بخش‌های مختلف سوماتیکی، اساساً استخوان، کبد و روده بدست می‌آید. در خون دو تا از ALP بیشترین ایزوفرم‌های مربوطه این آنزیم، ALP کبد و استخوانی می‌باشد. ایزوفرم استخوانی، پروتئین متصل به غشاء است که به‌وسیله استئوبلاست‌ها در بافت استخوانی سنتز می‌شود و شاخص حساسی از رشد استخوانی در پستانداران و پرندگان می‌باشد. در سن بلوغ، افزایش ALP سرمی در ارتباط با حضور سم در بدن یا شرایط ضعیف تغذیه‌ای است [۲۲].

با جمع‌بندی موارد فوق و نتایج مربوطه به فعالیت این آنزیم در گروه‌های آزمایشی این پژوهش، می‌توان عدم تغییر در میزان فعالیت این آنزیم در گروه‌های آزمایشی نسبت به گروه شاهد را موثر نبودن آن در فعالیت این آنزیم به منظور تحریک رشد استخوانی دانست.

..... آن بیرات سلول‌های فید خونی بررسی نتایج سلول‌های سفید خونی نشان داد که افزودن ژل آلوئومورا در جیره غذایی جوجه‌ها باعث افزایش تعداد لنفوسیت‌ها و مونوپلیت‌ها نسبت به گروه شاهد می‌شود و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (P<۰/۰۵).

عمده‌ترین پلی‌ساقارید موجود در آلوئومورا، آسمانان می‌باشد که یک پلیمر تشکیل شده از مانوز است و می‌تواند به گیرنده‌های مانوز در ماکروفازها که گرایش زیادی به ساختارهای کربوهیدراتی واجد مانوز دارند متصل شده [۲۴، ۲۳]، و این اتصال باعث فعال شدن ماکروفازها شده و در نتیجه باعث آزادی سیتوکاین‌ها از جمله ایترلوكین ۱ (IL1)، ایترلوكین ۶ (IL6)، ایترلوكین ۱۲ (IL12) و فاکتور نکروزکننده تومورها (TNF- α) می‌شود. از طرف دیگر اینترلولین ۱۲، باعث تقویت عمل یاخته‌های TH1 می‌شود، که

تأثیر ژل آلوئهورا در افزایش تیتر آنتی‌بادی علیه SRBC در دومین تزریق، با یافته‌های برخی پژوهش‌های پیشین، هم راستا بود [۲۷، ۱۶]. Mehala و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کردند که افزودن ژل آلوئهورا در مقادیر ۱٪ و ۲٪ در جیره جوجه‌های گوشتی باعث افزایش تیتر آنتی‌بادی می‌شود [۱۶]. طی تحقیقی Tizard (۲۰۰۴) ادعای کرده که پلی‌ساقاریدهای موجود در ژل آلوئهورا دارای خواص درمانی از قبیل تحریک سیستم ایمنی و تحریک کردن خون‌رسانی هستند [۲۷]. Mmtereole (۲۰۱۱) گزارش کرد که گنجاندن ژل آلوئهورا در رژیم غذایی جوجه‌های گوشتی نه تنها باعث بهبود رشد جوجه شده، بلکه با بهبود کیفیت سیستم خونی و افزایش سیستم ایمنی، باعث بهبود سلامت و تندrstی حیوان می‌شود [۲۸].

با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که افزودن ۱٪ ژل آلوئهورا به جیره جوجه‌های گوشتی، سطح ایمنی سلولی و همورال را افزایش می‌دهد و احتمالاً اثر سمی ندارد و یا حداقل در مقادیر آزمایشی پژوهش حاضر (۱٪، ۲٪ و ۳٪ ژل آلوئهورا)، چنین اختلالی مشاهد نشده بود. هم‌چنین با بررسی مقدار گلوبولین‌ها در آزمایش مشخص شد که مقدار گلوبولین‌ها در گروه ۱٪ ژل آلوئهورا بالاتر از بقیه گروه‌ها (معادل با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین) بوده و به لحاظ ایمنی سلولی و همورال حائز اهمیت است.

تشکر و قدردانی

از جناب آقای امید صفار بنیس به عنوان کارشناس حیوانات آزمایشگاهی کمال تشکر و قدردانی را داریم. از جناب آقای حسن تقی‌زاده و خانم شیرین محمودیان کارشناسان آموزشکده دام‌پزشکی شهریزاد برای هماهنگی و تسهیل در امور مرکز حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه سمنان و آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی سپاس‌گزار هستیم.

در خصوص افزایش تعداد ائوزونوفیل‌ها در ۴۲ روزگی گزارشی مشاهده نشده است. تعداد هتروفیل‌ها در ۲۸ و ۴۲ روزگی تحت تأثیر مقادیر مختلف آلوئهورا نسبت به گروه شاهد و ویرجینیامايسین، کاهش معنی‌داری را نشان می‌دهد ($P < 0.05$).

آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین هیچ‌گونه اثر معنی‌داری را روی بازووفیل نداشت، اما فقط در ۳٪ ژل آلوئهورا افزایش معنی‌داری مشاهده شده بود ($P < 0.05$). با توجه به مشاهده فقط یک عدد بازووفیل در گروه ۳٪ ژل آلوئهورا افزایش معنی‌داری گزارش شده، بنا به توصیه محققین و متخصصین، اگر در هنگام شمارش گلوبول‌های سفید، بازووفیل دیده نشد، می‌توان برای آن عدد ۱ یا ۱٪ را در نظر گرفت. با توجه به این امر نمی‌توان دقیقاً افزایش بازووفیل را در ۳٪ ژل آلوئهورا گزارش کرد. نسبت هتروفیل به لنفوسيت در ۲۸ و ۴۲ روزگی در گروه شاهد و ویرجینیامايسین افزایش معنی‌داری را نسبت به گروه‌های آلوئهورا نشان دادند ($P < 0.05$). دلیل این افزایش، کاهش تعداد هتروفیل در گروه‌های آلوئهورا می‌باشد. چون که افزایش قابل ملاحظه لنفوسيت‌ها و مونوسیت‌ها در خون رخ داده است، نه این‌که واقعاً تعداد هتروفیل در خون کم شده باشد.

۱.۱.۱. از مز گوسفند (Sheep Red Blood Cell، SRBC) تیتر SRBC پایه (بدون تزریق) و تیتر آنتی‌بادی علیه اولین تزریق SRBC در بین گروه‌ها هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری را نشان نمی‌دهد، اما در دومین تیتر آنتی‌بادی بر علیه SRBC، گروه‌های حاوی ژل آلوئهورا و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین افزایش معنی‌داری را با گروه شاهد داشتند ($P < 0.05$). در بین همه گروه‌ها بالاترین تیتر آنتی‌بادی مربوط به گروه ۱٪ آلوئهورا می‌باشد.

آخر آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین در افزایش تیتر آنتی‌بادی علیه SRBC، در تضاد با یافته‌های Mathivanan و همکاران (۲۰۰۷) بود. این محققین گزارش کردند که گروه حاوی آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین تأثیر قابل توجه و معنی‌داری را روی تیتر SRBC ندارد [۱۸].

منابع

- [14] Kaufman T, Kalderon N, Ullmann Y, Berger J. Aloe vera gel hindered wound healing of experimental second-degree burns: a quantitative controlled study. *J Burn Care Rehabil* 1988; 9: 156-159.
- [15] Rajasekaran S, Ravi K, Sivagnanam K, Subramanian S. Beneficial effects of Aloe vera leaf gel extract on lipid profile status in rats with streptozotocin diabetes. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 2006; 33: 232-237.
- [16] Mehala C, Moorthy M. Production performance of broilers fed with Aloe vera and Curcuma longa (Turmeric). *Int J Poult Sci* 2008; 7: 852-856.
- [17] Ur Rehman S, Durrani F, Chand N, Khan RU, ur Rehman F. Comparative efficacy of different schedules of administration of medicinal plants infusion on hematology and serum biochemistry of broiler chicks. *ROAVS* 2011.
- [18] Mathivanan R, Kalaarasi K. Panchagavya and Andrographis paniculata as alternatives to antibiotic growth promoters on haematological, serum biochemical parameters and immune status of broilers. *J Poult Sci* 2007; 44: 198-204.
- [19] Viveros A, Brenes A, Arija I, Centeno C. Effects of microbial phytase supplementation on mineral utilization and serum enzyme activities in broiler chicks fed different levels of phosphorus. *Poult Sci* 2002; 81: 1172-1183.
- [20] Singh J, Koley K, Chandra Kar K, Pagruti NS. Effects of Aloe vera on dressing percentage and haemato-biochemical parameters of broiler chickens. *Veterinary World* 2013; 6: 803-806.
- [21] Fallah R. Effect of adding aloe vera gel and garlic powder on performance and liver functions of broiler chickens. *Global J Anim Sci Res* 2015; 3: 491-496.
- [22] Calabuig CP, Ferrer M, Muriel R, Tilgar V. Plasma alkaline phosphatase as a sensitive indicator of age and skeletal development in wild coscoroba swans. *Wildlife Research* 2010; 37: 504-511.
- [23] Lee A, Chui PT, Aun CS, Gin T, Lau AS. Possible interaction between sevoflurane and Aloe vera. *Ann Pharmacother* 2004; 38: 1651-1654.
- [24] Tizard I. Immunity in the fetus and newborn animal. *Introduct Vet Immunol* 1982; 165-177.
- [25] Kemper KJ, Small R. Astragalus (Astragalus membranaceous). Longwood Herbal Task Force 1999; 3: 1-18.
- [26] Valle-Paraso D, Grace M, Vidamo D, Pernell Jan S, Anunciado D, Rea Victoria P, et al. Effects of aloe vera (Aloe barbadensis) on the white blood cell count and antibody titer of broiler chickens vaccinated against Newcastle disease. *Philippine J Vet Med* 2014; 42.
- [27] eynolds T. Aloes: the genus Aloe: CRC press; 2004.
- [28] Mmtereole F. Evaluation of the dietary inclusion of Aloe vera as an alternative to antibiotic growth promoter in broiler production. *Pakistan J Nutr* 2011; 10: 1-5.
- [1] Ueda HR, Chen W, Adachi A, Wakamatsu H, Hayashi S, Takasugi T, et al. A transcription factor response element for gene expression during circadian night. *Nature* 2002; 418: 534-539.
- [2] Akhtar M, Hai A, Awais MM, Iqbal Z, Muhammad F, ul Haq A, Anwar MI. Immunostimulatory and protective effects of Aloe vera against coccidiosis in industrial broiler chickens. *Vet Parasitol* 2012; 186: 170-177.
- [3] Mashreghi M, Mollaie S, Gholami Z, Tavallai S. Investigation on the effects of alcoholic extracts of fruit and leaves of three khorasani medicinal plants on Escherichia coli O157 using spectrophotometry. *Koomesh* 2007; 8: 145-154. (Persian).
- [4] Jebelli Javan A. Combinational effects of Trachyspermum ammi and Zataria multiflora Boiss essential oils on some pathogenic food-borne bacteria. *Koomesh* 2016; 17: 374-383. (Persian).
- [5] Tan BK, Vanitha J. Immunomodulatory and antimicrobial effects of some traditional Chinese medicinal herbs: a review. *Curr Med Chem* 2004; 11: 1423-1430.
- [6] Djeraba A, Quere P. In vivo macrophage activation in chickens with Acemannan, a complex carbohydrate extracted from Aloe vera. *Int J Immunopharmacol* 2000; 22: 365-372.
- [7] yala I, Pérez BG, Doménech G, Castells M, Valdés M. Use of the chicken as an experimental animal model in atherosclerosis. *Avian and Poultry Biology Reviews* 2005; 16: 151-9.
- [8] Mahdavi A, Shivaazad M, Alemi F, Zaghami M, Moravej H, Darabighane B. Digestible lysine requirement of broilers based on practical diet. *Italian Journal of Animal Science* 2012; 11: 68-76.
- [9] Kuehn L, Price S, Honaker C, Siegel P. Antibody response of chickens to sheep red blood cells: Crosses among divergently selected lines and relaxed sublines. *Poult Sci* 2006; 85: 1338-1341.
- [10] Taiwo V, Olukunle O, Ozor I, Oyejobi A. Consumption of aqueous extract of raw Aloe vera leaves: histopathological and biochemical studies in rat and tilapia. *African J Biomed Res* 2006; 8: 169-178.
- [11] Ajabnoor MA. Effect of aloes on blood glucose levels in normal and alloxan diabetic mice. *J Ethnopharmacol* 1990; 28: 215-220.
- [12] Bunyapraphatsara N, Jirakulchaiwong S, Thirawarapan S, Manonukul J. The efficacy of Aloe vera cream in the treatment of first, second and third degree burns in mice. *Phytomedicine* 1996; 2: 247-251.
- [13] al-Awadi F, Fatania H, Shamte U. The effect of a plants mixture extract on liver gluconeogenesis in streptozotocin induced diabetic rats. *Diabetes Res* 1991; 18: 163-168.

Effects of different levels of Aloe Vera gel on some of hematological, biochemical and immunological parameters in the chicken model

Ali Mahdavi (Ph.D)¹, Morteza Saberi (M.Sc)², Gholam-Ali Jeloudar (Ph.D)³, Ebrahim Shahroozian (Ph.D)^{*2}

1 - Dept. of Animal Health Sciences, School of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran

2 - Dept. of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran

3 - Dept. of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran

(Received: 5 Dec 2015; Accepted: 14 Sep 2016)

Introduction: The present study was conducted to investigate the effects of subchronic administration of different levels of Aloe Vera gel on some biochemical and immunological factors in the chicken model.

Material and Methods: Two hundred and forty-one-day old Ross 308 (male and female) broilers were used on a completely randomized design in 5 groups with 4 replicates, and each replicate was consisting of 12 broilers. The groups included one control group (basal diet) and four experimental groups with basal diet mixed with different levels of Aloe Vera gel (1%, 2% and 3%) plus virginiamycin antibiotic.

Results: No significant difference between experimental groups was observed in serum albumin level and ALP activity on days 14, 28 and 42. On the day 14, the variation of albumin and total protein levels were significant. In the days 28 and 42, the level of blood glucose in the group receiving 3% Aloe Vera and in the group receiving 1% Aloe Vera on the day 28 was decreased significantly. On the day 28, the count of lymphocytes was raised significantly in the group receiving 3% Aloe Vera. Also in this day, the most count of heterophils was found in the control and virginiamycin groups. On the day 42, the significant rise of lymphocyte count was observed in all groups receiving Aloe Vera gel. On the day 28, the level of antibody titers against **sheep red blood cell** was raised significantly.

Conclusion: Daily supplementation with 1% Aloe Vera gel markedly potentiates cellular and humeral immunity in chickens and can be used as a food additive in order to prevent infections.

Key Words: Aloe, Cellular Immunity, Chickens

* Corresponding author. Tel: +98 9155719356

shahroozian@semnan.ac.ir