

داشت. گیاهان با دارا بودن اثر چندگانه و نیز اثرات جانبی کم تر می تواند در درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعه حاضر قصد داریم تا امکان وجود مهارکننده های آنزیم استیل کولین استراز در عصاره آبی اسطوخدوس را با استفاده از روش المان به منظور یافتن مکانیسم اثر احتمالی آن مورد بررسی قرار دهیم. به دلیل آن که کبد جایگاه اصلی متابولیسم داروها به شمار می رود و آثار سمیت عوامل آگزوژن در این اندام حیاتی نمود بیش تری دارد در ادامه نقش سمیتی عصاره آبی اسطوخدوس بر سلول های رده HepG2 کبدی مربوط به کاسینومای انسانی نیز مورد بررسی قرار گرفت.


مواد و روش ها

آماده سازی: ماده اصلی اسطوخدوس از پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شد. این گونه از گیاه مورد تایید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و دارای کد هرباریوم ۱۰۹۲ می باشد. بعد از جداسازی، شستشو و خشک کردن سرشاخه های گیاه، ۲۵۰ گرم از سرشاخه های خشک شده گیاه درون ظرف محتوی ۱۰۰۰ میلی لیتر آب جوش ریخته شد و درب ظرف برای مدت ۴ ساعت محکم بسته شد. در مرحله بعد محتوی ظرف فیلتر شد و مایع باقی مانده به روش بن ماری تغلیظ شد. در نهایت ماده ی به دست آمده را با استفاده از فریز درایر به پودر تبدیل کردیم. ماده شیمیایی استیل تیو کولین یداید و آنزیم استیل کولین استراز به دست آمده از اریتروسیت های گاوی از شرکت سیگما خریداری شد. اتانول، دی متیل سولفوکساید (DMSO) و دیگر محلول های آلی نیز از شرکت مرک آلمان تهیه شدند. در ادامه اولی رده سلولی مورد استفاده در این آزمایش مربوط به سلول های کارسینومای کبد انسانی و با نام اختصاری HepG2 بود که از انستیتو پاستور تهیه شد. در این مطالعه رده سلولی HepG2 در محیط مناسب دارای FBS، دمای ۳۷ درجه به همراه رطوبت و فشار اتمسفر ۵ درصد برای

موجود در اسانس اسطوخدوس است که دارای خواص بیولوژیکی متفاوت از جمله اثر آرام بخشی می باشد [۵،۴]. در مطالعات قبلی خود نشان دادیم که عصاره آبی اسطوخدوس سبب بهبود یادگیری و حافظه حیوانات آزایمری می شود [۶]. از جمله علائم بیماری آزایمر که در مطالعات مختلف انجام شده بر روی انسان [۷] و مدل های حیوانی نشان داده شده است اختلال یادگیری و تشکیل حافظه [۸،۹] و نیز ناتوانی در حرکت و عدم کنترل فرد می باشد [۱۰]. Younghee Kim و همکارانش اثر اسانس اسطوخدوس بر افزایش قدرت حرکتی و تعادلی حیوانات در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند [۱۱]. دکتر حاج هاشمی و همکارانش اثر ضدالتهابی عصاره های آبی - الکل و پلی فنولی و نیز اسانس این گیاه را اثبات کردند [۱۲]. هم چنین مطالعات نشان می دهد که اسطوخدوس سبب پاک سازی پلاک های آمیلوئیدی - که از مهم ترین عوامل ایجاد بیماری آزایمر می باشند - از بافت مغز می شود [۱۳]. عوامل مختلفی در بروز آزایمر دخالت دارند از جمله عوامل التهابی، استرس های اکسیداتیو و کاهش استیل کولین [۱۴،۱۵]. آنالیز محتوی نوروترانسمیترها در کورتکس مغز مبتلایان به آزایمر نشان داد که محتوی استیل کولین کاهش پیدا کرده است [۱۶،۱۷]. استیل کولین از جمله نوروترانسمیترهای موجود در مغز می باشد که در انتقال پیام دخالت دارد [۱۸]. کاهش میزان این نوروترانسمیتر در نتیجه فعالیت زیاد آنزیم استیل کولین استراز و یا کاهش میزان گیرنده های آن می تواند در بیماری آزایمر نقش داشته باشد [۱۹،۲۰]. در حال حاضر از جمله درمان های موثر در جلوگیری از پیشرفت بیماری آزایمر داروهای ممانعت کننده از فعالیت آنزیم استیل کولین استراز می باشند. دونپزیل و ریواستیگمین از جمله مهارکننده های انتخابی استیل کولین استراز در سیستم اعصاب مرکزی هستند که روی بافت های محیطی اثر کمی دارند [۲۱] و در درمان بیماری آزایمر و تقویت حافظه اثر دارند [۲۲،۲۳]. داروهای مذکور علاوه بر کارایی آن ها در ممانعت از پیشرفت بیماری، به دلیل ماهیت شیمیایی که دارند عوارض جانبی زیادی به دنبال خواهند

نتایج

فعالیت مهارکنندگی آنزیم استیل کولین استراز جهت بررسی میزان اثربخشی عصاره اسطوخودوس بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز از کیت اختصاصی در محیط *In vitro* استفاده گردید. بر پایه نتایج حاصل مشخص گردید که ترکیبات موجود در عصاره آبی سرشاخه‌های اسطوخودوس در غلظت ۳۰۰ ppm اثر قابل توجهی روی مهار فعالیت آنزیم متابولیزه‌کننده استیل کولین از خود نشان نمی‌دهد ($P=0/21$, $F_{(3,11)}=0/368$). به‌علاوه نمودار تغییر جذب عصاره در برابر زمان جهت بررسی میزان اثربخشی عصاره رسم گردید. همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده شده است منحنی تغییرات جذبی در حضور و عدم حضور عصاره در طول زمان به موازات هم و با اختلاف ناچیز پیش رفته است. این موضوع بیانگر آن است که عصاره آبی گیاه دارویی اسطوخودوس در غلظت مورد استفاده بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز اثری نداشته است.



شکل ۱. بررسی اثر آنتی استیل کولین استرازی عصاره آبی اسطوخودوس در غلظت ۳۰۰ ppm بر پایه جذب نوری در طول موج ۴۰۵ نانومتر. عصاره آبی اسطوخودوس بر مهار فعالیت آنزیم استیل کولین استراز اثر معنی داری نداشته است.

فعالیت سیتوتوکسیسیته توکسیسیته به‌منظور بررسی اثر سیتوتوکسیسیته عصاره آبی اسطوخودوس بر سلول‌های رده HepG2 کبدی، ارزیابی مورفولوژیکی سلول‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش سلول‌ها در محیط کشت مناسب به


رشد قرار داده شد. عصاره آبی اسطوخودوس در غلظت‌های مختلف از ۳/۱۲۵ تا ۱۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر برای مدت ۲۴ ساعت روی سلول‌ها اثر داده شد و در نهایت منحنی رشد سلول‌های دریافت‌کننده عصاره در مقایسه با گروه سالم رسم شد.

آنالیز آماری: کاندگی آنزیم استیل کولین استراز فعالیت مهارکنندگی آنزیم استیل کولین استراز به روش المان و با استفاده از میکروپلیت‌های ۹۶ خانه سنجیده شد. در این روش آنزیم استیل کولین استراز با هیدرولیز سوبسترای خود که همان استیل کولین می‌باشد سبب تشکیل تیوکولین می‌شود. تیوکولین نیز با ماده شاخص المان واکنش داده و موادی به نام ۵-تیو-۲-نیترو بنزوات و ۲-نیترو بنزوات-۵-مرکاپتوتیوکولین تولید می‌شود که در طول موج ۴۰۵ نانومتر قابل مشاهده می‌باشد. درون خانه‌های میکروپلیت مقدار ۲۵ میکرولیتر استیل کولین یویدید، ۵۰ میکرولیتر بافر فسفات با pH برابر ۸ و ۲۵ میکرولیتر عصاره حل شده در اتانول (۳ میلی‌گرم در میلی‌لیتر) ریخته شد. سپس جذب چاهک‌ها هر ۱۳ ثانیه و برای مدت ۶۵ ثانیه در ۴۰۵ نانومتر اندازه‌گیری شد. سپس ۲۵ میکرولیتر از آنزیم استیل کولین استراز به میزان ۰/۲۲ واحد در میلی‌لیتر به خانه‌های میکروپلیت اضافه شد و مجدداً جذب هر خانه هر ۱۳ ثانیه و به مدت ۱۰۴ ثانیه اندازه‌گیری شد. منحنی جذب در مقابل زمان رسم شد و میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز با استفاده از شیب خط محاسبه شد. هر گونه افزایش در جذب به سبب هیدرولیز غیر آنزیماتیکی سوبسترا با استفاده از فرمول (میزان واکنش قبل از اضافه کردن آنزیم منهای میزان آن بعد از اضافه کردن آنزیم) تصحیح شد.

آنالیز آماری در این مطالعه از آزمون آماری ANOVA یک‌طرفه به‌همراه تست تکمیلی LSD جهت آنالیز داده‌های به‌دست آمده استفاده شد و مقدار P-value کم‌تر از ۰/۰۵ معنی‌دار در نظر گرفته شد.

معطوف شده است. به همین دلیل نقش داروهای مهارکننده آنزیم استیل کولین استراز در ممانعت از پیشرفت این بیماری و یافتن داروهای جدید و موثر در مهار این آنزیم از اهمیت زیادی برخوردار است [۲۵،۲۰]. از جمله گیاهان دارویی که اثرات موثر بیولوژیکی آن به اثبات رسیده است اسطوخدوس می باشد. از آنجا که کبد یکی از اندام های مهم و جایگاه اصلی متابولیسم داروهای شیمیایی در بدن می باشد در بیش تر مطالعات برای سنجش فعالیت توکسیسیته عوامل مختلف از رده سلولی HepG2 که مربوط به کارسینومای کبد انسانی می باشد استفاده شده است. مطالعات مختلفی به منظور بررسی اثر سیتوتوکسیسیته عوامل مختلف روی رده سلولی HepG2 انجام شده است [۲۷،۲۶]. دانشمندان تایوانی با اثر دادن عصاره برگ زیتون روی این رده سلولی دریافتند که عصاره برگ درخت زیتون اثر مهارکنندگی روی رشد سلول ها داشته است [۲۸]. در این مطالعه نیز ابتدا اثر سمیتی عصاره بر رده سلولی کبدی HepG2 مورد بررسی قرار گرفت. ما یافتیم که عصاره آبی این گیاه دارویی اثر سمیتی روی سلول های رده HepG2 نداشته است و تغییر مورفولوژیکی در سلول ها دیده نمی شود. این یافته می تواند تضمین کند که حداقل در دوزهای مورد استفاده در این تحقیق مشکلی در استفاده از عصاره اسطوخدوس به عنوان گیاه دارویی وجود ندارد. با توجه به یافته های قبلی مبنی بر اثر بهبوددهنده اسطوخدوس در یادگیری و حافظه و نیز اثر بر بیان پروتئین ها، برای یافتن مکانیسم اثر احتمالی عصاره روی مهار آنزیم استیل کولین استراز مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات مختلفی برای بررسی عوامل مختلف بر مهار این آنزیم از طریق انجام تست DPPH انجام شده است. Lehner و همکارانش در سال ۲۰۰۵ نشان دادند که اسانس پرتقال و اسطوخدوس به عنوان یک مهارکننده قوی آنزیم استیل کولین استراز عمل می کند [۲۹]. هم چنین Aderson و همکارانش اثر مهارکنندگی اسانس اسطوخدوس در غلظت های مختلف روی آنزیم استیل کولین استراز را از طریق انجام تست های مختلف به اثبات رساندند [۳۰]. در مطالعه دیگری روی گیاهان معطر

همراه رطوبت و CO2 لازم کشت داده شدند و غلظت های مختلف عصاره اسطوخدوس از ۳/۱۲۵ تا ۱۰۰ میکروگرم در میلی لیتر برای مدت ۲۴ ساعت به چاهک های حاوی سلول اضافه شد. در نهایت سلول های تیمار شده با عصاره گیاه به صورت چشمی و با استفاده از میکروسکوپ با سلول های تیمار نشده مقایسه شدند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که غلظت های مختلف عصاره آبی اسطوخدوس تغییر محسوسی را در شکل ظاهری سلول های تیمار شده با عصاره در مقایسه با گروه شاهد ایجاد نکرده اند. هم چنین بررسی مورفولوژیکی آن ها نشان می دهد که سلول های تیمار شده مانند سلول های گروه کنترل به طور کامل و طبیعی به بستر فلاسک چسبیده اند. هم چنین این سلول ها شکل طبیعی خود را حفظ کرده و گرانولاسیون سلولی نیز در آن ها مشاهده نشد (شکل ۲). نتایج به دست آمده نشان می دهد که عصاره آبی اسطوخدوس هیچ گونه فعالیت سیتوتوکسیسیته روی رده سلولی HepG2 کبدی ندارد.



شکل ۲. A سلول های رده سلولی HepG2 گروه شاهد و B سلول های رده سلولی HepG2 تیمار شده با عصاره آبی اسطوخدوس. سلول های تیمار شده با عصاره در مقایسه با گروه شاهد از نظر مورفولوژیکی هیچ تغییری نکرده اند و عصاره اثر سیتوتوکسیکی نداشته است.

بحث و نتیجه گیری

با افزایش سن بروز بیماری های نورودژنراتیو به طور چشمگیری افزایش می یابد. یکی از پدیده های شایع در سنین کهنسالی دمانس است که در برخی افراد مسن به صورت بیماری آلزایمر بروز می یابد [۲۴]. با توجه به نقش مدارهای عصبی کولینرژیک در پدیده های شناختی توجه محققین روی عمل کرد استیل کولین و عوامل کاهنده و افزایش دهنده سیناپسی آن

dementia: a cross-over randomized trial. *Int J Geriatr Psychiatry* 2007; 22: 405-10.

[2] Soheili M, Salami M, Haghiri A, Zali H, Rezaei Tavirani M. Aqueous Extract of *Lavandula Angustifolia* Alter Protein Expression in Alzheimer Rats. *J Rep Pharm Sci* 2014; 3: 1-9.

[3] Soheili M, Rezaei Tavirany M, Salami M. *Lavandula angustifolia* extract improves deteriorated synaptic plasticity in an animal model of Alzheimer's disease. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences* 2015; 18: 1147-52.

[4] Adam JN SA, Kokkini S, Lanaras T, Arsenakis M. Antifungal activities of *Origanum vulgare* subsp. *Hirtum*, *Mentha spicata*, *Lavandula angustifolia* and *Salvia fruticosa* essential oils against human pathogenic fungi. *J Agric Food Chem* 1998; 46: 1739-45.

[5] Dorman HJP DS, Noble RC. Evaluation in vitro of plant essential oils as natural antioxidants. *J Essent Oil Res* 1995; 7: 645-51.

[6] Kashani MS, Tavirani MR, Talaei SA, Salami M. Aqueous extract of lavender (*Lavandula angustifolia*) improves the spatial performance of a rat model of Alzheimer's disease. *Neurosci Bull* 2011; 27: 99-106.

[7] Akbari E, Asemi Z, Daneshvar Kakhaki R, Bahmani F, Kouchaki E, Tamtaji OR, Hamidi GA, Salami M. Effect of Probiotic Supplementation on Cognitive Function and Metabolic Status in Alzheimer's Disease: A Randomized, Double-Blind and Controlled Trial. *Frontiers in aging neuroscience* 2016; 8: 256.

[8] Horner AJ, Gadian DG, Fuentemilla L, Jentschke S, Vargha-Khadem F, Duzel E. A Rapid, Hippocampus-Dependent, Item-Memory Signal that Initiates Context Memory in Humans. *Curr Biol* 2012; 22: 2369-2374.

[9] Taghizadeh M, Talaei SA, Djazayeri A, Salami M. Vitamin D supplementation restores suppressed synaptic plasticity in Alzheimer's disease. *Nutritional Neuroscience* 2014; 17: 172-177.

[10] Friedland RF, T. Smyth, K. Koss, E. Lerner, A. Chen, C. et al. Patients with Alzheimer's disease have reduced activities in midlife compared with healthy control-group members. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 2004; 98: 3440-5.

[11] Younghee Kim MK, Hyunji Kim, Kisok Kim. Effect of lavender oil on motor function and dopamine receptor expression in the olfactory bulb of mice. *J Ethnopharmacol* 2009; 125: 31-35.

[12] sharif VHAGB. Anti-inflammatory and analgesic properties of the leaf extracts and essential oil of *Lavandula angustifolia* Mill. *J Ethnopharmacol* 2003; 89: 67-71.

[13] Soheili M, Tavirani MR, Salami M. Clearance of Amyloid Beta Plaques from Brain of Alzheimeric Rats by *Lavandula angustifolia*. *Neurosci Medicine* 2012; 3: 362-367.

[14] Mathew A, Yoshida Y, Maekawa T, Sakthi Kumar D. Alzheimer's disease: Cholesterol a menace? *Brain Res Bull* 2011; 86: 1-12.

[15] Selkoe DJ. Alzheimer's Disease: Genes, Proteins, and Therapy. *Physiol Rev* 2001; 81: 741-766.

[16] Wu MN, He YX, Guo F, Qi JS. Alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptors are required for the amyloid beta protein-induced suppression of long-term potentiation in rat hippocampal CA1 region in vivo. *Brain Res Bull* 2008; 77: 84-90.

[17] Kar S, Issa AM, Seto D, Auld DS, Collier B, Quirion R. Amyloid beta-peptide inhibits high-affinity choline uptake and acetylcholine release in rat hippocampal slices. *J Neurochem* 1998; 70: 2179-2187.

منطقه مدیترانه مشخص شد که برخی گونه‌ها دارای اثر مهارکنندگی روی آنزیم و در نتیجه افزایش میزان استیل کولین می‌باشند [۳۱]. نتایج حاصل از تست المان در این مطالعه بیانگر آن است که عصاره آبی اسطوخودوس اثر مهارکنندگی معنی‌داری بر آنزیم استیل کولین استراز نداشته است. به‌نظر می‌آید تفاوت در اثربخشی اسطوخودوس روی عملکرد سیستم کولینرژیک حداقل بخشی به دلیل نحوه عصاره‌گیری باشد زیرا مطالعاتی که این گیاه را موثر دانسته‌اند از عصاره‌های کلروفرمی، اتیل استاتی و متانولی آن استفاده کرده‌اند که در مورد برخی دیگر از گیاهان موثر بر عملکرد سیستم کولینرژیک نیز صدق می‌کند [۳۲، ۳۳]. این‌که چه ترکیباتی در اسانس وجود دارد که در عصاره آبی نیست نیاز به انجام آزمایشات کروماتوگرافی و مقایسه ترکیبات آن‌ها دارد.

به‌نظر می‌آید که نوع عصاره مورد استفاده در تحقیقات مختلف به‌طور قابل توجهی اثربخشی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تفاوت در اثرات آنتی کولین استرازی عصاره این داروی گیاهی نتیجه همین اختلاف در عصاره‌گیری است. با توجه به اثرات گزارش شده تقویت‌کنندگی حافظه توسط اسطوخودوس به‌نظر می‌رسد که مکانیسم عملکردی عصاره آبی آن متفاوت با سایر عصاره‌ها و از مسیری غیر از مسیر سیستم کولینرژیک باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شماره ثبت ۴۴۲۳۴/ص/۱۳۹۴ مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ بوده است. هم‌چنین نویسندگان مقاله از خانم مهندس عبایی به خاطر همکاری‌های ایشان در انجام این پروژه تحقیقاتی کمال تشکر و قدردانی به عمل می‌آورند.

منابع

[1] Lin PW, Chan WC, Ng BF, Lam LC. Efficacy of aromatherapy (*Lavandula angustifolia*) as an intervention for agitated behaviours in Chinese older persons with

cuneatum in human HepG2 and WRL68 cells line. Asian Pacific journal of tropical medicine 2013; 6: 811-816.

[27] Abu Bakar MF, Ahmad NE, Suleiman M, Rahmat A, Isha A. Garcinia dulcis Fruit Extract Induced Cytotoxicity and Apoptosis in HepG2 Liver Cancer Cell Line. Biomed res int 2015; 2015: 1-10.

[28] Cheng JS, Chou CT, Liu YY, Sun WC, Shieh P, Kuo DH, Kuo CC, Jan CR, Liang WZ. The effect of oleuropein from olive leaf (*Olea europaea*) extract on Ca(2+) homeostasis, cytotoxicity, cell cycle distribution and ROS signaling in HepG2 human hepatoma cells. Food Chem Toxicol 2016; 91: 151-166.

[29] Lehrner J, Marwinski G, Lehr S, Jöhren P, Deecke L. Ambient odors of orange and lavender reduce anxiety and improve mood in a dental office. Physiol Behav 2005; 86: 92-95.

[30] Adersen A, Gauguin B, Gudiksen L, Jäger AK. Screening of plants used in Danish folk medicine to treat memory dysfunction for acetylcholinesterase inhibitory activity. J Ethnopharmacol 2006; 104: 418-422.

[31] Parejo I, Viladomat F, Bastida J, Rosas-Romero A, Flerlage N, Burillo J, Codina C. Comparison between the radical scavenging activity and antioxidant activity of six distilled and nondistilled mediterranean herbs and aromatic plants. J Agric Food Chem 2002; 50: 6882-6890.

[32] Carpinella MC, Androne DG, Ruiz G, Palacios SM. Screening for acetylcholinesterase inhibitory activity in plant extracts from Argentina. Phytother Res 2010; 24: 259-263.

[33] Asaduzzaman M, Uddin MJ, Kader MA, Alam AH, Rahman AA, Rashid M, Kato K, Tanaka T, Takeda M, Sadik G. In vitro acetylcholinesterase inhibitory activity and the antioxidant properties of *Aegle marmelos* leaf extract: implications for the treatment of Alzheimer's disease. Psychogeriatrics 2014; 14: 1-10.

[18] Zali H, Seyyedi SS, Rashidy Pour A, Rezaei Tavirani M. Epidemiology and etiology of Alzheimer's disease. koomesh 2015; 16: 119-127.

[19] He YX, Wu MN, Zhang H, Qi JS. Amyloid beta-protein suppressed nicotinic acetylcholine receptor-mediated currents in acutely isolated rat hippocampal CA1 pyramidal neurons. Synapse 2013; 67: 11-20.

[20] Maatuk N, Samson AO. Modeling the binding mechanism of Alzheimer's Aβ(1-42) to nicotinic acetylcholine receptors based on similarity with snake alpha-neurotoxins. Neurotoxicology 2012; 50: 2243-2248.

[21] Doost mohammad pour J, Hosseinmardi N, Janahmadi M, Ebrahimi S, Fathollahi Y, Motamedi F. Induction of a rat model of Alzheimer's disease by amyloid-β did not change short term synaptic plasticity in CA1 area of hippocampus. koomesh 2014; 16: 76-81.

[22] Winblad B, Engedal K, Soinen H, Verhey F, Waldemar G, Wimo A, Wetterholm AL, Zhang R, Haglund A, Subbiah P. A 1-year, randomized, placebo-controlled study of donepezil in patients with mild to moderate AD. Neurology 2001; 57: 489-495.

[23] Magdesian MH, Nery AA, Martins AH, Juliano MA, Juliano L, Ulrich H, Ferreira ST. Peptide blockers of the inhibition of neuronal nicotinic acetylcholine receptors by amyloid beta. J Biol Chem 2005; 280: 31085-31090.

[24] Forestier A, Douki T, Sauvaigo S, Rosa VD, Demeilliers C, Rachidi W. Alzheimer's disease-associated neurotoxic Peptide amyloid-beta impairs base excision repair in human neuroblastoma cells. Int J Mol Sci 2012; 13: 14766-14787.

[25] Ni R, Marutle A, Nordberg A. Modulation of alpha7 Nicotinic Acetylcholine Receptor and Fibrillar Amyloid-beta Interactions in Alzheimer's Disease Brain. J Alzheimers Dis 2012; 33: 841-851.

[26] Wesam RK, Ghanya AN, Mizaton HH, Ilham M, Aishah A. Assessment of genotoxicity and cytotoxicity of standardized aqueous extract from leaves of *Erythroxylum*

Anti-acetylcholine esterase activity of aqueous extract of *lavandula angustifolia* and its toxicity effect on HepG2 cell line

Masoud Soheili (Ph.D)¹, Mostafa Rezaei Tavirani (Ph.D)², Mahmoud Salami (Ph.D)^{3*}

1- Student Research Committee, Faculty of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2- Proteomics Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3- Physiology Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

(Received: 2 Nov 2015; Accepted: 6 Feb 2017)

Introduction: *Lavandula angustifolia* (lavender) is an aromatic evergreen of laminacea family with some medicinal characteristics. The effect of lavender aqueous extract on improving learning and memory in Alzheimeric model of animals has been proved. Reduced acetylcholine due to increased activity of acetylcholine esterase is one of the main symptoms of Alzheimer's disease. This research was accomplished in order to evaluate the anti-acetylcholine esterase activity of the aqueous extract of lavender. Meanwhile, the toxic effect of the herbal medicine on hepatic HepG2 cell line was considered.

Materials and Methods: The dried flowers of lavender were mixed with boiled water and then evaporated. In this experimental study the acetylcholine esterase inhibitory activity of lavender was assessed using Ellman's colorimetric method in 96 well microplates at 405 nm. Also the toxicity effect of lavender was evaluated on HepG2 cell line.

Results: Comparing the results taken from the treated and untreated solutions showed that the aqueous extract of lavender did not affect efficiently the acetylcholine esterase inhibitory activity. Also the microscopic evaluation of the HepG2 cells indicated no granulation of the treated cells compared with the untreated cells; confirming that the aqueous extract of lavender has no toxic effect on the HepG2 cell line.

Conclusion: The aqueous extract of lavender is not affected impressively the acetylcholine esterase activity and also is not toxic to the hepatic cells.

Keywords: Alzheimer's Disease, *Lavandula angustifolia*, Cytotoxicity, Acetylcholine Esterase

* Corresponding author. Tel: +98 9133612920

salami-m@kaums.ac.ir